



www.hldrwsy.com

موقع دل دروسي هو موقع تعليمي ي العمل على مساعدة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور في تقديم حلول الكتب المدرسية والاختبارات وشرح ال دروس والملخصات والتحاضير وتوزيع المنهج لكل المراحل الدراسية بشكل واضح ومبسط مجاناً بتصفح وعرض مباشر أو نلاين على موقع دل دروسي

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



الأحياء 2-1

السنة الثانية
التعليم الثانوي - نظام المسارات



قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

يُوزع مجانًا وللإيتام

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

طبعة 1447 - 2025

المركز الوطني للمناهج ، ١٤٤٦ هـ

المركز الوطني للمناهج
الأحياء ١-٢ - التعليم الثانوي - السنة الثانية - نظام المسارات.
المركز الوطني للمناهج. - الرياض، ١٤٤٦ هـ
٢٧٥ ص: ٢٧، ٥ × ٢١ سم

رقم الإيداع: ١٤٤٦/١٦٤٨٩
ردمك: ٩٧٨ - ٦٠٣ - ٨٥٣٣ - ٠١ - ٧

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترباتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa



المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يأتي اهتمام المملكة بتطوير المناهج الدراسية وتحديثها من منطلق أحد التزامات رؤية المملكة العربية السعودية (2030) وهو "إعداد مناهج تعليمية متغيرة تركز على الممارسات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية".

ويأتي كتاب أحياء 2 لنظام المسارات في التعليم الثانوي داعماً لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) نحو الاستثمار في التعليم عبر "ضمان حصول كل طالب على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة" بحيث يكون الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية.

وقد جاء تنظيم وبناء محتوى كتاب الطالب بأسلوب مشوق وبطريقة تشجع الطالب على القراءة الوعائية والنشطة، وتسهل عليه بناء أفكاره وتنظيمها، وممارسة العلم كما يمارسه العلماء وبما يعزز أيضاً مبدأ رؤية (2030) "تعلم لنعمـل"، من خلال إتاحة الفرص المتعددة للطالب لممارسة الاستقصاء العلمي بمستوياته المختلفة، المبني والموجـه والمفتوح.

يبدأ كل فصل من فصول الكتاب بالفكرة العامة التي تقدم صورة شاملة لمحتواه. ثم ينفذ الطالب "التجربة الاستهلالية" التي تساعد على تكوين نظرة شاملة عن محتوى الفصل. وتمثل التجربة الاستهلالية أحد أشكال الاستقصاء (المبني)، كما تتيح في نهايتها ممارسة شكل آخر من أشكال الاستقصاء (الموجـه) من خلال سؤال الاستقصاء المطروح. وتتضمن النشاطات التمهيدية للفصل إعداد مطوية تساعد على تلخيص أبرز الأفكار والمفاهيم التي يتناولها الفصل. وهناك أشكال أخرى من النشاطات الاستقصائية التي يمكن تنفيذها في أثناء دراسة المحتوى، ومنها مختبرات تحليل البيانات، أو التجارب العملية السريعة، أو مختبر الأحياء الذي يرد في نهاية كل فصل ويتضمن استقصاءً مفتوحاً في نهايته.

تقسم فصول الكتاب إلى أقسام، يتضمن كل منها في بدايته ربطاً بين المفردات السابقة والمفردات الجديدة، وفكراً رئيساً مرتبطة مع الفكرة العامة للفصل. كما يتضمن القسم أدواتٍ أخرى تساعد على تعزيز فهم المحتوى، منها ربط المحتوى مع واقع الحياة، أو مع العلوم الأخرى، وشرحًا وتفسيرًا للمفردات الجديدة التي تظهر مظللة باللون الأصفر، وأسئلة تعمق معرفة الطالب بمحتوى المقرر واستيعاب المفاهيم والمبادئ العلمية الواردة فيه. ويدعم عرض المحتوى في الكتاب مجموعة من الصور والأشكال والرسوم التوضيحية المختارة والمعدة بعناية لتوضيح المادة العلمية وتعزيز فهم مضمونها. ويتضمن الكتاب مجموعة من الشروح والتفسيرات، تقع في هوامش الكتاب، منها ما يتعلق بالربط بمحاور رؤية (2030) وأهدافها الاستراتيجية، وبالمهن، أو التمييز بين الاستعمال العلمي والاستعمال الشائع لبعض المفردات، وبعضها إرشادات للتعامل مع المطوية التي يعدها الطالب في بداية كل فصل.

المقدمة

وقد وظفت أدوات التقويم الواقعي في التقويم بمراحله وأغراضه المختلفة: القبلي، والتشخيصي، والتکويني (البنائي) والختامي (التجمیعی)؛ إذ يمكن توظیف الصورة الافتتاحیة في كل فصل، والأسئلة المطروحة في التجربة الاستھلالیة بوصفها تقویماً قبلیاً تشخیصیاً لسبر واستكشاف ما یعرفه الطالب عن موضوع الفصل. ومع التقدم في دراسة كل جزء من المحتوى یُطرح سؤالٌ تحت عنوان "ماذا قرأت؟"، وتتجدد تقویماً خاصّاً بكل قسم من أقسام الفصل يتضمن أفكار المحتوى وأسئلةً تساعده على تلمس جوانب التعلم وتعزیزه، وما قد یرغب الطالب في تعلمه في الأقسام اللاحقة. وفي نهاية الفصل یأتي دلیل مراجعة الفصل متضمناً تذکیراً بالفكرة العامة والأفكار الرئیسة والمفردات الخاصة بأقسام الفصل، وخلاصة بالمفاهیم الرئیسة التي وردت في كل قسم. یلي ذلك تقویم الفصل والذي یشمل أسئلة وفقرات متنوعة تستهدف تقویم تعلم الطالب في مجالات عددة، هي: مراجعة المفاهیم، وتبییت المفاهیم الرئیسة، والأسئلة البناییة، والتفكير الناقد، ومهارات الكتابة في علم الأحياء، وأسئلة المستندات المتعلقة بتتائج بعض التقاریر أو البحوث العلمیة، بالإضافة إلى فقرات خاصة بالمراجعة التراكمیة. كما يتضمن الكتاب في نهاية كل فصل اختباراً مقتنناً يتضمن أسئلة وفقرات اختباریة تسهم في إعداد الطالب للاختبارات الوطنية والدولیة، بالإضافة إلى تقویم تحصیلهم في الموضوعات التي سبقت دراستها.

ونسأل الله سبحانه أن یحقق الكتاب الأهداف المرجوّة منه، وأن یوفق الجميع لما فيه خیر الوطن وتقدمه وازدهاره.



قائمة المحتويات

75	ختبر تحليل البيانات 1 - 3
77	3- الطيور
83	تجربة 1 - 3
86	إثراء علمي: الأنواع الدخيلة في البيئة
87	ختبر الأحياء
88	دليل مراجعة الفصل
89	تقويم الفصل

الفصل 4

94	الثدييات
95	تجربة استهلاكية
96	4-1 خصائص الثدييات
102	تجربة 1 - 4
107	4-2 تنوع الثدييات
114	ختبر تحليل البيانات 1-4
115	إثراء علمي: الكلاب المدربة المساعدة
116	ختبر الأحياء
117	دليل مراجعة الفصل
118	تقويم الفصل

الفصل 5

122	مقدمة في النباتات
123	تجربة استهلاكية
124	5-1 النباتات اللاوعائية
127	ختبر تحليل البيانات 5-1
129	5-2 النباتات الوعائية اللابذرية
133	5-3 النباتات الوعائية البذرية
137	تجربة 5-1
140	إثراء علمي: علم حبوب اللقاح الجنائي
141	ختبر الأحياء
142	دليل مراجعة الفصل
143	تقويم الفصل

دليل الطالب

7	كيف تستفيد من كتاب الأحياء؟
---	-----------------------------

الفصل 1

10	شوكيات الجلد واللافقاريات الحبلية
11	تجربة استهلاكية
12	1-1: خصائص شوكيات الجلد
13	تجربة 1-1:
21	ختبر تحليل البيانات 1-1
22	2-1: اللافقاريات الحبلية
27	إثراء علمي: شوكيات الجلد تساعد على البحث الطبي
28	ختبر الأحياء
29	دليل مراجعة الفصل
30	تقويم الفصل

الفصل 2

34	الأسماك والبرمائيات
35	تجربة استهلاكية
36	1-2 الأسماك
39	تجربة 1-2
49	2-2 البرمائيات
52	ختبر تحليل البيانات 1- 2
57	إثراء علمي: تشوهات خلقية في الضفادع
58	ختبر الأحياء
59	دليل مراجعة الفصل
60	تقويم الفصل

الفصل 3

66	الزواحف والطيور
67	نشاط استهلاكي
68	1-3 الزواحف

الفصل 9

234	الطاقة الخلوية
235	تجربة استهلاكية
236	9-1 كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة؟
238	تجربة 9-1
241	9-2 البناء الضوئي
243	تجربة 9-2
249	9-3 التنفس الخلوي
254	مختبر تحليل البيانات 9-1
256	إثراء علمي: البناء الضوئي الاصطناعي
257	مختبر الأحياء
258	دليل مراجعة الفصل
259	تقويم الفصل

مراجعات الطالب

266	المصطلحات
-----------	-----------

الفصل 6

148	تركيب النبات ووظائف أجزائه
149	تجربة استهلاكية
150	6-1 خلايا النبات وأنسجتها
152	تجربة 6-1
158	6-2 هرمونات النباتات واستجاباتها
160	تجربة 6-2
163	إثراء علمي: النباتات ودفاعاتها
164	مختبر الأحياء
165	دليل مراجعة الفصل
166	تقويم الفصل

الفصل 7

172	التكاثر في النباتات الزهرية
173	تجربة استهلاكية
174	7-1 الأزهار
179	تجربة 7-1
181	7-2 النباتات الزهرية
186	مختبر تحليل البيانات 7-1
188	إثراء علمي: النباتات المعدلة وراثياً (جينياً)
189	مختبر الأحياء
190	دليل مراجعة الفصل
191	تقويم الفصل

الفصل 8

196	تركيب الخلية ووظائفها
197	تجربة استهلاكية
198	8-1 التراكيب الخلوية والعضيات
203	مختبر تحليل البيانات 8-1
207	مختبر تحليل البيانات 8-2
215	8-2 كيمياء الخلية
218	مختبر تحليل البيانات 8-3
223	إثراء علمي: استكشاف تقنية النانو
224	مختبر الأحياء
225	دليل مراجعة الفصل
226	تقويم الفصل



كيف تستفيد من كتاب الأحياء؟

هذا الكتاب ليس كتاب ثقافة عامة، بل كتاباً علمياً يصف مخلوقات حية، وعمليات حيوية، وتطبيقات تقنية. لذا فأنت تقرؤه لتحصيل العلم.
وفيما يأتي بعض الأفكار والإرشادات التي تساعدك على قراءته.

قبل أن تقرأ

اقرأ كلاً من الفكرة العامة و الفكرة الرئيسية قبل قراءة الفصل أو في أثنائه؛ فهما تزودانك بنظرة عامة تمهدية لهذا الفصل.

لكل فصل فكرة عامة تقدم صورة شاملة عنه. ولكل موضوع من موضوعاته تدعم فكرته العامة.



طرق أخرى للمراجعة

- ٢٠ اقرأ عنوان الفصل لتتعرفّ على موضوعاته.
 - ١٩ تصفح الصور والرسوم والجداول.
 - ١٨ أبحث عن المفردات البارزة المظللة باللون الأصفر.
 - ١٧ اعمل مخططاً للفصل باستخدام العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية.

كيف تستفيد من كتاب الأحياء؟

عندما تقرأ

نـيـ كل جـزـءـ من الفـصـلـ سـتـجـدـ أـسـالـيبـ لـتـعـمـيقـ فـهـمـكـ
لـمـوـضـوـعـاتـ الـتـيـ سـتـدـرـسـهـاـ،ـ وـاـخـبـارـ مـدـىـ اـسـتـيـعـابـكـ لـهـاـ.

الربط مع الحياة: يصف ارتباط المحتوى مع حياتك.

تجاهيل المغيرات لشوكات الجليل حلباً عصبية حسية حرفة مخاوفة
يُقدّم بحسب اهتمامها المختلطة، وعمومًا حالات حساسية تحيط بالفهم
عات الحال العصبية تصل إلى ملحوظ الحسّ المفرط في المخ، تتوجّب
الانتباه إلى المخالب العصبية المفتوحة، وأنواع المخالب الأخرى، مما يجعل
الشخص يُدرك على الأهميات الظرفية لتجاهيل المخ، إثباتاته
واساً، ولذلك، على الأجهزة المخالية المحسّنة لتجاهيل المخ، عينيه، وهي
مجموعة من الحالات الحساسة المفتوحة، الشكل ١-٥، وتلك من شوكيات
ملء تدريجي للإحساس في الأجزاء الحساسية، فتجاهيل المخ لا يعود إلى وضعه
الجسدي، بل ينبع بحسب الاعتراض أو الآثار.

حركة تتبع طرقة الحركة في شركيات الجلد بحسب أشكال الجسم،
وهي تكتب كـ **كـ** حيث يكتب الكلمة بالحروف اللاتينية في بداية الكلمة، ثم يليها حركة الحرف في الكلمة.
حركة هي حركة العصافير المتماثلة في الهيكل الداخلي لشركيات الحركة،
وكذلك في كل من الحركة **رسولون**. وتحتاج نجم الحرف اليهبي إلى إدخال الرسوبات
لتحقيق التماثل في الحركة. **رسوبات** زادت الرغبة تحويلة على خط النطاق الفوري، أو
الرسوبات **رسوبات** مع حركة إلزامية إلى أعلى وأسفل. وتعد **رسوبات**
رسوبات **رسوبات** في الحركة التي تأتي من الأعلى، بينما يتحرك نجم الحرف
رسوبات **رسوبات** في الحركة التي تأتي من الأسفل، بينما يتحرك نجم الحرف
رسوبات **رسوبات** في الحركة التي تأتي من الأعلى، بينما يتحرك نجم الحرف
رسوبات **رسوبات** في الحركة التي تأتي من الأسفل، بينما يتحرك نجم الحرف

ماذا قرأت؟ لـ خضر الطاطة، التي تستعملها شركات المجلد في الحركة؟



ما الصناعات التي تتعذر شموليتها
المجلد من البناء في البيئة؟

شكل 6-1 يحذّر الحمر احدى
زرعه، وهي عملية قد تستمر عاًماً.
كيف تساعد عملية زراعة أعضاء الجسم
في إزالة بكتيريا الماء؟

شكل 6-1 يجدد نجم البحر احدى
ذراعيه، وهي عملية قد تستغرق عاماً.
ج. كيف تساعد عملية تجديد اعضاء الجسم
يات الحدال على الشفاء؟

1-1

الشكل 1 - شوكيات الجلد حيوانات بحرية، وهي أول الحيوانات التي لها فم ثانوي وهيكلا داخلي:



1

ماذا قرأت؟ أسئلة تقوّم مدى فهمك لما درسته.

مهارات قرائية

- أسأل نفسك: ما الفكرة العامة؟ وما الفكرة الرئيسية؟
 - فكّر في المخلوقات الحية والمواصفات التي مررت بها، هل هناك علاقة بينها وبين دراستك لمادة الأحياء؟
 - اربط معلومات مادة الأحياء التي درستها مع المجالات العلمية الأخرى.
 - توقع نتائجك من خلال توظيف المعلومات التي لديك.
 - غذّي به فعاتك حينما تقأ معلمات جديدة.

كيف تستفيد من كتاب الأحياء؟

بعد ما قرأت

قرأ الخلاصة، وأجب عن الأسئلة؛ لتقدير مدى فهمك لما درسته.



يتضمن كل جزء في الفصل أسئلة وخلاصة؛ حيث تقدم الخلاصة، مراجعة المفاهيم الرئيسية، في حين تخbir الأسئلة فهمك لما درسته.

ستجد في نهاية كل فصل دليلاً للمراجعة تتضمن المفردات والمفاهيم الرئيسية. ستعمل هذا الدليل للمراجعة وللتأكيد من مدي استيعابك.

طريق آخر للمراجعة

- حدد الفكرة (العامة) .
 - اربط الفكرة الرئيسية بالفكرة العامة .
 - استخدم كلماتك الخاصة لتوضيح ما قرأت.
 - وظف المعلومات التي تعلمتها في المنزل، أو في موضوعات أخرى تدرسها.
 - حدد المصادر التي يمكن أن تستخدمها في البحث عن لمزيد من المعلومات حول الموضوع.



شوكيات الجلد واللافقاريات الحبلية

Echinoderms and invertebrate chordates

1



الفكرة العامة لشوكيات الجلد واللافقاريات الحبلية صفات تربطها مع الحبليات.

1-1 خصائص شوكيات الجلد


الفكرة الرئيسية شوكيات الجلد هي أنواع بحرية لها هيكل داخلي بأشواك وجهاز وعائي مائي وأقدام أنبوبية، ولأفرادها البالغة تناظر شعاعي.

1-2 اللافقاريات الحبلية

الفكرة الرئيسية اللافقاريات الحبلية لها صفات تربطها مع الفقاريات الحبلية.

حقائق في علم الأحياء


- تستطيع ذراع واحدة من نجم البحر ذي الأشواك أن يلتهم ما بين $2-6 \text{ m}^2$ من المرجان كل عام.
- أذرع نجم البحر تحتوي على أشواك مغطاة بجلد مملوء بالسم.
- يحمي خيار البحر نفسه عن طريق تغيير قوام جسمه من حالة شبه سائلة إلى حالة صلبة ثم يعود إلى وضعه الطبيعي.




نشاطات تمهيدية

وصف اللافقاريات الحبلية اعمل المطوية الآتية لمساعدتك على فهم الصفات الجسمية التي تربط اللافقاريات الحبلية مع الفقاريات الحبلية.


الخطوة 1 رتب ثلاث ورقات بعضها فرق بعض على أن تفصل كل واحدة عن التي تليها مسافة 1.5 cm طولياً، وحافظ على مستوى حافة كل ورقة كما في الشكل الآتي:



الخطوة 2 انثنِ الطرف السفلي للورقة لتحصل على ألسنة (أشرطة) كما في الشكل الآتي:



الخطوة 3 انثنِ الأوراق جيداً وثبت الألسنة في مكانها باستعمال مكبس دبابيس على طول الثنية، أدر الورقة بحيث تصبح الثنية في الأعلى، ثم رقم كل سطح كما هو مبين في الشكل الآتي:



المطويات استعمل هذه المطوية في القسم 2-1. سجل وأنت تقرأ هذا الجزء معلوماتك المتعلقة بالصفات الجسمية للافقاريات الحبلية التي ترتبطها مع الفقاريات الحبلية.

المطويات

منظمات الأفكار

تجربة استعمالية

ما أهمية الأقدام الأنبوية؟

ذراع نجم البحر التي في صورة مقدمة الفصل مثل جميع شوكيات الجلد، له تراكيب تُسمى الأقدام الأنبوية. وستلاحظ في هذه التجربة الأقدام الأنبوية وتحدد وظائفها.

خطوات العمل

- املاً بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
- ضع نجم البحر في طبق بتري مملوء بماء من مربى مائي به مياه بحر مالحة.
- تنبيه: عامل نجم البحر برفق.
- لاحظ الجهة السفلية لنجم البحر مستعملاً المجهر التشريحي. انظر إلى صفوف الأقدام الأنبوية التي تمتد على طول كل ذراع، وارسم التراكيب.
- المس بلطف طرف القدم الأنبوية بقبضيب زجاجي. وسجل ملاحظاتك.
- أعد نجم البحر إلى المربى المائي.

التحليل:

- صف تراكيب القدم الأنبوية لنجم البحر.
- استنتج. بناءً على ملاحظاتك، ما وظيفة القدم الأنبوية في شوكيات الجلد؟

الأهداف

• تلخص الصفات العامة لشوكيات الجلد.

• تقوم كيف مكّن الجهاز الوعائي المائي والأقدام الأنويةي شوكيات الجلد من البقاء.

• تميّز بين طائف شوكيات الجلد.

مراجعة المفردات

المهيكل الداخلي يوفر الهيكل الداخلي الدعامة والحماية، ويعمل نقطة ارتكاز لانقباض العضلات.

المفردات الجديدة

اللواقط القدمية

الجهاز الوعائي المائي

المصفاة

القدم الأنوية

الحوصلة العضلية

خصائص شوكيات الجلد

Echinoderm Characteristics

الفقرة الرئيسية شوكيات الجلد هي حيوانات بحرية لها هيكل داخلي بأشواك وجهاز وعائي مائي وأقدام أنوية، ولأفرادها البالغة تناظر شعاعي.

الربط مع الحياة لقياس ضغط الدم يمر الهواء في جهاز قياس ضغط الدم عبر أنبوب يوصله إلى رباط يُلف حول الذراع ويبقى مشدوداً حتى تحرير الهواء منه وطرده إلى الخارج. تستعمل بعض الحيوانات -شوكيات الجلد- المبدأ نفسه لتنفس وتحصل على غذائها.

شوكيات الجلد ثانوية الفم

Echinoderms are Deuterostomes


الرخويات والديدان الحلقي والفصيليات التي درستها في مقرر أحياء 1 حيوانات بدائية الفم.


شوكيات الجلد حيوانات ثانوية الفم، وهذا تحول أساسي في العلاقات بين الحيوانات. لاحظ تفرع المخطط عند نقطة ثانوية الفم، الشكل 1-1.

يتكون الفم في بدائية الفم من فتحة الجاستروولا، في حين يتكون الفم في ثانوية الفم من مكان آخر في الجاستروولا، كما في شوكيات الجلد والحبليات. جميع شوكيات الجلد حيوانات بحرية، وهي تضم 6000 نوع، منها نجم البحر وقنفذ البحر وخيار البحر ونجم البحر الهش وزنابق البحر ونجم البحر الرئيسي واللؤلؤية البحرية. ويظهر الشكل 1-1 نوعين من شوكيات الجلد.



■ **الشكل 1-1** شوكيات الجلد حيوانات بحرية، وهي أول الحيوانات التي لها فم ثانوي وهيكل داخلي.





نجم البحر الهاش البالغ
يرقة نجم البحر الهاش

■ **الشكل 2-1** يرقة نجم البحر الهاش تناظر جانبي. ويمكن أن تُقسم على طول محور واحد إلى قسمين متباينين كُلّ منهما صورة للأخر. نجم البحر الهاش البالغ ذو تناظر شعاعي، ويمكن تقسيمه عبر المحور المركزي وعبر أي محور إلى أنصاف متماثلة.

تركيب الجسم Body structure

من شوكيات الجلد نجم البحر الهاش، الذي له هيكل داخلي شوكي. وهي صفات مميزة لهذا المخلوق ضمن هذه الشعبة. شوكيات الجلد هي أول مجموعة من الحيوانات في السلم التصنيفي التي لها هيكل داخلي. وشوكيات الجلد حيوانات معقدة التركيب ذات تناظر شعاعي في مرحلة البلوغ، **الشكل 2-1**. يتكون الهيكل الداخلي فيها من صفائح من كربونات الكالسيوم، وغالباً ما تتصل به أشواك، ويعطى بطبقة رقيقة من الجلد. يوجد على الجلد **لواقط قدمية pedicellariae** صغيرة تساعد على الإمساك بالغذاء، وعلى إزالة المواد الغريبة عن الجلد.

جميع شوكيات الجلد لها تناظر شعاعي في مرحلة البلوغ، **الشكل 2-1**. ويمكنك ملاحظة هذه الخاصية بوجود الأذرع الخمس مرتبة حول قرص مركزي. كما أن ليرة نجم البحر تناهراً جانبياً. ابحث في صفات شوكيات الجلد في التجربة 1-1.

ماذا قرأت؟ استنتج أهمية التناظر الشعاعي للحيوانات التي لا تستطيع الحركة بسرعة.

تجربة 1-1

لاحظ تشريح شوكيات الجلد

ما صفات شوكيات الجلد؟ جميع شوكيات الجلد صفات عامة رغم أن لها أشكالاً وأحجاماً مختلفة.

خطوات العمل


1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. ادرس عينات محفوظة لخيار البحر، ونجم البحر، وقنفذ البحر.
3. اعمل جدول بيانات لتسجيل ملاحظاتك. وأكمل الجدول بكتابية وصف للصفات الرئيسية لكل عينة. وضمن ذلك رسماً تخطيطياً.
4. اكتب أسماء التراكيب الخارجية التي تستطيع تعريفها.
5. نظف جميع أدواتك، وأعدها إلى المكان المناسب، واغسل يديك جيداً بعد حملك للعينات المحفوظة.

التحليل:

1. قارن بين الصفات الخارجية لشوكيات الجلد التي درستها. وبناءً على ملاحظاتك، لماذا تم تصنيف هذه المخلوقات الثلاثة ضمن الشعبة نفسها؟ ووضح ذلك.
2. لاحظ واستنتج. ما الصفات الأكثر أهمية التي تساعد شوكيات الجلد على تجنب الاقتراس؟

Echinoderm

الشكل 3-1 يمكن أن يوجد قنفذ البحر في مناطق المد والجزر، وهو يختبئ بين شقوق الصخور، وقادر على كشط الطحالب بواسطة تركيب خاصي الصفائح للفم يسمى مصباح أسطو. تخيل أن هذه الصفائح تشبه الأسنان التي تتحرك.





■ **الشكل 4-1** يستعمل نجم البحر أقدامه الأنبوية لفتح صدفيتي المحار. **صف** طريقة تغذّي نجم البحر.

تجربة استهلاكية

مراجعة بناءً على ما قرأته حول الأقدام الأنبوية، كيف يمكنك الإجابة الآن عن أسئلة التحليل؟

النظام الوعائي المائي تتميز شوكيات الجلد أيضًا بوجود **الجهاز الوعائي المائي** water vascular system، وهو نظام يتكون من أنابيب مغلقة مملوءة بسائل، تعمل معًا لتمكّن الحيوان من الحركة والحصول على الغذاء. للجهاز الوعائي المائي فتحة تسمى **المصفاة** madreporite. يندفع الماء في اتجاه المصفاة، وينتقل عبر قناة حجرية إلى القناة الحلقة، ثم إلى قناة شعاعية - قناة تفرع إلى جميع الأذرع - ليتهي في القدم الأنبوية، **الشكل 3-1**.

الأقدام الأنبوية tube Feet أنابيب صغيرة وعضلية تمتد بالسائل، وتنتهي بمص قرسي يشبه الفنجان يُستعمل في الحركة وجمع الغذاء والتنفس. يوجد على نهاية الطرف الداخلي الموازي للقدم الأنبوية كيس عضلي يسمى **الحوبيصلات العضلية** ampulla. عندما تنقبض الحوبيصلات العضلية يندفع الماء إلى القدم الأنبوية فتتمدد. ويوجد في نهاية القدم الأنبوية ممتص قرسي يساعد على التصاق الحيوان بالسطح. يساعد الشفط المائي جميع شوكيات الجلد على الحركة، ويعطي بعض شوكيات الجلد، ومنها نجم البحر القوة الكافية اللازمة لفتح مصراعي المحار، **الشكل 4-1**.

التغذّي والهضم تستعمل شوكيات الجلد طرائق تغذّي متنوعة، بالإضافة إلى الأقدام الأنبوية؛ فالزنابق البحرية ونجم البحر الرئيسي تمد أذرعها للإمساك بالغذاء، وتفترس نجوم البحر أنواعاً كثيرة من الرخويات والمرجان ولافاريات أخرى. كثير من أنواع نجم البحر تستطيع قذف معدتها خارج الفم إلى الفريسة، ثم تفرز إنزيمات لهضم الغذاء، ثم تستعمل الأهداب لجلب المواد المهمضومة إلى أفواهها. نجم البحر الهش مفترس نشط أو حيوان كانس يقتات على الفضلات، ويستطيع الإمساك بالمواد العضوية بواسطة مخاط على أذرعه. وكثير من القنافذ البحرية تستعمل صفائح شبيهة بالأنسان، **الشكل 3-1**، لکشط الطحالب عن السطوح، أو تتغذى على حيوانات أخرى. ويمد العديد من خيار البحر لوماسه المتفرعة والمغطاة بالمخاط للإمساك بالغذاء الطافي.

التنفس والدوران والإخراج تستعمل شوكيات الجلد أقدامها الأنبوية للتنفس؛ إذ ينتشر الأكسجين من الماء عبر أغشية الجسم الرقيقة للأقدام الأنبوية. بعض شوكيات الجلد ينتشر فيها الأكسجين عبر جميع أغشية الجسم الملاصقة للماء. ولبعضها الآخر خياشيم ذات جدر جلدي رقيقة (تجاويف صغيرة تمتد من الجسم). ولخيار البحر أنابيب متفرعة تسمى الشجرة التنفسية، يمر خلالها الماء، ومنها ينتقل الأكسجين المذاب في الماء إلى الجسم. تحدث الدورة الدموية في التجويف الجسمي والجهاز الوعائي المائي، في حين يحدث إخراج الفضلات الخلوية بالانتشار عبر أنسجة الجسم الرقيقة. تحرّك أهداب الأقدام الأنبوية الماء وسوائل الجسم عبر أجهزة الجسم المختلفة لإخراج الفضلات في بعض شوكيات الجلد. وعلى الرغم من بساطة هذه الأعضاء والأجهزة فشوكيات الجلد قادرة على حفظ الاتزان الداخلي لأجسامها بشكل فعال، بالإضافة إلى وجود تكيفات تناسب طريقة معيشتها.

ماذا قرأت؟ لخص وظائف الأقدام الأنبوية في شوكيات الجلد.




الاستجابة للمثيرات لشوكيات الجلد خلايا عصبية حسية حركة متفاوتة التعقّيد بحسب أنواعها المختلفة. وعموماً هناك حلقة عصبية تحيط بالفم مع تفرعات للحجال العصبية تتصل مع مناطق الجسم الأخرى جميعها. تستجيب الخلايا الحسية العصبية للمس، وللمواد الكيميائية المذابة في الماء، ولتيارات الماء، وللضوء. يوجد على النهايات الطرفية لنجم البحر بقع عينية، وهي مجموعة من الخلايا الحساسة للضوء، الشكل 5-1. وكثير من شوكيات الجلد تستطيع الإحساس في اتجاه الجاذبية؛ فنجم البحر مثلاً يعود إلى وضعه الطبيعي بعدما ينقلب بفعل الأمواج أو التيارات.

الحركة تنوع طريقة الحركة في شوكيات الجلد بحسب أشكال الجسم؛ فتركيب الهيكل الداخلي مهم في تحديد نوع الحركة التي يستطيع القيام بها. إن حركة الصفائح العظمية المتحركة في الهيكل الداخلي لشوكيات الجلد تمكنها من الحركة بسهولة. ويتحرك نجم البحر الرئيسي بإمساك الرسوبيات الناعمة في قاع المحيط بواسطة زوائد طويلة نحيلة على السطح السفلي، أو بواسطة السباحة مع تحريك أذرعه إلى أعلى وإلى أسفل. ويستعمل نجم البحر الهش أقدامه الأنبوية وأذرعه للزحف كالأفعى. بينما يتحرك نجم البحر مستعملاً أقدامه الأنبوية، ويحفر بأشواكه المتحركة. بينما يزحف خيار البحر مستعملاً أقدامه الأنبوية وعضلات جدار الجسم.

✓ **ماذا قرأت؟** لخصل الطائق التي تستعملها شوكيات الجلد في الحركة؟

التكاثر والنمو تتكاثر أغلب شوكيات الجلد جنسياً عن طريق الإخصاب الخارجي؛ حيث تضع الأنثى البيض، ويقوم الذكر بإفراز الحيوانات المنوية في الماء، ثم يحدث الإخصاب. وتتنمو البيضة المخصبة إلى يرقة تسبح بحرية. وهي ذات تناقض جانبي. وبعد مرور اليرقة بعدة مراحل من التغيرات تنمو إلى حيوان بالغ له تناقض شعاعي.

يوضح الشكل 6-1 تجديد (إعادة تكوين) الجزء المفقود في نجم البحر. الكثير من شوكيات الجلد -ومنها نجم البحر الهش- تستطيع التخلص من أحد أذرعها عندما يهاجمها مفترس، وببعضها الآخر -ومنه خيار البحر- قادر على إخراج جزء من الأعضاء الداخلية عندما يتعرض للخطر، مما يمكنه من الهروب مسبباً تشويشاً وإرباكاً للمفترس. ومن الممكن أن تتجدد جميع أجزاء الجسم التي فقدت.



بقعة عينية

■ **الشكل 5-1** يرفع نجم البحر نهاية ذراعه للإحساس بالضوء والحركة.




جريدة
علمية

ما الصفات التي تمكن شوكيات
الجلد من البقاء في البيئة؟

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة مبنى الإثرائية



■ **الشكل 6-1** يجدد نجم البحر إحدى أذرعه، وهي عملية قد تستمر عاماً. **وضح**. كيف تساعد عملية تجدد أعضاء الجسم شوكيات الجلد على البقاء؟

طوانف شوكيات الجلد						الجدول 1-1
اللؤلئيات	القثائيات	الزنبقيات	القنفذيات	الشعبيات	النجميات	الطاقة
						أمثلة
اللؤلئية البحرية (أقحوان البحر)	خيار البحر	زنابق البحر نجم البحر الرئيسي	قنفذ البحر، دواه الرمل	نجم البحر الهش	نجم البحر	أمثلة
<ul style="list-style-type: none"> • قطره أقل من cm . • شكله يشبه ثمرة الخيار. • لا أذرع لها. • توجد الأقدام الأنبوية حول قرص مركزي. 	<ul style="list-style-type: none"> • جالسة في بعض فترات حياتها. • الجسم مغطى بطبقة جلدية. • تحورت الأقدام الأنبوية إلى لوامس قرب الفم. 	<ul style="list-style-type: none"> • بعض زنابق البحر ساق طويلة. • نجم البحر الرئيسي أذرع طويلة متشعبة. 	<ul style="list-style-type: none"> • الجسم مغطى بهيكل داخلي مع أشواك. • يحفر قنفذ البحر في المناطق الصخرية. • يحفر دواه البحر في الرمل. 	<ul style="list-style-type: none"> • يحفر نجم البحر الهش في التربة. • تتحرك بحركة أذرعها. • لا تحتوي الأقدام الأنبوية على مص كأسى. 	<ul style="list-style-type: none"> • خمس أذرع غالباً. • تتكسر الأذرع بسهولة ويمكن تجدها. • تتحدى الأذرع. 	<ul style="list-style-type: none"> • أقدام أنبوية تستعمل للتغذى والحركة.

Echinoderm Diversity تنوع شوكيات الجلد

تشتمل الطوانف الرئيسية لشوكيات الجلد على كل من: النجميات ومنها نجم البحر، والشعبيات ومنها نجم البحر الهش، والقنفذيات ومنها قنفذ البحر ودواه الرمل، والزنبقيات ومنها زنابق البحر ونجم البحر الرئيسي، والقثائيات ومنها خيار البحر، واللؤلئيات ومنها اللؤلئية البحرية. انظر الجدول 1-1.

الشكل 7-1 قد يكون نجم البحر عشرون ذراعاً أو أكثر.



نجم البحر Sea Star لعلك شاهدت أحد شوكيات الجلد. إن أغلب أنواع نجم البحر لها خمس أذرع مرتبة حول قرص مركزي. وببعضها له ما يزيد على خمس أذرع، كما في الشكل 7-1. قد يوجد نجم البحر في مناطق المياه الضحلة قرب الشواطئ، أو في المياه المتبقية بعد الجزر، ويمكن أن يوجد في مجتمعات متتصقة بالصخور بواسطة أقدامها الأنبوية. تولد القدم الأنبوية الواحدة قوة سحب تعادل $N = 0.25 - 0.3$ ، ولأن نجم البحر قد يكون له ما يقارب 2000 قدم أنبوية، فهو يستطيع توليد قوة كبيرة ضرورية لفتح أصداف الرخويات، أو الزحف للبحث عن الغذاء. تشكل نجوم البحر مفترسات مهمة في النظام البيئي البحري؛ إذ تتغذى على المحار، وغيره من ذات المصارعين. ولا يشكل نجم البحر غذاءً لأي مفترس بحري؛ بسبب جلده الشوكي.

نجم البحر الهش **Brittle Star** لمعظم نجوم البحر الهشة - كما في نجم البحر - خمس أذرع نحيلة ومرنة جداً، **الشكل 8 - 1**. وهي تفتقر إلى ممتصات على أقدامها الأنبوية، ولهذا لا تستعملها في الحركة كما يفعل نجم البحر. تتحرك نجوم البحر الهشة بالتجديف ب أجسامها فوق القاع الصخري أو الرسوبي، أو تحريك أذرعها بحركة تشبه حركة الثعابين. يتخفى نجم البحر الهش في الشقوق الصخرية في أثناء النهار ويتجاذب خلال الليل على دقائق صغيرة معلقة في الماء، أو تلتقط المواد العالقة عن طريق أشرطة مخاطية لاصقة بين أشواكها . تستجيب بعض نجوم البحر الهشة للضوء، ونجوم البحر الهشة واسعة الانتشار، ولها أنواع يفوق عددها أي طائفة من شوكيات الجلد.



■ **الشكل 8 - 1** السلسلة النجمية نوع من أنواع نجم البحر الهش، تقدر أذرعها المتشعبية نحو التيارات لترشيح الغذاء.

حل كيف تختلف نجوم البحر الهشة عن نجوم البحر؟

قنفذ البحر ودولار الرمل **sea urchin and sand dollar** الاختباء هو الصفة الرئيسية لكل من قنفذ البحر ودولار الرمل. ولشوكيات الجلد هذه جسم مضغوط محاط بهيكل داخلي يُسمى القشرة، تتكون من صفائح متلاصقة ومرتبة من كربونات الكالسيوم، وهي تشبه الصدفة؛ حيث تمتد الأقدام الأنبوية عبر ثقوب في القشرة. يفترق قنفذ البحر ودولار الرمل إلى الأذرع، وتقابل القشرة فيها نظام الأذرع الخماسي الموجود في نجم البحر ونجوم البحر الهش. وجود الأشواك صفة أساسية في هذه الطائفة، **الشكل 9 - 1** . تحوي بعض أشواك ولواقط قنفذ البحر سموماً تنتهي بها خطط الافتراض. يمكن أن يسبب السم الموجود في اللواقط شللاً للفريسة. وقد يكون قنفذ البحر حيواناً آكلًا للنبات، يكشف الطحالب عن الصخور، في حين يرشح دولار الرمل الدقائق العضوية من الرمل الذي يكون مدفوناً فيه.




دولار الرمل



قنفذ البحر

■ **الشكل 9 - 1** تختبئ قنافذ البحر في الشقوق الصخرية، ولها أشواك حادة متجردة. ويخفي دولار الرمل في الرمل، حيث ترشح أجزاء الغذاء الصغيرة.



■ **الشكل 10-1** لقند البحر فم بخمسة أجزاء تشبه هذا المصباح، وقوه قضم كبيرة بحيث يستطيع قضم الأسمنت.

مصباح أرسسطو، مصباح بخمسة أوجه

الربط التاريخ لمعظم قناذل البحر أجهزة للمضبغ موجودة داخل أفواهها، ويكون كل منها من خمس صفائح تشبه الأسنان، ويسمى هذا الشكل مصباح أرسسطو، الشكل 10-1. وقد سُمي بهذا الاسم نسبة إلى العالم اليوناني أرسسطو الذي وصفه في كتابه (تاريخ الحيوانات) في القرن الرابع قبل الميلاد؛ حيث استعمل الناس آنذاك مصباحاً بخمسة أوجه شفافة. اعتقاد أرسسطو أن شكل فم قند البحر يشبه هذا المصباح.

زنابق البحر ونجم البحر الرئيسي Sea Lilies and Feather Star يختلفان عن بقية شوكيات الجلد في أنهما حيوانان جالسان (ثابتان) في جزء من حياتهما. لأجسام زنابق البحر شكل زهرى محمول على ساق طويلة، في حين تكون أذرع نجم البحر الرئيسي طويلة وممتدة إلى أعلى ومتفرعة من منطقة مركزية، الشكل 11-1. ويتناول كلاهما الغذاء بمد الأقدام الأنبوية والأذرع في الماء، ليتقطن الماء العضوية العالقة فيه.

ماذا قرأت؟ لخُص أوجه التشابه بين كل من نجم البحر الرئيسي وزنابق البحر؟



نجم البحر الرئيسي



زنابق البحر

■ **الشكل 11-1** يظهر جسم الزنابق البحرية في صورة زهرة على قمة ساق طويلة. أما نجم البحر الرئيسي فيمد أذرعه من نقطة مركزية. استنتاج كيف تكيف شكل الذراع في نجم البحر الرئيسي لنمط حياة قليلة الحركة؟

خيار البحر Sea Cucumber خيار البحر لا يشبه شوكيات الجلد الأخرى. بعض الناس يقولون إنه لا يشبه الحيوانات أبداً. هل تعرف لماذا يُسمى خيار البحر بهذا الاسم؟ تتحرك أجسام خيار البحر الطويلة ببطء بأقدام أنبوية تساعد على انقباضات جدار الجسم العضلي، فاختزل حجم صفائح كربونات الكالسيوم فيه، بحيث لا يتصل بعضها ببعض، كما في سائر شوكيات الجلد. لذا فإن السطح الخارجي لأجسامها عادة ما يظهر جلدياً (لينا). تحورت بعض الأقدام الأنبوية لتكون لوامس تتمدد حول أفواهها للإمساك بجزيئات الغذاء العالقة، الشكل 12-1. تُعطي اللوامس بالمخاط، مما يزيد من قدرتها على الإمساك بالغذاء، وعند التصاق الغذاء باللوامس ينتقل إلى الفم حيث يتم امتصاصه، وتشبه هذه العملية لعق الإصبع.

خيار البحر الوحيد من شوكيات الجلد الذي له أعضاء تنفس على شكل شجرة تنفسية، حيث تضخ أنابيبها المتفرعة ماء البحر إلى الداخل عبر الشرج ليستخلص الأكسجين. تقوم الشجرة التنفسية أيضاً بعملية الإخراج، بالتخلص من الفضلات الخلوية. ومن المهم أن نذكر أن خيار البحر قادر على حفظ الاتزان الداخلي لجسمه، بوجود أعضاء تتناسب مع طريقة معيشته في بيئات محددة.

اللؤلؤية البحرية (أقحوان البحر) Sea daisies

اكتشفت عام 1986م قبلة شواطئ نيوزلندا، ومن الصعب تصنيف اللؤلؤية البحرية ودراساتها؛ لقلة ما وجد منها. قطرها أقل من 1 cm، وشكلها قرصي دون أذرع، وتوجد الأقدام الأنبوية حول طرف القرص المركزي. وبين الشكل 1-13 أن لها نظاماً خماسياً وتناظراً شعاعياً مثل سائر شوكيات الجلد. لاحظ انتظام نمط الأقدام الأنبوية حول طرف القرص.

ماذا قرأت؟ استنتاج الصفات التي أدت إلى تصنيف اللؤلؤية البحرية
ضمن شوكيات الجلد.

أهمية شوكيات الجلد Importance of Echinoderms

يشكل خيار البحر وقنفذ البحر مصدر غذاء لسكان بعض البلدان الآسيوية، فتؤكل بعض عضلات خيار البحر. ويضاف خيار البحر المجفف لإعطاء نكهة للحساء والخضروات واللحم، و يؤكل ييض قنافذ البحر مطبوخاً أو نيئة. هناك علاقة تعايش بين بعض شوكيات الجلد والحيوانات البحرية الأخرى؛ إذ يستفيد مخلوق حي واحد من هذه العلاقة، في حين لا يستفيد المخلوق الآخر ولا يتضرر. بعض أنواع نجم البحر الهش مثلًا تعيش داخل الإسفنج، ويترك النجم الهش المكان الداخلي الآمن في الإسفنج ليتعذى على المواد التي تربست على الإسفنج واستقرت.

فوائد شوكيات الجلد يعتمد النظام البيئي البحري على بعض شوكيات الجلد. فعندما ينقص مجتمع شوكيات الجلد يحدث غالباً تغير في النظام البيئي. فإذا انخفضت أعداد أنواع قنفذ البحر مثلًا نتيجة انتشار مرض ما ازدادت الطحالب زيادة كبيرة على الشعاب المرجانية، مما يؤدي إلى تدمير المرجان في كثير من المناطق. قنافذ البحر وخيار البحر مخلوقات حية تحرك الرواسب من قاع البحر إلى أعلى، وهذا أمر مهم لجميع مكونات النظام البيئي، مما يجعل المغذيات الموجودة في قاع البحر ترتفع في الماء وتصبح متوفّرة للمخلوقات الحية الأخرى.



- **الشكل 1-12** تحورت الأقدام الأنبوية في بعض أنواع خيار البحر إلى لوماس لتلتقط جزيئات الطعام من الماء.
- **حدد** المادة التي تغطي اللوماس وتساعد على الإمساك بجزيئات الطعام؟

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

عالم الأحياء البحري

العلماء في هذا المجال يدرسون النباتات والحيوانات التي تعيش في البحار، ومنها شوكيات الجلد. وكذلك يدرسون التلوث الذي يؤثر في البيئة البحرية.

- **الشكل 1-13** اللؤلؤية البحرية شوكية جلد دقيقة ذات شكل قرصي.





مضار شوكيات الجلد قد تغير بعض شوكيات الجلد النظام البيئي البحري. فنجم البحر التاجي ذو الأشواك يتغذى على بوليب المرجان. وعندما تتکاثر هذه المخلوقات فإنها تدمر الشعاب المرجانية. وتشكل قنافذ البحر غذاءً شهياً لثعالب البحر، الشكل 14-1. فإذا انخفض عدد ثعالب البحر ازداد عدد قنافذ البحر. وتتغذى قنافذ البحر على غابات عشب البحر، فيؤدي ذلك إلى تدمير بيئات الأسماك والقواقع والسرطانات.

■ **الشكل 14-1** وجود عدد كافٍ من ثعلب البحر يحافظ على مجتمع قنافذ البحر، ويجعله تحت السيطرة، وإلا ازدادت أعداد قنافذ البحر، مما يهدد غابات عشب البحر الذي تتغذى عليه هذه القنافذ.

مختبر تحليل البيانات 1-1

بناء على بيانات حقيقة


تفسير الرسوم العلمية

كيف يُظهر خطط العلاقات التركيبية العلاقات بين أنواع نجوم البحر؟ يُظهر المخطط التصنيفي المقابل العلاقة بين أنواع مختلفة من نجوم البحر، معتمداً على بيانات جزيئية. وكل حرف يمثل نوعاً معيناً من نجوم البحر.

التفكير الناقد

1. حدد نجم البحر الأكثر صلة بنجم البحر A؟
2. حلّل أي مجموعات نجم البحر أكثر تنوعاً: ؟ أو ()

أخذت البيانات في هذا المختبر من



Hrincevich, A.W., et al. 2000. Phylogenetic analysis of molecular lineages in a species -rich subgenus of sea stars (*Leptasterias* subgenus *Hexasterias*) American Zoologist 40: 365-374

التقويم 1-1

الخلاصة

فهم الأفكار الرئيسية

5. كون فرضية. يعيش نوع معين من الروبيان المخطط باللونين الأحمر والأبيض غالباً على نوع من نجم البحر الهش الملون. كون فرضية عن العلاقة بين الروبيان ونجم البحر الهش.
6. **الرياضيات في علم الأحياء** إذا كانت القوة التي يحتاج إليها نجم البحر لفتح صدفة محار هي 20 نيوتن، فكم قدماً أنبوية يحتاج إذا كانت القدم الواحدة تولّد قوة مقدارها 0.25 نيوتن؟

- يمكن تحديد الأفراد البالغة من شوكيات الجلد باستعمال أربع صفات تركيبية رئيسية.
- لشوكيات الجلد جهاز وعائي مائي وأقدام أنبوية.
- لشوكيات الجلد تكيفات متنوعة للتغذى والحركة.
- لشوكيات الجلد التي تعيش حالياً ست طوائف رئيسية.

اللافقاريات الحلبية

Invertebrate Chordates

ال فكرة ► **اللافقاريات الحبلية** لها صفات تربطها مع الفقاريات الحبلية.
الربط مع الحياة الديدان والقواقع والنحل والأسماك والطيور والأسود كلها حيوانات تشترك في صفات عامة. فكّر في الصفات المشتركة بين هذه الحيوانات، والصفات التي تختلف فيها. الحيوانات التي تشترك في أغلب الصفات تكون أكثر تقاربًا من تلك التي تشترك في صفات قليلة.

صفات اللافقاريات الحليلة

يظهر مخطط العلاقات التركيبية في الشكل 15 – 1، أن اللافقاريات الحجلية - ومنها السهيم والكيسيات - ثانوية الفم، وهي تشبه في ذلك شوكيات الجلد، ولها صفات أخرى لا توجد في شوكيات الجلد سوف تعلمنها لاحقاً.

ومن أكثر الحيوانات شهرة عند علماء الحيوان، الشكل 15 - 1، حيوان صغير ثعباني الشكل يسمى **السَّهِيم** (الرميغ)، وهو يقضى معظم حياته مدفوناً في الرمل. لذا من الصعب عليك أن تجد **السَّهِيم**، فهو مخلوق متخفّ، له غطاء شفاف، يشبه جسمه السميكة، طوله نحو 5 cm، نصف جسمه يكون مدفوناً عادة في الرمل، يرُشح غذاءه، ولا يدرك الكثير ونأهمته.



الكتسيات (Tunicate)

- تفسر صفات اللافقاريات الحبلية التي أدت إلى تصنيفها في شعبة الحبليلات.
 - تحلل صفات اللافقاريات الحبلية التي أدت إلى تصنيفها مع اللافقاريات.
 - تقارن بين التكيفات في السهيم وبخاخ البحر.


مراجعة المفردات

ثانوي الفم: مصطلح يطلق على
الحيوان الذي نما له فم من خلايا لا
تتوحد في فتحة الحاستر ولا .

المفردات الجديدة


- الحلبيات
- اللافقاريات الحلبية
- الحلب الظاهري
- الذيل خلف الشرجي
- الحلب العصبي الظهيري الانبوي
- الحليب اللقوعية.

الشكل 15-1 تظهر ثانوية الفم في اللافقاريات الحبلية مثلها مثل شوكيات الجلد.



الشكل 16-1 للحجلات حبل عصبي ظهري أنبوبي، وحبل ظهري، وجيوب بلعومية، وذيل خلف شرجي، وربما تكون شكلًا من أشكال الغدة الدرقية.

استنتاج أي هذه الصفات كانت لديك عندما كنت جنيناً؟



الحجلات Chordates حيوانات تتبع شعبة الحجلات، لها أربع صفات مميزة (حبل عصبي ظهري أنبوبي، وحبل ظهري، وجيوب بلعومية، وذيل خلف شرجي) تظهر في أوقات ما خلال فترة نموها. تشير الأدلة الحدية إلى أن جميع الحجلات قد يكون لها بعض أشكال الغدة الدرقية، ولها تجويف جسمي حقيقي، وجسمها مقسم إلى قطع. ادرس **الشكل 16-1**، لمعرفة الصفات الرئيسية للحجلات. تذكر أن الفقاريات حيوانات لها عمود فقري. أغلب الحجلات فقاريات. تتمي **اللافقاريات الحبلية** إلى تحت شعبتين من الحجلات، هما شعبة حجلات الرأس، وشعبة حجلات الذيل، ولهم صفات الحجلات الأربع، بالإضافة إلى الشكل الأولي للغدة الدرقية. وليس للافقاريات الحبلية عمود فقري.

المفردات
الحجل الظاهري Notochord
- no-to - كلمة يونانية تعني الظهر.
chord- كلمة يونانية تعني الحبل...

الحبل الظاهري notochord الحبل الظاهري مرن، وشكله يشبه الخيط، ويمتد على طول الجسم، ويوجد تحت الحبل العصبي الظاهري الأنبوبي. في أغلب الفقاريات يحل محله عظم أو غضروف، بينما يبقى الحبل الظاهري في اللافقاريات الحبلية. ومرنة الحبل الظاهري تمكّنه من ثني الجسم من دون قصره خلال انقباض قطع العضلات. تستطيع الحيوانات التي لها حبل ظاهري القيام بحركات جانبية للجسم والذيل، مما يمكنها من السباحة، كما في الأسماك.

الذيل خلف الشرجي Postanal tail يستعمل الذيل خلف الشرجي أساساً للحركة، ويقع خلف الجهاز الهضمي والشرج، وفي معظم الحجلات يمتد الذيل إلى ما بعد فتحة الشرج. وفي غير الحجلات يوجد داخل الذيل أجزاء من الجهاز الهضمي، وتقع فتحة الشرج في نهاية الذيل. ويمكن الذيل - بما فيه من عضلات - الحيوان أن يدفع بحركات أقوى مما تدفع اللافقاريات التي ليس لها مثل هذا الذيل.

الحبل العصبي الظاهري الأنبوبي Dorsal tubular nerve cord توجد الحبال العصبية في غير الحجلات في العجمة البطنية، أو أسفل الجهاز الهضمي، وهي مصممة. أما في الحجلات فيوجد **الحبل العصبي الظاهري الأنبوبي** فوق الجهاز الهضمي، ويتخذ شكل أنبوب أجوف. خلال نمو أغلب الحجلات ينمو الطرف الأمامي لأنبوب ليكون الدماغ. أما الطرف الخلفي فيكون الحبل الشوكي.

ماذا قرأت؟ حلل أهمية الحبل الظاهري للافقاريات الحبلية?

المعلومات
ضمّن معلومات من هذا القسم في مطويتك.

الجيوب (الأكياس) البلعومية pharyngeal pouch توجد

في جميع الأجنحة أزواج من التراكيب تسمى **الجيوب البلعومية** تربط الأنوب العضلي الواصل بين التجويف الفمي والمريء. تحوي الجيوب في الحبليات المائية شقوقاً تفتح إلى الخارج. وقد تخصصت هذه التراكيب في ترشيح الغذاء، كما يمكن أن تتخصص الخياشيم في تبادل الغازات في الماء. أما في الحبليات التي تعيش على اليابسة فلا تحتوي الجيوب البلعومية على شقوق، بل تخصصت جنينياً إلى تراكيب أخرى، مثل لوزتي الحلق والغدة الرعترية.

الغدة الدرقية thyroid gland الغدة الدرقية تركيب ينظم الأيض والنمو والتكون الجنيني. وتفرز الغدة الدرقية في خلايا الحبليات الأولية مخاطاً يساعد الحيوانات الترشيحية التغذوية على جمع جزيئات الغذاء. تحوي اللافقاريات الحبلية قناة داخلية endostyle والخلايا في هذه المنطقة تفرز بروتينات شبيهة بما تفرزه الغدة الدرقية. والفقاريات الحبلية هي المخلوقات الوحيدة التي لها غدة درقية.

الربط الصحة يتركز اليود في القناة الداخلية ويلعب دوراً مهماً في وظيفة الغدة الدرقية، وهو أساساً لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية. ويضاف اليود في معظم الدول إلى ملح الطعام لتجنب الإصابة بنقص اليود. ومن المصادر الأخرى للإيد الأسماك ومنتجات الألبان، والخضروات التي تنمو في تربة غنية باليود.

ماذا قرأت؟ اشرح تقويم القناة الداخلية بدور الغدة الدرقية.

تنوع اللافقاريات الحبلية


Diversity of Invertebrate Chordates

كما هو الحال في شوكيات الجلد فإن جميع اللافقاريات الحبلية حيوانات بحرية. ويوجد 23 نوعاً من السهيم في شعبة حبليات الرأس، وتضم حبليات الذيل 1250 نوعاً من الكيسيات.

السهيم حيوان صغير، يشبه السمكة، لكنه دون قشور، ويُدفن جسمه في الرمل في مياه البحر الضحلة، الشكل 1-17. يفتقر السهيم إلى الألوان في جلده، ويكون الجلد من طبقة واحدة من الخلايا شفافة اللون. ويمكن مشاهدة حركة مرور الماء داخل الجسم. وللحصول على الغذاء يدخل الماء فم السهيم، ويمر خلال الشقوق الخيشومية البلعومية؛ حيث يرشح الغذاء (ترشح التغذية)، ثم يمر إلى تراكيب يشبه المعدة ليُهضم، ثم يخرج الماء من خلال الشقوق الخيشومية.


إرشادات الدراسة

التعاون كون مجموعة من خمسة طلاب. يختار كل طالب في المجموعة أحد العناوين الخمسة التي يضمها العنوان "صفات اللافقاريات الحبلية"، ثم يقرؤه أمام المجموعة ويشرحه.



■ الشكل 1-17 السهيم لافقاري حبلي له الصفات الرئيسية للحبليات. استنتاج. كيف يمكن أن تعمل اللؤامس القصيرة والمحبطة بفم السهيم؟

■ **الشكل 18 – 1** يرقة ذيلية الحبل تشبه أبا ذئبية، ولها جميع صفات الحجليات. تبين الأسهم دخول الماء إلى الجسم وخروجه منه.




يرقة الأسidiّات *Ascidian larvae*

لاحظ الشكل 17-1. يمكنك مشاهدة القطع العضلي، وهي شبيهة بالقطع العضلي في اللافقاريات، وتمكّن السهيم من السباحة بحركة مماثلة لحركة السمكة. يختلف السهيم عن الفقاريات في عدم وجود رأس أو أعضاء حس إلا مستقبلات الضوء ولوامس حسية صغيرة قرب الفم. يتربّك الجهاز العصبي من أعصاب رئيسة متفرعة، ودماغ بسيط في مقدمة الحيوان. يمر الدم عبر الجسم بضخه في الأوعية الدموية، حيث لا يوجد قلب حقيقي. والجنس منفصل في السهيم، والتلقيح فيه خارجي.

الكيسيات *Tunicates* (القميصيات) سُميّت كذلك لوجود طبقة خارجية سميكّة تسمى القميص تشبه الكيس، وتغطي جسم الحيوان الصغير. تعيش أغلب الكيسيات في المياه الضحلة، وبعضها يعيش في تجمعات على قاع المحيط. وتكون الكيسيات عموماً جالسة غير متحركة، وتظهر فيها الصفات المماثلة للحجليات فقط في مرحلة اليرقة. انظر الشكل 18-1، ولا حظ موقع الحبل الظهري والذيل والحبل الظهري والأكياس البلعومية والغدة الدرقية. يدخل الماء إلى الجسم الشبيه بالكيس في الكيسيات البالغة عبر السيفون الشهيقي، الشكل 19-1، وذلك بفعل حركة الأهداب. وتَجمِع جزيئات الغذاء في شبكة مخاطية، ثم تتحرك إلى المعدة، حيث تُهضم هناك. وخلال ذلك يترك الماء الجسم، أو لاً عبر الفتحات الخيشومية في البلعوم، ثم إلى خارج الجسم عبر السيفون الرفيري. تتم الدورة الدموية بفعل القلب والأوعية الدموية التي توزّع المغذيات والأكسجين إلى أعضاء الجسم. ويترّك الجهاز العصبي من جزء رئيس عصبي معقد، وعصيبونات متشعبه. والكيسيات خناث (تنتج كلاً من البيوض والحيوانات المنوية)، والتلقيح فيها خارجي. لماذا تسمى الكيسيات بخاخات الماء؟ عندما تهُدد أو تشعر بالخطر تكون قادرة على إخراج سيل من الماء بقوّة عبر السيفون الرفيري، فتشوش على المفترس القوي.

ماذا قرأت؟ قارن بين الكيسيات والسهيم.



■ **الشكل 19 – 1** يشبه الحيوان البالغ في الكيسيات الكيس. الصفة الوحيدة للحجليات التي بقيت في هذا الحيوان البالغ هي الفتحات الخيشومية البلعومية. تشير الأسهم إلى طريق دخول الماء في الجسم وخروجه منه. **قارن.** ما اللافقاريات الأخرى التي درستها وترشّح غذائها؟

التقويم 1-2

الخلاصة	فهم الأفكار الرئيسية	التفكير الناقد
• للحبيبات أربع صفات رئيسية جعلتها مختلفة عن الحيوانات غير الحبلية.	1. الفكرة الرئيسة لشخص الصفات الرئيسية للافقاريات الحبلية لتبيّن فيم تشبه الفقاريات الحبلية.	5. صمم تجربة لتحديد ما إذا كان السهيم يفضل بيئه مضيئة أم بيئه مظلمة.
• للافقاريات الحبلية جميع صفات الحبليات إلا أنه ليس لها الصفات الرئيسة للفقاريات الحبلية.	2. صف خصائص اللافقاريات الحبلية التي وضعتها مع لافقاريات أخرى عوضاً عن وضعها مع الفقاريات.	6. الكتابة في علم الأحياء اكتب فقرة تصف فيها ما تتشابه فيه الإسنجيات والكيسيات، وفقرة أخرى تصف ما تختلفان فيه.
• الجبل الظاهري تكيف يُمكن الحيوانات من الحركة ببطائق لم تتحرك بها من قبل.	3. اعمل نموذجًا للسهيم وحيوان كيسى من الطين، أو من عجينة الملح. وحدد الصفات التي صنفت هذه الحيوانات في شعبة الحبليات.	
• السهيم من اللافقاريات الحبلية، له شكل يشبه السمكة، ولأفراده البالغة كل الصفات الرئيسية للحبليات.	4. قارن بين تكيفات كل من الكيسيات والسهيم التي مكتنثها من العيش في بيئاتها.	
• الكيسيات لافقاريات حبلية كيسية الشكل، ولها صفات الحبليات وهي في مرحلة اليرقة.		



شوكيات الجلد تساعد على البحث الطبي



يستطيع خيار البحر تغيير حالة جسمه من حالة تجانس الخيلاتين السائل إلى شكل صلب ثابت، ثم العودة إلى الحالة الأولى في ثوان وهكذا، وهذا يعود إلى أن الكولاجين في النسيج الضام لخيار البحر غير ثابت.

وفي حالة عدم اكتمال التكون السليم للعظام لا يكون الجسم قادرًا على إنتاج كولاجين على نحو كافٍ، أو يتبع نوعاً رديئاً من الكولاجين، مما يؤدي إلى عظام هشة تنكسر بسهولة. والأشخاص الذين لديهم متلازمة مارfan يكون لديهم نسيج ضام غير صلب، مما يؤدي إلى تشوّهات هيكلية، وضعف في الأوعية الدموية. وبدراسة النسيج الضام في شوكيات الجلد مثل خيار البحر، اقترب الباحثون من النجاح في معالجة أمراض الوهن الذي يعيق حرية حركة المفاصل نتيجة أمراض النسيج الضام.

الكتابة في علم الأحياء

دفتر العلوم أرجع إلى المصادر العلمية المختلفة لتتعرف المزيد من البحوث التي تتضمن شوكيات الجلد. اكتب بحثاً عن عالم / أو عالمة أحياء تصف فيه عمله / أو عملها مع شوكيات الجلد، على أن يتضمن البحث جداول ورسوماً تتعلق بشوكيات الجلد.

النسيج الضام Connective tissue اكتشف طالب Greg Szulgit الدراسات العليا في علم الأحياء جريج زولجت القدرة الضخمة لخيار البحر على زيادة حجم جسمه ثم انكمasherه ثانية إلى حجمه الطبيعي. كيف يستطيع خيار البحر تغيير حجم جسمه؟ كل هذا يعود إلى النسيج الضام، وهو النسيج الذي يربط الأنسجة بالأعضاء في الجسم، ويدعمها ويحيط بها.

وهناك تشابه بين النسيج الضام لخيار البحر والنسيج الضام عند الإنسان؛ إذ تحوي ألياف النسيج الضام بروتيناً يسمى كولاجين. والكولاجين في الإنسان مكون ثابت في النسيج. فقد وجد زولجت وباحثون آخرون أن الكولاجين في النسيج الضام لشوكيات الجلد غير ثابت، ويترافق إلى الأمام وإلى الخلف. وعندما تكون جزيئات البروتين في الهيكل الداخلي يترافق بعضها فوق بعض، ويكون جسم خيار البحر ليناً ومرنًا. وتستطيع خلايا خيار البحر إفراز مادة تثبت الكولاجين وتنمّعه من الانزلاق، وهذا يعطي صلابة للهيكل الداخلي، و يجعله غير متحرك.

اعتلال النسيج الضام كان الأمل من دراسات زولجت على قدرة انبساط جسم خيار البحر وتمددّه هو تمكين الباحثين من معالجة اعتلال النسيج الضام في الإنسان. وهذه الاعتلالات تضم متلازمة إهيلرس دانلوس Ehlers-Danlos Syndrome، وعدم اكتمال التكون العظمي، ومتلازمة مارfan Marfan Syndrome، والناس المصابون بمتلازمة إهيلرس-دانلوس لديهم نسيج ضام غير طبيعي واهش، مما يؤدي إلى مشاكل في المفاصل وضعف في الأعضاء الداخلية.

مختبر الأحياء

الإنترنت: كيف تستطيع شوكيات الجلد العيش دون رأس أو عين أو دماغ؟



نجم البحر، والسلة النجمية، وقنفذ البحر الشوكي أنواع تعيش في مياه الخليجان.

حل ثم استنتاج

- صف بعض الصفات الجسمية الأساسية التي تشتراك فيها شوكيات الجلد.
- قارن بين استراتيجيات التكاثر الجنسي واللاجنسي المستعملة في أنواع شوكيات الجلد المتنوعة.
- التفكير الناقد تختلف البرائقات والحيوانات البالغة في شوكيات الجلد في طرائق عديدة مهمة. ووضح الفوارق بينها، وبين مزاياها.
- فسر البيانات ما مصادر الغذاء الرئيسية لشوكيات الجلد التي درستها؟
- استخلص النتائج هل تكيفت شوكيات الجلد للعيش في البيئات البحرية؟ فسر إجابتك.
- تحليل الخطأ صفات مزايا ومساوئ الحصول على معلومات حول شوكيات الجلد عبر المواقع الإلكترونية.

الكتابة في علم الأحياء

مرجع استعمل البيانات التي جمعتها لعمل ملخص حقائق يحوي صوراً ومعلومات مهمة حول كل من شوكيات الجلد التي درستها. ثم ضم ملخصك إلى ملخصات الطلبة الآخرين لتكون في النهاية مرجعاً عن شوكيات الجلد يبقى في مركز مصادر التعلم في مدرستك.

الخلفية النظرية: تفتقر شوكيات الجلد إلى العين والدماغ، كما أنه لا يوجد لها قلب، وتضخ ماء البحر عبر الجسم بدلًا من الدم. منح الله سبحانه وتعالى بعض شوكيات الجلد القدرة على تغيير هيكلها الداخلية من حالة الصلابة القاسية، إلى السائلة تقريرًا خلال ثوان، وبعضها الآخر قادر على التخلص من ذراعه للهرب من المفترسات.

سؤال: كيف تستطيع شوكيات الجلد العيش في بيئات بحرية تنافسية؟

المواد والأدوات

- الشبكة العنكبوتية (إنترنت).
- مراجع علمي حول شوكيات الجلد.
- دليل ميداني.

خطوات العمل

- املاً بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
- صمم جدول بيانات تسجّل فيه المعلومات الآتية للأنواع: الصفات الجسمية، مصادر الغذاء / طرائق الحصول على الغذاء، المفترسون، الاستراتيجيات الدافعية، التكاثر ونمو الأجنة، وأي حقائق أخرى مميزة لستة حيوانات.
- اختر نوعاً واحداً من كل طائفة رئيسة لشوكيات الجلد المست دراسته، وسجله في جدول البيانات.
- ابحث عن النوع الذي اخترته واملاً جدول البيانات بالمعلومات. ثم لاحظ شوكيات الجلد في بيئتها الطبيعية، وذلك بزيارة حديقة حيوان محلية أو أحواض تربيتها. إذا كنت لا تستطيع ملاحظة الحيوانات في بيئتها الطبيعية فاحصل على معلومات عن شوكيات الجلد من المرجع العلمي، أو ارجع إلى الإنترنت.
- سجل ملاحظاتك في جدول البيانات.
- تعاون مع زملائك في تعبئة الأجزاء الناقصة في جدولك.

المطويات حل استعمل ما تعلمه في هذا الفصل لمناقشة تصنيف اللافقاريات الحبلية مع شعبة الجبليات.

المفاهيم الرئيسية

المفردات

١-١ خصائص شوكيات الجلد

الفكرة **الرئيسة** شوكيات الجلد حيوانات بحرية لها هيكل داخلي يأشواك، وجهاز وعائي مائي، وأقدام أنبوبية؛ ولأفرادها البالغة تناضر شعاعي.

- يمكن تحديد الأفراد البالغة من شوكيات الجلد باستعمال أربع صفات تركيبية رئيسة.
- لشوكيات الجلد جهاز وعائي مائي، وأقدام أنبوبية.
- لشوكيات الجلد تكيفات متنوعة للتغذّي والحركة.
- لشوكيات الجلد التي تعيش حالياً ست طوائف رئيسة.



اللواء القدمية
الجهاز الوعائي المائي
المصفاة
القدم الأنبوية
الموصلة

٢-١ اللافقاريات الحبلية

الفكرة **الرئيسة** اللافقاريات الحبلية لها صفات تربطها مع الفقاريات الحبلية.

- للحbellيات أربع صفات رئيسية جعلتها مختلفة عن الحيوانات غير الحبلية.
- للافقاريات الحبلية جميع صفات الحbellيات إلا أنه ليس لها الصفات الرئيسية للفقاريات الحبلية.
- الحبل الظاهري تكيّف يمكن للحيوانات من الحركة بطريق لم تتحرك بها من قبل.
- السمّيون من اللافقاريات الحبلية، له شكل يشبه السمكة، ولأفراده البالغة كل الصفات الرئيسية للحbellيات.
- الكيسيات لفقاريات حبلية كيسية الشكل، ولها صفات الحbellيات وهي في مرحلة اليرقة.



الحbellيات
اللافقاريات الحبلية
الحبل الظاهري
الذيل خلف الشرجي
الحبل العصبي الظاهري الأنبوبي
الجيوب البلعومية

التقويم

١

١-١

مراجعة المفردات


ميز بين زوجي المصطلحات الآتية:

١. قدم أنبوبية، وحوصلة عضلية

٢. مصفاة، وجهاز وعائي مائي

ثبتت المفاهيم الرئيسية

٣. أيّ مما يأتي ليس من شوكيات الجلد؟



٤. أيّ شوكيات الجلد الآتية يُعد حيوانًا جالسًا في طور من حياته؟

a. خيار البحر.

c. نجم البحر.

b. زنابق البحر.

d. قنفذ البحر.

٥. ما الوظائف الثلاث التي تقوم بها القدم الأنبوية؟

a. تكاثر، تنفس.

b. تنفس، تنظيم عصبي.

c. تنفس، حركة.

d. نمو جنبي، تكاثر، تنفس.


٦. أيّ مما يأتي مرتبط بثانوية الفم؟

a. المفصليات.

b. الديدان الحلقي.

c. الرخويات.

d. الجبليات.



أسئلة بنائية

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤالين ١٠ و ١١.


١٠. إجابة قصيرة. افحص الرسم الدائري وقدر نسبة شوكيات الجلد من نوع خيار البحر.

١١. نهاية مفتوحة. افحص الرسم الدائري، واشرح لماذا لا تظهر طائفة المؤليات مع الطوائف الأخرى لشوكيات الجلد الحية؟

ثبات المفاهيم الرئيسية

19. أي مما يأتي يوجد في الجبليات خلال فترة من حياتها؟
- جهاز وعائي مائي، جبل ظهري، جيوب بلعومية، ذيل خلف شرجي.
 - قميص، جيوب بلعومية، جبل شوكي ظهري أنبوبي، ذيل خلف شرجي.
 - أقدام أنبوبية، جبل ظهري، جيوب بلعومية، ذيل خلف شرجي.
 - جبل شوكي ظهري أنبوبي، جبل ظهري، جيوب بلعومية، ذيل خلف شرجي.
20. ما الوظيفة الرئيسية للذيل خلف الشرجي؟
- الدوران.
 - الهضم.
 - المرونة.
 - الحركة.

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤالين 21 و 22.



21. أصبحت السباحة كسباحة السلمكة ممكناً بواسطة التركيب:

- | | |
|-------|-------|
| 3 . c | 1 . a |
| 4 . d | 2 . b |

22. أي التركيب تتحول إلى دماغ وجلد شوكي في أغلب الجبليات؟

- | | |
|-------|-------|
| 3 . c | 1 . a |
| 4 . d | 2 . b |

12. نهاية مفتوحة. وجد العلماء أحافورة لها الصفات الآتية: هيكل داخلي شببه بالهيكل في شوكيات الجلد، شكل يشبه الذيل مع فتحة الشرج في نهاية الذيل، شكل يمكن أن يكون خيشوماً، تنظر شببه بشوكيات الجلد. كيف يستطيع العلماء أن يصفوا هذا الحيوان اعتماداً على تصنيف شوكيات الجلد؟

13. نهاية مفتوحة. الحيوانات في منطقة المد والجزر تعاني من نقص الماء، وارتفاع درجة الحرارة أكثر من الحدود التي تستطيع الحيوانات تحملها. وتبقى درجة حرارة نجم البحر نحو 18 درجة أقل من درجة حرارة بلح البحر في المنطقة الواحدة في يوم حار. كون فرضية تبين فيها لماذا تكون درجة حرارة جسم نجم البحر أقل؟

التفكير الناقد

14. لاحظ ثم استنتج. في أثناء سيرك على الشاطئ وجدت حيواناً له العديد من الأذرع الجلدية والأقدام الأنبوية. إلى أي أنواع الحيوانات يمكن أن ينتمي هذا الحيوان؟

15. كون فرضية. بعض قنافذ البحر فتره حياة طويلة. كون فرضية حول سبب ذلك.

1-2

مراجعة المفردات

استبدل الكلمات التي تحتها خط بمصطلحات صحيحة من صفحة دليل مراجعة الفصل.

16. اللافقاريات لها صفات الجبليات، وليس لها عمود فقري.

17. تركيب يمكن اللافقاريات من السباحة بتحررك الذيل إلى الأمام والخلف.

18. وصلات تربط تجويف الفم بالمرئ، تكون شقوقاً، وتنستعمل في ترشيح الغذاء في بعض اللافقاريات الجبلية.

1 تقويم الفصل

أسئلة بنائية

28. نهاية مفتوحة. وضح لماذا لا توجد للافقاريات حبلية في المياه العذبة؟

29. نهاية مفتوحة. ماذا يحدث إذا اخفت جميع حيوانات السهيم؟



استعمل الرسم الآتي

للإجابة عن السؤالين 30 و 31.

30. إجابة قصيرة. افحص الرسم، ووضح لماذا لا يمكن أن يكون هذا الحيوان لافقارياً حبلياً؟

31. إجابة قصيرة. ما الصفات التي يشتراك فيها هذا الحيوان مع اللافقاريات الحبلية؟

التفكير الناقد


32. حلّل كيف يمكن أن تساعد يرقات المخلوقات العلماء على تصنيف الحيوانات وتحديد العلاقات التركيبية بينها؟

تقويم إضافي

33. **الكتابة في علم الأحياء** اكتب قصيدة شعرية توضح فيها شوكيات الجلد المفضلة لديك. وتحقق أنك سوف تشير إلى صفاتها الحقيقة.

أسئلة المستندات

ادرس الرسوم التوضيحية لتكوين الأذرع في نجم البحر.



34. ما نوع التناظر المبين في الرسم رقم 1؟

35. بّين كيف يمكن أن تكون أذرع إضافية؟

36. كيف يعكس عدد الأذرع في الرسم 3 صفات لشوكيات الجلد جميعها؟

23. أي الصفات الآتية ينطبق على حيوان بخار البحر البالغ؟

a. له تناظر جانبي.

b. له مظهر السهيم البالغ نفسه.

c. له صفة واحدة فقط من صفات الحبليات بوصفه حيواناً بالغاً.

d. حيوان مفترس ونشط في السباحة.

24. ماذا تفرز القناة الداخلية في اللافقاريات الحبلية؟

a. البروتين المماثل لهرمون الغدة الدرقية.

b. المخاط.

c. الجبل الظاهري.

d. الجيوب البلعومية.

25. شوكيات الجلد ذات صلة بالحبليات. أي الصفات الآتية تشتراكن فيها؟

a. لهما جيوب بلعومية

b. بدائية الفم.

c. ثانية الفم.

d. تجويف جسمي كاذب.

26. أي التراكيب الآتية يمكن أن يكون الغدة الدرقية؟

a. الجبل الشوكي الظاهري الأنبوبي.

b. الجبل الظاهري.

c. القناة الداخلية.

d. الجيوب البلعومية.

27. أي صفات الحبليات الآتية مكّن الحيوانات الكبيرة من التخصّص؟

a. الجبل الشوكي الظاهري الأنبوبي.

b. الجبل الظاهري.

c. الجيوب البلعومية.

d. الذيل خلف الشرجي.

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

4. نجم البحر من شوكيات الجلد، يتغذى على المحارات.
لماذا ينبغي على مزارعي المحارات ألا يقطعوا أذرع
نجم البحر ويلقونها مرة أخرى إلى الماء.
5. قوم تكيفات الدفاع لمجموعتين من اللافقاريات
الحبلية.
6. قارن بين الصفات الرئيسية لشوكيات الجلد وحيوان
آخر تعرفه من الشعبة نفسها.


أسئلة الإجابات المفتوحة

7. اشرح فيم تتشابه شوكيات الجلد والديدان الحلقية؟

أسئلة الاختيار من متعدد

1. أيّ الصفات الآتية جعلت شوكيات الجلد قريبة من
الفقاريات؟
a. تناظر جانبي للأفراد المكتملة النمو.
b. يرقق حرة السباحة.
c. ثانوية الفم.
d. تناظر شعاعي لليرقات.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 2، 3.



2. أيّ التراكيب حل محله عظم أو غضروف في الفقاريات
الحبلية؟

- 4 .c 1 .a
5 .d 2 .b

3. أيّ التراكيب يعد حزمة من الأعصاب محمية بسائل؟

- 5 .c 1 .a
6 .d 3 .b

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن
تباحث فيه عن إجابة السؤال

السؤال	الدرس / القصل	الصف
7	1-1	1-2
6	1-1	1-2
5	1-2	1-2
4	1-1	1-2
3	1-2	1-2
2	1-2	1-2
1	1-1	1-2

الأسماك والبرمائيات

Fishes and Amphibians

2



الفكرة العامة خلق الله للأسماء تكيفات تساعدها على العيش في البيئات المائية. في حين تكيفت معظم البرمائيات - بما وهبها الله تعالى من خصائص - لتعيش جزءاً من حياتها على اليابسة.

1-2 الأسماك


الفكرة الرئيسية للأسماك فقاريات لها خصائص تسمح لها بالعيش والتتكاثر في الماء.

2-2 البرمائيات

الفكرة الرئيسية لمعظم البرمائيات تكيفات تؤهلها للعيش جزءاً من حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابسة.

حقائق في علم الأحياء

- تحتوي قشور الأسماك على حلقات نمو تشبه تلك التي في جذوع الأشجار.
- تحتوي بعض القشور على مادة المينا، وهي المادة نفسها التي تكون الأسنان.
- قشور الأسماك عديمة اللون؛ أما اللون الظاهر فيأتي من الجلد الذي يلي القشور.




نشاطات تمهيدية

الأسماء والبرمائيات أعمل المطوية
الآتية لمساعدتك على تحديد
خصائص الأسماء والبرمائيات.


المطويات

منظمات الأفكار

الخطوة 1: ضع ورقتين إحداهما فوق الأخرى، على أن
تبعد إحداهما عن الأخرى رأسياً مسافة 1.5 ، كما في
الشكل الآتي:



الخطوة 2: اثن الطرف السفلي للورقة لتكون ثلاثة
ألسنة متساوية، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 3: ثبّت الأوراق معًا على طول الطرف المثنى،
وعنون كل لسان كما في الشكل الآتي:

الخصائص	○
الريamiات الأوليّة	○
البرمائيّات	○
الأسماء	○

المطويات استخدم هذه المطوية في القسم 1-2
و 2-2. سجّل - وأنت تقرأ الدرس - معلوماتك عن
خصائص كل مجموعة، ثم ارسمها.

تجربة استهلاكية

ما خصائص المجموعات المختلفة من الأسماء؟

صنّفت الأسماك في ثلاث مجموعات رئيسة - أسماك
لافكية، وأسماك غضروفية، وأسماك عظمية - اعتماداً على
خصائصها الداخلية والخارجية. ستقارن في هذه التجربة بين
الخصائص الخارجية للأسماء في المجموعات الثلاث.

خطوات العمل

- اماً بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
- افحص صوراً تمثل كلاً من مجموعات الأسماك الثلاث.
انظر إلى بعض الخصائص ومنها الجلد / القشور،
وموقع الزعنفة، وشكل كلٌ من الزعنفة والعينين والفم
والأسنان والجسم والذيل.
- صمّم جدولًا، وسجّل فيه المعلومات التي تتعلق
بالمميّزات الخارجية للمجموعات المختلفة للأسماء.

التحليل

- لخص ما الاختلافات الرئيسة للخصائص الخارجية لهذه
المجموعات من الأسماك؟
- استنتاج ما أهمية فحص التراكيب الخارجية وخصائص
المخلوقات الحية والمقارنة بينها عند تصنيفها؟

تحدد خصائص الفقاريات التي تميزها عن اللافقاريات.

تصف أهم الخصائص المشتركة بين طوائف الأسماك.

تلخص تكيف خصائص الأسماك مع الحياة المائية.

تقارن بين الخصائص المختلفة لطوائف الأسماك.

مراجعة المفردات

الحبل الظاهري Notochord: تركيب مرن يشبه العصاء، يمتد على طول الجسم.

المفردات الجديدة

الغضروف

العرف العصبي

الزعنفة

القشور

غطاء الخياشيم

الأذنين

البُطين

الوحدة الأنابيبية الكلوية (النفرون)

جهاز الخط الجانبي

وضع البيض (التبويب)

مثانة العوم

■ **الشكل 1-2** يوجد العمود الفقري في معظم الفقاريات، ومنها الأسماك والزواحف المبينة في الشكل أدناه.



رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الأسماء Fishes

الفكرة الرئيسية الأسماك فقاريات لها خصائص تسمح لها بالعيش والتَّكاثر في الماء.
الربط مع الحياة لعلك رأيت حوض ماء مليئاً بأسماك ملونة تشبه تلك التي في الصورة في بداية الفصل. ما التكييفات التي تُمكِّن الأسماك من العيش في الماء؟
لأسماك خصائص فريدة تسمح لها بالعيش والتَّكاثر في الماء.

خصائص الفقاريات


Characteristics of Vertebrates

درست حتى الآن الإسفنجيات واللاسعات والرخويات والديدان بأنواعها والمفصليات وشوكيات الجلد، وكلها لا فقاريات. تذكر أنَّ أهم أربع خصائص للحيليات هي أن لها جبلاً عصبياً ظهرياً، وجبلاً ظهرياً، وجيوياً بعلومنية، وذيلاً خلف شرجي وتندرج الحيوانات الفقارية ضمن تحت شعبة الفقاريات. ولهذه الفقاريات عمود فقري وخلايا مُتخَصصة تنمو من الحبل العصبي. ويعود العمود الفقري سمة أساسية للفقاريات. تضم طوائف الفقاريات الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات.

العمود الفقري *Vertebral column* في معظم الفقاريات يحل العمود الفقري - الذي يحيط بالحبل العصبي ويحميه - محل الحبل الظاهري. ويحدث استبدال الحبل الظاهري خلال النمو الجنيني. فالغضروف أو العظم مما المادتان المكونتان للهيكل الداخلي لمعظم الفقاريات. ويعُرَّف الغضروف *cartilage* بأنه مادة قاسية مرنة تُكوِّن هيكل أو أجزاء من هيكل الفقاريات.

تُعد الأعمدة الفقرية، المبينة في **الشكل 1-2**، تراكيب مهمة للفقاريات. ويعمل العمود الفقري عمل عصا قوية ومرنة؛ حيث تستند عليه العضلات في أثناء السباحة أو الرَّكض. وتساعد الفقرات المنفصلة الحيوان على التَّحرُّك بسرعة وسهولة. كما تُساعد العظام على انتقاض العضلات بقوة، فتزدِّ من قوة الحيوان.





■ **الشكل 2-2** ينتج العُرُف العصبي في الفقاريات من التحام الطبقة الخارجية من حافتي الانثنain العصبيين في المرحلة الجنينية.


العُرُف العصبي Neural crest تحدث عملية أخرى مهمّة في أثناء تكون الحبل العصبي خلال النمو الجنيني في الفقاريات، وهي تكون **العُرُف العصبي neural crest**، وهو مجموعة من الخلايا، تتكون من الحبل العصبي في الفقاريات. ويوضح الشكل 2-2 عملية تكون العُرُف العصبي. وعلى الرّغم من أنَّ هذه المجموعة من الخلايا صغيرة إلا أنها مهمّة لنمو الفقاريات؛ لأنَّ العديد من أجزاء أجسام الفقاريات المهمّة تنتج عن العُرُف العصبي. ومن هذه الأجزاء أجزاء إلْهَسَاس، وأجزاء من الجيوب البلعومية، وعزل (تغليف) الألياف العصبية، وخلايا عُدُد محددة.

ومن الخصائص الأخرى المميزة للفقاريات وجود الأعضاء الداخليّة، ومنها الكلّي والكبد والقلب، وجهاز دوري مغلق.

ماذا قرأت؟ فسر لماذا يُعد العُرُف العصبي صفة مهمة للفقاريات؟


خصائص الأسماك Characteristics of Fishes

■ **الشكل 3-3** تم تمييز الطوائف المختلفة من الأسماك بالألوان في هذا المخطط.



تعيش الأسماك في معظم البيئات المائية على سطح الأرض، في البحار والبرك والجداول وبعض المستنقعات، وببعضها الآخر يعيش في الظلمة التامة في قاع المحيط. كما تعيش أسماك أخرى في المياه المتجمدة في المناطق القطبية؛ حيث يحتوي دمها على بروتينات خاصة تمنع تجمده. وهناك نحو 24,600 نوع من الأسماك، وهذا يفوق مجموع أنواع الفقاريات كلها مجتمعة، وتتراوح حجمها بين أسماك قرش الحوت Whale shark التي قد يبلغ طولها 18 m، إلى أسماك المشط الصغيرة وهي في حجم ظفر الإنسان.

وقد خلق الله للأسماك عدداً من الخصائص التركيبية ساعدتها على العيش في معظم البيئات المائية، من هذه الخصائص المهمة وجود الفكوك في بعض الأسماك، والرّئات في بعضها الآخر. ويوضح مخطط العلاقات التركيبية في الشكل 3-3 أن هناك ثلاثة طوائف من الأسماك، كلّها فقاريات. وعلى الرّغم من أنَّ أجسام الأسماك تختلف في الشكل والتركيب كثيراً، إلا أنَّ لها العديد من الصفات المشتركة. ولمعظم الأسماك عمود فقري وفكوك وزعانف مزدوجة وقشور وخياشيم ودورة دموية واحدة، ولا تستطيع بناء بعض الأحماض الأمينية.



■ **الشكل 4-2** ت تكون الفكوك من الأقواس الخيشومية الأمامية في الأسماك الفكية.

الفكوك Jaws لمعظم الأسماك فكوك. ويوضح الشكل 4-2 الأقواس الخيشومية التي تكون الفكوك في الأسماك؛ إذ تسمح هذه الفكوك للأسماك الكبيرة بافتراس العديد من المخلوقات الحية، وقد تكون قادرة على افتراس أسماك أكبر حجمًا وأكثر نشاطاً، فتُمسك الأسماك الفريسة بأسنانها القوية، وتحطّمها بعضلات فكيّها القوية. كما تساعد الفكوك للأسماك على الدفاع عن نفسها ضد بعض المفترسات.


ماذا قرأت؟ صُف ما أهمية الفكوك في الأسماك?

الزعانف المزدوجة Paired fins من بديع صنع الخالق عز وجل أن وهب للأسماك تراكيب مختلفة، ومنها الزَّعانف المزدوجة؛ لتساعدها على العيش في البيئات المائية المتنوعة. **الزعانفة** fin تركيب يشبه المجداف على جسم السمكة، أو أي حيوان مائي آخر، تُستعمل للتوازن، وتغيير اتجاه الحركة، والاندفاع إلى الأمام. والزَّعانف الحوضية والزَّعانف الصَّدرية، المبينة في الشكل 5-2، تمنحك السمكة استقراراً أكثر أثناء السباحة. ولمعظم الأسماك زعناف مزدوجة؛ تقلل من فرصة الانقلاب الجانبي (عدم التوازن) للسمكة، وتسمح بتجهيه أفضل لها خلال السباحة.

ساهم وجود كل من الفكوك والزعانف المزدوجة لدى الأسماك في قدرتها على افتراس بعض الأسماك الأخرى، كما مكتتها هذه التراكيب من العيش في بيئات جديدة، وإنجاح أجيال أكثر.



■ **الشكل 5-2** الزَّعانف المزدوجة للأسماك (ومنها الزَّعانف الحوضية والصَّدرية) تسمح لها بالحفاظ على توازنها في أثناء السباحة، وتغيير اتجاه حركتها في الماء.



■ **الشكل 6-2** يبين نوعين من قشور الأسماك، هما القشور المعينة، والقشور القرصية. **صف الفروق الظاهرة بين القشور القرصية والقشور المعينة.**

القشور Scales للأسماء نوع واحد على الأقل من أربعة أنواع مختلفة من القشور. **والقشور scales** تراكيب صغيرة مسطحة تشبه الصفيحة، توجد بالقرب من سطح الجلد في معظم الأسماك. ومنها: القشور المشطية في صورة أحد أنواع الأسماك العظمية الموضحة في بداية هذا الفصل، وكذلك القشور القرصية التي تتكون من عظم وجلد، وهي رقيقة مرنّة، تغطي جسم سمكة السردين، كما في **الشكل 6-2**. أما قشور القرش فتُسمى القشور الصفائحية، وهي مكونة من مواد قاسية وثقيلة، وتشبه الأسنان، كما في **الشكل 14-2** الذي ستردسه لاحقاً. وأما النوع الرابع من القشور فهو القشور المعينة اللمعنة التي تغطي جسم السمكة الرمح، المعينة في **الشكل 6-2**، وهي معينة الشكل ومكونة من مينا (المادة نفسها التي تغطي أسنان الإنسان) وعظم.

ماذا قرأت؟ استنتاج لماذا تختلف القشور باختلاف نوع السمكة?

تجربة 2-1

ملاحظة سمكة

التحليل


- استنتج جسم السمكة مُقسّم إلى ثلاثة مناطق: رأس، وجذع، وذيل. حدد هذه المناطق على الشكل الذي رسمته.
- طبق افتراض أنَّ سمكة فقدت إحدى زعانفها الصدرية عندما أفلتت من مفترس. كيف يمكن أن يؤثِّر هذا في قدرتها على التَّحرُّك في الماء؟



ما خصائص الأسماك التي تستنتجها من خلال الملاحظة؟ ستلاحظ في هذه التجربة سمكة في بيئتها المائية.

خطوات العمل

- املاً بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
- لاحظ سمكة (أسماكاً) في حوض مائي.
- ارسم شكلاً توضيحيًّا لسمكة، ثم أشر إلى التراكيب الآتية: الزعنفة الظَّهيرية، الزعنفة الذَّيلية، الزعنفة الشَّرجية، الزعناف الصَّدرية، الزعناف الحوضية، القشور، الفم، العين، غطاء الخياشيم.
- لاحظ كيف تتحرَّك السمكة في الماء. ووضح كيف تحرَّك السمكة جسمها وزعنفتها عندما تتحرَّك إلى الأمام في الماء.



الخياشيم Gills يسمح تكيف آخر للأسماك بالعيش في البيئات المائية، وهو قدرتها على الحصول على الأكسجين من الماء؛ إذ تحصل الأسماك على الأكسجين عندما يدخل الماء فمها، ثم يعبر خياشيمها، فينتشر الأكسجين من الماء إلى الدم. وتكون الخياشيم من خيوط رقيقة مغطاة بصفيفة شديدة الانثناء. ويوضح الشكل 2-7 تركيب الخياشيم في معظم الأسماك. وتحتوي الصفيحة على العديد من الأوعية الدموية التي يمكنها أن تأخذ الأكسجين، وتطلق ثاني أكسيد الكربون. ويتدفق الدم في الخياشيم في عكس اتجاه جريان الماء على سطح الخياشيم. وجريان التيار المعاكس يمثل آلية فعالة يمكن بها استخلاص الأكسجين من الماء. ويُستخلص 85% من الأكسجين المذاب في الماء تقريباً عندما يجري الماء فوق الخياشيم في اتجاه، ويجري الدم في اتجاه آخر. ولبعض الأسماك **غطاء خيشومي operculum**؛ وهو غطاء متحرك يغطي الخياشيم ويحميها، ويساعد هذا الغطاء أيضاً في ضخ الماء القادم من الفم عبر الخياشيم. وبعض الأسماك - ومنها سمكة الرئة Lung fish - يمكنها أن تعيش خارج الماء لفترة قصيرة باستخدام تراكيب تشبه الرئتين. ويمكن لأسماك الأنجلوں eel (ثعبان الماء) أن تتنفس من خلال الجلد الرطب عندما تكون خارج الماء.

جهاز الدوران Circulation للفقاريات دورة دموية مغلقة، يتم فيها ضخ الدم عبر الأوعية الدموية. ويوضح الشكل 2-8 الجهاز الدوري للأسماك، حيث يجري الدم - في أغلب الأسماك - في دورة دموية واحدة، ويتدفق من القلب إلى الخياشيم، ثم عبر الجسم، فيصل إلى الأنسجة ليزودها بالأكسجين، ثم يعود إلى القلب. ويُوضح مرة أخرى من القلب إلى الخياشيم، ثم إلى جميع أجزاء الجسم مرة أخرى. ولأن هذا النظام يشكل دورة واحدة كاملة ومتصلة، فإنه يُسمى الجهاز الدوري ذات الدورة الواحدة المغلقة.

يتكون القلب - في أغلب الأسماك - من حجرتين رئيسيتين تشبهان الأذين والبطنين في قلبك. **والأذين atrium** هو حجرة القلب التي يصلها الدم من جميع أجزاء الجسم، ثم ينتقل منه إلى **البطن ventricle**؛ وهو الحجرة التي تضخ الدم من القلب إلى الخياشيم. وعندما يمرّ الدم في الخياشيم ينتقل إلى سائر أجزاء الجسم.

■ **الشكل 2-2** تحتوي الصفيحة الرقيقة لخياشيم السمكة على العديد من الأوعية الدموية. استنتاج لماذا تكون خياشيم الأسماك من نسيج رقيق جداً؟


المفردات.....


أصل الكلمة

الأذين Atrium

من الكلمة اللاتينية atrium، وتعني ممراً رئيساً، وفي اللغة العربية هو أحد التجويفين في القسم الأعلى من القلب.

■ **الشكل 2-8** يوضح قلب السمكة الدم عبر جهاز دوري مُغلق.





■ **الشكل 9-2** أعضاء الجهاز الهضمي للسمكة تُشبه مثيلتها في الفقاريات الأخرى.
أعمل قائمة بالتركيب التي يمرّ عبرها الطعام في أثناء هضمه.

التغذية والهضم Feeding and digestion تحصل بعض الأسماك على الغذاء بتصفيته من الماء، أو بالترميم بامتصاصه من بقايا عضوية في قعر المحيط. أمّا الأسماك الفكية فهي مفترسات فعالة تتّنوع مصادر غذائها. ويتكوّن الجهاز الهضمي للأسماك، المبيّن في الشكل 9-2، من أعضاء تُشبه مثيلتها في الفقاريات الأخرى.

تبتلع معظم الأسماك غذاءها كاملاً، ثم يمر إلى المعدة عبر أنبوب يُسمى المريء، حيث يبدأ الهضم، ويمر الغذاء بعد ذلك إلى الأمعاء، ليحدث معظم الهضم فيها. ولبعض الأسماك أكياس بوّابية (معي أعور)، وهي أكياس صغيرة عند منطقة اتصال المعدة بالأمعاء، تُفرز إنزيمات هاضمة، كما تمتّص الغذاء إلى مجرى الدم. ويفرز كل من الكبد والبنكرياس والمحوصلة الصفراوية عصارة هضمية تُساعد على إتمام الهضم.

وتتصف الأسماك بأنها لا تستطيع تصنيع بعض الأحماض الأمينية؛ لذا يجب أن تحصل - مثل بعض أنواع الفقاريات الأخرى - على هذه الأحماض من الأغذية التي تأكلها.


الإخراج Excretion تُنفّي الفضلات الخلوية من دم الأسماك عن طريق أعضاء تُسمى الكلّى، وتسمى الوحدة الوظيفية الأساسية للكلية **الوحدة الأنبوية الكلوية (النفرون nephron)**؛ وهي وحدة تنقية داخل الكلية تساعد على المحافظة على اتزان الماء والأملاح في الجسم، وتُزيل الفضلات الخلوية من الدم. وبعض هذه الفضلات يُطرح عن طريق الخياشيم.

الربط مع الكيمياء تستعمل أسماك المياه العذبة الخاصية الأسموزية لتأخذ الماء؛ وذلك لأنّ الماء المحيط بالأسماك يحوي تركيزاً منخفضاً من الأملاح؛ أي أنّ الماء يحتوي على عدد جزيئات كبير من الماء، مقارنة بعدد جزيئات الماء داخل أنسجة الأسماك. أمّا في الأسماك العظمية التي تعيش في المياه المالحة فيحدث العكس؛ لأنّ الماء المحيط يحوي تركيزاً عالياً من الأملاح؛ أي أنّ عدد جزيئات الماء فيه قليل مقارنة بعدد جزيئات الماء داخل أنسجة الأسماك، لذلك فإنّ أجسام الأسماك تكون قابلة لفقد الماء. وتقوم الكليتان والخياشيم وغيرها من الآليات الداخلية بتنظيم اتزان الماء والأملاح في أجسام أسماك المياه العذبة والمالحة.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

عالم الأسماك (البحار Ichthyologist) يبحث عن معلومات حول سلوك الأسماك، وبيئتها، وتشريحها، ووظائفها، سواءً أكان ذلك في الميدان أم في المختبر. كما يتم عالم الأسماك أيضاً بالأحواض المائية، وينظم مجموعات المتحف، ويدرس في الجامعات، ويحاول المحافظة على جماعات الأسماك.





الدماغ والحواس Brain and Senses يتكون الجهاز العصبي للأسماك - كما في الفقاريات الأخرى - من جبل شوكي ودماغ كما في الشكل 10-2. ويقوم المُخيخ بتنسيق الحركة والتَّحْكُم في الاتزان. وللأسماك مُستقبلات شمية للإحساس بالروائح، تُمْكِنُها من اكتشاف المواد الكيميائية الذائبة في الماء. وتستجيب بُصيلات الشَّم لِلمنبه الكيميائي، وللأسماك أيضًا القدرة على الرؤية الملونة، حيث إنَّ الأجزاء البصرية في الدماغ مسؤولة عن المعلومات البصرية. كما ينسّق المخ المعلومات التي تستقبلها أجزاء الدماغ الأخرى، في حين يسيطر التَّنَاخُع المستطيل على الأعضاء الدَّاخِلية.

وتحتاج الأسماك أن تكتشف أقل حركة في الماء؛ لأن لها مُستقبلات أخرى تُسَمَّى جهاز الخط الجانبي. **جهاز الخط الجانبي lateral line system** يمكن السمكة من اكتشاف الحركة في الماء، ويساعد أيضًا على إيقاعها معتدلة ومتزنة. ويوضح الشكل 10-2 جهاز الخط الجانبي في السمكة.

التَّكاثُر Reproduction تتكاثر معظم الأسماك بالإخصاب الخارجي. وتُطلق الأسماك ذكورًا وإناثًا أمشاجها (خلاياها التناسلية) بعضها قريباً من بعض، خلال عملية تُسَمَّى **وضع البيض (التبويض spawning)**. فتحصل الأجنة النَّامية على الغذاء من الطعام المخزون في مُحَّ البيضة. وتتكاثر بعض الأسماك - ومنها سمكة القرش - بالإخصاب الدَّاخِلِي. وعلى الرَّغم من حدوث الإخصاب الداخلي فإن نمو الجنين في بعض أنواع الأسماك يكون خارج جسم الأنثى بعد أن تضع البيضة المُخضَّبة. ولبعض أنواع الأسماك إخصاب داخلي ينمو فيه الجنين داخل جسم الأنثى، وفي هذه الحالة يأخذ الجنين النَّامي غذاء من جسم الأم.

■ **الشكل 10-2 للأسماك دماغ يُمْكِنُها من القيام بوظائفها الحيوية.**
استنتاج كيف يختلف دماغ سمكة تعيش على البقايا العضوية في قاع بركة ماء عن دماغ سمكة مفترسة تسحق بخفة خلف فريسة؟




■ **الشكل 11-2** معظم الأسماك لا تعتني بصغارها؛ ومع ذلك فإن ذكر أسماك الحارس الكبير من الأسماك التي تعتني ببيوضها.

وستستطيع الأسماك التي تتکاثر بالإخصاب الخارجي أن تنتج ملايين البيوض في الفصل الواحد. ومعظم هذه الأسماك لا تحمي بيضها ولا تعتنى به ولا بصغارها. لذا يكون مصير العديد من هذه البيوض الصغار أن تفترسها حيوانات أخرى. وتنتج الأسماك كمية كبيرة من البيوض ليتمكن بعض الصغار من النمو والنجاة حتى يصلوا إلى سن التكاثر. أما ذكور أسماك الحارس الكبير *Sergeant major fish*، الشكل 11-2، فتحرس البيوض المخصبة من المفترسات حتى تفقس الصغار.

الحركة Movement تكيفت الأسماك بشكل جيد للسباحة في الماء؛ فمعظم الأسماك الآسيوية الشكل، ولمعظمها مخاط يُزيّن سطح جسدها، ويقلل من احتكاك السمكة بالماء. وتمكّن الزعانف الأسماك من تغيير الاتجاهات والمُناورة بعدة طرائق مختلفة، وتقلّل قوة طفو الماء من تأثير الجاذبية في الأسماك. وبالإضافة إلى هذا فإن **مثانة العوم** – *swim bladder* – وهي كيس مملوء بغاز مثل البالون يوجد في الأسماك العظمية. تسمح للسمكة بالتحكم في عمق غوصها، انظر الشكل 9-2. وعندما تنتشر الغازات خارج مثانة العوم يمكن للسمكة أن تغطس إلى أسفل. أما عندما تنتشر الغازات من الدم إلى داخل مثانة العوم فإنَّ السمكة ترتفع إلى أعلى خلال الماء.

الربط Physics يبين الشكل 12-2 حركة الأسماك عبر الماء، من خلال انقباض مجموعات عضلية على جانبي أجسامها، بحيث يسمح ترتيب العضلة بانقباضها، ومن ثم اثناء جزء كبير من جسمها. وكلما اثنى هذا الجزء من الجسم دفع الماء بقوة، مولداً قوة معاكسة تسمح بحركة السمكة إلى الأمام. وتتولد قوة الدفع في اتجاه الانثناء في جسم السمكة. كما أن الانقباض المتبادل للعضلات – الذي يبدأ على جهة واحدة من جسم السمكة ثم ينتقل إلى الجهة المقابلة – يحافظ على استمرار حركة السمكة بطريقة تشبه الحرف S.

■ **الشكل 12-2** يُحرك الأنقليس جسمه كاملاً على نمط الحرف S. أما الأسماك الأخرى الأسرع في الحركة – ومنها السلمون المرقط – فتحرّك ذيولها فقط عندما تندفع خلال الماء.



■ **الشكل 2-13** لأسماك الجريث والجلكي تراكيب تُشبه الأسنان على أسنانها. وسمك الجلكي مُنطفل على الأسماك الحية الأخرى. **صف التَّكِيفات التي تراها في صورة سمكة الجريث التي تمكنتها من العيش في قاع البحر.**



الجلكي



الجريث


طوائف الأسماك Classes of fishes

تقسم الأسماك إلى ثلات طوائف بناءً على تركيب أجسامها؛ فأسماك الجريث Hagfish والجلكي Lamprey أسماك لافكية، أما القرش والورنك واللحمة Ray فأسماك غضروفية، وأسماك العظمية تتضمن الأسماك ذات الزعانف الشعاعية (الهامور والتونة)، وذات الزعانف المجزأة.

الأسماك اللافكية Jawless fishes ومنها أسماك الجلكي والجريث، كما في **الشكل 2-13**، والجريث كالجلكي أسماك لافكية، ليس لها قشور أو زعانف مزدوجة أو هيكل عظمي، ولها جبل ظهري يبقى طوال حياتها. وسمكة الجريث من الحيوانات الكائنة تتغذى على اللافقاريات الطيرية وأسماك المياه الميتة. وعلى الرغم من كونها عمياً تقريباً فإن إحساسها الكيميائي الحاد يُمكّنها من تحديد موقع الطعام. ولأسماك الجلكي خياشيم ولها عدد من الخصائص الأخرى للأسماك. والجلكي البالغ، المبين في **الشكل 2-13**، مُنطفل يتغذى بتثبيت نفسه على أسماك أخرى. فيستعمل فمه (القمعي المستدير) الشبيه بالمضادات ولسانه المزود بتراتيب تشبه الأسنان ليتغذى على دم عائله وسوائل جسمه.

ماذا قرأت؟ اكتب قائمة بخصائص الأسماك اللافكية.





■ **الشكل 14-2** لأسماء القرش أجسام انسانية مغطاة بقشور صفائحية صلبة.
استنتاج ماذا تتوقع أن يكون ملمس جلد سمكة القرش إذا لمسته؟

الأسماء الغضروفية Cartilaginous fishes يتتمي القرش والورنك واللخمة إلى طائفة الأسماك الغضروفية Chondrichthyes. وأهم ما يميز سمكة القرش وكل الأسماك الغضروفية أن الفم يقع على الجهة البطنية بالإضافة إلى هيكلها المكون من الغضروف، وكربونات الكالسيوم. فالغضروف يعطي الجسم المرونة، أما كربونات الكالسيوم فتعطيه القوة. وبعض أنواع أسماك القرش لها عدّة صفوف من الأسنان الحادة. وعندما تنكسر أسنان سمك القرش أو يفقدها، تتحرّك أسنان جديدة نحو الأمام لتحل محلها. ولمعظم أنواع سمك القرش أيضاً جسم انساني ذو رأس مدبّب وذيل مرتفع إلى أعلى في المؤخرة، كما في الشكل 14-2.


وقد ساعد الجسم الانساني لأسماء القرش، إضافة إلى عضلات السباحة القوية وأسنانها الحادة، على أن تكون من المفترسات المُميزة في الماء. ويستطيع سمك القرش الإحساس بالمواد الكيميائية في الماء، مما يسمح له بكشف الفريسة عن بعد كيلومتر واحد. وكلما اقترب القرش من فريسته، فإن الخط الجانبي على جسمه يستطيع أن يكتشف الاهتزازات في الماء. وفي المرحلة الأخيرة من مطاردة الفريسة، يمكنه أن يستخدم بصره والمُستقبلات الأخرى لاكتشاف المجالات الكهرومغناطيسية التي تصدر عن الحيوانات كلها. من التكيفات الأخرى للحياة الافتراضية العجل القاسي المُعطى بحرافش صفائحية، كما في الشكل 14-2.

بعض أسماك القرش لا تمتلك صفوفاً من الأسنان. فأسماء قرش الحوت، وهي أكبر أسماك القرش الحية، مخلوقات ترشيحية التغذّي من خلال استخدام تراكيب خاصة في أفواهها. ولبعض أسماك القرش الأخرى أفواه ذات تراكيب تساعدها على التغذّي على الرخويات الصدفية.

الأسماء العظمية Bony fishes تحوي طائفة الأسماك العظمية مجموعتين من الأسماك، هما: الأسماك العظمية الشعاعية الزعناف، والأسماك العظمية المجزأة الزعناف. وللأسماك ذات الزعناف الشعاعية هيكل عظمي، وقشور مشطية أو دائرية، وغطاء يغطي الخياشيم، ومثانة للعلوم. وأكثر ما يميز أسماك الزعناف الشعاعية مذكور في اسمها. والأغشية الرقيقة لزعناف هذه الأسماك مدروعة بتراكيب رقيقة تشبه الأشواك، كما في الشكل 15-2. ومعظم الأسماك - ومنها السلمون والتونة - أسماك شعاعية الزعناف.


Bony Fishes

■ الشكل 15-2 تقسم طائفة الأسماك العظمية إلى تحت طائفتين، هما: أسماك شعاعية الزعناف، وأسماك مجزأة الزعناف.




للأسماك الشعاعية الزعناف تراكيب رقيقة تشبه الأشواك، تدعم أغشية زعنافها.

سمكة مجزأة الزعناف



للأسماك المجزأة الزعناف أجزاء عضلية ومفاصيل تُشبه مثيلتها في رباعيات الأطراف الأولية.

رباعيات الأطراف الأولية



تحتوي أطراف رباعيات الأولية على مفاصيل وأجزاء عضلية خاصة بالحركة والسباحة، وقد عاشت على الأرض قبل 325 مليون سنة تقريباً.

لزعانف الأسماك المجزأة أجزاء عضلية ومفاصيل، وهذا يجعل الزّعانف أكثر مرونة من تلك التي في الأسماك الشعاعية الزّعانف. وللأسماك المجزأة الزّعانف، ومنها السلمكة الرّئوية، رثات لتبادل الغازات. وعندما يحدث الجفاف، يمكن للسمكة الرّئوية أن تدفن نفسها مع زعنافها الطّرية في الطين وتتنفس الهواء. وعندما يهطل المطر، تخرج هذه الأسماك من مخابئها، واليوم لا يوجد سوى ثمانية أنواع من الأسماك المجزأة الزّعانف.

وتعدّ أسماك الزّعانف الشعاعية الـ*الذيلية الجوفاء* Coelacanths مجموعة أخرى صغيرة من الأسماك الشعاعية الزّعانف التي اعتقد الكثير من الناس أنها انقرضت قبل 70 مليون عام تقريباً. ولكن في عام 1938م، اصطاد بعض الصياديـن على سواحل أفريقيا الجنوبية سمكة من هذه المجموعة. ومنذ ذلك الوقت، تمَّ اصطياد العديد من هذه الأسماك. وهناك مجموعة ثالثة انقرضت من الأسماك المجزأة الزّعانف، لها خصائص مشتركة مع رُباعيات الأطراف. والحيوان الـ*الرباعي الأطراف* Tetrapod، كما في **الشكل 15-2**، حيوان له أربعة أطراف (أرجل)، تحتوي كل منها على أجزاء عضلية وقدم وأصابع لها مفاصيل.

بيئة الأسماك

الأسماك مصدر مهم للغذاء في كل الأنظمة المائية. ومع ذلك فقد غيرت نشاطاتُ الإنسان مواطنـها في المياه العذبة والمياه المالحة، ومن ذلك بناء السـدود على الأنهر، أو التـلـوث. وتعد الأسماك مؤشرات حـيـوية لـصـحةـ النـظـامـ البيـئـيـ المـائـيـ؛ فـعـنـدـمـاـ تـنـاقـصـ مـجـمـوعـاتـ الأسـمـاكـ غـيرـ التـجـارـيـةـ يـكـونـ السـبـبـ الرـئـيـسـ تـغـيـرـ المـوـطـنـ. وـعـنـدـمـاـ تـنـاقـصـ أـعـدـادـ الأسـمـاكـ لـاـ يـكـونـ التـأـيـرـ سـلـيـيـ اـقـتصـادـيـاـ عـلـىـ الـبـشـرـ فـقـطـ، بـلـ قـدـ تـعـانـيـ الـأـنـظـمـةـ الـبـيـئـيـةـ أـيـضاـ مـنـ عـدـمـ الـإـزـانـ.

الشكل 16-2 لا تستطيع بعض أنواع السـلـمـونـ القـفـزـ عـنـ السـدـودـ المـسـتـخـدـمـةـ فيـ تـولـيدـ الـكـهـرـبـاءـ مـنـ الطـاـقـةـ المـائـيـةـ. وـلـكـيـ يـضـعـ بيـضـهـ، يـحـبـ أـنـ يـعـودـ السـلـمـونـ إـلـىـ الـجـداولـ الـتيـ فـقـسـ فيهاـ.



تغير الموطن *Habitat alteration* نوع من الأسماك المهاجرة، يقضي حياته كبالغ في المحيط ولكنه يعود إلى المياه العذبة لوضع البيض في الجدول حيث يفقس فيه الصغار. وفي شمال غرب المحيط الهادئ، تغيرت مواطنـ البيـئـيـةـ فيـ الأنـهـارـ وـالـجـداولـ بـسـبـبـ بنـاءـ السـدـودـ التيـ تـمـنـعـ الـهـجـرـةـ صـعـوـدـاـ وـهـبـوـطاـ للـسـلـمـونـ، وـكـانـتـ التـيـجـةـ النـهـائـيـةـ فيـ شـمـالـ غـرـبـ المـحـيـطـ الـهـادـئـ، عـلـىـ سـيـلـ المـثالـ، أـنـ أـعـدـادـ السـلـمـونـ الـتـيـ تـسـبـحـ صـاعـدـةـ عـكـسـ التـيـارـ، كـماـ فيـ **الـشـكـلـ 16-2**، أـصـبـحـتـ حـوـالـيـ ثـلـاثـةـ فـيـ الـمـئـةـ فـقـطـ مـنـ بـيـنـ 10ـ 16ـ مـلـيـونـ سـلـمـونـ تـقـرـيـباـ. سـبـحـتـ إـلـىـ الـأـنـهـارـ قـبـلـ 150ـ سـنـةـ مضـتـ.

التلوث *pollution* يمكن أن تغيّر مواطنـ البيـئـيـةـ لـلـأـسـمـاكـ منـ خـلـالـ التـلـوثـ الذيـ يـقـلـلـ مـنـ نـوـعـيـةـ المـيـاهـ العـذـبـةـ وـجـوـدـهـاـ فـيـ الـبـحـيرـاتـ، وـالـأـنـهـارـ، وـالـجـداولـ. وـيـمـكـنـ أـنـ يـقـلـلـ هـذـاـ مـنـ عـدـدـ الـأـسـمـاكـ وـتـنـوـعـهـاـ فـيـ مـنـطـقـةـ ماـ. وـفـيـ بـعـضـ الـحـالـاتـ، عـنـدـمـاـ يـزـوـلـ السـبـبـ الـمـسـؤـولـ عـنـ تـغـيـرـ المـوـطـنـ الـبـيـئـيـ وـتـعـوـدـ الـظـرـوفـ إـلـىـ طـبـيـعـتـهـاـ، تـعـودـ الـأـسـمـاكـ أـيـضاـ. فـمـثـلاـ انـخـفـضـتـ نـسـبـةـ الـأـسـمـاكـ الـتـيـ تـعـيـشـ بـالـقـرـبـ مـنـ شـوـاطـئـ الـبـحـرـ الـأـحـمـرـ نـتـيـجـةـ التـلـوثـ بـالـمـخـلـفـاتـ وـالـفـضـلـاتـ. أـمـاـ بـالـنـسـبـةـ لـمـيـاهـ الـخـلـيجـ الـعـرـبـيـ فقدـ انـخـفـضـتـ نـسـبـةـ العـدـيدـ مـنـ أـنـوـاعـ الـأـسـمـاكـ نـتـيـجـةـ تـلـوثـ موـطـنـهاـ بـالـنـفـطـ الـمـتـسـرـبـ إـلـىـ مـيـاهـ الـخـلـيجـ فـيـ الـفـترـاتـ السـابـقـةـ، وـبـعـدـ تـعـافـيـ المـوـطـنـ تـدـريـجيـاـ بـدـأـتـ أـعـدـادـ هـذـاـ الـأـسـمـاكـ بـالـزـيـادـةـ التـدـريـجـيـةـ.

التقويم 1-2

الخلاصة

- تضم الفقاريات الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات.
- للفقاريات كلها جبل ظهري. ويحل العمود الفقري في أغلب الفقاريات محل الجبل الظهري خلال النمو الجنيني.
- للأسماء خصائص مُعَيَّنةً مُشتركة. لذا تُصنف معًا.
- لأجسام الأسماك تكييفات فريدة تُمكِّنها من العيش بشكل كامل في الماء.
- يمكن تصنيف الأسماك في ثلاث طوائف أساسية، هي: أسماك لافكية، وأسماك غضروفية، وأسماك عظمية.
- الجريث والجلكي مثالان على الأسماك اللافكية. وأسماك القرش والورنك مثالان على الأسماك الغضروفية. والسلمون والهامور مثالان على الأسماك العظمية.
- تغيير الموطن والتلوث قد يؤثِّران سلباً في جماعات الأسماك.

فهم الأفكار الرئيسية

الفكرة الرئيسية

التفكير الناقد

7. كون فرضية يبني ذكرأسماك أبي شوكة Spined stickleback من مواد لامعة براقة قليلة الوجود تختارها الإناث غالباً. كون فرضية حول أهمية ذلك في اختيار الأنثى ذكرًا له صفات قوية ضمن أنفراد نوعه.
8. استنتاج كيف تؤثر إصابة جهاز الخط الجانبي في قدرة السمكة على الهروب من المفترسات؟

1. الفكرة الرئيسية لخص خصائص الفقاريات التي تجعلها تختلف عن اللافاريات.
2. صف خصائص الأسماك التي تسمح لها بالعيش والتكاثر في الماء.
3. قوم أهمية الفكوك في الأسماك.

4. حدد الخصائص التي تشتراك فيها معظم الأسماك.
5. فسر لماذا يجب على أسماك المياه العذبة وأسماك المياه المالحة تنظيم اتزان الماء والأملاح داخل أجسامها؟
6. قارن بين التراكيب الداخلية والخارجية في الأسماك اللافكية والأسماك الغضروفية والأسماك العظمية.





2-2

الأهداف

تُحلل أنواع التكيفات التي كانت مهمة عندما انتقلت بعض المخلوقات الحية إلى اليابسة.

تلخص خصائص البرمائيات.

تفرق بين رتب البرمائيات.

مراجعة المفردات

التحول: Metamorphosis: تغيرات نمو مُتابعة في شكل المخلوق الحي أو تركيبه.

المفردات الجديدة

المجمع (الذرق)

الغشاء الرامش

غشاء الطلبة

متغيرة درجة الحرارة

البرمائيات Amphibians


الفكرة الرئيسية لمعظم البرمائيات تكيفات تؤهلها للعيش جزءاً من حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابسة.

الربط مع الحياة إذا فكرت في السباحة فستجد أن التَّحْرُك في الماء يختلف عن التَّحْرُك على اليابسة. وكما أن للأسماء تكيفات تمكّنها من العيش في الماء فإن للبرمائيات البالغة أيضاً تكيفات للعيش على اليابسة.

الانتقال إلى اليابسة The move to land واجهت بعض المخلوقات الحية تحديات فيزيائية كثيرة في الانتقال من الماء إلى اليابسة. و**يُبيّن الجدول 2-1** بعض اختلافات ظروف الحياة في الماء عنها على اليابسة. وتشمل هذه الاختلافات الطفو، وتركيز الأكسجين، ودرجة الحرارة. ويوضح الجدول أيضاً أمثلة على تكيفات الفقاريات البرية للحياة على اليابسة، كما يوضح **الشكل 17-2** تكيف البرمائيات للحياة البرية.

التكيفات للعيش على اليابسة		الجدول 2-1
الظروف في الماء	الظروف على اليابسة	التكيفات الفقاريات للعيش على اليابسة
للماء قوة طفو تعكس قوة الجاذبية.	<ul style="list-style-type: none"> قوه طفو الهواء أقل من قوه طفو الماء 1000 مرة تقريباً. يجب أن تتحرّك الحيوانات عكس قوه الجاذبية. 	تكون الأطراف والأجهزة العضلية والهيكلية للمخلوقات البرية أقوى.
الأكسجين يذوب في الماء، ويجب أن يستخلاص عن طريق الخياشيم من خلال دورة دموية تتحرّك عكس اتجاه التيار المائي.	<ul style="list-style-type: none"> يتوافر الأكسجين على اليابسة أكثر من توافره في الماء 20 مرة على الأقل. 	يمكن لحيوانات اليابسة أن تحصل على الأكسجين من الهواء بشكل فعال أكثر من الماء؛ بسبب رئتها.
يحتفظ الماء بالحرارة، لذا لا تتغيّر درجة حرارة الماء بسرعة.	<ul style="list-style-type: none"> تتغيّر درجة حرارة الهواء أسرع من درجة حرارة الماء. قد تتغيّر درجة الحرارة اليومية بمقدار 10°C بين النهار والليل. 	أظهرت حيوانات اليابسة تكيفات سلوكية وفيزيائية؛ لكي تحمي نفسها من درجات الحرارة العالية.

الشكل 17-2 يبيّن أهم التكيفات التي ساعدت البرمائيات على العيش على اليابسة.



بالإضافة إلى الفروق المُدرجة في الجدول 1-2، هناك فرق آخر بين ظروف اليابسة والماء؛ وهو أنَّ الصوت ينتقل أسرع في الماء. لذا تستعمل الأسماك جهاز الخط الجانبي للإحساس بالذبذبات، أو موجات الصوت في الماء. ولكن في الهواء يكون هذا الجهاز غير فعال. أما في فقاريات اليابسة (البرية) فقد تخصصت الأذن في الإحساس بموجات الصوت التي تنتقل عبر الهواء.

بيئات اليابسة **Terrestrial habitats** على الرَّغم من التَّحديات المرتبطة مع الحياة البرية إلا أنَّ هناك العديد من البيئات المناسبة للمخلوقات الحية على اليابسة؛ حيث تتضمن المناطق البيئية المختلفة على اليابسة الغابات المطيرة الاستوائية، والغابات المعتدلة، والأراضي العُشبية، والصحاري، والتِّيجا Taiga، والتندرا Tundra، وكلها توفر بيئات مُناسبة للمخلوقات الحية ذات التَّكيفات المُناسبة.

خصائص البرمائيات


Characteristics of Amphibians

هل سبق أن شاهدت أبوذنيبة في بركة ماء؟ ادرس أبوذنيبة المبين في الشكل 18-2، ثم صفةه. أبوذنيبة (الشرغوف) يرقة ضفدع من دون أطراف، يتنفس بالخياشيم، وهو يُشبه السمكة. ويدخل أبوذنيبة يوماً بعد يوم في عملية التَّحول، فتكتون الأطراف الخلفية وتطول، ويقصر الذيل، وتحل الرئات محل الخياشيم، وتتمو الأطراف الأمامية. وبعد عدَّة أسابيع فقط أو أشهر، اعتماداً على نوعه يصبح ضفدعًا بالغاً. ومعظم البرمائيات تبدأ حياتها مخلوقات مائية، وبعد التَّحول تُصبح قادرة على العيش على اليابسة.

وتضم البرمائيات الضفادع، والعجوم، والسلمندر Salamander، وToad، وسمندل الماء العذب Newts، والديدان العديمة الأطراف. وتميَّز معظم البرمائيات بأنَّ لها أربع أرجل، وجلاًداً رطبًا من دون قشور، ويتم تبادل الغازات عبر الجلد، والرئات أو بطانة الفم كل على حدة أو مجتمعين، ولها دورة دموية مزدوجة، ويرقات مائية.

التغذية والهضم **Feeding and digestion** مُعظم يرقات الضفادع آكلات أعشاب، في حين أنَّ يرقات السلمnder آكلات لحوم. وعلى كُل حال، يتتشابه الغذاء في المجموعتين عند البلوغ، حيث تصبح جميعها مفترسات تتغذى على العديد من اللافقاريات والفقاريات الصغيرة. ويستعمل بعض السلمndرات والبرمائيات التي ليس لها سيقان الفكوك فقط للإمساك بالفريسة. وبعضها الآخر - ومنها الضفدع والعجوم - يمكنها أن تطلق ألسنتها الطوبلية اللزجة بسرعة كبيرة ودقة للإمساك بالفراش الطائرة.

لا توجد لدى الضفادع غدد لعابية وبالتالي فإنَّ الطعام ينتقل من الفم إلى المريء إلى المعدة، حيث يبدأ الهضم، ثم ينتقل الغذاء غير المهضوم من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، فيختلط بإفرازات البنكرياس لهضم الطعام، ويُمتص فيها، ثم ينتقل إلى مجرى الدم الذي يوصله إلى خلايا الجسم، وينتقل الغذاء غير المهضوم من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة قبل التَّخلُّص من الفضلات. وفي نهاية الأمعاء هناك مجرى يسمى المجمع. **المجمع (المذرق)** Cloaca حجرة تستقبل فضلات الهضم، وفضلات البول، والبويبة أو الحيوان المنوي قبل مغادرة الجسم.



■ الشكل 2-18

الأعلى: أبوذنيبة من دون أطراف.

الأوسط: يدخل الضفدع في عملية التَّحول ليُصبح ضفدعًا بالغاً. لاحظ نمو الأطراف.

الأسفل: ضفدع الأشجار دقيق الأرجل، وهو بالغ له أطراف متخصصة، وليس له ذيل.

المفردات.....

الاستعمال العلمي مقابل

الاستعمال الشائع.

البرمائيات Amphibian

الاستعمال العلمي: مخلوقات تتسمى إلى طائفة البرمائيات؛ وتقضى جزءاً من حياتها في الماء، والجزء الآخر على اليابسة.

- الضفدع حيوان برمائي.

الاستعمال الشائع: طائرة مصممة للإقلاع والهبوط، إما على اليابسة، وإما على الماء.

هبطت البرمائية بهدوء على مياه البحيرة...


■ **الشكل 19-2** يتكون جهاز الدوران في البرمائيات من دورة دموية مزدوجة تُحرّك الدم خلال الجسم.

الإخراج Excretion تُرشح البرمائيات الفضلات من الدم من خلال الكلى، وتُخرج الأمونيا أو اليوريا (بولينا) بوصفها فضلات ناتجة عن عمليات الأيض الخلوي. أمّا الناتج النهائي لعملية أيض البروتينات وهو الأمونيا فيتم طرحها من البرمائيات التي تعيش في الماء. وتُنتج البرمائيات التي تعيش على اليابسة فضلات اليوريا التي تكونت من الأمونيا في الكبد. وعلى عكس الأمونيا تخزن اليوريا في المثانة البولية حتى يتخلص منها الجسم من خلال المجمع.

التنفس والدورة الدموية Respiration and circulation تتبادل معظم البرمائيات الغازات عندما تكون يرقة من خلال جلدها وخياشيمها، وعندما تصبح بالغة يتنفس معظمها عن طريق الرّئتين وجلدتها الرّقيق الرّطب وبطانة تجاويف الفم. ويمكن للضفادع أن تتنفس من خلال جلدها، سواء أكانت خارج الماء أم داخله. وهذه الخاصية تمكّن الضفادع من قضاء الشّتاء محمية من البرد داخل الطّين في قاع بركة الماء.

يتكون جهاز الدوران في البرمائيات - كما في **الشكل 19-2** - من دورة دموية مزدوجة، بدلاً من الدورة الدموية المفردة التي درستها في الأسماك. في الدورة الأولى يتحرّك الدم غير المؤكسج من القلب ليتحمّل بالأكسجين في الرّئتين والجلد، ثُمَّ يتحرّك الدم المؤكسج عائدًا إلى القلب. وفي الدورة الثانية يتحرّك الدم المؤكسج من القلب عبر الأوعية الدموية إلى الجسم، حيث يتشرّد الأكسجين نحو الخلايا. وللبرمائيات قلب مكون من ثلاث حجرات. وينقسم الأذين كلياً بنسيج إلى أذينين. ويستقبل الأذين الأيمن دمًا غير مؤكسج من الجسم، في حين يستقبل الأذين الأيسر الدم المؤكسج من الرّئتين. ويبقى البطنين في البرمائيات غير مُقسّم.

ماذا قرأت؟ صُفْ كيف يتكيّف جهاز الدوران في البرمائيات للحياة على اليابسة?




الدماغ والحواس The brain and senses

متخصصة، كما هو الحال في الأسماك. وقد انعكست الفروق في ظروف الحياة في الماء وعلى اليابسة على الفروق بين أدمغة الأسماك وأدمغة البرمائيات. فعلى سبيل المثال، يحتوي الدماغ الأمامي للضفادع على منطقة ذات علاقة برصد الرؤائح المنتشرة في الهواء. فالمحنيخ - على الرغم من أهميته في المحافظة على الاتزان في الأسماك - ليس معقداً في البرمائيات البرية التي تبقى قريبة من سطح الأرض.

والبصر حاسة مهمة في أغلب البرمائيات؛ حيث تستعمله لتحديد الفريسة التي تطير على سرعات عالية، والإمساك بها، والهروب من المفترسات. ويعطي عيون الضفادع أغشية تسمى أغشية رامش. **وغضاء الطبلة** nictitating membrane هي غشاء يساعد على الحفاظ على العين، لحمايتها تحت الماء، وحمايتها من الجفاف على اليابسة.

تُظهر أذن البرمائيات تكيفاً للحياة على اليابسة؛ **غضاء الطبلة tympanic membrane** في الضفادع غشاء رقيق خارجي على جانب الرأس، كما في الشكل 20-2، تستعمله لسماع الأصوات العالية التردد، ولتضخيم الأصوات من العبال الصوتية. وتشمل الحواس الأخرى في البرمائيات: اللمس، والمستقبلات الكيميائية في الجلد، وبراعم التذوق على اللسان، وحسنة الشم في التجويف الأنفي.



شكل 20-2 غشاء الطبلة في الضفادع تكيف للعيش على اليابسة.

مختبر تحليل البيانات 2-1

بناءً على بيانات حقيقة

تفسير الرسم البياني


كيف يمكن أن تؤثر درجة الحرارة في معدل ذبذبات نقيق ضفادع الأشجار؟ تصدر ذكور ضفادع الأشجار صوتاً (نقيقاً) يمكن أن تميزه الإناث بسهولة؛ اعتماداً على معدل ذذبذبات النقيق.

البيانات والملاحظات

يُظهر الرسم البياني معدل ذذبذبات النقيق ل نوعين من الضفادع مقابل درجة الحرارة.

التفكير الناقد

- فَسّر البيانات ما العلاقة بين ذذبذبات النقيق ودرجة الحرارة؟
- قارن كيف أثرت درجة الحرارة في معدل الذذبذبات في النوع A والنوع B؟
- استنتج ما أهمية أن يكون لنوعي الضفادع معدل ذذبذبات النقيق نفسه عند درجة الحرارة نفسها؟



أخذت البيانات في هذا المختبر من: Gerhardt, H.C. 1978. Temperature coupling in the vocal communication system in the grey treefrog *Hyla versicolor*. *Science* 199: 992-994



■ الشكل 2-21 ليس لبيوض البرمائيات قشور تحميها من الجفاف.
استنتاج ما التكيفات التي تضمن عدم جفاف بيوس البرمائيات؟

من المهم أن تحس البرمائيات بدرجة حرارة محاطها؛ لأنّها من الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة. **والمتغير درجة الحرارة** ectotherms مخلوقات تحصل على حرارة أجسامها من البيئة الخارجية، ولا تستطيع أن تنظم درجات حرارة أجسامها من خلال عمليات الأيض، لذا يجب أن تكون قادرة على الإحساس بالمكان المناسب لتتدفئة أجسامها أو تبریدها. فعلى سبيل المثال، إذا كان الطقس بارداً يمكن للعلجوم أن يجد صخرة دافئة ورطبة ليعرض جسمه للشمس ويدفع نفسه.

التكاثر والنمو Reproduction and development الاصناب خارجي في البرمائيات حيث تطلق ذكور الصفاديض المنيوية عند التزاوج على البيوض اثناء خروجها من جسم الانثى في الماء. وليس للبيوض قشور أو أغطية واقية تحميها من الجفاف. والبيوض - كما في الشكل 2-21 - مغطاة بمادة لزجة تشبه الهلام، تساعدها على الالتصاق بالنباتات في الماء. وبعد التلقيح يستعمل الجنين النامي المُمح في البيضة للتغذى حتى يفقس منها أبوذنيبة الذي يتحول، كما في الشكل 18-2، من مخلوق يتنفس بالخياسيم ومخلوق عديم الأرجل، أكل أعشاب، وله زعناف وقلب مكون من حجرتين - إلى مخلوق يتنفس بالرئتين، رباعي الأرجل أكل لحوم، وله قلب ثلاثي الحجرات. وتحكم مواد كيميائية تطلق داخل جسم أبيذنيبة في مراحل التحول.

تنوع البرمائيات Amphibian Diversity

يصنّف علماء الأحياء البرمائيات إلى ثلاثة رتب: رتبة عديمة الذيل Anura وتحتوي 4200 نوع من الصفاديض والعلاجيم؛ ورتبة الذيليات Caudata، وتحتوي 400 نوع من السلمدرات؛ ورتبة عديمة الأرجل Gymnophiona، التي تضم مئة وخمسين نوعاً من عديمة الأطراف التي تشبه الديدان. وتعيش الصفاديض والعلاجيم والسلمدرات في مناطق رطبة في بيئات مختلفة، أما السمندل فهو مائي، وأما عديمة الأطراف فهي حيوانات استوائية تدفن نفسها.

■ الشكل 2-22 للصفدع جلد رطب وناعم، مقارنةً بالعلجوم الذي له جلد جاف وغير ناعم.

الصفاديض والعلاجيم Frog and toads تقتصر الصفاديض والعلاجيم البالغة - كما في الشكل 2-2 - إلى الذيل، ولها أقدام طويلة تُمكّنها من القفز. وللصفاديض أرجل أطول من العلاجيم، تُمكّنها من القفز بفاعلية أكبر مقارنة بقفزات العلاجيم الصغيرة.





سلمندر أحمر



السمندل المائي ذو التأليل

وللضفادع أيضًا جلد رطب وناعم، في حين أن جلد العلاجوم جاف وذو نتوءات وانخفاضات. وعلى الرغم من حاجة كل منهما للعيش قرب الماء من أجل التكاثر إلا أن العلاجيم عموماً تعيش أبعد عن الماء من الضفادع. وثمة فرق آخر بين الضفادع والعلاجيم، وهو أن للعلاجيم غدداً تشبه الكلية خلف رؤوسها تفزر سماً سيء الطعم، لا يشجع المفترسات على أكلها.

■ **الشكل 23-2** يعيش السَّلمندر الأحمر شرقي الولايات المتحدة فقط. ويتكاثر السَّلمندل المائي ذو التأليل في أعماق البرك التي تحتوي على نباتات مائية.

ماذا قرأت؟قارن بين خصائص الضفادع والعلاجيم.

السلمندرات وسمندلات الماء *Salamanders and newts* على العكس من الضفادع والعلاجيم فإن للسلمندرات وسمندلات الماء أجساماً طويلة ونحيلة، ولها رقبة وذيل، كما في **الشكل 23-2**. ولمعظم السلمندرات أربع أرجل وجلد رقيق رطب، ولا تستطيع العيش بعيداً عن الماء. وتضع معظم السلمندرات بيوضها في الماء، مثل الضفادع. وتشبه يرقات الضفادع السلمندرات الصغيرة، إلا أنّ لها خياشيم. أما السَّلمندلات المائية - كما في **الشكل 23-2**، فهي مائية عموماً طوال حياتها، في حين تعيش معظم السلمندرات المكتملة النمو في بيئات رطبة بين الأوراق المتساقطة أو تحت الجذوع. ويتراوح طول السلمندرات بين 15 cm تقريباً، وقد يصل طول بعضها - ومنها السلمندر العملاق - إلى 1.5 m. ويتجذر السلمندر المكتمل النمو على الديدان وبيوض الضفادع والحشرات واللافقاريات الأخرى.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

مربي الحيوانات Animal Curator

يعمل مُربو الحيوانات في حدائق الحيوان، ويعتنون ببعض حيوانات الحديقة، ومنها البرمائيات. ويعملون معًا لتحديد الطريقة المثلثى للمحافظة على البيئة المناسبة للحيوان داخل الحديقة.



■ **الشكل 24-2** ليس لعديمة الأطراف فتحات أذن. ولا يُعرف إن كانت تستطيع سمع الأصوات، أو كيف تسمعها.

عديمة الأطراف Caecilians تختلف عن البرمائيات الأخرى؛ فليس لها أطراف وهي تُشبه الديدان، كما في **الشكل 24-2**. وهي تدفن نفسها في التربة، وتتغذى على الديدان وبعض اللافقاريات الأخرى. ويغطي الجلد العيون في العديد من عديمة الأطراف، لذا قد تكون عمياء تقريباً. ولعديمة الأطراف كلها إخصاب داخلي؛ إذ تضع بيوضها في تربة رطبة تقع قرب الماء، ومنها أمثلتها: السيسيليا السوداء، السيسيليا الهندية، السيسيليا الاستوائية. وتعيش عديمة الأطراف في الغابات الاستوائية في أمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا.



كيف تكَيَّفت الضفادع للعيش في
المواطن البيئية البرية والمائية؟

ارجع لندليل التجارب العملية على منصة عين الاشترانية

بيئة البرمائيات Ecology of Amphibian


تناقصت جماعات البرمائيات في العقود القرية على مستوى العالم. وقد جمع العلماء بيانات لتحديد الأسباب المحتملة لهذا التناقص، فاختللت التأاج. ويمكن في بعض الحالات حصر السبب في عامل محلي، وفي حالات أخرى قد يكون السبب ناتجاً عن عدة عوامل تحدث على مستوى أكبر.

عوامل محلية Local factors كان سبب التناقص في بعض الحالات - ومنها تلك التي حدثت لضفدع الأرجل الحمراء - هو تدمير البيئة. فعندما جفت الأراضي الرطبة وبنية المبني بدلاً منها، لم تعد المناطق المائية متوافرة للبرمائيات لتضع بيوضها قريباً منها، حتى تتکاثر بنجاح. وفي مناطق أخرى أثر إدخال أنواع خارجية دخيلة - وهي أنواع لم تكن موجودة في المنطقة بشكل طبيعي - في جماعات البرمائيات، ونافست الأنواع الخارجية الدخيلة البرمائيات على الغذاء وعلى مساحة البيئة، أو كانت مفترسات للبرمائيات.





بيوض علجمون سليمة



بيوض علجمون مصابة بعدوى فطرية

العوامل العالمية Global factors ربما سبّبت عوامل عالمية متعدّدة تناقصاً في أعداد البرمائيات بالإضافة إلى العوامل المحلية. فالـ**التغييرات المناخية** - ومنها ارتفاع درجة الحرارة، وتناقص رطوبة التربة، وازدياد فترة الفصل الجاف. والـ**التغييرات في كميات المطر المتتساقطة** - يمكن أن تسبّب موت البرمائيات أو إجهاد أجسامها، مما يجعلها أكثر تعرضاً للأمراض. ويقارن الشكل 25-2 بين بيوض علاجيم سليمة وأخرى مصابة بفطر. ويعتقد بعض العلماء أنَّ تغييرات المناخ العالمية التي أدّت إلى تناقص كميات الأمطار تركت بيوض البرمائيات تنمو في برك ضحلة المياه. ولأنَّ الماء ضحل فقد تعرّضت البيوض أكثر إلى الأشعة فوق البنفسجية. وقد أظهرت التجارب أنَّ ازدياد التعرّض للأشعة فوق البنفسجية يؤدّي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالعدوى الفطرية في بيوض البرمائيات.

■ **الشكل 25-2** توضع البيوض السليمة للعلجم على هيئة كتلة واحدة في الماء. أما بيوض العلجم المصابة بالعدوى فتُنطّى بالفطريات؛ وربما تكون العدوى بالفطريات مسؤولة عن تناقص أعداد جماعات العلجم.

التقويم 2-2

الخلاصة

- يتطلّب انتقال بعض المخلوقات الحية إلى اليابسة تكيّفات متنوعة.
- لأجسام البرمائيات تكيّفات فريدة مكّتها من العيش على اليابسة.
- تصنّف البرمائيات إلى ثلاث رُتب؛ اعتماداً على تراكيب متشابهة.
- تتناقص أعداد جماعات البرمائيات على مستوى العالم لأسباب مختلفة.


التفكير الناقد

فهم الأفكار الرئيسة

1. **الفكرة الرئيسية** لخص تكيّفات البرمائيات التي ساعدتها على العيش على اليابسة.
2. قارن بين ظروف البرمائيات التي تعيش على اليابسة وتلك التي تعيش في الماء.
3. حلّ أنواع التكيّفات التي ساعدت على انتقال بعض المخلوقات إلى اليابسة.
4. لخص خصائص كل رتبة من رتب البرمائيات.
5. فسر الرسوم العلمية قم بدراسة الشكل 19-2، وفسّر سبب وجود دورة دموية مزدوجة في البرمائيات.
6. **الكتابة في علم الأحياء** لعلك عثرت في أثناء تجوالك في منطقة سبخية بالقرب من بيتك على ضفدع ميت بأطراف مشوّهة. كون فرضية تبيّن أسباب حدوث هذه التشوهات.

اكتشافات في علم الأحياء

تشوهات خلقية في الضفادع



من غرفة الصف إلى غرفة الأخبار ما بدا كأنه رحلة ميدانية لأحد الصحف انتهت بتبنيه علماء البيئة إلى مشكلة مهمة محتملة. وفي أثناء القيام برحلة ميدانية إلى الأراضي الرّطبة في عام 1995م لدراسة النّظام البيئي لاحظ المختصون جماعات ضخمة من الضفادع - يزيد عددها على 50% مما اصطادوه - كانت مشوهة. وفي العام 1996م ظهرت تقارير في أماكن أخرى عن ضفادع ذات تشوهات، منها نقصان أرجل أو زياقتها، وأطراف مُتكوّنة جزئياً، وعيون مفقودة. وكانت تظهر في بلدان أخرى.

الانتقال إلى التّجربة في المختبر أُجريت عدّة دراسات لتحديد سبب التّشوهات. وقد أشارت نتائج إحدى هذه الدراسات إلى أنَّ سوء نوعية الماء قد يكون السبب. فعند نمو الضفادع في المختبر في عينات مختلفة من الماء تشوّه أكثر من 75% من الضفادع التي تم تربيتها في مياه من مواقع مختلفة في مدينة واحدة، مُقارنة بـ 0% عند تربية الضفادع في ماء نقي. ولكن المشكلة ما زالت قائمة؛ إذ لم يتم اكتشاف أي ملوثات حتى الآن. ويختبر العلماء فرضيات أخرى، كأن يكون أبو ذئبيّة قد تعرّض لعدوى ديدان طفيليّة أو فطريّة سبب هذه التّشوهات. وهناك فرضية أخرى يتم فحصها، وهي أن زيادة تعرّض بيوس الضفادع للأشعة فوق البنفسجية قد سبّبت هذه التّشوهات. وقد قدمت جميع الدراسات بيانات داعمة للفرضية التي يتم فحصها، ولكن لأنَّ نوع التّشوهات ونسبتها ليست هي نفسها في كل الواقع، كما يظهر في الرّسوم أعلاه، فربما كان السبب العالمي للتّشوهات خليطاً من العوامل.

الرياضيات في علم الأحياء

حل البيانات توضح الرسوم البيانية أعلى الاختلافات في نسبة التّشوهات في الضفادع في ثلاثة مواقع مختلفة في المدينة نفسها خلال ثلاثة سنوات. أوجد معدل نسبة التّشوهات في كل منطقة خلال السنوات الثلاث. أي المناطق فيها أعلى نسبة تشوهات؟



مختبر الأحياء

كيف تنظم بعض الحيوانات المتحركة درجة الحرارة أجسامها؟



5. ضع مقياس حرارة في وعاء، واملاً الوعاء بالتربيه على أن يكون مقياس الحرارة مغموراً بنحو 5 cm في التربة. ثم ضع مقياس الحرارة الثاني في وعاء وغطه بـ 5 cm من الرمل.
6. كرر الخطوة 3.

حلّ ثم استنتاج

1. تُخُص هل نجحت في المحافظة على درجة الحرارة ضمن مدى مُعطى لكل خطوات التجربة؟ وكيف فعلت هذا؟

2. حلّ هل كان هناك اختلافات تتعلق بكيفية المحافظة على درجة حرارة مقياس الحرارة في الماء، والتربيه، والرمل؟ وأي مادة كانت المحافظة فيها على درجة الحرارة أسهل؟ ولماذا؟

3. استنتاج ما المشكلات المرتبطة بكون المخلوق الحي متغير درجة الحرارة؟ فسر إجابتك.

4. التفكير الناقد كيف تحافظ المخلوقات الحية المتغيرة درجة الحرارة، -ومنها البرمائيات والزواحف- على درجات حرارتها ضمن المعدل المناسب؟

طبق مهاراتك

ملخص ابحث عن المخلوقات الحية المتغيرة درجة الحرارة، واعمل ملصقاً تصف التكيفات التي تحتاج إليها للبقاء حية في درجات الحرارة الباردة.

الخلفية النظرية: تذكّر أنَّ البرمائيات متغيرة درجة الحرارة. والعديد منها يعيش في مواطن تتغيّر فيها درجة الحرارة من 15–10 °C طوال اليوم. وستقوم في هذا المختبر بفحص الآليات التي تستعملها لتحافظ على درجة حرارة الجسم بصورة ملائمة.

سؤال: كيف تحافظ المخلوقات الحية المتغيرة درجة الحرارة على درجة حرارة أجسامها ضمن مدى محدود؟

المواد والأدوات

- مقياس حرارة (2).
- مناشف ورقية.
- أوعية بلاستيكية (2).
- رمل.
- مسطرة مترية.
- ماء عند درجة حرارة 0°C.
- مصباح ضوئي كهربائي بقوة كهربائية عالية.
- الغرفة.

احتياطات السلامة

تحذير: المصابيح قد تُصبح ساخنة عند إضاءتها.

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. احصل على مقياس حرارة، على أن يكونا نموذجين لحيوان متغير درجة الحرارة. وسجل درجة حرارة كلّ منهما، ثم ضع أحدهما في وعاء بلاستيكي، وضع المقياس الثاني في الوعاء الآخر واملاً بالماء على أن يكون المقياس مُعطى إلى ارتفاع 5 cm.
3. ضع كل وعاء تحت مصدر إضاءة، وراقب درجة حرارة المقياسين. يجب المحافظة على درجة الحرارة بين 36–39 °C مدة 15 دقيقة. ثم قرر كم مرة ستقيس درجة حرارة المقياسين، وسجل البيانات في جدول، وكذلك سجل الأعمال التي قمت بها لتحافظ على درجة حرارة مقياس الحرارة ضمن المدى المُعطى.
4. تخلص من الماء الذي في الوعاء وجفف الوعاء جيداً. واترك مقياس الحرارة لتصل درجة حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة.

**المطويات**

تحليل السبب والنتيجة فسر - خلف مطويتك - علاقة السبب والنتيجة بين طريقة الحركة لمخلوق ما وجهازه الدوري. فعلى سبيل المثال، كيف يؤثر المشي في نسبة الأكسجين التي تحتاج إليها البرمائيات؟

المفاهيم الرئيسية**المفردات****1-2 الأسماء****الفكرة** ► **الأسماء** فقاريات لها خصائص تسمح لها بالعيش والتكاثر**في الماء.**

- تضم الفقاريات الأسماء والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات.
- للفقاريات كلها جبل ظهيـري. ويحل العمود الفقري في أغلب الفقاريات محل الجبل الظـهيـري خلال النمو الجنيني.
- للأسماء خصائص مـعـيـنة مشتركة، لـذـا تـصـنـف مـعـاً.
- لأجسام الأسماء تـكـيـفات فـريـدة تـمـكـنـها من العـيش بـشـكـل كـامـل فـي المـاء.
- يمكن تصنيف الأسماء في ثلاثة طوائف أساسية، هي: أسماك لاـفـكـيـة، وأسماك غـضـرـوـفـيـة، وأسماك عـظـمـيـة.
- الجـريـثـ والـجلـكـيـ مـثـلـانـ عـلـىـ الأـسـمـاـكـ الـلاـفـكـيـةـ. وأـسـمـاـكـ القرـشـ وـالـورـنـكـ مـثـلـانـ عـلـىـ الأـسـمـاـكـ الغـضـرـوـفـيـةـ، وـالـسـلـمـونـ وـالـهـامـوـرـ مـثـلـانـ عـلـىـ الأـسـمـاـكـ العـظـمـيـةـ.
- تـغـيـرـ المـوـطـنـ وـالـتـلـوـثـ قـدـ يـؤـثـرـانـ سـلـبـاـ فيـ جـمـاعـاتـ الأـسـمـاـكـ.

الغضروف

العرف العصبي

الزعنفة

القشور

غطاء الخياشيم

الأذين

البُطْنِين

الوحدة الأنوية الكلوية (النفرون)

جهاز الخط الجانبي

وضع البيض (التبويب)

مثانة العوم

2-2 البرمائيات**الفكرة** ► **البرمائيات** تـكـيـفاتـ تـؤـهـلـهاـ لـالـعـيشـ جـزـءـاـ مـنـ حـيـاتـهاـ**في الماء والجزء الآخر على اليابسة.**

- يتطلب انتقال بعض المخلوقات الحية إلى اليابسة تـكـيـفاتـ مـتـنـوـعةـ.
- لأجسام البرمائيات تـكـيـفاتـ فـريـدةـ مـكـنـهاـ منـ العـيشـ عـلـىـ اليـابـسـةـ.
- تـصـنـفـ البرـمـائـيـاتـ إـلـىـ ثـلـاثـ رـتـبـ اـعـتمـادـاـ عـلـىـ تـرـاكـيـبـ مـتـشـابـهـةـ.
- تـنـاقـصـ أـعـدـادـ جـمـاعـاتـ البرـمـائـيـاتـ عـلـىـ مـسـتـوىـ الـعـالـمـ لـأـسـبـابـ مـخـتـلـفـةـ.

المجمع (المذرق)

الغشاء الرامش

غشاء الطلبة

متغيرـةـ درـجـةـ الحرـارـةـ





2-1


مراجعة المفردات

أكمل العبارات الآتية مستعملًا مفردات من دليل مراجعة الفصل:

1. العملية التي يُطلق فيها ذكر الأسماك والأنثى أم شاجهما (الخلايا التناسلية) أحدهما قریباً إلى الآخر في الماء هي:
2. هو حجرة القلب التي تستقبل الدم من الجسم.
3. مجموعة من الخلايا في الفقاريات تنمو من الجبل العصبي.
4. تسمى التراكيب الصغيرة والمسطحة التي تغطي أجسام الأسماك

ثبت المفاهيم الرئيسية

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 5 و 6.



5. ما الجزء المشار إليه بالحرف A؟
 - a. القشور المشطية.
 - b. جهاز الخط الجانبي.
 - c. العرف العصبي.
 - d. الغطاء الخيشومي.



التفكير الناقد

14. استنتاج. ذكور الأسماك ذات الخياشيم الزّرقاء تصنع عُشاً وتحمي البيوض وصغارها. و تستطيع بعض الذكور المُسللة أحياناً أن تُلْقِح بعض البيوض. ويمكن لأنسماك الخياشيم الزّرقاء أن تعرّف أبناءها وتعتني بهم فقط، ولا تعنّي بالآخرين الذين قد يكونون قد فقسوا في العش نفسه. ما أهمية تعرّف ذكور أسماك الخياشيم الزرقاء لأبناءها والاعتناء بهم فقط؟

2-2

مراجعة المفردات

استعمل المفردات من صفحة دليل مراجعة الفصل، واستبدل الكلمات التي تحتها خط بمصطلحات صحيحة:

15. الأذين حجرة تستقبل الفضلات الغذائية والفضلات البولية والبيوض أو الحيوانات المنوية قبل أن تترك الجسم.

16. الغشاء الرّامش يُمكّن البرمائيات من سمع الأصوات.

10. أي مما يأتي من صفات أسماك القرش؟

- a. عديمة الفكوك، هيكل غضروفي، خط جانبي.
- b. عديمة الفكوك، هيكل عظمي، زعناف شعاعية.
- c. فكوك، هيكل عظمي، مثانة عوم.
- d. فكوك، هيكل غضروفي، خط جانبي.

أسئلة بنائية

11. نهاية مفتوحة. هناك أنواع من الفقاريات تعيش في المحيط أكثر من تلك التي تعيش على اليابسة. كون فرضية تفسر ذلك.

12. نهاية مفتوحة. ارسم الشكل الخارجي لأجسام كل نوع من الأنواع الرئيسية للأسماك، متضمناً شرحاً لتكيفاتها الخارجية مع بيئتها.

13. مهن مرتبطة مع علم الأحياء بعد أن اكتشف علماء الأسماك نوعاً جديداً هو أسماك التنين dragon fish المفترسة التي تعيش في أعماق البحار، كانوا مهتمين بوظيفة جزء بارز طويل ونحيل ومُضيء يسمى الشويكة تلتتصق أسفل الفك السفلي، وتمتد تحت جسمها. صمم تجربة يمكن أن تُحدّد وظيفة شويكة سمك التنين.



17. للبرمائيات غشاء طبلة لحماية أعينها من الجفاف.

ثبت المفاهيم الرئيسية

23. نهاية مفتوحة. صُفْ كِيْفَ تَكَيَّفَتِ الْحَوَاسِ فِي الْبَرَمَائِيَّاتِ لِلْحَيَاةِ عَلَىِ الْيَابِسَةِ.

التفكير الناقد

24. صَمِّمْ تجربة تجتمع يرقات أبي ذئبة من نوع معينٍ معاً على شكل مجموعات بعضها قريب إلى بعض، لدرجة أنَّ المجموعة تبدو كأنَّها كرة قدم متحرّكة في الماء. صَمِّمْ تجربة تختبر فرضية تبيَن لماذا يسلُك أبو ذئبة هذا السلوك.

25. ابتكر. اقرأ الإعلان عن البيوت في وسائل التواصل الاجتماعي لترى كيف تُكتب. واقتُبِّل إعلاناً عن بيت حيوان برمائي؛ اعتماداً على ما تعرَفُه عن البيئة والتَّغذِيَّة وحاجات الصِّفَادُع الأخرى.

18. أي مما يأتي عديم الأطراف؟

- a. السلمدر.
- b. السيسيليا السوداء.
- c. السحلية.
- d. الضفدع.

19. أي التراكيب الآتية تستعمله البرمائيات للمحافظة على اتزانها المائي؟

- a. الأغشية الطربلة.
- b. مثانات العوم.
- c. الكلى.

20. أي مما يأتي ليس مرتبطاً مع أبي ذئبة؟

- a. الرئات.
- b. الذيل.
- c. التغذية النباتية.
- d. الخياشيم.

أسئلة بنائية

21. نهاية مفتوحة. وضح أثر زيادة فترة التعرض للأشعة فوق البنفسجية في البرمائيات.

22. نهاية مفتوحة. صُفْ كِيْفَ أَنَّ تَرْكِيبَ الْبَرَمَائِيَّاتِ وَعَمَلِيَّاتِهَا الْحَيَويَّةِ الْمُتَكَيِّفَةِ حَالِيًّا مَعَ الْبَيَّنَاتِ الْأَسْتَوَائِيَّةِ وَالْمُعَدَّلَةِ قَدْ يَتَعَدَّلُانْ لِتَمُكُّنِ الْعِيشِ فِي بَيَّنَاتِ بَارِدَةِ.




تقويم إضافي

27. **الكتابة في علم الأحياء** قم بإجراء بحث عن الجهود التي يقوم بها العلماء للمحافظة على البرمائيات. واكتب مقالاً صحفياً تلخص فيه ما تعلمته.

أسئلة المستندات

يُحاول العلماء أن يحدّدوا أسباب تناقص جماعات البرمائيات خلال العقود القليلة الماضية. ويوضح الرسم البياني الآتي نتائج إحدى الدراسات التي قيس فيها معدل بقاء أجنة البرمائيات على قيد الحياة، مقارنة بعمق الماء الذي تنمو فيه.


(استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤالين 28 و29)



28. صف العلاقة بين عمق الماء خلال نمو الأجنة ومعدلات بقائتها.

29. كون فرضية حول تناقص جماعات البرمائيات بالنسبة للتغير في المناخ.

استعن بالرسم البياني أدناه للإجابة عن السؤال 26.



26. احسب. حدد نسبة كل رتبة من رتب البرمائيات بالاعتماد على المجموع الكلي للبرمائيات.



اختبار مقتني

أسئلة الاختيار من متعدد

3. ما وظيفة جهاز الخط الجانبي في الأسماك؟
- تحديد المواد الكيميائية في الماء.
 - تحديد التغيرات في ضغط الماء.
 - يساعدها على الرؤية الملونة.
 - إرسال الإشارات بين أسماك النوع الواحد.
4. أي التركيب الآتية تستعمل في الحصول على الأكسجين وتنقله إلى خلايا الجسم في معظم البرمائيات البالغة؟
- الخياسيم وجهاز الدوران المغلق
 - الخياسيم وجهاز الدوران المفتوح
 - الرّتتان وجهاز الدوران المغلق
 - الرّتتان وجهاز الدوران المفتوح
5. ما التكيف الذي يساعد السمك على عدم الانقلاب الجانبي من جانب إلى آخر في الماء؟
- القشور المشطية.
 - الزعانف المزدوجة.
 - القشور الصفائحية.
 - مثانة العوم.

استعمل الجدول الآتي للإجابة عن السؤال 1:

الصف	المجموعة	الصفات
1	اللافقاريات الحلبية	تفتقر لوجود العمود الفقري.
2	الأسماك اللافكية	تفتقر لوجود الجبل الظاهري.
3	الأسماك العظمية	لها هيكل من العظم.
4	الأسماك الغضروفية	لها هيكل من الغضروف.

1. أي صفات في الجدول أعلاه يحوي معلومات غير صحيحة؟

- | | |
|------|------|
| 2. b | 1. a |
| 4. d | 3. c |

2. أي العبارات الآتية لا تطبق على البرمائيات؟

- العديد منها ينقصها الأطراف الخلفية خلال جزء من دورة حياتها.
- العديد منها يمضي وقتاً من دورة حياته في الماء وجزءاً آخر على اليابسة.
- معظمها يعتمد على مصدر ماء خارجي للمحافظة على رطوبة أجسامها.
- معظمها لها جهاز خط جانبي معقد.




اختبار مقتني

أسئلة الإجابات المفتوحة

11. قُوم كيف تساعد المثانة الهوائية السمكة على التحكم في عمق غوصها في الماء؟

12. قارن بين جهازي الدوران لدى الصندوق والسمكة، وبين أهمية هذه الاختلافات.

أسئلة مقالية




يُعد الفك تكييفاً مهماً في تركيب السمكة؛ حيث أصبحت الأسماك أكثر تخصصاً في سلوكيات التغذّي. ولقد أعطى شكل الفك معلومات مهمة عن طريقة تغذّي الأسماك، وعن نوع غذائتها في بعض الحالات.

ويُمكن للعلماء - من دراسة الأشكال المختلفة للفك - أن يفهموا كيف تتكيف أنواع مختلفة مع بيئاتها المحدودة. استعن بالمعلومات المحدودة في الفقرة السابقة، وأجب عن السؤال الآتي في صورة مقال:

13. وضّح كيف يتلاءم كل نوع من أنواع الفكوك الأربع السابقة مع طبيعة الطعام الذي تأكله الأسماك؟


أسئلة الإجابات القصيرة

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 6.



6. صِف كيف تكون الفكوك، موضحاً أهميتها للأسماك.

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤالين 7، 8.



7. صِف الفروق بين كل من: الأسماك التي تحرك جسمها على نمط الحرف S، والتي تحرك ذيولها فقط.

8. حدد أين يمكن أن توجد الأسماك التي تحرك جسمها كاملاً على نمط الحرف S؟

9. قُوم لماذا يُعدُّ وجود الجبل الظاهري مهمًا للمخلوقات الحية؟

10. قارن بين ثلاث خصائص للأسماك وثلاث خصائص لمجموعة مخلوقات حية أخرى تعرّفتها سابقاً.

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	الدرس / الفصل	الصف
1	2-1	2-1
2	2-1	2-1



الفكرة **العامة** للزواحف والطيور تكيفات تساعدها على العيش والتكاثر بنجاح على اليابسة.

3-1 الزواحف

الفكرة **الرئيسية** خلق الله سبحانه وتعالى للزواحف تكيفات مكنتها من العيش على اليابسة.

3-2 الطيور

الفكرة **الرئيسية** وهب الخالق جل وعلا للطير ريشاً وأجنحة وعظاماً خفيفة الوزن، وتكيفات أخرى تسمح لها بالطيران.

حقائق في علم الأحياء

- تشني أنياب أفعى الجرس وتنبسط على سقف فمها عندما يكون فمها مغلقاً.

- عندما تفتح أفعى الجرس فمها في أثناء الهجوم تدور أنيابها إلى الأمام، وتصبح جاهزة لحقن السم من الغدة السمية في الفك عبر فتحة في الأناب.

- سرعة هجوم أفعى الجرس مذهلة تصل إلى (2.4 m/s) .

نشاطات تمهيدية

خصائص الزواحف والطيور اعمل المطوية الآتية لمساعدتك على المقارنة بين خصائص الزواحف والطيور.


الخطوة 1: اطو صفحه من الورق رأسياً، تاركًا الثقوب مكشوفة كما في الشكل الآتي:



الخطوة 2: اطو الورقة ثلاثة أجزاء، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 3: أعد الورقة إلى ما كانت عليه في الخطوة 1، ثم ارسم أشكالاً بيضوية متداخلة. وقص الشيئات على طول الطبقة العلوية، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 4: عنون شكل ثن كما في الشكل الآتي:



المطويات استعمل هذه المطوية في أثناء دراستك

للقسمين 3-1 و 3-2. وسجل - وأنت تقرأ الخصائص المميزة للزواحف والطيور - الخصائص المشتركة بينهما.

نشاط استهلاكي

هل الرموز التاريخية للزواحف والطيور دقيقة علمياً؟

خاف البشر عبر التاريخ من الطيور والزواحف، كما استعملوا رموزها في ثقافاتهم. وسوف تراجع في هذه التجربة أمثلة على زواحف وطيور اُخذت رموزاً، وتُحدّد ما إذا كانت هذه التمثيلات دقيقة علمياً.

خطوات العمل

- املاً بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
- ابحث عن رموز، أو قصص، تتعلق بالزواحف أو الطيور في ثقافات مختلفة.
- حلّل المعلومات التي وجدتها في الخطوة 2 من حيث الدقة العلمية، وكوّن فرضية حول سبب اتخاذ هذا الزاحف أو الطائر رمزاً في كل حالة.

التحليل

- قوم أي قدر من المعلومات التي حلّلتها كان دقيقة علمياً؟ ولماذا تظن أن بعضها غير دقيق؟
- اكتب اختر رمزاً واحداً (أو أسطورة) يحوي معلومات غير دقيقة علمياً، ثم صحّحها لتُصبح دقيقة.

3-1

الأهداف

• توضح الخصائص التي تمكّن البيضة الرهليّة (الأمنيونية) من التكيف للعيش على اليابسة.

• تلخص خصائص الزواحف.

• تميّز بين رتب الزواحف.

مراجعة المفردات

الجُنِين Embryo: أول مراحل نمو النباتات والحيوانات بعد إخضاب البيضة.

المفردات الجديدة

الغشاء الرهلي (الأمنيون)
البيضة الرهليّة (الأمنيونية)
الطاقة ATP (أدينوسين ثلاثي الفوسفات)


عضو جاكوبسون

درع الظهر

درع البطن

■ الشكل 3-1

اليمين: للزواحف والطيور والثدييات غشاء رهلي (الأمنيون).
اليسار: السحلية نوع من 7000 نوع من الزواحف التي تتسمى إلى طائفة الزواحف.
وتعيش هذه الزواحف في بيئات بريّة ومائية متنوّعة.



الزواحف Reptiles

الفكرة خلق الله سبحانه وتعالى للزواحف تكيفات مكّنتها من العيش على اليابسة.

الربط مع الحياة ربما شاهدت شخصية كرتونية متحركة مضحكة تمثل الزواحف كأفعى أناكوندا الضخمة أو ديناصوراً مخيفاً. فكر وأنت تدرس هذا القسم، فيما إذا كان هذا الحيوان الزاحف يتشاربه فعلياً مع الحقائق العلمية والصفات الحقيقة للزواحف.

خصائص الزواحف Characteristics of Reptiles


لقد خلق الله تعالى للفقاريات أطراً متخخصة، وأجهزة دورانية وتنفسية، وتكيّفات أخرى ساعدتها على العيش على اليابسة، أمّا البرمائيات فلا تستطيع العيش بصورة دائمة على اليابسة؛ لأنّها معرّضة لتأثيرات الجفاف في أثناء حياتها على اليابسة، وبioxophها غير مُحاطة بقشرة، ويرقاتها تنفس عن طريق الخياشيم. أما الزّواحف - ومنها السحلية كما في الشكل 1-3 - فقد تكيفت للعيش على اليابسة، ومن خصائص الزواحف التي مكّنتها من العيش على اليابسة أن بioxophها محاطة بقشرة جلدية، وجسمها مغطى بجلد حرشفي سميك، ولها أجهزة دورانية وتنفسية ذات فاعلية أكبر.

البيوض الرهليّة (الأمنيونية) Amniotic eggs يبيّن مخطط العلاقات التركيبية، المبين في الشكل 1-3، أن للزواحف خصائص مشتركة مع المجموعات الأخرى التي لها غشاء رهلي وأغشية أخرى تحيط بالجنين في أثناء نموه.

الغشاء الرهلي (الأمنيون) amnion غشاء يحيط بالجنين مباشرة، مملوء بسائل رهلي يحمي الجنين خلال فترات نموه. وتسمي المخلوقات الحية التي تمر بمثل هذا النوع من النمو المخلوقات الحية الأمنيونية (حيوانات الغشاء الرهلي)، وتضم الزواحف والطيور والثدييات.



■ **الشكل 2-3 تحاط البيضة الرهلية**
بقشرة وأغشية ملؤة سائل يحمي الجنين من الجفاف في أثناء نموه.



المفردات.....
أصل الكلمة
Squamata
الحرشف

من اللاتينية، وتعني Squama-
الحرشفة. -ata من اللاتينية، وتعني يملك. وفي اللغة العربية، فالحرشفة تعني القشور الموجودة على ظهر بعض الحيوانات والحشرات.



نحوية علمية
ما تراكيب بيضة الدجاجة
ووظائفها؟

ارجع لمذيل التجارب العملية على منصة عين الافتراضية

المطويات

ضمن مطويتك معلومات من هذا القسم.



■ **الشكل 3-3 تسلخ بعض الزواحف**
كلما زاد نموها.
قارن بين الانسلاخ في الزواحف
والمفصليات.


تحاط البيضة الرهلية (الأمنيونية) amniotic egg بقشرة واقية، والعديد من الأغشية الداخلية التي تنتشر تحوي سوائل بينها، كما هو مبين في الشكل 2-3. ويحصل الجنين داخل البيضة على الغذاء اللازم لنموه من كيس المح. ويحيط بالجنين داخل الغشاء الرهلي سائل يسمى السائل الرهلي، يشبه البيئة المائية لأجنة الأسماك والبرمائيات. أما كيس المهمbar فهو غشاء يكُون كيساً يحتوي على الفضلات التي يُتتجها الجنين. ويُسمى الغشاء الخارجي للجنين (أسفل القشرة مباشرة) غشاء الكوريون، ويسمح بدخول الأكسجين، ويحفظ السائل داخل البيضة. وفي الزواحف تحمي القشرة الجلدية السوائل الداخلية والجنين، وتحمي البيضة من الجفاف على اليابسة. أما في الطيور ف تكون القشرة صلبة، لا جلدية.

ماذا قرأت؟ قوم ما الأهمية التي توفرها البيضة الرهلية للمخلوق الحي ليصبح قادرًا على العيش على اليابسة فقط؟

الجلد الجاف والحرشي Dry, scaly skin على الزواحف - بالإضافة إلى حفظ السوائل في البيوض - أن تحفظ السوائل داخل أجسامها؛ فجلدها الجاف يمنع فقدان السوائل الداخلية. وهناك طبقة من الحراسف للعديد من الزواحف تحميها من الجفاف أيضًا. ومع ذلك فلللغطاء الخارجي القاسي مشكلاته، ومنها أن المخلوق يُواجه صعوبة في النمو. ولκي ينمو تقوم بعض الزواحف - منها السحلية في الشكل 3-3 - بالانسلاخ بشكل دوري.

التنفس Respiration معظم الزواحف - ما عدا بعض السلاحف المائية التي تتميز بطريقة مختلفة في دخول الهواء إلى رئاتها نظرًا لوجود الدرع - تعتمد على الرئات لتبادل الغازات. تذكر أنه عندما تنفس البرمائيات فإنها تضغط على الحنجرة (الحلق) لمرور الهواء إلى رئاتها. أما الزواحف فلديها القدرة على سحب الهواء إلى داخل رئاتها، أو تقوم بعملية الشهيق بانقباض عضلات القفص الصدري وجدار الجسم لتوسيع الجزء العلوي من التجويف الجسمي الذي يحوي داخله الرئات. وتقوم الزواحف بعملية الزفير عندما تبسط العضلات نفسها. وتتبادل الزواحف الغازات عن طريق الرئات التي لها مساحة سطح أكبر من مساحة سطح رئات البرمائيات. ومع وجود المزيد من الأكسجين يزداد إنتاج **الطاقة ATP** (أدنوسين ثلاثي الفوسفات) وهو الجزيء الكيميائي الذي يزود أجسام المخلوقات الحية بالطاقة اللازمة لنشاطاتها من خلال تفاعلات الأيض، وتصبح متاحة للقيام بحركات أكثر تعقيدًا.

■ **الشكل 4-3** جهازا الدوران والمضم في الزواحف تشبه ما لدى البرمائيات.
قارن جهاز الدوران في هذا الشكل مع جهاز الدوران بالشكل 19-2.



الدوران Circulation يدخل الأكسجين في معظم الزواحف من الرئتين إلى الجهاز الدوراني الذي يشبه جهاز الدوران في البرمائيات. ولمعظم الزواحف أذنان منفصلان وبطين واحد مفصول جزئياً ب حاجز غير كامل، كما في **الشكل 4-3**. أما في التماسيح فيكون الحاجز في البطن كاملاً، لذلك فإن له قلباً ذات أربع حجرات منفصلة يُبقي الدم الغني بالأكسجين بعيداً عن الدم القليل الأكسجين داخل القلب.


ولأن الزواحف أكبر حجماً من البرمائيات فإنها تحتاج إلى ضخ الدم بقوة كافية ليصل إلى أجزاء الجسم بعيدة عن القلب. فعلى سبيل المثال، كان على الديناصور *Brachiosaurus* ضخ الدم إلى أكثر من 6 m من القلب إلى الرأس!

التغذية والهضم Feeding and digestion تشبه أعضاء الجهاز الهضمي في الزواحف -المبنية في **الشكل 4-3**- مثيلتها في البرمائيات والأسمدة. وللزواحف طرائق تغذية متنوعة وأغذية مختلفة. ومعظم الزواحف من آكلات اللحوم، وإن كان بعضها يتغذى على النباتات، ومنها الإجوانا *Iguana* والسلاحف. وبعض السلاحف حيوانات فارقة، أي آكلات لحوم ونباتات في الوقت نفسه. وللسلاحف والتماسيح ألسنة تساعدها على الابتلاع، في حين أن بعض السحالي -ومنها الحرباء- ألسنة طويلة لزجة؛ لالءمساك بالحشرات.

وللأفاعي قدرة على ابتلاع فريسة أكبر كثيراً من حجمها. فعظام الجمجمة في الأفاعي -وكذلك فكوكها- مرتبطة بعضها مع بعض بأربطة مرنة، بحيث تمكّنها من الابتعاد بعضها عن بعض عند ابتلاع فرائس كبيرة الحجم، كما في **الشكل 5-3**. وحتى تتبع الفريسة فإن الجهتين المتقابلتين من الفكين (العلوي والسفلي) تندفعان إلى الأمام بالتبادل، ثم تعودان لتسحب الطعام. ولبعض الأفاعي سم يستطيع شل حركة الفريسة وتحليلها، ثم تبدأ عملية هضمها.



■ **الشكل 5-3** يمكن للأفاعي أن تبتلع وجبة أكبر حجماً من أفواهها؛ لأنَّ فكيها العلوي والسفلي متصلان بأربطة مرنة، ويُمكن للفكين أن يتحرّكاً بشكل منفصل أحدهما عن الآخر.



■ **الشكل 6-3** تستعمل الأفاعي أعضاء جاكوبسون في الفم للإحساس بالروائح.

الإخراج Excretion خلق الله تعالى للزواحف جهازاً إخراجياً لتعيش على اليابسة. وتنقي الكليتان الدم وتُزيل الفضلات، كما في **الشكل 4-3**. وعندما يدخل البول إلى المجمع يتم إعادة امتصاص الماء فيتكون حمض البوليک، وهو فضلات شبه صلبة. وهذه الطريقة في إعادة امتصاص الماء تمكّن الزواحف من حفظ الماء وثبات الاتزان الداخلي للماء والأملاح في أجسامها.

الدماغ والحواس The brain and senses **أدمغة الزواحف** تشبه أدمغة البرمائيات، إلا أن مخ الزواحف أكبر حجماً. ولأنَّ وظيفة البصر والعضلات أكثر تعقيداً فإنَّ الجزء البصري وأجزاء المُخيخ في دماغ الزواحف أكبر من تلك التي في البرمائيات. والبصر هو الحاسة الرئيسية في معظم الزواحف، حتى إن بعض الزواحف لديها القدرة على تمييز الألوان. ويتنوع السمع في الزواحف؛ فلبعضها غشاء طبلة يشبه الذي في البرمائيات. وهناك زواحف أخرى - ومنها الأفاعي - تلتقط الذبذبات الصوتية عن طريق عظام فكها.

حسنة الشم في الزواحف معقدة أكثر من البرمائيات. ولعلك شاهدت أفاعي تُخرج لسانها الذي يشبه الشوكة، إنها تفعل ذلك لتشم الروائح، حيث تلتتصق جزيئات الرائحة باللسان، الذي تُدخله الأفعى إلى فمها. فتنتقل جزيئات الرائحة إلى زوج من التراكيب يشبه الكيس يسمى **أعضاء جاكوبسون Jacobson's organs**، كما في **الشكل 6-3**. وتوجد هذه التراكيب التي تميز الروائح في سقف حلق فم الأفعى. وقد أظهرت التجارب أنَّ الأفعى - من دون أعضاء جاكوبسون - تجد صعوبة في تحديد الفريسة، وشريك التزاوج.

ماذا قرأت؟ قارن بين الدماغ والحواس في الزواحف والبرمائيات.

تنظيم درجة الحرارة Temperature control **الزواحف** كالبرمائيات، متغيرة درجة الحرارة، فلا يُمكنها أن تولّد حرارة جسمها، بل تنظم درجة حرارتها سلوكياً. فلعلك شاهدت سلحفاة تسير تحت أشعة الشمس، مما يرفع درجة حرارة جسمها. وقد تخفض درجة حرارة جسمها بالانتقال إلى الظل أو الدخول في الجحور الباردة. وبعض الزواحف في المناطق المعتدلة تقضي الشتاء مختبئة داخل الجحور، أو تدخل في حالة سبات (بيات شتوي)، حيث ينخفض معدل الأيض في أجسامها، فتنخفض درجة حرارة أجسامها. وبعض الزواحف الأخرى - ومنها الأفاعي - تتجمع معاً بالمئات، فيعطي بعضها بعضًا على هيئة كتل خلال الشتاء، بحيث تقلل فقدان الحرارة.

الحركة Movement قارن بين موقع الرجل في السلمnder وموقعها في التمساح المبين في **الشكل 7-3**. ولاحظ أنَّ بطن السلمnder يكون على الأرض، في حين يكون بطن التمساح مرتفعاً عنها. وبعض الزواحف تشبه البرمائيات؛ إذ تتحرك بأطراف بارزة من جنبي الجسم تضغط على الأرض من جهة، فتسمح بدفع الجسم من الجهة الأخرى المقابلة. أما أطراف التمساح فتدور بحرية تحت الجسم، وهي تحمل أوزاناً أكبر، وتسمح بحركة سريعة. ولكي تحمل الزواحف أوزاناً أكبر على اليابسة يجب أن تكون هيأكلها أقوى، وذات تراكيب عظمية أثقل. وللزواحف مخالب في أصابعها تُساعدها على الحفر، والتسلق، والثبت بالأرض للسحب والجر.



سلمندر



تمساح

التكاثر Reproduction للإخصاب في الزواحف داخلي، وتنمو البيوضة بعد الإخصاب، فتكون جنيناً جديداً يحيط به أغشية البيضة الأمنيونية لضمان نموه بصورة آمنة. ويكون الجهاز التناسلي الأنثوي قشرة جلدية تحيط بالبيوض التي ينتجها. ويتجذر الجنين من المح في البيضة. وعادة تحفر الأنثى حفرة في الأرض تضع فيها البيوض، أو تضعها في بقايا الباتات. وتترك معظم الإناث البيوض وحدها بعد وضعها حتى تفقس. وتبني التماسيح عشاً تضع فيه البيوض. أما بعض الأفاعي والسمالي فتبقي البيوض داخل أجسامها حتى تفقس الصغار. وبهذه الطريقة يتم حماية البيوض داخل جسم الأم حتى تفقس منها صغار مكتملة النمو.

■ الشكل 7-3 يتحرك السَّلمندر بأرجل مفلطحة تضغط على الأرض فتدفع أجسامها نحو الأمام. وللتمساصح أرجل متعددة تحت أجسامها، تحملها بعيداً عن الأرض.

تنوع الزواحف Diversity of Reptiles


بعد انقراض الديناصورات، بقيت أربع رتب من الزواحف، هي: رتبة الحرشفيات Squamata؛ ومنها الأفاعي والسمالي، ورتبة التمساحيات Crocodilia؛ ومنها التماسيح، ورتبة السلاحفيات Testudinata؛ ومنها السلاحف، ورتبة خطمية الرأس Sphenodonta، ومنها التواتارا.

السمالي والأفاعي Lizards and snakes لسمالي عموماً أرجل بأصابع ذات مخالب، كما لها أيضاً جفوناً متحرّكة، وفك سفلي ذو مفاصل متحركة تسمح بمرنة حركة الفك، وأغشية طبلة في الفتحات الأذنية. والسمالي الشائعة تشمل الإجوانا المبينة في الشكل 8-3، والحرباء، والحرذون، والضب، والورل.

■ الشكل 8-3 الأفعى الشجرية الخضراء - البايون العاصر - والإجوانا الخضراء كلتا هما تتبع رتبة الحرشفيات.



الإجوانا الخضراء



البايون العاصر

إرشادات الدراسة

نظرة عامة للدراسة الدرع الظاهري Carapace تعبير استعمل في هذا القسم. استعمل كلمات أخرى تصف هذا المصطلح. وتوقعَ معنى كلمة الدرع الظاهري.

أما الأفاعي فليس لها أرجل، ولها ذيول أقصر من ذيول السحالى، وليس لها جفون متحركة ولا أغشية طبلة. وهي كالسحالى لها مفاصل في فكوكها تُمكّنها من ابتلاء فرائس أكبر حجمًا من رؤوسها. وبعض الأفاعي - ومنها الأفعى ذات الجرس الموضحة في الصورة بداية هذا الفصل - لها سُمٌ يمكنه أن يشل حركة الفريسة أو يقتلها ومنها أيضًا الأفاعي المقرنة. وبعض الأفاعي لا تنتج سمًا، وإنما هي أفاعٌ عاصرة، أي تستعمل عضلاتها القوية لعصير الفرائس، ومنها أفعى البايون العاصرة الخضراء المبينة في **الشكل 8-3**، والأناكوندا والبوا Boas، حيث تخنق فريستها بالاتفاق حولها والضغط عليها حتى تموت بسبب عدم قدرتها على التنفس.

ماذا قرأت؟ صفات الطرائق المختلفة التي تمسك بها الأفعى فريستها.

السلاحف Turtles لاحظ أن الدرع الواقية التي تحيط بجسم السلفحفاة، المبينة في **الشكل 9-3**، تجعلها مختلفة عن غيرها من الزواحف. ويسمى الجزء الظاهري من هذه الدرع **الدرع الظاهري** (الواقي) carapace، والجزء البطني **الدرع البطني** plastron. وتلتزم الفقرات والأضلاع في معظم السلاحف مع الدرع الظاهري. وتستطيع العديد من السلاحف سحب رأسها وأرجلها إلى داخل دروعها للحماية نفسها من المفترسات. وبعض هذه السلاحف مائية، وبعضها الآخر يعيش على اليابسة، ويسمى السلاحف البرية tortoises. وليس للسلاحف البرية أو المائية أسنان، وإنما لها حواف فم حادة وصلبة يمكنها أن تسبب عصمة قوية.

التماسيخ والقواطير Crocodiles and alligators تضم رتبة التمساحيات التمساح والقواطير (التماسيخ الأمريكية) والكيمان Caimans. وبخلاف معظم الزواحف، للتمساحيات قلب مكون من أربع حجرات. وهي صفة تميز الطيور والثدييات أيضًا؛ لأنَّ القلب ذو الحجرات الأربع يصل الأكسجين بفاعلية أكبر. وتمكن العضلات القوية التمساحيات من التحرُّك بسرعة وبطريقة عدوانية داخل الماء وخارجها؛ فهي تهاجم حيوانات في حجم الماشية والغزلان، وقد تهاجم الإنسان. وللتماسيخ مقدمة رأس طويلة، وأسنان حادة، وفكوك قوية. وأسنان التمسيخ تشبه مثيلاتها في الديناصورات. وللقاطور عمومًا - كما في **الشكل 9-3** - مقدمة رأس أعرض مما للتماسيخ. والفك العلوي في القاطور أعرض من الفك السفلي.



■ **الشكل 9-3** درع السلفحفاة يساعد على حمايتها من المفترسات. وللقاطور مقدمة رأس عريضة وحرافش سميك تغطي جسمه.

وعندما يغلق القاطور فمه يتداخل الفك العلوي مع السفلي، وتختفي أسنانه بصورة كاملة تقريباً. وللفكين العلوي والسفلي في التماسح العرض نفسه. لذا فعندما يغلق التماسح فمه، تبدو بعض الأسنان من الفك السفلي واضحة بسهولة.


التواتارا Tuataras تشبه التواتارا السحلية الكبيرة، **الشكل 10-3**. وتوجد فقط في جزر بعيدة عن شاطئ نيوزلندا، ويوجد منها نوعان. وللتواتارا عُرف من الأشواك يمتد على طول ظهره، وعين ثالثة على قمة الرأس. تستطيع أن تحس بضوء الشمس على الرغم من تغطيتها بالحراشف التي يعتقد علماء الأحياء أنها ربما تقي التواتارا من حرارة الشمس الزائدة. ومن الصفات الفارقة في التواتارا أن لها أسناناً فريدة، مقارنة بتلك التي في الزواحف الأخرى؛ فهناك صفان من الأسنان في الفك العلوي يقصان الطعام بمساعدة صف من الأسنان في الفك السفلي، وهذا ما يعطيها صفة الافتراض للعقارات الصغيرة.



■ **الشكل 10-3** يصل طول التواتارا مترين تقريباً، ويعيش نحو 80 عاماً في البرية.

الربط علم الأرض **الдинاصورات Dinosaurs** عاشت الديناصورات على الأرض لأكثر من 165 مليون عام. وبعض الديناصورات -ومنها التيرانوسورس ر克斯 *Tyrannosaurus rex* - كان ارتفاعه 6 m، وطوله 14.5 m، وزنه أكثر من 7طنان، وكان مفترساً. وبعضاها الآخر - ومنها ثلاثي القرون *Triceratops* - كان له قرون ضخمة، وكان آكل أعشاب. وعلى الرغم من تنوع الديناصورات فإنه يمكن تقسيمها إلى مجتمعتين كما هو مبين في **الشكل 11-3**، اعتماداً على تراكيب عظام الورك فيها. فالنوع الأول - ومنه السوريسكيانات - تتجه فيه عظام الورك إلى الأمام، ويمتاز بأن عظام الورك فيه تخرج وتبعد من مركز منطقة الحوض. أما في النوع الثاني - ومنه الأورنيثيسكيانات - فتخرج عظام الورك من الحوض، وتتجه إلى الخلف نحو الذيل.

■ **الشكل 11-3** للسوريسكيانات ورك يتجه إلى الأمام. أما الأورنيثيسكيانات فلها العظم نفسه متجهاً إلى الخلف في اتجاه الذيل.



يُعرف العصر الطباشيري بعصر الانقراض العالمي الضخم للعديد من الأنواع، ومنها динاصورات؛ إذ يعتقد بعض العلماء أنَّ مذنبات ضربت الأرض وسببت الانقراض، وحجبت سحب الغبار أشعة الشمس، مما سبب ظهور مناخ بارد. وهذا التغيير - مع وجود الحرائق والغبار السام والغازات - ربما أدى إلى موت العديد من النباتات والحيوانات في ذلك الوقت. وعندما اختفت динاصورات أصبحت الأماكن التي كانت مُسيطرًا عليها متاحة للفقاريات الأخرى لتسكّنها وتنمو وتزيد من فرصة بقائها.

بيئة الزواحف Ecology of Reptiles


تؤدي الزواحف دوراً مهماً في السلسل الغذائية، بوصفها فريسة ومفترسًا. ويمكن أن يختل الاتزان في النظام البيئي إذا أزيلت أنواع الزواحف. على سبيل المثال، إزالة أنواع محددة من الأفاعي من البيئة باستمرار يؤدي إلى ازدياد جماعات القوارض. وبعد فقدان الموطن البيئي وإدخال أنواع خارجية دخلة عوامل تساهم في تناقص جماعات بعض أنواع الزواحف.

مختبر تحليل البيانات 3-1

بناءً على بيانات حقيقة

البيانات والملاحظات

يبين الرسم البياني منحنى نموٍّ - معتمدة على العظم - تقارن بين عدّة ديناصورات.



تفسير الشكل

ما سرعة نمو الديناصورات؟ درس العلماء مقاطع رقيقة من نسيج عظام أحافير لتتحديد سرعة نمو العظم فيها. ويمكن للعلماء - بدراسة سرعة نمو الديناصورات - أن يسترجوا معلومات عن بيئتها وجماعاتها.

التفكير الناقد

- قارن أيّ عمر كان فيه نمو الديناصورات أكبر ما يمكن؟ فسر ذلك.
- حلل البيانات أي الديناصورات كان معدل نموه بطئًا، وأيها كان معدل نموه أسرع؟
- استنتاج للعظام ذات النمو السريع العديد من الأوعية الدموية. فكيف تبدو عظام التيرانتوسورس *Tyrannosaurus* مقارنة بتلك التي في الداسپليتوسورس *Daspletosaurus*؟

أخذت البيانات في هذا المختبر من:

Stokstad, E. 2004. Dinosaurs under the knife. *Science* 306:962–965

فقدان الموطن البيئي **Habitat loss** تأثرت بعض القواطير والتماسيخ بفقدان الموطن البيئي؛ حيث إن تدمير الأراضي الرطبة من أجل البناء أدى إلى تناقص أعداد هذه الزواحف. وبقي القاطور مهدداً بالانقراض، مع بقاء 500 - 1200 حيوان منها فقط. ومع ظهور قوانين تحمي الأراضي الرطبة في بعض المناطق عاد التوازن إلى أعداد جماعات القاطور بشكلٍ كافٍ ليتغير وضعه من مهدد بالانقراض إلى مهدد فقط.



إدخال أنواع خارجية جديدة **Introduction of exotic species**

يتم إدخال أنواع خارجية دخيلة على النظام البيئي في منطقة ما فإنَّ الحيوانات الأصلية (المحلية) ربما تواجه خطرًا بسبب الافتراض أو التَّنافُس على الغذاء. فعلى سبيل المثال، عندما أدخل النمسٌ وهو حيوان ثديي صغيرٍ إلى جامايكا لقتل الجرذان في حقول قصب السُّكُر تغذى على أنواع عديدة من السَّحالي، التي يعتقد أنها انقرضت بسبب ذلك. وتشمل هذه السَّحالي أنواعاً مهددة بالانقراض، منها الإيجوانا الجامايكية.

وبعض الأنواع - ومنها أفعى الغرطر Grater Snak المبينة في الشَّكل 12-3 - عانت من تناقص في أعدادها بسبب فقدان الموطن، وبسبب إدخال مخلوقات دخيلة أيضاً. إنَّ استعمال الأرضي من أجل البناء والزَّراعة أدى إلى فقدان الموطن البيئي لهذه الأفعى. وإدخال الضفدع الثور - وهو ضفدع غازٍ لبيئة هذه الأفعى - أثر في أعداد هذه الأفاعي؛ إذ يأكل الضفدع الثور Bullfrog كلاً من أفعى الغرطر والضفدع ذا الرجل الحمراء Red - legged frog الذي يشكل مصدر غذاء لأفعى الغرطر.

■ **الشكل 12-3** تعيش أفعى الغرطر (*Thamnophis sertalis tetradenia*) في الأراضي الرطبة أو العُشبية بجانب البرك والسبخات.

التقويم 3-1

الخلاصة

- وهب الله للزواحف عدة أنواع من التكيفات التي مكتنها من العيش على اليابسة.
- تكيف بيض الزواحف للنمو والعيش على اليابسة.
- تقسيم الزواحف إلى أربع رتب، هي: الحرشفيات، والتمساحيات، والسلحفيات، وخطمية الرأس.
- الزواحف مخلوقات أمنيونية. والعديد من الزواحف - ومنها الديناصورات - انقرضت.

التفكير الناقد

فهم الأفكار الرئيسية

1. الفكرة **الرئيسية** حدد الخصائص التي مكنت الزواحف من العيش على اليابسة.
 2. صف أجزاء البيضة الأمنيونية. وبين كيف سمح هذا التركيب بالتكيف على اليابسة.
 3. قارن بين أفراد رتبة الحرشفيات وأفراد رتبة خطمية الرأس.
 - 4.وضح الفرق بين الأفاعي والسحالي. وأعطي مثالاً يوضح كلاً منهما.
5. اعمل نموذجاً لبيضة أمنيونية كما في الشكل 2-3. ما وظيفة كل غشاء؟
6. **الرياضيات في علم الأحياء**
تناسب قوة العض في القاطور طردياً مع طوله. فإذا كانت قوة العض في قاطور طوله 1 m تساوي 268 kg فما قوة عض قاطور طوله 3.6 m؟



3-2

الأهداف

تلخص خصائص الطيور.

ترتبط بين تكيفات الطيور وقدرتها على الطيران.

تصف الرتب المختلفة للطيور.

مراجعة المفردات

برئيّ *terrestrial*: يعيش على اليابسة، أو تحت سطحها.

المفردات الجديدة

ثابتة درجة الحرارة

الريش

الريش المحطي (الكافافي)

الغدة الزيتية

الريش الزغبي

عظم الفص

كيس الهواء

الخضانة

الربط مع الحياة قد تكون الطيور من أكثر الفقاريات الشائعة التي تراها. وربما سمعت أقوالاً مشهورة منها: "حرٌ مثل الطائر"، أو "الطيور على أشكالها تقع"، أو "خفيف كالريشة". عند قراءتك لهذا القسم انظر هل تشير هذه الأقوال إلى معنى علمي دقيق؟

خصائص الطيور Characteristics of Birds

عندما يطلب المعلم منك وصف طائرٍ ما، فقد تجيب بأن له ريشاً ويطير. وهاتان سمتان تميز الطيور عن الفقاريات الأخرى؛ إذ تتبع الطيور إلى طائفة الطيور Aves التي تضم نحو 8600 نوع، مما يجعلها أكثر الفقاريات البرية تنوعاً. وتتباعن الطيور في حجومها، فمنها طائر الطنان الصغير الحجم الذي يحوم حول الأزهار، والنعام الذي لا يطير، بل يركض عبر سهول إفريقيا. وتعيش الطيور في الصحراوات والغابات والجبال والبراري وتطير فوق كل البحار.

ويوضح مخطط العلاقات التركيبية، في الشكل 3-3، أن ما يميز الطيور والزواحف هو السائل الريحي (الأمنيون). فالطيور تضع بيضًا أمنيونياً (رهليًّا). ومن الصفات المشتركة بينهما أيضًا أن أرجل الطيور مغطاة بحراشف تشبه تلك التي تغطي أجسام الزواحف.


فقد خلق الله سبحانه وتعالى للطيور مجموعة من التكيفات - ومنها الطيران - لتستطيع العيش في البيئات المتنوعة. ومن هذه التكيفات أيضًا قدرتها على إنتاج الحرارة الداخلية في أجسامها (ثابتة درجة الحرارة)، ووجود الريش، وظامامها خفيفة الوزن. وقد تكيف جهازا الدوران والتنفس أيضًا ليزودَ العضلات بأكسجين أكثر للطيران.


ثابتة درجة الحرارة Endotherms على العكس من الزواحف، تولد الطيور حرارتها داخليةً. **الثابتة درجة الحرارة endotherm** مخلوقات تولّد حرارة جسمها داخليةً عن طريق العمليات الأيضية الخاصة بها. ويرتبط معدل الأيض العالي بالحرارة الداخلية للجسم، مما يؤدي إلى توليد وإنتاج كميات كبيرة من الطاقة (ATP) يمكن استعمالها لتوفير طاقة العضلات أو حاجات أخرى.

وتبلغ درجة حرارة جسم الطائر 41°C تقريبًا. أما درجة حرارة جسم الإنسان فهي 37°C . وتمكّن درجة حرارة الجسم العالية خلايا العضلات الخاصة بالطيران من استهلاك كميات كبيرة من ATP اللازمة لانتباus العضلات السريع خلال الطيران.

ماذا قرأت؟ وضح لماذا يعُد ثبات درجة حرارة الجسم تكيفاً للطيران؟

■ الشكل 3-3 يوضح مخطط العلاقات التركيبية أن الريش صفة فريدة خاصة بالطيور.





■ الشكل 14-3 للطير ريش محيطي،
وريش زغبي، وعظام خفيفة الوزن.

الريش Feathers الطير هو المخلوقات الحية الوحيدة التي يغطي أجسامها الريش. **والريش feathers** زوائد نمو متخصصة من جلد الطير، مكونة من الكيراتين؛ وهو بروتين في الجلد يكون أيضًا الشعر والأظافر والقرون في بعض المخلوقات الحية الأخرى. وللريش وظيفتان أساسيتان، هما: الطيران، والعزل؛ إذ يمنع الريش فقدان الحرارة التي تولدها عمليات الأيض في جسم الطائر. وعندما ينفس الطائر ريشه يكون فراغًا هوائيًا عازلاً يحبس الحرارة. وهو ما يشبه عمل الغطاء عندما تكون نائماً، فيكون الغطاء فراغًا هوائيًا عازلاً بينك وبين الهواء البارد الموجود في الغرفة، مما يمنع فقدان حرارة الجسم.

والريش الذي يغطي الجسم والأجنحة وذيل الطائر يسمى **الريش المحيطي** (الكافافي) contour feathers. افحص الريش المحيطي المبين في الشكل 14-3. يتكون الريش المحيطي من قصبة ذات أشواك متفرعة، وتتفرع هذه الأشواك إلى سويكاث تتماسك معًا بخطافات. فإذا انفصلت الأشواك بعضها عن بعض فإنها تعاود الاتصال مرة أخرى كأسنان سخاب الملابس. وتُصلح الطير الروابط المنكسرة بين أشواك الريش عندما تقوم بتزييت ريشها، حيث تمرّ بمنقارها على طول الريشة. وتستغرق الطير الكثير من الوقت في إعادة بناء الروابط المنكسرة في ريشها. وللعبد من الطير **غدة زيتية preen gland**، وهي غدة موجودة قريباً من قاعدة الذيل تُفرز الزيت. وفي أثناء عملية التزييت تنشر الطير زيتاً من الغدة الزيتية على ريشها، فتكون غلافاً مقاوماً للماء. **والريش الزغبي down feather**، المبين في الشكل 14-3، ريش ناعم موجود تحت الريش المحيطي، ولا يحتوي خطافات لربط الأشواك معًا؛ فالتركيب اللين للريش الزغبي يمكنه حجز الهواء الذي يعمل عمل العازل.

المفردات.....

الاستعمال العلمي

مقابل الاستعمال الشائع.


Preen

الاستعمال العلمي: الإصلاح
والإدامة باستعمال منقار (طائر).

تُزيّت الطير ريشها قبل الطيران.

الاستعمال الشائع: التزييت يعني
الدهن بالزيت.

زيت الشعر: دهن بالزيت.....




■ **الشكل 15-3** عندما يتنفس طائر يمر الهواء في اتجاه واحد، بحيث يتم تبادل الغازات بكفاءة عالية.

العظم الخفيف الوزن Light weight bones هناك تكيف آخر للطير يسمح لها بالطيران، وهو هيكلها القوية الخفيفة الوزن. وعظام الطيور فريدة لأنها تحتوي على تجاويف هوائية. وبين **الشكل 14-3** التركيب الداخلي لعظام طائر. ورغم امتلاء العظام بالهواء فهي قوية. هل سبق أن وجدت عظم الترقوة في قطعة من الدجاج أو الديك الرومي؟ تكون عظمة الترقوة من التحام عظمتين، كما في **الشكل 14-3**. إن التحام العظام في هيكل الطائر يجعل الهيكل أكثر صلابة. وهذا تكيف آخر للطيران. فعضلات الصدر كبيرة، وتُشكّل نحو 30 % من وزن الطائر الكلي، فتُوفّر له القوة اللازمة للطيران. وترتبط هذه العضلات الجناح بعظم الصدر، الذي يُسمى **عظم القص sternum**، والمبيّن في **الشكل 14-3**. وعظم القص كبير، وفيه بروز لربط العضلات بعضها مع بعض.

التنفس Respiration تستهلك العضلات المسؤولة عن عملية الطيران كمية كبيرة من الأكسجين. لذا فإن أجهزة التنفس في الطيور متكيّفة جيداً؛ لتتوفر هذه الكمية من الأكسجين. وللطيور حيز للهواء في جهازها التنفسي أكبر من الزواحف، كما أن الهواء يدور في جهازها التنفسي في اتجاه واحد فقط. ويتحرّك الهواء الغني بالأكسجين في عملية الشهيق عبر القصبة الهوائية إلى **الأكياس الهوائية air sacs** الخلفية، كما هو مبيّن في **الشكل 15-3**. وفي المقابل يُسحب الهواء الموجود في الوقت نفسه في الجهاز التنفسي من الرئتين نحو الأكياس الهوائية الأمامية، حيث يحدث تبادل الغازات. أما في عملية الزفير فيُطرد الهواء غير المؤكسج الموجود في الأكياس الهوائية الأمامية من الجهاز التنفسي، ويحل محله الهواء المؤكسج الذي يتوجه من الأكياس الهوائية الخلفية إلى الرئتين. وأخيراً يتحرّك الهواء المؤكسج فقط داخل الرئتين في اتجاه واحد اعتماداً على اتجاه دوران الدم.

الدورة Circulation تساعد الدورة الدموية الطائر على المحافظة على مستويات عالية من الطاقة، من خلال النقل الفعال للدم المؤكسج إلى أجزاء الجسم. وللطيور قلب بأربع حجرات، كما في **الشكل 16-3**. وجود بطنين يُعيّن الدم المؤكسج وغير المؤكسج منفصلين، مما يجعل توصيل الدم أكثر فاعلية.

ويستقبل الأذين الأيسر الدم من الرئتين، ويضخه إلى البُطين الأيسر، ثم إلى جميع أجزاء الجسم. كما يصل الدم من الجسم إلى الأذين الأيمن، ثم يتحرك إلى البُطين الأيمن، ومنه إلى الرئتين، حيث يحصل على المزيد من الأكسجين.



■ **الشكل 16-3** للطيور قلب من أربع حجرات، يُقىي الدم المحمل بالأكسجين والدم غير المحملاً بالأكسجين منفصلين أحدهما عن الآخر.

قارن بين قلب الطائر وقلب الزاحف في **الشكل 4-3**.

التغذية والهضم Feeding and digestion تحتاج الطيور إلى كمية كبيرة من الغذاء للمحافظة على معدل أيض عاليٍ. فعندما تأخذ الطيور الطعام تقوم باستهلاكه من خلال تكيّفات فريدة في أجهزتها الهضمية، كما في **الشكل 17-3**. وللعديد من الطيور حجرة تخزين تُسمى الحوصلة، توجد أسفل المريء، تخزن فيها الغذاء الذي يتبلعه، ثم يتحرك الطعام من الحوصلة إلى المعدة. والنهاية الخلفية للمعدة ما هي إلا كيس عضلي سميك يُسمى القانصة. وتحوي القانصة عادةً حجارة صغيرة تقوم بطحن الطعام الذي ابتلعه الطائر بمساعدة الأداء العضلي للقانصة. فتُصبح جزيئات الطعام الصغيرة الناتجة أسهل للهضم. وليس للطيور أسنان، ولا يمكنها مضغ الطعام؛ إذ يتم هضم الطعام وامتصاصه بشكل رئيس في الأمعاء الدقيقة، وتساعد إفرازات البنكرياس والكبد على عملية الهضم.

الإخراج Excretion تُنقى كلية الطائر الدم من الفضلات، وتحولها إلى حمض البوليک (uric acid)، كما هو الحال في الزواحف. وللطيور مجتمع (مذرق)، يتم فيه إعادة امتصاص الماء من حمض البوليک، **الشكل 17-3**. وليس للطيور مثانة بولية تخزن البول؛ حيث يسبب تخزينه زيادة وزن الطائر خلال الطيران، لذا يمكن اعتبار عدم وجود مثانة بولية تكيّفاً للطيران. وتطرح الطيور حمض البوليک في صورة مادة بيضاء طرية.

المطويات


ضمّن مطويتك معلومات من هذا القسم.

تجربة استكشافية

مراجعة: بناءً على ما قرأته عن الزواحف والطيور، كيف يمكنك الآن الإجابة عن أسئلة التحليل؟

Feeding and Digestion

■ الشكل 17 - 3 تفَحَّصُ أعضاء الجهاز الهضمي لطائر ما. فبالإضافة إلى وجود تكييفاتٍ فريدةٍ في أجهزة الطيور الهضمية، فإن لها أيضًا مناقير مُنْكِيَّةٍ مع نوع الغذاء الذي تأكله.



تستعمل طيور الرفراف مناقيرها الطويلة والرفيعة والحادية لطعن الأسماك والبرمائيات الصغيرة والإمساك بها.



لطائر الطنان منقار طويل رفيع لامتصاص الرحيق من الأزهار.



يستعمل الصقر منقاره الحاد لتمزيق لحم الفريسة.



يستعمل البجع منقاره الكيسى لغرف الماء الذي يحوي الأسماك.

الدماغ والحواس The brain and senses تتميز أدمغة الطيور - كما في الشكل 18-3- بأنها كبيرة، مقارنة بحجم الطائر. فالمخيخ كبير لأنّ الطيور تحتاج إلى تناسق الحركة والاتزان في أثناء الطيران. وينسق الجزء البصري المعلومات البصرية. وحجم المخ كبير أيضًا لأنّه مركز التكامل الأساسي في الدماغ. وتحكم هذه المساحة من الدماغ في الأكل والتغريد والطيران والسلوك الغريزي، كما أن مساحة القشرة المخية كبيرة نسبياً، وهي مسؤولة عن الذكاء في الطيور. ويتحكم النخاع المستطيل في الوظائف الإيقاعية، ومنها التنفس ودقات القلب.


للطيور عموماً بصر حادٌ. والطيور المفترسة - ومنها البوم، الشكل 18-3 - لديها نظام تركيز عاليٍ يمكنها من التركيز على فريسة متحركة بشكل دائم عندما تقوم بالانقضاض عليها لافتراسها. ويعتمد موقع عيون الطائر في وجهه على بيته؛ فللطيور المفترسة عيون في مقدمة رأسها. وهذا يمكنها من تمييز مسافة الهدف؛ لأن كلتا العينين يمكنها أن تركز على الهدف نفسه. وللحمامات عينان على جانبي الرأس، مما يمكنها من الرؤية بزاوية 360° تقريباً في الفراغ المحيط بها؛ إذ ترى كل عين مناطق مختلفة. وتأكل الحمامات الحبوب والبذور ولا تفترس، وبصرها متكيف لاكتشاف المفترسات التي يمكن أن تكون قريبة منها. وللطيور أيضاً حاسة سمع جيدة. ويمكن للبوم أن يسمع أدنى صوت لفأر خائف في الليل. فحتى لو هرب الفأر ليختبئ يمكن للبومة أن تمسك به بتتبع صوته فقط.

التكاثر Reproduction النشاطات التكاثرية في الطيور معقدة؛ فهي تشمل تحديد مناطق التكاثر، وتحديد شريك التزاوج، وسلوك المغازلة، والتزاوج، وبناء الأعشاش، وحضن البيض، وإطعام الصغار. وخلال فصل التكاثر يتجمع العديد من الطيور في مستعمرات كبيرة؛ حيث تتكاثر وتعتنى بصغارها. والإخصاب في الطيور داخلي. وتكون البيضة الأمنيوية بعد الإخصاب، وتكون مُحااطة بقشرة صلبة وهي لا تزال في جسم الأنثى. وبعد تكون القشرة، يتم طرح البيضة أو البيض عن طريق المجمع (المذرق) إلى العش، حيث يحضن الذكر أو الأنثى أو كلاهما البيض، ويُطعمان الصغار بعد الفقس. **والحضانة incubation** تعني إبقاء الظروف الملائمة لفقس الصغار، وترقد الطيور على البيض لحضنه.

■ الشكل 3-18

الأيمان: تبقى عيون البوم مرکزة على الفريسة المتحركة في أثناء عملية الانقضاض عليها.

الأيسر: للطيور مخيخ كبير يمكنها من الاتزان والتناسق في أثناء الحركة. ويتحكم النخاع المستطيل في العمليات الإيقاعية.



Diversity of Birds تنوع الطيور

تُقسم الطيور إلى 27 رتبة تقريباً. وتحتَّل هذه الرُّتب بعضها عن بعض اعتماداً على الاختلافات التشريحية، والسلوك المحدد، والتغريد، والموطن. ويوضح الجدول 3-1 أكثر رتب الطيور شيئاًً وبعض تكثُّفاتها. وأكبر رتبة للطير هي العصافير، وتسمى عادةً الطير الجاثمة أو الطير المُغرَّدة. وهناك أكثر من 5000 نوع في هذه الرتبة. وللطيور التي لا تطير - ومنها العنامة Ostriche والإيمو Emus وطائر الكيوبي Kiwis - أجنة صغيرة، أو ليس لها أجنة على الإطلاق. وطائر الكيوبي - وهو في حجم الدجاجة ويعيش في نيوزيلندا - يضع بيضة واحدة كبيرة جداً مقارنة بحجمه. وبعض الطيور - ومنها البطريق والإوز والبط - تمتاز بتكييف يسمح لها بالسباحة. وستعمل البطاريق أجنتتها مجاذيف للسباحة عبر الماء، في حين أن للبط والإوز أقداماً بأغشية تساعدها على السباحة.

بيئة الطيور Ecology of Birds

تؤدي الطيور دوراً مهماً في السلسل الغذائي بوصفها مفترسات للثدييات الصغيرة، والمفصليات، واللافقاريات الأخرى. ولذلك شاهدت طائراً يسحب دودة من الأرض. والطيور أيضاً فرائس لطير أكبر للثدييات. لذا فإن الطير مهم في السلسل الغذائي بوصفها فريسة داخل النظام البيئي للطيور الكبيرة أو الثدييات.

تجربة 3-1

الطيور المحلية (دراسة مسحية)

التحليل

ما الطير التي تعيش في منطقتك؟ يمكن أن يكون هناك طير متنوع في أي بيئة تقريباً. استكشف المنطقة حول مدرستك لتقدير الطير المختلفة التي تعيش هناك.

- عُدّ أنواع الطيور التي شاهدتها، ووضع قائمة بأنواعها.
- حدّد ما إذا كانت الطير التي شاهدتها محلية أم دخلية.
- حلّ هل ظهرت أي عينات جديدة عند تجميع البيانات؟
- توقع هل تختلف هذه القائمة لو مسحت المنطقة المحيطة بمنزلك؟ وإذا اختلفت فكيف تختلف؟

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العلمية.
2. قدر عدد أنواع الطيور المختلفة التي يمكن أن تراها في المنطقة المحيطة بمدرستك، واعمل جدول بيانات لمتابعة الطير التي تلاحظها.

3. اذهب في رحلة مشي مدتها 10 دقائق إلى المنطقة المجاورة لمدرستك. وتأكد من اتباع إرشادات معلمك حول الأماكن المسموح لك بالذهاب إليها. وسجل معلوماتك عن الطير الذي تشاهده. واستعمل منظاراً إذا دعت الحاجة. وإذا لم تستطع تعرّف طائر ما فاستعمل دليلاً ميدانياً مصوراً للطيور المحلية.

4. اجمع نتائجك، وابحث عن الطير التي شاهدتها.



تنوع رتب الطيور

الجدول 1-3

الخصائص	أفراد الرتبة	المثال	الرتبة
لهذه الرتبة أقدام تمكّنها من الجثوم على السيقان الصغيرة والأفرع. والعديد من الطيور في هذه الرتبة تغُرّد. وعضو الصوت (الحنجرة) فعالً جدًا في هذه الطيور. وهناك أنواع أخرى لا تغُرّد ، منها الغربان.	السُّماني، الدَّخَل Warbler، الغراب، الدُّوري، كاسر الجوز Nuthatch، المحاكي.		العصافير (باسيروفورميس Passeriformes طيور جاثمة مغُرّدة؛ نحو 5000 نوع).
لهذه الرتبة مناقير متخصصة مرتبطة مع طريقة تغذّيها. وكلها تبني أعشاشًا في التجاويف، كتنبّق داخل شجرة ميتة على سبيل المثال. وللأقدام إصبعان متداهان إلى الأمام، وإصبعان متداهان إلى الخلف، وهذا يسمح للطائر بالتعلق بجذوع الأشجار.	نقّار الخشب، الطوقان Toucans، مرشد العسل Honey guide، اليقمر Jacamars		النقاريات (بيسيروفورميس Piciformes تبني أعشاشها في التجاويف والثقوب، نحو 380 نوعًا).
يتراوح حجم أفراد هذه الرتبة بين الصغير والكبير؛ ولها رقب طويل وأرجل طويلة. ومعظمها طيور جماعية تعيش في مجموعات كبيرة في الأرضي الرّطبة. والعقبان تشبهه القالق إلى حد كبير في أجسامها إلا أنها رمية التغذى.	الطائر الحزين، الفلامنغو، البلشون، النسور، القالق.		القالق (سيكونيروفورميس (iconiiformes طيور مائية والعقبان، نحو 90 نوعًا).
هذه الرتبة طيور بحرية. ولديها مناقير معقوفة تساعدها على التغذى على الأسماك، والجبار والقشريات الصغيرة. لديها فتحات تفاصية تشبه الأنوب، موجودة في أعلى مناقيرها. وللعديد منها أقدام بأغشية.	القطرس Albatross، المازور Petrel، حلم الماء Shear waters		النويات (بروسيلاريروفورميس (rocellariiformes الطيور البحرية، نحو 100 نوع).
البطريق طيور بحرية تستخدم أجنحتها مجاذيف للسباحة عبر المياه، بدلاً من الطيران. وعظام البطريق صلبة، وتخلو من الفراغات الهوائية الموجودة في الطيور الأخرى. وأنواع هذه الرتبة موجودة في نصف الكرة الجنوبي.	البطريق.		البطريقيات (سفينيروفورميس (phenisciformes البطاريق، نحو 17 نوعًا).
البوم طيور ليلية، لها عيون كبيرة، ومناقير قوية معقوفة، مع مخالب قوية، حادة في أقدامها، وتساعدها هذه التكيفات على الإمساك بالفريسة. وللعديد منها ريش على أرجلها. ويوجّد البوم في جميع أنحاء العالم ما عدا القارات المتجمدة.	البوم		البوميات (ستيريجيروفورميس (Strigiformes البوم، نحو 135 نوعًا).
أعضاء هذه الرتبة أجنحة صغيرة، وهي طيور لا تطير. والنّعام أكبر طائر حي؛ إذ يصل طولها إلى أكثر من مترين، وتزن حوالي 130 kg. ويوجّد معظم أنواع هذه المجموعة في نصف الكرة الجنوبي.	النّعام، الإيمو، الكيوي، الريّة Rheas		النعميات (ستروثيونيروفورميس (truthioniformes لا تطير، نحو 10 أنواع).
تعيش أفراد هذه الرتبة في بيئات مائية. ولها أقدام غشائية تساعدها على الحركة في الماء. وللعديد منها مناقير دائيرية عريضة تستعملها للتغذى على النباتات المائية، وأحياناً على القشريات أو الأسماك الصغيرة.	الإوز، البط، البعج.		الأوزيات (أنسيروفورميس (Anseriformes طيور الماء، نحو 150 نوعًا).



■ **الشكل 19-3** لم يبق طيور مكاو في البرية؛ فلا يوجد إلا نحو 70 من هذه الطيور فقط في الأسر.



وتؤدي الطيور أيضًا دوراً مهماً في نشر البذور؛ إذ تأكل الطيور البذور أو الشمار، ثم تخر جها بعد هضمها في صورة فضلات في مكان آخر. كذلك تتتصق البذور بريش الطائر، وتتساقط عنه كلما انتقل من مكان إلى آخر. وبعض الطيور - ومنها الطيور الطنانة، تتغذى على رحيق الأزهار، وتقوم بتلقيحها في أثناء التغذية على رحيقها.

تدمير الموطن البيئي Habitat destruction العديد من الطيور مهدد بالانقراض؛ لأنَّ مواطنها التي تحتاج إليها تختفي أو تُدمر بتأثير المبيدات الحشرية والملوثات الكيميائية الأخرى. وتعتمد جماعات طيور الماء على الأرضي الرَّطبة، وهي مناطق تختفي بسرعة؛ حيث يتم تجفيفها للتطوير والبناء، وقد أدَّت إزالة الغابات في منطقة الغابات المطرية إلى تهديد حياة بعض أنواع الطيور أيضًا.

التجارة غير القانونية Illegal trade تزايد تجارة طيور الزينة غير القانونية. والعديد من طيور الزينة تُربَّى في الأقفاص. وقد أدى الصيد غير المشروع للطيور، واستخدامها سلعة تدرِّ الأموال الكثيرة - في بعض الحالات - إلى اختفاء طيور نادرة من البريَّة، فلا يوجد طائر المكاو مثلاً، كما في **الشكل 19-3**، إلا في الأقفاص. ولقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة (UN) في عام 1975 م عن اتفاقية دولية تهدف إلى حماية أنواع معينة من النباتات والحيوانات (ومنها الطيور) المهددة بالانقراض من الاستغلال التجاري المفرط بعنوان (اتفاقية التجارة الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض "CITES") اضمنت لها المملكة العربية السعودية ممثلاً بالهيئة السعودية للحياة الفطرية في عام 1995 م وقد بلغ عدد الدول الأطراف التي وقعت على هذه الاتفاقية حتى عام 2016 م حوالي 183 دولة.

التقويم 3-2

التفكير الناقد

فهم الأفكار الرئيسية

الخلاصة

7. توضيحات علمية أرسم دماغ طائر، وحدَّد عليه الأجزاء المختلفة في الدُّماغ، ووضح وظيفة كل منها.

8. **الكتابة في علم الأحياء** تضع معظم الطيور البرية الصَّغيرة - التي تُطعم صغارها - ما بين بيضتين إلى 12 بيضة في أعشاشها. وبعض الطيور الكبيرة - ومنها طائر الماء - لدى صغارها القدرة على العناية بنفسها بعد الفقس، ولا يطعمها أبوها. وتضع نحو 20 بيضة في أعشاشها. كُوٌن فرضية مُفصَّلة تُفسِّر فيها لماذا تضع بعض أنواع الطيور أعدادًا من البيض أقل من الأنواع الأخرى.

1. **الفكرة الرئيسة** حدد خصائص الطيور التي تجعلها متكيفة للطيران.

2. قارن بين الريش المحيطي والريش الزغبي.

3. فسِّر كيف تكيف الجهاز التنفسي والدوراني في الطيور للطيران.

4. قارن بين التكاثُر في الطيور والزواحف.

5. صف كيف تختلف صفات الطيور في رتبة ستريجيورميس (البوم) عنها في رتبة أنسيريغورميس (الأوزيات - طيور الماء).

6. صف دور الطيور في انتشار الغطاء النباتي.

- لطيور خصائص تجعلها متكيفة جيدًا للطيران.

- يمكن لطيور أن تولِّد حرارة جسمها داخليًّا.

- لطيور عظام خفيفة الوزن.

- شكل منقار الطائر يحدد نوع الغذاء الذي يتناوله.

- لطيور عمومًا بصر حاد.

- تُقسم الطيور إلى 27 رتبة.

- تؤدي الطيور دورًا مهمًا في السلسل الغذائية.

- تدمير الموطن والتجارة غير القانونية قد يؤثِّران في بعض أنواع الطيور.



الغراب الهندي أحد الأنواع الدخيلة على بيئتنا المحلية

ما الخسائر التي تسببها الأنواع العدوانية؟ يمكن

للأنواع الدخيلة أن تسبب خسائر مالية كبيرة سنويًا للمحاصيل الزراعية والأراضي الخضراء. ووجود الأنواع الدخيلة يُعد ثاني سبب رئيس لتهديد الأنواع وانقراضها. ويمكن لأنواع النباتات الدخيلة أن تهدد جماعات الطيور من خلال فقدان الموطن في أراضي التكاثر أو الأراضي التي تقضي فيها فصل الشتاء. وقد تفترس أنواع الحيوانات الدخيلة حيوانات أصلية في منطقة ما. ويشكل التَّنافُس على المكان والفرائس عاملًا أساسياً في اكتساح الأنواع الدخيلة للأنواع الأصلية.

الحلول يمكن التَّحَكُّم في الأنواع الدخيلة بعدة طرائق، منها القوانين، وعدم السماح بدخول المخلوقات الحية الدخيلة. ويدرس العلماء باستمرار الأنواع الدخيلة لكي يفهموا طرائق السيطرة على انتشارها، ودورها حياتها، وسلوكها. ويمكن أن تساعد قوانين وأنظمة متعلقة بالمشكلات البيئية على تحسين الظروف المرتبطة مع الأنواع الدخيلة أيضًا.

مشاركة المجتمع المحلي

كتابة تقرير اكتب تقريرًا عن أحد أنواع الحيوانات الدخيلة في منطقتك، وشارك مدارس منطقتك نتائج التقرير بالتعاون مع معلمك. على أن يكون التقرير موجهاً إلى طلاب المدارس الابتدائية في منطقتك. وتتأكد من أنك قد شاركت طلاب المدارس في هذا النشاط.

الأنواع الدخيلة في البيئة

ماذا يحدث عندما يشتري مالكو الحيوانات الأليفة صغيراً أفعى بور ما العاصرة، ثم يُعْتَرِّرون بعد أن يصل طول الأفعى إلى 4-5 m أنهم لا يستطيعون العناية بها؟ إن أصحاب هذه الأفاعي الضخمة يُلقون بها في المروج الخضراء. وتعد الأفعى العاصرة عدوانية؛ فهي تسبّ مشكلات في المروج الخضراء. وتسبّ أنواع عدوانية أخرى مشكلات ليئتها المُضيفة في مناطق مُختلفة من العالم.

ما الأنواع الدخيلة (الغازية)؟ الأنواع الدخيلة (الغازية) هي مخلوقات تم إدخالها من قبل البشر إلى مناطق لا تعيش فيها أصلاً، وهي تتکاثر بنجاح، وتُحدث في النظام البيئي أضراراً ومشكلات بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية. ومن أبرز هذه القضايا تحولها إلى آفات أحيايَة تتنافس بشراسة مع الأنواع المحلية الموطنة، وتحدد من انتشارها أو القضاء عليها أو جلب الأمراض إليها، مما يهدد قيام الأنظمة البيئية بوظائفها في دعم الحياة. ومن الأنواع الدخيلة على البيئة في المملكة العربية السعودية طائر مينة الضفاف (الاسم الإنجليزي Bank mynah)، وهو من الطيور الدخيلة على المملكة العربية السعودية، حيث تم جلبه من جمهورية باكستان الإسلامية بهدف تربيته للزينة، ثم أطلق من الأقفاص. وهو الآن منتشر في منطقة الرياض، ويعتبر على الحشرات والفواكه.

ومن الأنواع الدخيلة أيضاً الغراب الهندي المنزلي (الاسم العلمي *Corvus splendens* والاسم الإنجليزي Indian House Crow)، والغراب البني الرقبة أو الغراب التوحي (الاسم العلمي *Corvus ruficollis* والاسم الإنجليزي Brown-necked Raven).

مختبر الأحياء

كيف يمكنك عمل نموذج لبيئة الزواحف والطيور؟



4. تأكّد من موافقة المعلم على خطّتك قبل المضي فيها.

5. استعمل المواد المُتوافرة لعمل نموذج لكلّ من بيئه الزَّاحف وبيئة الطَّائر اللذين اخترتهما والتي تمكّنها من العيش في حديقة الحيوانات.

6. اعرض النموذجين على الصف، ثم فسّرهما.

حلّ ثم استنتاج

1. صُفْ كيف أدَّت الاختلافات بين الطُّيور والزَّواحف إلى اختلافات في النُّماذج التي عملتها لكلّ بيئه.

2. حَدَّد جوانب الضعف في نموذجك. وهل يدعم نموذجك حاجات كلّ نوع؟ وما التعديلات التي أضفتها إلى نماذجك؟

3. صُفْ كيف أنّ تراكيب المخلوقات الحية وسلوکها تُعد من المميزات التنافسية في بيئاتها.

الكتابة في علم الأحياء

نشرة للمنزل اكتب نشرة ووضحها بالرسوم؛ لتمكّن الناس الذين يزورون معرضك أن يأخذوا نسخة منها إلى منازلهم. وضمنها معلومات عن الحيوانات الموجودة في المعرض، وتوضيحات لبيئاتها الطبيعية.

الخلفية النظرية: اطلب إلى طلاب صفك أن يساعدوك على التّخطيط لعمل معرض جديد لحديقة حيوانات يتعلق بتكييفات الطُّيور والزواحف. وسوف تبحث في هذا المختبر عن أنواع مختلفة من الطُّيور والزواحف لتتفهم كيف تكيّفت تراكيب أجسامها مع البيئات المتنوعة ومصادر الغذاء المختلفة. وستستعمل هذه المعلومات لعمل نموذج لبيئة يمكن أن تعيش فيها الطُّيور والزواحف في حديقة الحيوان.

سؤال: كيف يمكنك عمل نموذج لبيئة ما بالاعتماد على ما تعرّفه عن تكييفات المخلوق مع بيئته؟

المواد والأدوات

- دليل ميداني للطُّيور والزواحف.
- صمع.
- مقص.
- رمل.
- تربة.
- أقلام تلوين.
- قطع ورق مقوى.
- فاصولياء جافة.
- صندوق ورق مقوى.
- حجارة/ حصى.
- قطع لباد/ فلين.

احتياطات السلامة

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السَّلامة في دليل التجارب العملية.
2. اختر أحد أنواع الزَّواحف وأحد أنواع الطُّيور، وابحث عن تكييفات كلّ نوع، ومعلومات عن البيئة التي يعيش فيها، والطّعام الذي يتغذّى عليه وسلوکه. وابحث أيضًا عن دور ترکيب الجسم والسلوك بوصفهما من المميزات التنافسية في البيئة التي تعيش فيها هذه المخلوقات.

3. استعمل المعلومات التي جمعتها لعمل وصف مُفصّل للبيئة التي يجب بناؤها في المعرض لكلّ طائر وزاحف قمت بالبحث عنه.



المطويات استنتاج ليس للأسماك والبرمائيات بيوض أمنيونية. لماذا؟ صف هذه الأسباب على ظهر المطوية.

المفاهيم الرئيسية

المفردات

1 – 3 الزواحف

الفكرة خلق الله سبحانه وتعالى للزواحف تكيفات مكنتها من العيش على اليابسة.

وهب الله للزواحف عدة أنواع من التكيفات التي مكنتها من العيش على اليابسة.

تكييف بعض الزواحف للنمو والعيش على اليابسة.

تقسم الزواحف إلى أربع رتب هي: الحرشفيات، والتمساحيات، والسلحفيات، وخطميات الرأس.

الزواحف مخلوقات أمنيونية. والعديد من الزواحف – ومنها الديناصورات – قد انقرضت.



الغشاء الرهلي (الأمنيون)

البيضة الراهلية (الأمنيونية)

الطاقة ATP (أدينوسين ثلاثي الفوسفات)

عضو جاكوبسون

درع الظهر

درع البطن

الفكرة وهب الخالق جل وعلا للطّيور ريشاً وأجنحة وعظاماً خفيفة الوزن

وتكيفات أخرى تسمح لها بالطيران.

للطّيور خصائص تجعلها متكيفة جيداً للطيران.

يمكن للطّيور أن تولّد حرارة جسمها داخلياً.

للطّيور عظام خفيفة الوزن.

شكل منقار الطّائر يحدده نوع الغذاء الذي يتناوله.

للطّيور عموماً بصر حاد.

تقسم الطّيور إلى 27 رتبة.

تؤدي الطّيور دوراً مهماً في السلسل الغذائية.

تدمير الموطن والتجارة غير القانونية قد يؤثران في بعض أنواع الطّيور.

2 – 3 الطّيور

ثابتة درجة الحرارة

الريش

الريش المحيطي (الكافافي)

الغدة الزيتية

الريش الغربي

عظم القص

كيس الهواء

الحضانة



التقويم

3



3-1

مراجعة المفردات

استبدل المفردات التي تحتها خط بكلمات أخرى من صفحة دليل مراجعة الفصل لتصحيح العبارات الآتية:

1. توجد عدّة أغشية داخل الدرع الظهرية.

2. الجزء البطني في درع السُّلحفاة يسمى عضو جاكوبسون.

3. الدرع السفلية مسؤولة عن حاسة الشّم في الأفاعي.

4. الجزء الظاهري لدرع السُّلحفاة يسمى البيضة الأمينية.

ثبت المفاهيم الرئيسية

5. أيّ مما يأتي ليس من الزواحف؟

.b



.a



.d



.c



6. أيّ الجمل الآتية خاطئة فيما يتعلق بتنفس الزواحف؟

a. تستعمل معظم الزواحف الرئات لتبادل الغازات.

b. في عملية الشهيق تنبسط عضلات القفص الصدري في الزواحف.

c. في عملية الرفير تنبسط عضلة جدار الجسم في الزواحف.

d. لرئات الزواحف مساحة سطح أكبر من تلك التي في البرمائيات.

7. أيّ تراكيب الزواحف الآتية يوجد فيها حمض البوليك؟

b. المجمّع.

d. المعدة.

a. الرئتان.

c. القلب.

8. نهاية مفتوحة. اعمل جدولًا يوضح التراكيب الآتية ووظائفها، وتشابهها مع أداة صنعها الإنسان: الأمنيون، البُطين، المثانة، عضو جاكوبسون، الدرع الظهرية والدرع البطنية في السُّلحفاة، الكليتين.
9. نهاية مفتوحة. اعمل مفتاحاً ثانياً للتفرّع يمكن أن يساعد الشخص الذي يدرس حيواناً زاحفاً على تحديد رتبته.

التفكير الناقد

10. تطبيق المفاهيم. أرجل أبي بريص (الوزَّاغة) مُعطّاة بالملابس من التراكيب التي تُشبه الشّعر قد تلتصق بالسطح، وعندما تلامس سطحًا ما يحدث تجاذب بين الجُزئيات، فتلتصق أقدام أبي بريص على ذلك السّطح. وهذه التراكيب قد تدعم حتى 400 ضعف وزن جسم أبي بريص تقريباً. فكيف يُمكن للعلماء أن يستعملوا طريقة التصاق أرجل أبي بريص بالسطح في عمل أداة يُمكن أن تكون مُفيدة للبشر؟




تقويم الفصل

3

تشبيت المفاهيم الرئيسية

- 19.** أي العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بالطير؟
- قلبها مكون من ثلاثة حجرات.
 - ظامانها خفيفة الوزن لأنها تحتوي تجاويف هوائية.
 - لها مثانة بولية.
 - الطير حيوانات متغيرة درجة الحرارة.
- 20.** أي مصطلح مما يأتي لا يتمي إلى المصطلحات الأخرى في كل مجموعة مما يأتي؟
- البُطين، الأذين، الدم المؤكسج، الدم غير المؤكسج.
 - الكلية، الفضلات النيتروجينية، حمض البوليك، المجمع (المذرق).
 - المُخيخ، المُخ، الأجزاء البصرية، النُخاع.
 - البيضة الأمينية، المذرق، الكلية، الأمينون.

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 21.



- 21.** أي التركيب الآتية يدخل إليها الهواء المؤكسج في أثناء عملية الشهيق في الطائر؟

B. b A. a

D. d C. c


22. تنتهي الكلية والمجمع إلى الجهاز:

a. الإخراجي. b. العصبي.
c. الهضمي. d. التكاثري.

- 23.** ما نوع المنقار الذي يحتاج إليه طائر يتغذى على نباتات مائية؟

a. واسع وعربيض.
b. كبير وعلى شكل مغرفة.
c. حاد ومعقوف.
d. طويل، رفيع، ومدبّب.

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤالين 11 و 12. لقد أدخلت السحالى البنية الرباعية الأصابع إلى جزيرة جوام في المحيط الهادئ في بدايات عام 1950 م.



11. حل البيانات. كيف تغيرت أعداد جماعات السحلية البنية الرباعية الأصابع وسحلية ماريانا ذات الذيل الأزرق منذ عام 1950 م؟

12. كون فرضية مفصلة تفسّر التناقض في أعداد جماعات سحلية ماريانا الزرقاء الذيل.

13. قارن. بين جهاز الدوران في الزواحف والبرمائيات؟

14. وضّح. اعمل مخططاً يبيّن كيف أثر فقدان البيئات وإدخال أنواع الدخيلة في جماعة أفعى الغرطر.

3-2

مراجعة المفردات

فسّر العلاقة بين المفردات الآتية:

15. الثابتة درجة الحرارة، الريش الزيتي.

16. الريش المحيطي، الريش الذهبي.

17. الغدة الزيتية، الريش المحيطي.


18. عظم القص، كيس الهواء.

نحويم إضافي

28. **الكتابة في علم الأحياء** اكتب ملخصاً حول الدراسة المسحية في التجربة 1-2، وسجّل أنواع الطيور التي حدّتها، وعددها.

أسئلة المستندات

لأفاعي البحر الخضراء سمّ قويّ جدّاً تحقّنه داخل الفريسة. وفي العديد من الحالات يشلّ السم العضلات التي تضخ الماء عبر خياشيم السمك. ويُظهر الرسم البياني معدّلات الوفاة لخمسة أنواع من الأسماك أعطت جرعات مختلفة من سم استخلص من أفعى بحر خضراء.



استخدم الرسم البياني السابق في الإجابة على السؤالين 30-29

29. أيّ أنواع الأسماك أكثر تأثراً بالسم، وأيها أقل تأثراً؟ فسر كيف عرفت ذلك؟

30. لنوع السمك الأقل تأثراً بالسم المقدّرة على التنفس من خلال جلدّه، بالإضافة إلى الخياشيم. لماذا تُعد هذه الصفة مهمّة للّّجأة من سمّ أفعى البحر؟

أسئلة بنائية


24. **مهن مرتبطة مع علم الأحياء**. وضع علماء الطيور فرضية مفادها أنَّ الذَّاكِرَة الطَّوِيلَة الْأَمْدَلْعَبْعُض الطَّيُور المهاجرة تكون أفضَلَ مِنْهَا في الطَّيُور غَيْرِ المهاجرة. ولاختبار هذه الفرضية زُيِّنت غرفتان؛ واحدة ببنات اللبلاب والأُخْرَى ببنات الْخُيَّبَة. ووضع طعام في غرفة واحدة فقط. وُسُمِّح لطيور مهاجرة وأخرى غير مهاجرة باستكشاف كلتا الغرفتين من دون وجود الغذاء. وبعد عام سُمِّح للطيور نفسها باستكشاف الغرفتين. وقد استغرقت الطيور المهاجرة في اكتشاف الغرفة التي احتوت على الغذاء فترة أطول من الطيور غير المهاجرة. صُنِعَ استنتاجاً عن الذَّاكِرَة الطَّوِيلَة الْأَمْدَلْعَبْعُض الطَّيُور.

التفكير الناقد

25. **كون فرضية.** تُغَرِّد الطَّيُور غالباً عند الفجر. ويعتقد العلماء أنَّ الطَّيُور تعلن عن حدود مناطقها أو تعلّن عن مكانها لأي شريك تزاوج مُحتمل. وقد اكتشف علماء الأحياء أيضاً أنَّه كلما كانت عينا الطَّائر أوسع غَرِّد أَبْكَر. كون فرضية عن العلاقة بين العين والتَّغْرِيد المبكر عند الطَّيُور.

26. استنتاج. عرف علماء الأحياء أنَّ صغار الطَّيُور تلف أجسامها داخل أعشاشها. استنتج أهمية هذا الالتفاف لأجسام الطيور.

استعمل الشَّكل الآتي للإجابة عن السؤال 27.



27. استنتاج. ما نوع الطَّعام الذي يأكله هذا الطَّائر؟ وكيف يستعمل منقاره خلال التَّغذية؟

اختبار مقتني

أسئلة الاختيار من متعدد

استعمل الجدول الآتي للإجابة عن السؤال 4.

بعض مكونات الجهاز الهضمي	المجموعة	الصنف
لها قانصة، معدة، أمعاء	البرمائيات	1
لها حوصلة، أمعاء دقيقة وغليظة	الزواحف	2
لها حوصلة، قانصة، أمعاء	الطيور	3
لها مثانة عوم، قانصة، أمعاء	الأسماك	4

4. أي صفة في الجدول أعلاه يحتوي معلومات صحيحة عن الجهاز الهضمي؟

- 1 . b
2 . a
3 . c
4 . d

5. يوصف دماغ الطيور بأنه:

- a. نخاع مستطيل كبير للرؤى.
b. مخ كبير لضبط عمليتي التنفس والهضم.
c. مخيخ كبير لتنسيق الحركة وحفظ التوازن.
d. قشرة دماغ كبيرة للتحكم في الطيران.


6. أي العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بجهاز الدوران في السلاحف؟

- a. دورantan دمويتان مغلقتان، وقلب مكون من أربع حجرات.
b. دورantan دمويتان مغلقتان ، وقلب مكون من ثلاثة حجرات.
c. دورة دموية واحدة مغلقة، وقلب مكون من ثلاثة حجرات.
d. دورة دموية واحدة مغلقة ، وقلب مكون من حجرتين.

1. أي الخصائص الآتية استخدمت في تقسيم الديناصورات إلى مجموعتين؟

- a. تركيب عظام الورك
b. تركيب الجمجمة والفكوك
c. ثابتة درجة الحرارة أم متغيرة درجة الحرارة
d. آكلة أعشاب أم آكلة لحوم

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 2 و 3.



2. أي الأرقام الآتية تمثل الغشاء المملوء بالسائل الذي يمنع الجنين من الجفاف ويحميه؟

- 1 . a
2 . b
3 . c
4 . d

3. أي الأرقام الآتية تمثل مصدر الغذاء الرئيسي لجنين الزواحف المبين في الشكل؟

- 1 . a
2 . b
3 . c
4 . d

اختبار مقنن

أسئلة مقالية

يقوم الأبوان في معظم أنواع الطيور برعاية الصغار؛ حيث يتزاوج الأبوان في موسم التزاوج ويربيان صغارهما. وفي بعض أنواع الطيور يعني أحد الأبوين العش، ثم يجذب شريكًا للتزاوج. وفي أنواع أخرى من الطيور يقوم الأبوان ببناء العش معاً. ويتناوبان على حراسة البيض وحضانته. وعندما يفقس الصغار يحضر الوالدان غذاء يُشبه ما ستأكله الطيور اليافعة عندما تُصبح بالغة، وتستمر هذه العناية إلى أن تُصبح الصغار مستعدة للطيران بعيداً عن العش. وبعد مغادرتها العش، تصبح الطيور اليافعة مستقلة، ونادرًا ما يكون لها أي اتصال مع والديها.

أجب عن السؤال الآتي بأسلوب مقالى مستعيناً بالمعلومات الواردة في الفقرة السابقة:

15. يقوم الأبوان كلاهما في الطيور بالعناية بالصغار. أمّا في الثدييات فتقوم الأم غالباً بتربية الصغار وحدها. اقترح فرضية تُفسّر فيها لماذا يقوم الأبوان في الطيور بالعناية بالصغار، في حين تقوم الأم في الثدييات بذلك. وناقش كيف يمكن اختبار هذه الفرضية.

أسئلة الإجابات القصيرة

7. صُفْ كَيْفَ تَنْظِمُ الْزَّوَافِفُ دَرْجَةَ حَرَارَةِ أَجْسَامِهَا؟
8. فَسُّرْ لِمَاذَا تَحْتَاجُ الطَّيُورُ إِلَى جَهَازٍ تَنْفُسُ فَعَالًّا؟
9. اذْكُرِ التَّغْيُيرَاتِ الَّتِي يَمْرُّ بِهَا أَبُو ذُبْيَةَ قَبْلَ أَنْ يَصُلِّ إِلَى مَرْحَلَةِ الصَّفْدَعِ الْمُكَتَمِلِ النَّمُوِّ.
10. قَارِنْ بَيْنَ نَوْعَيِ رِيشِ الطَّيُورِ.
11. كَوْنُ فَرَضِيَّةٍ تَجِبُّ فِيهَا عَنْ سَبَبِ وُجُودِ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ وَكَثِيرَةٍ مِنَ الطَّيُورِ.

أسئلة الإجابات المفتوحة

12. قَوْمْ كَيْفَ تَكَيَّفَ هِيَكَلُ الطَّائِرِ الْعَظِيمِ لِلطَّيْرَانِ؟
استخدم الشكل الشكل الآتي لتجيب عن السؤالين 13 و 14.



13. قَوْمْ مَا الْوَظِيفَةُ الَّتِي يَؤْدِيهَا مَوْقِعُ الْعَيْنَ فِي هَذِينِ الطَّائِرِينِ؟

14. فَسُّرْ كَيْفَ يَعْطِيَ الْمَنْقَارُ فِي هَذِينِ الطَّائِرِينِ دَلِيلًا عَلَى طَبِيعَةِ غَذَائِيهِمَا؟

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	الدرس / الفصل	الصف
1	3-1	2-1
2	3-1	2-1
3	3-1	2-1
4	3-1	2-1
5	3-1	2-1
6	3-1	2-1
7	3-1	2-1
8	3-1	2-1
9	3-1	2-1
10	3-2	2-1
11	3-2	2-1
12	3-2	2-1
13	3-2	2-1
14	3-2	2-1
15	3-2	2-1



Mammals



الفكرة العامة ميز الله سبحانه وتعالى الثدييات بمجموعة من التكيفات المتنوعة للمحافظة على اتزانها الداخلي والعيش في البيئات المختلفة.

1 - 4 خصائص الثدييات

الفكرة الرئيسية للثدييات خاصيتان مميزتان، هما: الشعر والغدد اللبنيّة.

2 - 4 تنوع الثدييات

الفكرة الرئيسية تقسّم طائفة الثدييات إلى ثلاث تحت طوائف، بناءً على طرائق تكاثرها.


حقائق في علم الأحياء

- الشعر الذي يغطي جسم الغزال يحوي فراغات، مما يساعد على عزل جسمه من البرد، وكذلك يقيه طافياً عندما يتحرك عبر الماء.
- شعر الدب القطبي شفاف ولا لون له. وتبدو الذبابة بيضاء لأنَّ الشعر المُجوَّف يعكس الضوء ويشتتة.
- بعض الثعالب الحمراء فرو أسود، أو فرو فضيّ، ولبعضها في حالات نادرة فرو مقطّع باللونين الأسود والفضي.

نشاطات تمهيدية

تحت طوائف الثدييات اعمل المطوية الآتية لمساعدتك على مقارنة خصائص الثدييات في كل تحت طائفة.


الخطوة 1: اطرو ورقة إلى ثلاثة أجزاء متساوية كما في الشكل الآتي:



الخطوة 2: اثن الورقة من أعلى بمقدار 2.5 cm إلى أسفل، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 3: افتح المطوية، وارسم خطوطاً على طول الطيّة العلوية. وعنون كل لسان بالعناوين التالية: الثديات الأولية، الثديات الكيسية، الثديات المشيمية. كما في الشكل الآتي:



المطويات استخدم هذه المطوية في القسم 4-2. عندما تقرأ هذا القسم سجل ما تعلّمته عن صفات الثدييات في كل تحت طائفة، واستعمل هذه المعلومات لتقارن بين أفراد كل مجموعة.



تجربة استهلاكية

ما المخلوق الثديي؟

إنك ترى الثدييات كل يوم، ومنها الأغنام التي ترعى، والجمال في الصحراء، والناس الذين تعيش معهم. ما الخصائص المشتركة بين هذه الثدييات؟

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. تفحّص عينات أو صوراً للثدييات، ومن ذلك الثعلب الأحمر المبيّن في الصفحة المقابلة.
3. حدد الخصائص التي تشتراك فيها الثدييات الظاهرة في الصور.
4. صمم جدول بيانات لتسجيل ملاحظاتك.

التحليل

1. استنتاج وظيفة كل خاصية طبيعية تشتراك فيها الثدييات.
2. صف مدى التنوّع الكبير في خصائص الثدييات وسلوكياتها، مستخدماً الصور، وكذلك خبراتك مع الثدييات الأخرى.
3. استنتاج كيف استخدم العلماء خصائص الثدييات المختلفة لتصنيفها في تحت طوائف محددة.

4-1

الأهداف

- تُحدَّد خصائص الثدييات.
- تصف كيف تحافظ الثدييات على درجة حرارة ثابتة للوصول إلى الاتزان الداخلي.

- تميَّز بين التنفس في الثدييات والتنفس في الفقاريات الأخرى.

مراجعة المفردات

ثابتة درجة الحرارة: Endotherms مخلوقات تولِّد حرارة جسمها داخليًّا من خلال العمليات الأيضية الخاصة بها.

المفردات الجديدة

الغدة اللبنية

الغدة

معدل الأيض

الحجاب الحاجز

القشرة المخية

المخيخ

الرحم

المشيمة

الحمل

الشكل 4-1 الشعر والغدد اللبنية
صفتان تميِّزان الثدييات من الفقاريات الأخرى.



■ **الشكل 2-4** الشعر الذي يُعطي جسم ثعلب الماء يُساعدُه على منع وصول الماء إلى جلده.



الفكرة **الرئيسية** للثدييات خاصيتان مميَّزان، هما: **الشعر**، وال**غدد اللبنية**.

الربط مع الحياة فكُّر في الخصائص المميزة لطواويف الفقاريات الأخرى التي سبق أن درستها. بيِّن كيف تختلف الثدييات عن مخلوقات الطواويف الأخرى؛ فخصائص الثدييات تساعدُها على أداء نشاطاتها اليومية المختلفة.

Hair and Mammary Glands

تُتميَّز أفراد طائفة الثدييات عن الفقاريات الأخرى بخَصَيْتَين مهمتين، هما **الشعر** وال**غدد اللبنية**. تُنتج **الغدد اللبنية** mammary glands الحليب، وتفرزه ليعُذِّي الصَّغير النَّامي. أما **الشعر** فهو يُعطي أجسام الثدييات. وكما ترى في مخطط العلاقات التركيبية، المبين في **الشكل 1-4**، فإنَّ للثدييات تفرعًا خاصًا بها يُسمى **تفرع الشعر والغدد اللبنية**.

وظائف الشعر Functions of hair يؤدِّي **شعر الثدييات** عدَّة وظائف، هي:

- العزل: العزل ضد البرودة من أهم وظائف **الشعر**؛ حيث تستفيد الثدييات من فرائتها أو أشعارها في المحافظة على حرارة أجسامها، ومنع فقدانها.
- التخفيف: تسمح فراء الثدييات أو أشعارها بالانسجام مع تنوع بيئتها.
- الإحساس: في بعض الحالات يتحوَّر الشعر إلى شاربين. **القُمة** مثلاً تستعمل شواربها الموجودة على أنفها لتبُّع الغريسة في ظلمة الماء من خلال الإحساس بتغييرات الماء التي تحدث عندما تمر سمكة بالقرب منها.
- مقاومة الماء: لعلك تعرف مدى البرودة التي تشعر بها عندما تخرج من بركة السباحة في يوم حار. فعندما يتبخَّر الماء عن جلدك يفقد جسمك الحرارة. العديد من المخلوقات المائية - ومنها ثعلب الماء المبين في **الشكل 2-4** - لها شعر يمنع وصول الماء إلى جلدها، وهذا يُساعدُها على المحافظة على درجة حرارة أجسامها.



التواصل

- الشكل 3-4**
- اليمين: إبر النি�ص شعر مُتحوّر، تحميه من المفترسات.
اليسار: يستعمل الشَّعر الأبيض على ذيول هذه الغزلان في تنبية باقي أفراد القطيع للهرب من المفترسات.



الدفاع

5. التواصل: يمكن للشَّعر أن يستعمل أداة للتواصل؛ فالغزلان ذات الذيل الأبيض - المبينة في **الشكل 3-4** - ترفع ذيولها لظهور المنطقة البيضاء أسفل الذيل، عندما تهرب لكي تلحق بها الغزلان الأخرى.
6. الدفاع: يمكن للشَّعر أن يستعمل أداة دفاع ضد المفترسات؛ فلننلص المبين في **الشكل 3-4** إبر حادة - وهي شعر مُتحوّر - تفصل بسهولة عندما يهدده مخلوق مفترس آخر، فتلتصق الإبر بالمفترسات التي تلمسه، وتطعنها.



ما أفضل طريقة للمحافظة على دفء الأجسام؟

ترى ما هي طرق المحافظة على دفء أجسامك؟

ارجع لنيل التجارب العملية على منصة عين الإشراقة

تركيب الشعر Structure of hair يحتوي الشَّعر في الثدييات على بروتين ليفيٌّ قاسٍ يُسمَّى الكيراتين. وهو بروتين يدخل أيضاً في تكوين الأظفار والمخالب والحوافر. تتكون طبقة الشعر غالباً من نوعين من الشَّعر: شعر طويل يحمي شعراً قصيراً كثيفاً عازلاً تحته. ويوفر الهواء المحصور في طبقة الشعر السفلية القصيرة الكثيفة عزلاً ضد البرودة، ويحافظ على درجة حرارة الجسم.

ماذا قرأت؟ فسر ما أهمية الشعر للثدييات؟

إرشادات الدراسة

توقع راجع هذا القسم بالنظر إلى العناوين الملوّنة والصور، وتوقع الخصائص المميزة للثدييات، ثم استعن بالعناوين والصور على توقع الملاحظات التي تتعلق بهذا القسم.

الغدد Glands تفرز الغدد أنواعاً مختلفة من السَّوائل تساعد على تنظيم البيئة الدَّاخلية للثدييات. **الغدة gland** مجموعة من الخلايا تُفرز سائلاً يستعمل في مكان آخر من الجسم. وتساعد الغدد العرقية على المحافظة على درجة حرارة الجسم. وتُنتج الغدد اللبنية الحليب الذي يُغذي الصغار. يحتوي الحليب على الماء والكربوهيدرات على شكل سكر لاكتوز ودهون وبروتين. وتختلف نسبة هذه المواد من نوع إلى آخر من الحليب.

تنتوَّ نسب المواد الغذائية بشكل كبير في الأنواع المختلفة من الثدييات. فعلى سبيل المثال، يتَّنَوَّ معدل الدهون (الدسم) من 50% - 1؛ حيث يحتوي حليب الثدييات المائية التي تستعمل طبقة من الدهن لتحافظ على حرارة جسمها - على أعلى كمية من الدهون (الدسم).

تُفرز غُدد الرَّائحة مواد تستعملها الثدييات لتحديد مناطقها، أو لتجذب شريك التزاوج. وتحافظ الغدد الدهنية في الجلد على جودة وسلامة شعر المخلوق وجلدته، في حين تُنتَج غدد أخرى هرمونات تنظم العمليات الدَّاخلية، ومنها النمو وإطلاق البيوض من المبايض.

افحص الجدول 1-4 لترى نسب المواد الغذائية في حليب الثدييات مختلفة.

نسبة المواد الغذائية في حليب الثدييات					الجدول 1-4
الحمار الوحشي	الأرنب	الفقمة	الدلفين	الكلب	المادة المغذية
86.2	71.3	43.8	44.9	76.3	الماء
3.0	12.3	11.9	10.6	9.3	البروتين
4.8	13.1	42.8	34.9	9.5	الدهون
5.3	1.9	0.0	0.9	3.0	السكر



ماذا قرأت؟ فسر لماذا تكون نسبة الدهون عالية في حليب الثدييات المائية؟ 

خصائص أخرى Other Characteristics

تشترك الثدييات - بالإضافة إلى الشعر والغدد اللبنيّة - في خصائص أخرى، منها **معدل الأيض metabolic rate** (وهو المعدل الذي تحدث به التفاعلات الكيميائية داخل الخلية في المخلوق الحي) المرتفع الذي يحافظ على ثبات درجة حرارة أجسامها، ولها أسنان وأجهزة هضمية متخصصة، وحجاب حاجز يُساعدها على التنفس، وقلب رباعي الحجرات، ودماغ معقد ومتخصص.

مخلوقات ثابتة درجة الحرارة Endothermy الثدييات مخلوقات ثابتة درجة الحرارة. وهذا يعني أنها تُنتج حرارة جسمها داخليًّا. ويشكل **معدل الأيض** المرتفع داخل أجسامها مصدر حرارتها. يتم التَّحكُّم في درجة حرارة الجسم بالآليات تغذية راجعة داخلية، من خلال إشارات بين الدماغ والحواس المنتشرة في الجسم.

فعلى سبيل المثال، عندما ترتفع درجة حرارة بعض الثدييات بسبب بذل جهد أو ارتفاع حرارة الهواء المحيط تنشط غدد العرق في الجلد لإفراز العرق الذي يتبخّر عند سطح الجلد. وعندما يتبخّر العرق يتمتص الحرارة من الجسم فيُبرد.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

عالم الثدييات Mammalogist

علم الثدييات فرع من الأحياء يهتم بدراسة الثدييات. ويبحث عالم الثدييات في سلوك نوع أو أكثر من الثدييات، وتشريحه، أو بيته، وقد يقارن بين بعض الخصائص - ومنها الهضم مثلاً - في عدّة أنواع من الثدييات.


وعندما تنخفض درجة حرارة الجسم يتوقف التَّعرُّق. أما في الثدييات الأخرى التي لا تنتج العرق فـيُبَرِّدُ اللَّهَاثُ الجَسْمَ كما يفعل حيوان الكلب. ولذلك شاهدت مخلوقاً يلهث في يوم قاتل. وفي أثناء اللَّهَاث يتبخَّر الماء من الفم والأنف. ولأنَّ الثدييات تستطيع تنظيم درجة حرارة أجسامها داخلياً للمحافظة على الاتزان فهي تستطيع أن تعيش في جميع الأنظمة البيئية، ومنها المناطق القطبية في درجات حرارة التجمُّد، والصَّحاري، والمناطق الاستوائية الحارَّة، وغيرها.

التَّغْذِيَّةُ وَالْهَضْمُ Feeding and digestion للمحافظة على عمليات الأيض المسؤولة عن ثبات درجة الحرارة الداخلية تحتاج الثدييات إلى كميات كبيرة من الطاقة. وهي تحصل على حاجتها من الطاقة بتحليل الغذاء. يستعمل كثير من الثدييات الغذاء الذي تحصل عليه لإنتاج الحرارة اللازمة للمحافظة على درجة حرارة الجسم ثابتة.

تفحَّص الرَّسَمُ البياني في الشَّكْل 4-4 الذي يُبيِّنُ العلاقة بين مُعَدَّلِ الأَيْضِ لمخلوق ثديي وكتلة جسمه. فالثدييات الصَّغِيرَةُ - ومنها الفَرَانُ - يومياً طعاماً يعادل وزن كُتلتها تقريباً؛ للمحافظة على اتزان درجة حرارة جسمها. **حل** ما كمية الغذاء (kg) تقريباً التي يجب على الفَأْرِ ذي الأنف الطويل أن يتناولها كل يوم ليبقى على قيد الحياة؟

■ **الشكل 4-4** نتائج ارتفاع مُعدَّلات الأَيْضِ في أجسامها، يجُبُ أن تتناول بعض الثدييات الصَّغِيرَةِ - منها الفَرَانُ - يومياً طعاماً يعادل وزن كُتلتها تقريباً؛ للمحافظة على اتزان درجة حرارة جسمها. **حل** ما كمية الغذاء (kg) تقريباً التي يجب على الفَأْرِ ذي الأنف الطويل أن يتناولها كل يوم ليبقى على قيد الحياة؟

مُعَدَّلُ الأَيْضِ مُقَابِلُ كُتْلَةِ الْجَسْمِ



تقسيم الثدييات بحسب طريقة تغذيتها Trophic categories يقسم العلماء الثدييات إلى أربع مجموعات، اعتماداً على نوع غذائها:

1. آكلات الحشرات: ومنها الخلد والفار ذو الأنف الطويل، وهي تأكل الحشرات واللافقاريات الصغيرة.
2. آكلات الأعشاب: ومنها الأرانب والغزلان، وتتغذى على النباتات.
3. آكلات اللحوم: ومنها الثعالب والأسود، وتتغذى غالباً على آكلات الأعشاب.
4. القارارة (آكلات أعشاب ولحوم): ومنها الرَّاكون والدب ومعظم الرئيسيات، وتتغذى على كل من النباتات وبعض المخلوقات الحية الأخرى.

خلق الله سبحانه وتعالى للثدييات مجموعة كبيرة من التكيفات التي تساعدها على إيجاد الغذاء، والإمساك به، ومضغه، وبعله، وهضميه. وهذا من بديع صنع الخالق - عز وجل - في تنوع تركيب أجسام المخلوقات الثديية وأنماط حياتها. فهضم ألياف النبات أكثر صعوبة، ويطلب وقتاً أطول من هضم اللحوم. لذا فإن للثدييات التي تتغذى على النباتات معَّى أعرور أكبر، وجهازاً هضميّاً أطول من الثدييات التي تتغذى على اللحوم، الشكل 4-5.

آكلات الأعشاب (المُجترات) Ruminant herbivores يمكن أن يشكل السيليلوز - وهو من مكونات الجدار الخلوي في النباتات - مصدراً للغذاء والطاقة. لكن إنزيمات الجهاز الهضمي في الثدييات لا تستطيع هضم السيليلوز. وعوضاً عن ذلك يوجد في المعى الأعرور (وهو كيس يوجد حيث تلتقي الأمعاء الدقيقة مع الأمعاء الغليظة) لبعض آكلات الأعشاب بكثيرياً تحلل السيليلوز. أما آكلات الأعشاب الأخرى فتوجد البكتيريا في معدتها وتحلل السيليلوز أيضاً إلى مواد غذائية يمكن للمخلوق أن يستعملها. وهذا النوع من الثدييات يُسمى المُجترات، ولها معدة كبيرة مكونة من أربع حجرات. الماشية والخراف والثيران كلُّها مُجترات. عندما تتغذى المُجترات تمرّ المواد النباتية المطحونة عبر المعدة الأولى والثانية، فتهضم النباتات جزئياً عن طريق بكثيرياً المعدة، ثم تعيده إلى الفم على شكل كتل غذائية وتمضغها مرة أخرى لفترة طويلة، فتتحطم ألياف الحشائش. وعندما يتم ابتلاع المُضخة تصل إلى الحُجرة الرابعة، حيث يستمر الهضم.

 **ماذا قرأت؟** استنتاج نوع العلاقة الموجودة بين مخلوق مجتر وبكتيريا في معدته.

الأسنان Teeth بالإضافة إلى تكيفات الجهاز الهضمي، تُظهر الأسنان طرق تغذّي الثدييات أكثر من أي صفة طبيعية أخرى. ففي الأسماك والزواحف تبدو الأسنان كلها متشابهة جداً في الفم؛ لأنَّ هذه المخلوقات تستعمل كل أسنانها للغرض نفسه، وهو الإمساك بالفريسة أو لتمزيقها إرباً قبل بلعها. وعلى العكس من ذلك، فإن للثدييات عدّة أنواع من الأسنان التي تخصّصت في وظائف مختلفة.



Digestive Systems of Mammals

الأجهزة الهضمية في التَّدْبِيَاتِ

■ **الشكل 5-4 تكيف الأجهزة الهضمية في الثدييات** تقوم بهضم الغذاء وامتصاصه بشكل فعال. إن البروتين الذي تستهلكه أكلات اللحوم وأكلات الحشرات قابل للهضم بسهولة. تحتوي المواد النباتية على الكربوهيدرات، والماء، والسيليلوز الذي يقاوم الهضم. قارن بين تركيب كل جهاز هضمي أدناه.



تبين الرسوم في التجربة 1-4 الأنواع الأربع لأسنان الثدييات: الأناب، والقواطع، والأضراس الأمامية (الضواحك)، والأضراس الخلفية (الرحي). أناب الثعلب طويلة وحادة. تستعمل آكلات اللحوم الأناب لطعن فرائسها وجرحها. أما أناب آكلات الأعشاب ف تكون عادةً صغيرة الحجم، كما في جمجمة البقرة الظاهرة في التجربة 1-4. وتستخدم الأضراس الأمامية والأضراس الخلفية في آكلات اللحوم لقطع اللحم ونزعه عن عظام فرائسها، في حين أن وظيفة الأضراس الأمامية والأضراس الخلفية في آكلات الأعشاب هي الطحن. قواطع آكلات الحشرات طويلة ومنحنية، وتعمل عمل دبابيس لثبيت الفريسة (الحشرة). قواطع القندس الشبيهة بالإزميل متحورة للقرض.

ولأن أسنان الثدييات تعكس أنماط تغذّياً فيمكن لعلماء الأحياء أن يحدّدوا ما تأكله الثدييات بدراسة أسنانها. أكمل التجربة 1-4 ل تستنتج غذاء المخلوق الشدي؛ اعتماداً على أسنانه.

تجربة 1-4

المقارنة بين أسنان الثدييات



كيف تختلف أسنان الثدييات؟ استكشف كيف ترتبط أسنان الأنواع المختلفة من الثدييات مع غذائها؟

خطوات العمل


- املاً بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
- لاحظ الأسنان في جماجم أنواع مختلفة من الثدييات.
- اعمل قائمة بأوجه الشبه والاختلاف بين أسنان الأنواع المختلفة من الثدييات.

التحليل

- استنتاج وظيفة كل نوع من الأسنان بناءً على شكله.
- حدد نوع الأسنان المشتركة بين كل الثدييات التي درستها.
- صف كيف يستعمل كل مخلوق ثديي درسته أسنانه للحصول على الغذاء وابتلاعه؟
- فسّر كيف يمكن للعلماء أن يستعملوا الاختلافات بين أسنان الثدييات لتصنيفها إلى مجموعات مختلفة؟



■ **الشكل 6-4** يشبه عمل الدّورق والبالون مبدأ عمل الحجاب الحاجز الذي يجعل التنفس في الثدييات ممكناً. **صف** ماذا يحدث للتتجويف الصدري عندما ينقبض الحجاب الحاجز أو ينبسط؟




المفردات

مفردات أكاديمية

يحتفظ Retain:

يقي في الملكية أو الاستعمال أو الاحتفاظ.
يمكنك الاحتفاظ بأسنانك بتنظيفها بالفرشاة والخيط

■ **الشكل 7-4** للثدييات قلب رباعي الحجرات، يفصل فيه الأذينان عن الأطنابين بحاجز.




الإخراج Excretion تُخرج كُلِّ الثدييات فضلات الأيض، وتحافظ على اتزان سوائل الجسم: كما أنها تصفي الدم من البوريا، أو الناتج النهائي للأيض الخلوي. وتُخرج كُلِّ الثدييات أيضاً كمية مناسبة من الماء أو تحفظ بكميات مناسبة من سوائل الجسم إلى الدم، كما تمكّن الثدييات من العيش في البيئات القاسية، ومنها الصحاري؛ لأنَّها تستطيع أن تتحكّم في كمية الماء في سوائل الجسم وخلاياه.

التنفس Respiration يستعمل المخلوق الثديي الغذاء الذي يحصل عليه للمحافظة على مستويات طاقة عالية. كما أنه يحتاج إلى مستويات عالية من الأكسجين للمحافظة على مستويات أيض عالية. يدخل الأكسجين إلى الرئتين من خلال عملية التنفس. وعلى الرَّغم من أنَّ بعض المخلوقات الأخرى - ومنها الطيور والزواحف - لها رئتان فإنَّ الثدييات هي المخلوقات الوحيدة التي لديها حجاب حاجز. **الحجاب الحاجز diaphragm** طبقة عضلية تقع تحت الرئتين وتقسّل بين التجويف الصدري والتجويف البطني؛ حيث توجد الأعضاء الأخرى. عندما تنقبض عضلة الحجاب الحاجز فإنه يستقيم ويصبح مستوى، ويسبب زيادة في حجم التجويف الصدري، الشكل 6-4. وعندما يدخل الهواء إلى الرئتين يتنتقل الأكسجين بعملية الانتشار إلى الأوعية الدموية. وعندما تنبسط عضلة الحجاب الحاجز يصبح التجويف الصدري صغيراً، ثم يخرج الهواء بعملية الزفير.

✓ **ماذا قرأت؟** صُفْ كِيف يختلف الجهاز التنفسي في الثدييات عنه في سائر المخلوقات؟

الدوران Circulation عندما يحمل الدم بالأكسجين تنقله أوعية دموية خاصة إلى القلب، الذي يضخه إلى جميع أجزاء الجسم. الثدييات تشبه الطيور في أن لها قلباً رباعيَّاً الحجرات. وكما في الطيور يبقى الدم المؤكسج مُفصلاً تماماً عن الدم غير المؤكسج، انظر الشكل 7-4. ولأن أجسام الثدييات نشطة الحركة وثابتة درجة الحرارة فإنَّها تحتاج إلى كمية كبيرة من المواد الغذائية والأكسجين للمحافظة على الازان الداخلي. إن فصل الدم المؤكسج عن الدم غير المؤكسج يجعل توصيل المواد الغذائية والأكسجين أكثر فاعلية.



الربط الفيزياء يؤدي جهاز الدوران في الثدييات دوراً في المحافظة على ثبات درجة حرارة أجسامها. فعندما ترتفع درجة حرارة الجسم تمدد الأوعية الدموية السطحية، فتنقل دمًا أكثر من المعتاد. وتنتقل الحرارة من الدم إلى سطح الجلد عن طريق التَّوْصِيل، وتُنْفَدِدُ الحرارة من الجسم عن طريق الإشعاع وتبخر العرق على سطح الجلد. وعندما تنخفض درجة حرارة الجسم تتكثُّفُ الأوعية الدموية القرنية من سطح الجلد، مما يقلل من فقدان حرارة الجسم.

الدماغ والحواس The brain and senses للثدييات دماغ معقد جدًا، وبخاصة المخ؛ **قشرة المُخ cerebral cortex**، الشكل 8-4، هي طبقة الدماغ الخارجية ذات الانثناءات الكثيرة. وتسمح اثناءات الدماغ بالحصول على مساحة سطح كبيرة للاتصالات العصبية، كما تسمح للدماغ أن يتوازن مع حجم تجويف الجمجمة. وقشرة المخ مسؤولة عن تنسيق نشاطات الوعي والذاكرة والقدرة على التَّعْلُم. أمّا المنطقة الأخرى المعقّدة كثيراً في دماغ الثدييات فهي **المُخيخ cerebellum** مسؤول عن الاتزان وتنسيق الحركة. قارن بين حجم وتركيب المُخيخ في كل من الزَّواحف، والطيور، والثدييات في الشكل 8-4. يسمح المُخيخ المعقد للمخلوق بالحركة الدقيقة، ويسمح له بأداء الحركات المعقدة في جميع الاتجاهات.

السلوك المعقد Complex behavior تُعلّم أنثى الثعلب (الثعالبة) -الموضحة في صورة افتتاحية الفصل- ابنها الصغير كيف يصطاد. وأن الثدييات يمكنها أن تعلم صغارها مهارات البقاء فإن فرصها في البقاء تزداد. والثدييات يمكنها أن تؤدي سلوكاً معقداً، ومن ذلك التَّعلم وتذكُّر ما تعلّمت. كما يمكن لبعضها الآخر أن يأخذ معلومات عن بيئته ويحتفظ بها. ويمكن استعمال هذه المعلومات بعد ذلك. فعلى سبيل المثال تكون الفئران التي استكشفت موطنها بيئياً قادرة على تجنب المفترسات على نحو أفضل من الفئران التي لم تكن لديها فرصة لاستكشافه.

الحواس Senses تختلف أهمية الحواس من مجموعة إلى أخرى في الثدييات؛ فحساسة البصر لدى بعض الثدييات -ومنها الإنسان- ضرورية جدًا، في حين أن حاسة السمع أكثر أهمية في ثدييات أخرى، منها الخفافيش؛ حيث تُصدر الخفافيش أصواتاً عالية التَّردد، تردد وتعود إليها. وبهذه الطَّريقة يمكن للخفافيش أن تكتشف

■ **الشكل 8-4** القشرة المخية هي الجزء الأكثر تعقيداً في الدماغ، وهي الجزء الذي تزداد مساحته كلما زاد حجم المخلوق ودرجة تعقيده.

.....
المفردات.....

الاستعمال العلمي مقابل
الاستعمال الشائع.

Sense حاسة

الاستعمال العلمي: وظيفة متخصصة للمخلوق تتضمن وجود عضو إحساس ومؤثر ما.

تستعمل الكلاب حاسة الشَّم للحصول على معلومات عن بيئتها.

الاستعمال الشائع: آفة تصيب الزرع.
أصابت الزرع سنة حاسة، أي كثُر فيها الآفات.

المفردات

أصل الكلمة

الحمل :Gestation

gest- من الكلمة اللاتينية

gestare، وتعني يحمل.

ation- لاحقة من اللاتينية تصاف

آخر الكلمة وتعني حدث أو عملية.

أهاداً في مساراتها. وهذه الطريقة تسمى تحديد الموقع بالصدى. وإذا شاهدت كيف تستعمل الكلاب البوليسية حاسة الشم لتعتبر الأشخاص والأجسام الأخرى فسوف تدرك أهمية حاسة الشم لدى هذه الثدييات. وقد تساوي قوة حاسة الشم لدى الكلب أحياناً قوة حاسة الشم لدى الإنسان مليون مرة.

ماذا قرأت؟ استعمل التشابه لكي تصف مميزات وجود اثناءات في الطبقة الخارجية من قشرة الدماغ.

الحركة Movement يجب أن تبحث الثدييات عن الغذاء والمأوى، وأن تهرب من المفترسات. وللثدييات أطراف مختلفة تمكّنها من أداء سلوكيات ضرورية؛ إذ تركض بعض الثدييات، ومنها الذئاب والثعالب. أمّا أسرع ثدييات اليابسة فهو الفهد؛ فقد تصل سرعته إلى 110 km/h.

بعض الثدييات تقفز ومنها الكنغر، وبعضها الآخر يسبح ومنها الدلفين. أما الخفافيش فهي الثدييات الوحيدة التي تطير. ويعكس تركيب الجهازين العضلي والهيكلية في المخلوقات نوع الحركة التي يستعملها المخلوق. انظر الشكل 9-4 الذي يوضح الأطراف الأمامية للخلد والخفافش، وكيف أن تركيب هذه الأطراف يعكس المواطن البيئية التي يعيش فيها هذان المخلوقان وسلوك كل منهما.

التكاثر Reproduction يتم إخضاب البويضة داخلياً في الثدييات، وينمو الجنين في رحم الأنثى في معظم الثدييات. والرحم uterus عضو عضلي يُشبه الكيس، ينمو فيه الجنين. في أغلب الثدييات يتم تغذية الجنين عن طريق المشيمة placenta، وهي عضو يوفر الغذاء والأكسجين، ويتأخّص من فضلات الجنين في أثناء نموه. وتعتمد فترة الحمل على نوع المخلوق. **الحمل gestation** هو الفترة التي يبقى فيها الجنين داخل الرّحم قبل أن يولد. وتتبّاع فترة الحمل في الثدييات؛ فأقصى فترة حمل هي للأبوسوم، وتبلغ 12 يوماً، بينما أطول فترة هي للفيل الإفريقي، التي تترواح بين 660 - 760 يوماً. وعموماً كلما كبر حجم المخلوق الثديي زادت فترة حمله. وبعد الولادة يتغذى الصغار على الحليب الذي تنتجه الغدد اللبنية لدى الأم.

■ الشكل 4-9

اليمين: للخلد أطراف أمامية قوية، وقصيرة مُنكيفة لحرق الجحور في الأرض.
اليسار: يمكن للخفافش أن يطير بأغشية رقيقة تمتد بين الذراع وعظام اليد.



أطراف تستخدّم للطيران



أطراف تستخدّم لحرق الجحور

التقويم 4-1

الخلاصة

- مَكَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ الْتَّدِيَّاتِ مِنَ الْعِيشِ فِي بَيْئَاتٍ مُّتَوْعِةٍ عَدِيدَةٍ.
- لِلتَّدِيَّاتِ أَسْنَانٌ مُتَخَصِّصَةٌ.
- لِلأَجْهِزَةِ التَّنَفُّسِيَّةِ وَالدُّورَانِيَّةِ وَالْعَصِيبَةِ تَكْيُفَاتٌ مُعَقَّدةٌ تُمَكِّنُ التَّدِيَّاتِ مِنَ الْحَصُولِ عَلَى طَاقَةٍ إِضافَيَّةٍ تَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الْحَفَاظِ عَلَى الْإِتَّرَانِ الدَّاخِلِيِّ.
- الإِخْصَابُ فِي التَّدِيَّاتِ دَاخِلِ رَحْمِ الْأُنْثِيِّ.

فهم الأفكار الرئيسية

التفكير الناقد

6. كُونَ فِرْضِيَّةً تُطْلُقُ حِيتَانَ الْعَنْبَرِ صُوتًا مِنْ أَعْلَى الْأَصْوَاتِ الَّتِي تَصْدِرُهَا الْمُخْلوقَاتُ الْحَيَّةِ. وَكَلَّمَا كَانَ الْحَوْتُ أَكْبَرَ حَجْمًا كَانَ الصَّوْتُ أَعْلَى. كُونَ فِرْضِيَّةً تُوضَّحُ سَبَبَ إِطْلَاقِ هَذِهِ الْأَصْوَاتِ.
7. **الرِّياضِيَّاتُ فِي علم الأحياء** افترضَ أَنَّ أَرْنِبًا شَاهَدَ ذئبًا وَحَوَّلَ الْهَرَبَ مِنْهُ. يُمْكِنُ لِلْأَرْنَبِ أَنْ يَجْرِي بِسُرْعَةِ 65 km/h، وَيُمْكِنُ لِلْذَّئبِ أَنْ يَرْكَضَ بِسُرْعَةِ 70 km/h. مَا الْمَسَافَةُ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَرْكَضَهَا الْأَرْنَبُ قَبْلَ أَنْ يُمسِكَ بِهِ الذَّئبُ، مَعَ افْتِرَاضِ أَنَّ الْأَرْنَبَ عَلَى بَعْدِ 25 m مِنَ الذَّئبِ، وَقَدْ تَحرَّكَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ؟

1. الفكرة **الأُنْسَةُ اذْكُرْ خَاصِيَّيْنِ فَرِيدِيَّيْنِ لِلتَّدِيَّاتِ.**

2. فَسُرْ كِيفَ تُحَافِظُ التَّدِيَّاتُ عَلَى درَجَةِ حرَارَةِ أجْسَامِهَا ثَابِتَةً؟

3. صَنْفُ التَّدِيَّاتِ الَّتِي تَعِيشُ فِي مَنْطَقَتِكِ إِلَى آكَلَاتِ أَعْشَابٍ أَوْ آكَلَاتِ لَحْومٍ، أَوْ قَارَّةٍ، أَوْ آكَلَاتِ حَشَراتٍ.

4. لِخَصِّ كِيفَ يَعْمَلُ الْجَهازُانِ التَّنَفُّسِيِّ وَالدُّورَانِيِّ مَعًا فِي التَّدِيَّاتِ لِلْحَصُولِ عَلَى مَسْتَوَيَاتِ طَاقَةٍ عَالِيَّةٍ؟

5. قارنْ بَيْنَ طَرِيقَةِ حدُوثِ التَّنَفُّسِ فِي التَّدِيَّاتِ وَفِي الطَّيْورِ، بِالاعْتِمَادِ عَلَى الشَّكَلَيْنِ 15-3 وَ 4-6.



4-2

الأهداف

- تفحص خصائص الثدييات في كُلّ من تحت الطوائف الثلاث للثدييات.
- تميّز بين التَّكَيُّفَاتِ التي تسهم في تنوع الثدييات، وتمكنها من العيش في بيئات مختلفة.
- قارن بين رتب الثدييات المشيمية.

مراجعة المفردات

الクロモソーム: تركيب خلوي يحمل المادة الوراثية التي يتم نسخها ونقلها من جيل من الخلايا إلى جيل آخر.

المفردات الجديدة

الثدييات الأولية
الثدييات الكيسية
الثدييات المشيمية



رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

تنوع الثدييات

الفكرة الرئيسية تقسم طائفة الثدييات إلى ثلات تحت طوائف، بناءً على طائق تكاثرها.

الربط مع الحياة فكُر في الثدييات التي تراها كل يوم، ومنها الأغنام أو الجمال. إنَّها جزء صغير من 4500 نوع من الثدييات. وقد طرَّ العُلماء حداًئٍ ومحميات للمخلوقات البريَّة؛ لتقديم فرصةً لدراسة التنوُّع الكبير لأنواع الثدييات الموجودة حالياً.

تصنيف الثدييات

تُقسم طائفة الثدييات إلى ثلات تحت طوائف، اعتماداً على طريقة تكاثرها، وهي: الثدييات الأولية، والثدييات الكيسية، والثدييات المشيمية.

الثدييات الأولية Monotremes للملحوظ المبين في الشكل 4-10 منقار يشبه منقار البطة، وأقدام ذات أغشية، وهو لا يشبه أي ثديي شاهدته من قبل. ومع ذلك، فإن له شعراً وغددًا لبنيَّة، مما يجعله أحد الثدييات. ومنقار البط من الثدييات الأولية، يضع بيضًا كالبيض الذي تضعه الزواحف. **والثدييات الأولية** monotremes ثدييات تتکاثر بوضع البيض. ومن الثدييات الأولية التي تعيش حالياً آكل النمل الشوكي ومنقار البط. وبين الشكل 4-10 آكل نمل شوكياً بالغاً. ويعيش منقار البط وآكل النمل الشوكي في أستراليا وتسمانيا وغينيا الجديدة فقط. وللثدييات الأولية بعض خصائص الزواحف؛ فبالإضافة إلى وضع البيوض، تتشابه معها في تركيب العظم في منطقة الكتف، وكذلك درجة حرارة جسمها أقل من أغلب الثدييات الأخرى، ولها خليط فريد من الكروموسومات الطبيعية الحجم؛ كروموسومات بحجم تلك التي لدى الثدييات، وكروموسومات صغيرة مثل التي لدى الزواحف.

ماذا قرأت؟ حدَّد كيف تختلف الثدييات الأولية عن تحت الطوائف الأخرى للثدييات؟

■ **الشكل 4-10** آكل النمل الشوكي، مثله مثل منقار البط، ثديي يضع البيوض. عندما تفتقس البيضة يحصل الجنين على الغذاء من غدد الحليب الخاصة بأمه.



الثدييات الكيسية Marsupials تُسمى الثدييات التي لها كيس (جراب)، وفترة حمل قصيرة جدًا **الثدييات الكيسية marsupials**؛ حيث يزحف الصغير بعد الولادة مباشرة نحو الجراب المكون من الجلد والشعر على جسم الأم الخارجي. ويستمر نمو الصغير داخل الجراب، في حين يغذى بالحليب الذي تفرزه الغدد اللبنية للأم. وفي بعض أنواع الثدييات الكيسية يُولد الصغير ويزحف داخل جراب أمها بعد ثمانية أيام فقط من حدوث الإخصاب؛ حيث يبقى هناك فترة حتى يكتمل نموه.

ومن الثدييات الكيسية الأبوسوم - كما في **الشكل 11-4** - والكوالا، والولبي Wallaby، والكنغر الموضح بالشكل **12-4**. ومُعظم الثدييات الكيسية تعيش في أستراليا والجزر المجاورة لها.

الربط مع علوم الأرض إن وجود الثدييات الكيسية في أستراليا ما زال محيرًا للعلماء. وقد كانت الثدييات الكيسية تعيش في أمريكا الشمالية، اعتمادًا على أدلة من الأحافير، إلا أن بعضها انتشر ليعيش في أمريكا الجنوبية وأوروبا عندما كانت القارات مُرتبطة معاً في كتلة واحدة ضخمة من اليابسة. فانتقلت الثدييات الكيسية من أمريكا الجنوبية عبر إفريقيا إلى أستراليا. وبعد ذلك - قبل نحو 200 مليون سنة مضت - انفصلت القارات بسبب تحرك الصّفائح الأرضية، مما أدى إلى عزل الثدييات الكيسية بأستراليا والجزر القريبة منها.

نمت الثدييات الكيسية الأسترالية؛ لأنّها كانت منعزلة عن منافساتها من الثدييات المشيمية. ففي أمريكا الشمالية والجنوبية كان للثدييات المشيمية ميزات تكيفية تنافسية. فعلى سبيل المثال، أصبح لدى الثدييات المشيمية سلوك اجتماعي، ومصادر غذائية أكثر تنوعًا، وتنوع في الشكل والوظيفة أكثر مما لدى الثدييات الكيسية.

وحلّت الثدييات الكيسية - في أستراليا وغينيا الجديدة - محل الثدييات المشيمية في الأماكن التي كانت تحتلها. فعلى سبيل المثال، ملأت الكناغر - وهي آكلات أعشاب في أستراليا - الإطار البيئي للغزلان والوعول والثيران، التي تشكل آكلات الأعشاب في أماكن أخرى في العالم.



■ **الشكل 11-4** الأبوسوم الثدي يقضي معظم وقته على الأشجار.



■ **الشكل 12-4** للكنغر فترة حمل مُدَّتها 33 يومًا تقريبًا، وبعد ذلك يبدأ الصَّغير فترة الحضانة في الكيس.



الحوت الأحذب الظاهر

الفأر ذو الأنف الطويل

■ الشكل 13-4 الحوت الأحذب وزنه 100,000 kg، وهو أكبر مخلوق ثديي. أما الفأر ذو الأنف الطويل فوزنه 1.5 g وهو من أصغر الثدييات.

تجربة استهلاكية

مراجعة: بناءً على ما قرأته حول تصنيف الثدييات، كيف يمكنك الآن الإجابة عن أسئلة التحليل؟

المطويات

ضمّن مطويتك معلومات من هذا القسم.

الثدييات المشيمية Placental mammals تشكل الثدييات المشيمية - ومنها الإنسان - النسبة الكبرى بين الثدييات. فال**الثدييات المشيمية placental mammals** لها مشيمية. وهي العضو الذي يُوفّر الغذاء والأكسجين للجنين، ويُخلّصه من الفضلات. وتلد الثدييات المشيمية صغيراً لا يحتاج أن ينمو داخل كيس. تتوزّع الثدييات المشيمية في 18 رتبة. تضم بعض الرتب أنواعاً قليلة. فعلى سبيل المثال، هناك فقط نوعان من الليمور الطائر Flying Lemur في رتبة جلديات الأجنحة. ويمكن لليمور الطائر أن ينزلق عبر الهواء بسبب غشاء من الجلد يربط يديه برجليه. والأردفارك Aardvark - أكل نمل يعيش في إفريقيا - هو النوع الوحيد في رتبته. وتحتوي رتب أخرى - منها القوارض التي تضم السناجب والجرذان - على نحو 2000 نوع. وتتراوح أوزان الثدييات المشيمية بين مخلوق الفأر ذي الأنف الطويل الذي يزن 1.5 g، إلى بعض الحيتان التي تزن 100,000 kg، كما في الشكل 13-4. وتتراوح أشكال الثدييات المشيمية بين الدلفين البحري الذي له تكيّفات للسباحة، إلى الخلد الذي تكيف للحياة تحت الأرض، والخفافيش التي لها أجنحة و تستطيع تحديد المكان بانعكاس صدى الموجات فوق الصوتية لتمكّن من الطيران في الظلام.

وضع العلماء عدّة فرضيات تفسّر وجود أعداد كبيرة وأنواع كثيرة من الثدييات المشيمية مقارنة بالثدييات الكيسية. تقول إحدى الفرضيات إنّ صغار الثدييات الكيسية تتشبّث بفرو أمها عند الولادة. لذا لا يوجد حاجة لأن تغيّر الأطراف لتكون أرجلًا أو أجنحة أو زعناف. وتُفسّر فرضية أخرى نجاح الثدييات المشيمية بأنّ القشرة المُخية للثدييات المشيمية أكبر وأشد تعقيداً من تلك التي لدى الثدييات الكيسية. ويعود ذلك إلى البيئة الأكثر استقراراً، والأغنى بالأكسجين التي يكون فيها الجنين داخل الرّحم.

ماذا قرأت؟ وضح كيف تختلف الثدييات المشيمية عن الثدييات الكيسية؟




رُتبة آكلات الحشرات - الفأر ذو الأنف الطويل

رُتبة آكلات الحشرات Order Insectivora ومنها القنفذ والخلد؛ حيث تعد الحشرات مصدر غذاء رئيس لهذه الثدييات. ويبيّن الشكل 4-14 الفأر ذو الأنف الطويل، وهو أيضًا أكل للحشرات. أفراد رتبة آكلة الحشرات في العادة صغيرة الحجم، ولها أنف مدبب يسمح لها باصطياد الحشرات بسهولة؛ فالفأر ذو الأنف الطويل من أصغر الثدييات التي توجد في كل أرجاء العالم، وتقضي معظم حياتها تحت الأرض.

رُتبة الخفاثيات Order Chiroptera هناك نحو 925 نوعاً في رُتبة الخفاثيات، وكلها أنواع من الخفاث. وكما ذكر سابقاً، فالخفافيش هي الثدييات الوحيدة التي تستطيع الطيران. وأجنبتها مكونة من أغشية رقيقة مدعومة بأطراف أمامية متحورة. وتتغذى الخفافيش على أنواع مختلفة من الغذاء، فبعضها يأكل الحشرات، وبعضها الآخر يأكل الفاكهة، وأخرى تتغذى على الدم. وأكثرها شيوعاً الخفاث الصغير البني الذي يطير عند الغسق ليُمسك بالحشرات. والخفاث المبين في الشكل 4-14، هو أكبر الخفافيش، ويعيش في المناطق الاستوائية على نطاق واسع، وتتغذى على الفواكه.

رُتبة الرئيسيات Primates Order السعادين والقرود، أمثلة على الرئيسيات. وأدمغة الرئيسيات هي الأكبر والأكثر تعقيداً بين الثدييات. وتسكن معظم الرئيسيات على الأشجار، مما جعل العلماء يفترضون أنها تحتاج إلى أداء حركات معقدة وهي على الأشجار، كذلك التي تتطلب الإمساك بالغذاء، أو تجنُّب الأعداء، ومن ثم أدَّت إلى تحسين قدراتها العقلية وارتفاع درجة تعقيد تراكيبيها الدماغية. وهبَّا الله سبحانه وتعالى الأطراف الأمامية للرئيسيات في الغالب للإمساك بالأشياء. ويبيّن الشكل 4-15 نوعاً من القرود؛ حيث يمسك الصغير بأمه ويتشبث بها.

رُتبة الدرداروات Xenarthra Order قد لا يكون لمخلوقات هذه الرُّتبة أسنان أبداً، وقد يكون لها أسنان بسيطة، تُشبه الورندة. فآكل النمل في الشكل 4-16 لا أسنان له. ولا كلات النمل لسان شوكي ولعاب صمعي يسمح لها بالإمساك بالنمل بسهولة. ولكل من الكسلان والمُدرَّع أسنان قاضمة تُشبه الورندة. ويُتغذى الكسلان غالباً على الأوراق. أما المُدرَّع فيتغذى على الحشرات. وتعيش ثدييات هذه الرُّتبة في مناطق مختلفة من العالم.



رُتبة الخفاثيات - الخفاث


■ الشكل 4-14 الفأر ذو الأنف الطويل من رُتبة آكلات الحشرات. الخفاث من رُتبة الخفاثيات - الخفاث.

■ الشكل 4-15 نوع من القرود، يمسك الصغير بأمه ويتشبث بها، مما يوضح القدرات العقلية المتقدمة للرئيسيات. **حدد** مخلوقات أخرى في رُتبة الرئيسيات.





أكل النَّمل الصَّحْم



■ **الشكل 16-4** أكل النَّمل الصَّحْم، هو أكبر أكل نمل. وأكبر القوارض هو القندس؛ فقد يصل وزنه إلى 80 kg . **صف خصائص أفراد رتبة الدرادات.**

رتبة القوارض Order Rodentia تضم الثدييات القارضة مخلوقات منها القندس، كما في **الشكل 16-4**، والجرذان Rats، والمرموط Marmots، والسناب Squirrels، والهامستر Hamster. وتشكل القوارض 40% من جميع أنواع الثدييات. يستمر زوج القواطع الشبيه بالشفرة في النمو خلال حياة القوارض. وهي تستعمل أسنانها الحادة لقصم الخشب والبذور أو القشور للحصول على الغذاء. إن مقدرة القوارض على غزو كل أنواع البيئات الأرضية ونجاح سلوكها التكاثري جعلها حاضرة في كل الأنظمة الحيوية البرية.

رتبة الأرنبيات Order Lagomorpha تشبه القوارض؛ فالأفراد هذه الرتبة مثل الأرانب، والبيكة Pika (أربن الصخور) قواطع طويلة حادة مستمرة النمو. وللأرنبيات قواطع تشبه الإزميل تنمو خلف الرَّوج الأول. وهذه الثدييات أكلات أعشاب تتغذى على الأعشاب والفاكه والبذور. وتعيش البيكة، المبينة في **الشكل 17-4**، في المرتفعات أو بيئات المناطق العالية التي تكون أراضيها مغطاة بالثلج أجزاءً من السنة. وتتكيف هذه الثدييات لهذه الظروف بجمع العشب خلال أشهر الدفء وخرقه، ثم تأكله بعد ذلك خلال الشتاء عندما لا يكون العشب الأخضر الطازج مُتوافراً.

رتبة آكلات اللحوم Order Carnivora ربما يكون لديك مخلوق ثديي ألف مثل القطة. فالقطة والثعالب والدببة والفقمة والفظ (حصان البحر) Walruses والذئاب والظربان Skunk وثعالب الماء Otters وابن عرس Weasels، كلها تتبع رتبة آكلات اللحوم. فآكلات اللحوم هذه كلها مفترسات وذات أسنان تكيفت لتمزيق اللحم. فاللبؤة، كما في **الشكل 17-4**، تأكل الوعول وصغار الزراف وصغار التماسيح. وبعد أن تمسك بفريستها تستعمل قواطعها على تمزيق قطع اللحم.

■ **الشكل 17-4** توجد البيكة في المناطق الثلوجية. وتستخدم اللبؤة أنيابها في طعن الفريسة وقطعها.



رتبة الخرطوميات Order Proboscidea الفيلة من أكبر ثدييات اليابسة. ولها خرطوم مرن متكيّف لجمع النباتات وشرب الماء. وقد تحوّر قاطعاً إلى أننياب؛ لحفر التربة، وإخراج الجذور، وتمزيق لحاء الأشجار، الشكل 4-18. وقد درّبتُ بعض الفيلة للمساعدة على حمل الأشياء الثقيلة.

رتبة الخيالنيات Sirenia Order بقر البحر Manatees والأطوم Dugongs أكبّر أفراد رتبة الخيالنيات الكبيرة الحجم، وكلاهما ثدييان بطينا الحركة، وذوا رؤوس كبيرة وليس لهما أطراف خلفية. وقد خلق الله سبحانه وتعالى أطرافهما الأمامية على هيئة زعنف تساعد على السباحة. وهذه المخلوقات آكلات أعشاب؛ إذ تتغذى على أعشاب البحر، والطحالب، والنباتات المائية الأخرى. واعتماداً على حجمها، يمكن للأطوم مثلاً أن يستهلك نحو 50 kg من الأعشاب كل يوم. وتسبح أفراد هذه الرتبة غالباً على سطح الأنهر والأهوار الدافئة الاستوائية. ولأنها بطبيعة جدًا وتفضّل المياه السطحية فغالباً ما تصدمها القوارب السريعة فتؤذيها. يبيّن الشكل 4-19 بقر البحر في أثناء السباحة.



■ الشكل 4-18 الخرطوم خاص برتبة الخرطوميات.



■ الشكل 4-19 عظام الفك في الحوت (البلين) تُشبه المنخل. ويبيّن الشكل أيضًا الأطوم يطفو بالقرب من سطح الماء.



رتبة أحادية الحافر Order Perissodactyla تشمل الثدييات ذات الحوافر، ومنها الحصان وحمار الوحش ووحيد القرن. ولأفراد هذه الرتبة عدد مفرد من الأصابع، أي إصبع واحدة أو ثلاث أصابع في كل قدم. وهذه الثدييات آكلات أعشاب، ولها أسنان تكيفت لطحن النباتات. وتعيش أحادية الحافر في كل القارات ما عدا القارة القطبية.

رتبة ثنائية الحافر Order Artiodactyla أفراد هذه الرتبة ثدييات ذات حوافر أيضاً. تختلف عن أحادية الحافر في أن لها عدداً مزدوجاً من الأصابع، أي اثنين أو أربع على كل طرف. فالغزلان والماشية والخراف والماعز وفرس النهر كُلُّها ثنائية الحافر. وللعديد من الماشية والخراف والغزلان قرون. وثدييات هذه الرتبة آكلات أعشاب ومعظمها مجررة.


رتبة الحوتيات Order Cetacea للحيتان والدلافين أطراف أمامية تحورت إلى زعانف تساعد على السباحة. وليس لها أطرافخلفية، والذي يتكون من أجزاء لحمية. وفتحاتها الأنفية متحوّرة على شكل ثقب أو اثنين في أعلى الرأس لنفث الماء، ولا يغطي جسمها الشعر. وبعض الحيتان مفترسات، وبعضها الآخر - ومنه الحوت الأزرق - له تراكيب متخصصة داخل أفواهها تسمى عظام الفك (البلين) تُستعمل لتصفية العوالق التي تتغذى عليها. ويبيّن الشكل 4-19 الحوت الأحذب.

ماذا قرأت؟ قارن بين الثدييات المشيمية باستخدام الجدول 2-4.

الجدول 2-4	رتب الثدييات المشيمية	الرتبة
المُميّزات	مثال	
أنف مدبب، أصغر الثدييات، تعيش تحت الأرض، آكلة حشرات	الفأر ذو الأنف الطويل ، والقنافذ، والخلد	آكلات الحشرات
غشاء من الجلد يربط يديه برجليه.	الليمور الطائر	جلديات الأجنحة
ليلية، تستخدم الصدى، تطير، تأكل الحشرات والقوارب	الخفافش	الخفاشيات
رؤبة ثنائية، أدمغة كبيرة، تعيش أغلبها على الأشجار، إبهام متقابل	القرود، والسعادين	الرئيسيات
ليس لها أسنان أو ذات أسنان مثل الورن، آكلات حشرات	آكلات النمل، والدب الكسلان، والمدرع	الدرداريات
أسنان، قواطع حادة، آكلات أعشاب	القناص، والجرذان، والمرموط، والسناجب، والهامستر.	القوارض
الأرجل الخلفية أطول من الأمامية، متكيفة للقفز، قواطع دائمة التمو	الأرانب، والبيكية (أربن الصخور)	الأرنبيات
الأسنان متكيفة لتمزيق اللحم، آكلات لحوم	القطط، والعوالب، والدببة، والفقمة، والفظ (حصان البحر)، والذئب، والظربان، وطالب الماء، وابن عرس	آكلات اللحوم
خراطيم طويلة، أصبحت القواطع أنياباً عاجية، أكبر مخلوقات اليابسة	الفيلة	الخرطوميات
حركة بطيئة، رؤوس كبيرة، ليس لها أطراف خلفية	عجل البحر، والأطوم	الخيالنيات
ذات حوافر، عدد أصابعها مفرد، آكلات أعشاب	الحصان، والحمار الوحشي، ووحيد القرن	أحادية الحافر
ذات حوافر، عدد أصابعها زوجي، آكلات أعشاب	الغزال، والماشية، والخراف، والماعز، وفرس النهر Hippopotamus	ثنائية الحافر
الأطراف الأمامية على شكل زعناف، ليس لها أطراف خلفية، تستعمل فتحات المنآخر لنفث الماء.	الحيتان، والدلافين	الحوتيات

مختبر تحليل البيانات 1-4

بناء على بيانات حقيقة



البيانات والملاحظات

فبحص علماء الأحياء طول مدة نداءات الحوت في ثلاث مجموعات خلال عدة سنوات. تفحّص الرسوم البيانية.

التفكير الناقد

1. قوم التوجه لتغيير مدة النداء في الحيتان في الأسراي L, K, J من 1977 م إلى 2003 م.

ما الذي يتبع عن هذا التوجه؟
2. كون فرضية تصف ما يستقصيه الباحثون في هذه الدراسة.

حل ثم استنتاج

كيف يؤثّر ضجيج القوارب في الحيتان؟ قد تنسّق الحيتان القاتلة صيدها التعاوني، أو أي سلوك اجتماعي آخر عن طريق أنواع معينة من النداءات (الأصوات) التي لها معنى عند باقي أفراد الفوج أو المجموعة المهاجرة معها. وبين الرسم البياني أثر ازدياد عدد القوارب في منطقة الدراسة في الفترة 1990-2000 م في تواصل الحيتان؛ حيث وصل عدد القوارب إلى خمسة أضعاف تقريباً.

أخذت البيانات في هذا المختبر من:

Foote, A., et al. 2004. Whale –call response to masking boat noise. *Nature* 428:910.

التقويم 2-4

الخلاصة

- من بين تحت طائفه الثدييات الشلال، تضع تحت طائفة الثدييات الأولية فقط البิض.
- تحت طائفة الثدييات الكيسية لها كيس يقضي فيه الصغير معظم وقت نموه.
- صغاري الثدييات المشيمية تتغذى عن طريق المشيمة في أثناء نموها داخل الرّحم.
- صنفت الثدييات المشيمية إلى رتب مختلفة، اعتماداً على أشكالها وبيئاتها وخصائصها التركيبية وطبيعة غذائها.

التفكير الناقد

5. كون فرضية يمكن أن يكتشف منقار البط المجالات الكهربائية الناتجة عن انقباض عضلات مخلوقات أخرى. وهكذا يبحث منقار البط عن فريسته. كون فرضية تبيّن فاعلية هذا التكيف المعقّد بدلاً من حاسة البصر البسيطة.

6. الكاتبة في علم الأحياء يعتقد بعض الناس خطأً أن الثديات الكيسية أقل تعقيداً من الثدييات المشيمية. حلّ هذا الاعتقاد، ثم فسره.

فهم الأفكار الرئيسية

1. الفكرة «الرّبيبة سم» تحت الطوائف الثلاث التي تنقسم إليها الثدييات، وصف خصائص كل تحت طائفة.
2. حدّرتية أو رتب الثدييات التي ينتمي إليها المخلوق الثديي التالي، وفسّر إجابتك له: فرو أحمر بُني، وزوجان من القواطع في الفك العلوي (زوج خلف الآخر)، ومخالب، وجسمه أصغر قليلاً من كرة السلة، ويمكنه القفز بسهولة.
3. قارن بين خصائص الثدييات في رتبة أحادية الحافر وتلك التي في رتبة ثنائية الحافر.

4. صف الخصائص التي مكّنت رتبة القوارض من الانتشار في معظم الأنظمة الحيوية البرية.



نوع من الكلاب البوليسية المدرية.

الإحساس بنوبات المرض يمكن لبعض الكلاب أن تحسّ متى يمكن أن يمرّ المرء بنوبة تشنج. وهذا النوع من الكلاب يساعد على تنبيه الذين يُصابون بالمرض في أي مكان قبل 15 دقيقة إلى 12 ساعة من النوبة. مما يعطي الوقت للمصابين لكي يتناولوا أدويةهم الخاصة بمعالجة النوبة، أو يطلبوا المساعدة، أو ينتقلوا إلى مكان أكثر أماناً. فالنظيرية الحالية التي تفسر ذلك هي أنَّ هذه الكلاب تُحسّ أن هناك تغييرًا ما في تعابير الوجه أو أن هناك شيئاً مختلفاً في توازن شخصية الفرد.

خدمة المجتمع

اتصل بباحث في الإنترنت عن برامج علاجية استعمل فيها مخلوقات أليفة. وتعزّف كيف يعمل هذا البرنامج، وهل يمكن أن تساعد صفك في هذا البرنامج بتعلم المزيد حول طريقة مساعدة هذه المخلوقات الأليفة لكتار السن.

الكلاب المدربة المساعدة

كان رجل يعيش وحده، وفجأة أصيب بجلطة دماغية، ولم يستطع الحراك، بدأ كلبه ينبع بشدة، فنبه الناس، فجاؤوا ورأوا أن صاحب المزرعة بحاجة إلى مساعدة طيبة، فأنقذوا حياته.

حاسة الشّم حاسة الشّم لدى الكلب أكثر حدة من حاسة الشّم لدى الإنسان. ويوجد لدى الكلب 200 مليون مستقبل رائحة، في حين يوجد لدى الإنسان 5 ملايين مستقبل رائحة فقط. وتستعمل الكلاب مستقبلاتها الشمية بشكل اعتيادي للمساعدة على الكشف عن المخدرات والمتفجرات والأشخاص الضائعين. وتستطيع الكلاب المدربة أن تساعد على الكشف عن الأشخاص المدفونين تحت الانهيارات الثلوجية؛ إذ يمكن للكلاب أن تجد أشخاصاً مدفونين على عمق 5 m من الثلوج. ويمكن لكلب مدرب أن يمسح منطقة بحجم ملعب كرة القدم على عمق أكثر من 36 m من الثلوج في 30 دقيقة. بينما يتطلّب البحث في المساحة نفسها 5 أشخاص بمجسات إلكترونية حساسة مدة 15 ساعة.

الكشف عن السرطان تستعمل الكلاب أيضًا للكشف عن وجود الأورام السرطانية. ففي دراسة بحثية حديثة تمكّنت الكلاب من تمييز وجود سرطان المثانة عن طريق شم بول المريض. وفي هذه التجربة، دُربت الكلاب على الاستلقاء أرضًا عندما تكتشف خلايا سرطانية في عينة البول.

وهناك بعض الأدلة تشير إلى أنَّ الكلاب يمكنها الكشف عن سرطان الجلد من خلال اكتشاف روائح تطلقها الشامة (ورم سرطاني حميد). وتجري حالياً دراسات يتمُّ فيها فحص الكلاب لمعرفة مدى استطاعتها الكشف عن سرطان الرئة وسرطان البروستاتا. ويمكن للكلاب أن توفر نظام كشف مبكر لم يصل إليه العلم بعد.

مختبر الأحياء

الإنترنت: كيف يمكننا تمييز الثدييات من غيرها؟



الخلفية النظرية: الصفات الطبيعية التي تشتراك فيها جميع الثدييات - ومنها الشعر والغدد اللبنية - مكتنّها من التكيف مع أي نظام بيئي تقريباً في المحيط الحيوي. وتكثر الثدييات في الغابات المطيرة والصحراء والمناطق القطبية، وهي متكيّفة للعيش في البيئة القريبة من منزلك أو مدرستك أيضاً.

سؤال: ما التنوّع الذي يمكن أن تجده في منطقتك في الثدييات؟

حلّ ثم استنتاج

1. صفات المميّزات الأساسية التي تشتراك فيها جميع الثدييات التي لاحظتها.
2. قارن بين الثدييات التي درستها وتلك التي درسها طلاب آخرون في المنطقة نفسها.
3. قارن بين الخصائص الطبيعية التي يمكن أن يستعملها العلماء لتصنيف الثدييات إلى مجموعات تصنيفية مختلفة.
4. استنتاج كيف تكيفت الثدييات الموجودة في قائمتك مع البيئة وعاشت فيها؟
5. صفات طرائق الملاحظة الأخرى التي يمكن استخدامها لإجراء بحث شامل عن الثدييات في منطقة بحث تختارها.
6. تحليل الخطأ قارن بين قائمة الثدييات التي أعددتها وقوائم أعدّها طلاب آخرون لتحديد الأخطاء المحتملة في تعريف الثدييات.

تحضير ملصق

قدم عرضاً اجمع صوراً للثدييات من منطقة أخرى، واعمل ملصقاً لعرضه على طلاب صفك. وضمن الملصق معلومات عن مميّزات كل ثديي، والتكيّفات الخاصة به.

المواد والأدوات

- دليل ميداني لتعريف ثدييات منطقة الخليج العربي.
- مناظير مكبّرة.

احتياطات السلامة



خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. اكتب قائمة بالثدييات التي تلاحظها في منطقتك.
3. توقع كيف يمكن تصنيف أنواع هذه الثدييات.
4. صمم جدول بيانات لتسجيل هذه الأنواع وصفاتها الطبيعية، منها الحجم وشكل الجسم والخصائص الفريدة، وتصنيف هذه الثدييات.
5. أجرِ بحثاً عن الثدييات لتبعد جدول البيانات الخاص بك بالمعلومات المتعلقة بهذه الثدييات. كأن تراقب المخلوقات في منطقتك المحلية، فتقوم بزيارة المنتزهات، أو المحميات الطبيعية، أو حديقة الحيوانات. وإذا لم تستطع ملاحظة المخلوقات في بيئتها الطبيعية فاحصل على معلومات عن الثدييات في منطقتك من مراجع معتمدة.
6. سجل ملاحظاتك الموجودة في دفتر ملاحظاتك الحقلية، وانقل المعلومات إلى جدول البيانات الخاص بك.



المطويات كون فرضية هناك ثلاثة أنواع فقط من الثدييات الأولية التي تعيش حالياً: نوع واحد من منقار البط، ونوعان من آكل النمل الشوكى (الإكيندا). كون فرضية تفسّر لماذا تميز تحت الطائفة هذه من الثدييات بتنوع محدود مقارنة بتنوع الثدييات الكيسية والثدييات المشيمية؟

المظاهير الرئيسية

المفردات

٤-١ خصائص الثدييات

الفكرة > **الرئيسة** للثدييات خصائص مميزة: الشعر، والغدد اللبنية.

- ممكّن الله عز وجل الثدييات من العيش في بيئات متنوعة عديدة.
- للثدييات أسنان متخصصة.
- للأجهزة التنفسية والدورانية والعصبية تكييفات معقدة تمكن الثدييات من الحصول على طاقة إضافية تحتاج إليها في الحفاظ على الاتزان الداخلي.
- الإخضاب في الثدييات داخلي، وينمو الجنين غالباً داخل رحم الأنثى.



الغدة اللبنية

الغدة

معدل الأيض

الحجاب الحاجز

القشرة المخية

المُخيخ

الرحم

المشيمية

الحمل

٤-٢ تنوع الثدييات

الفكرة > **الرئيسة** تقسم طائفة الثدييات إلى ثلاث تحت طوائف، بناءً على طرائق تكاثرها.

- من بين تحت الطوائف الثدييات الثلاث، تضع تحت طائفة واحدة فقط بيضًا.
- إحدى تحت الطوائف الثديية لها كيس يقضي فيه الصغار معظم وقت نومه.
- صغار الثدييات المشيمية تتغذى عن طريق المشيمية في أثناء نموها داخل الرحم.
- صنفت الثدييات المشيمية إلى رب مختلفة اعتماداً على أشكالها وبيئاتها وخصائصها التركيبية وطبيعة غذائها.



الثدييات الأولية

الثدييات الكيسية

الثدييات المشيمية

التفصيم

4



4-1

مراجعة المفردات

التشابه: أكمل الآتي باستعمال مفردة من دليل مراجعة الفصل.


1. المُح للطَّاير مثل _____ للثدييات.

2. فَرَة الحضانة للطَّاير مثل فَرَة _____ للثدييات.

3. النَّوَة للخلية مثل _____ للدِّماغ.

ثبت المفاهيم الرئيسية

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 4 و 5.




6. أيٌ مما يأتي أقل ارتباطاً مع الاتزان الداخلي في الثدييات؟

- a. الكلب.
- b. القلب.
- c. الغدد العرقية.
- d. المخالب.

7. أيٌ مما يأتي يُعد من وظائف الغدد الدهنية، والغدد العرقية، وغدد الحليب؟

- a. المحافظة على الجلد والشعر، وتنظيم درجة الحرارة، وإنتاج الحليب.
- b. التكاثر، والمحافظة على الجلد والشعر، وتنظيم درجة الحرارة.
- c. تنظيم درجة الحرارة، وإنتاج الحليب، والتكاثر.
- d. إنتاج الحليب، وتوصيل الأكسجين، والمحافظة على الجلد والشعر.

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 8 و 9.



8. أيٌ مستوى غذائي تتمي إليه جمجمة هذا المخلوق الثديي؟

- a. أكل أعشاب.
- b. أكل حشرات.
- c. أكل لحوم.
- d. رمي.

9. كيف يساعد وجود أنواع مختلفة من الأسنان على وجود الثدييات في جميع البيئات؟

- a. تستطيع أن تأكل أشكالاً متنوعة من الغذاء.
- b. تستطيع أن تصطاد بفاعلية.
- c. يمكنها أن تهضم طعامها بسهولة أكثر.
- d. جهازها الهضمي متغير.

4. أيٌ الأجهزة الآتية يمثلها الشكل أعلاه؟

- a. الجهاز الإخراجي.
- b. الجهاز الهيكلي.
- c. جهاز الدوران.
- d. الجهاز التناسلي.

5. ما الذي يصف دعم هذا الجهاز لثبات درجة حرارة الثدييات؟

- a. الدَّم المؤكسج منفصل عن الدَّم غير المؤكسج.
- b. للقلب ثلاث حجرات، ويمكنه أن يضخ دماً أكثر.
- c. ينقل هذا الجهاز الدَّم المؤكسج إلى الرِّتني.
- d. ينقل هذا الجهاز الدَّم غير المؤكسج من القلب إلى الجسم.



4-2

مراجعة المفردات

استبدل الكلمة التي تحتها خط بكلمةٍ من صفحة دليل مراجعة الفصل لتصبح كل عبارة صحيحة:

14. الفيل مثال على الثدييات الكيسية.

15. في الثدييات الأولية ينمو الجنين داخل رحم الأنثى.

16. للثدييات الأولية جراب.

ثبت المفاهيم الرئيسية

17. أي الثدييات الآتية من رتبة الحوتيات؟

- a. القندهار.
- b. الدلافين.
- c. الحمار الوحشي.
- d. عجل البحر.

18. ما الفائدة من نمو الصغير داخل الرّحم؟

- a. يُولد الصغار أحياء.
- b. يقل احتمال افتراس الصغار.
- c. زيادة احتمال افتراس الصغار.
- d. يكون الصغير مكتمل النمو عند الولادة.

19. أي الثدييات الآتية ليس من الثدييات الكيسية؟

- a. الأبوسوم.
- b. الكنغر.
- c. الإيكينا.
- d. الولب.

20. أي مما يأتي ليس من خصائص منقار البط؟

- a. أقدام غشائية.
- b. القدرة على وضع البيوض.
- c. قلب ثلاثي الحجرات.
- d. كروموموسومات صغيرة، تُشبه ما لدى الزواحف.

21. تفحص الجدول 1 - 3. أي الثدييات الآتية تحوي أكبر نسبة من البروتين في حليبيها؟

- a. الدلافين.
- b. الفقمة.
- c. الأرنب.
- d. الحمار الوحشي.

أسئلة بنائية


10. نهاية مفتوحة. تفحص الجدول 1-3، وكون فرضية تفسّر فيها سبب وجود اختلافات واسعة في محتوى الدهون في كل من حليب الفقمة وحليب الثدييات الأخرى.

11. نهاية مفتوحة. للعديد من المخلوقات التي تعيش في المناطق المتجمدة أجسام كبيرة وأطراف قصيرة، منها الآذان والأرجل. فسر كيف يمكن أن يساعد هذا التكيف على بقائها دائمة؟

التفكير الناقد

12. صمم تجربة. تفرز أفراس النهر سائلاً من غدد عميقة في الجلد، يشبه العرق، إلا أنه قد يكون له وظائف أخرى أيضاً. افترض العلماء أنَّ هذا السائل ربما يستعمل واقياً لجلد فرس النهر ضد الشمس. صمم تجربة باستخدام حبيبات تمتص الأشعة فوق البنفسجية لاختبار ما إذا كان هذا السائل الذي يفرزه جلد هذا المخلوق الثديي يوفر له حماية من أشعة الشمس.

13. حل واستنتاج. لقد وضع علماء الأحياء فرضية مفادها أنه عندما توضع أكلات اللحوم ذات البيئات الكبيرة في أماكن صغيرة مغلقة فإنَّها تُظهر زيادة في حالات سلوك الحركة (جيئه وذهاباً). لقد درسوا الثعلب القطبي والدب القطبي والأسد. حل الرسم البياني أدناه، واستنتاج أثر الحبس في سلوك الحركة.



تقدير الفصل

4

27. حل البيانات. فسر العلاقة بين عدد الأيام التي يتطلبها تضاعف وزن المولود ومحظى الحليب من البروتين. مثل هذا الجدول بيانياً.


تقدير إضافي

28. الكتابة في علم الأحياء ابحث عن أي محتوى جيني لمخلوق ثديي تم معرفة ترتيب القواعد النيتروجينية فيه، ثم اكتب فقرة تصف فيها ما تعلمت.

أسئلة المستندات

وُجد أنَّ نوع مُحدَّد من سنجاب الأرض القدرة على إصدار نداءات فوق صوتية لا يُمكن أن يسمعها أي ثديي آخر، ونداءات يمكن أن تكون مسمومة. عرَّض العلماء السَّنَاجِب لنداء فوق صوتية، أو ضوضاء في الخلفية، أو رنين شبيه بالنداءات فوق الصوتية، ونداء يمكن سماعه، ثم لاحظوا الوقت الذي أمضته السَّنَاجِب في إظهار سلوك اليقظة (مراقبة المفترسات) خلال كُل صوت.

استعمل الرَّسم البياني للإجابة عن الأسئلة الآتية:



29. تحت أي ظروف أظهرت سناجب الأرض أعلى سلوك لليقظة عموماً؟
30. تحت أي ظروف كانت الإشارة فوق الصوتية أكثر فاعلية بوصفها تحذيراً للمخلوق؟

أسئلة بنائية

22. نهاية مفتوحة. ارسم وفسِّر التَّكَيُّفات الملائمة لثديي يعيش على عمق 1m في مياه مستنقع، وبيئة خضراء كثيفة تحت الماء، فيها أفاعٌ مفترسة.

23. نهاية مفتوحة. قدِّم أسباباً تعجل بها دراسة رتب الثدييات.

24. نهاية مفتوحة. نظم نقاطاً في صفك حول استعمال المخلوقات لتجربة الأدوية ومواد التَّجميل عليها.

التفكير الناقد

25. مهن مرتبطة مع علم الأحياء. افترض أنَّ حارس حدائق سيعرض فيها مخلوق مُهدَّد بالانقراض محلَّاً. صمم مكاناً ونمط غذاء وتعليمات أخرى للعناية بهذا المخلوق، والمحافظة على بقائه في حديقة المخلوقات المحلية. جهز إعلاناً ينبه الناس إلى أهمية حماية هذا النوع المُهدَّد بالانقراض، والطرق التي يُمكن أن يُشاركاً فيها لإجراءات الحماية.

26. ابحث. اختار مجموعتك المفضلة من الثدييات، وارسم خريطة تُبيِّن توزيعها في العالم. وحدد العوامل البيئية التي قد تؤثِّر حالياً في توزيعها وفي المجموعة مستقبلاً. اكتب توصيات لما يجب عمله للتَّأكيد من نجاح مجموعتك المفضلة من الثدييات.

استعمل الجدول الآتي للإجابة عن السُّؤال 27.

وزن المواليد ومحظى الحليب من البروتين		
محظى الحليب من البروتين (g/1000)	الأيام المطلوبة لمضاعفة وزن المولود	الثديي
12	180	الإنسان
26	60	الحصان
33	47	البقرة
51	10	الخروف
101	9	القط

اختبار مقتني

4. ما الخاصية المميزة للثدييات؟

- a. الشعر.
- b. ثابتة درجة الحرارة.
- c. قلبه مكون من أربع حجرات.
- d. الإخصاب الداخلي.

5. أي الحيوانات الآتية ثديي مشيمى؟

- a. الطائر الطنان.
- b. الكنغر.
- c. منقار البط.
- d. الحوت.

استعمل المخطط الآتي للإجابة عن السؤال 6.



6. يبين المنحنى نمط التغير اليومي في درجة حرارة جسم الإنسان. متى تبدو درجة حرارة الجسم أقل مما يمكن؟

- a. بعد الأكل.
- b. قبل الفجر.
- c. منتصف الليل.
- d. بعد الظهر.


أسئلة الإجابات القصيرة

7. صف أربع خصائص مختلفة، أو عمليات تُمكّن الثدييات من المحافظة على الاتزان الداخلي لدرجة الحرارة.

8. ما الفائدتان اللتان يحصل عليهما صغير الثدييات من التغذّي على حليب أمّه؟

أسئلة الاختيار من متعدد

استعمل المخطط الآتي للإجابة عن السؤالين 1 و 2.



1. أي المخلوقات الحية له أعلى معدل درجة حرارة جسم؟

- a. البقرة.
- b. السنجب.
- c. الإلز.
- d. الجرذ.

2. الجرذ والسنجب من المخلوقات الليلية في الغالب. فما الذي تستنتجه من الرسم حول درجات حرارة أجسام هذه المخلوقات؟

- a. درجات حرارة أجسامها أعلى من درجات حرارة أجسام المخلوقات الحية النشطة خلال النهار.
- b. تغييرات درجة حرارتها أكثر حدّة من المخلوقات النشطة خلال النهار.
- c. درجات حرارة أجسامها أقل من درجات حرارة أجسام المخلوقات الحية النشطة خلال النهار.
- d. تغييرات درجة حرارتها أقل حدّة من المخلوقات النشطة خلال النهار.

3. ما الخاصية التي تميز الخفاش من غيره من الثدييات؟

- a. حدة النظر.
- b. الريش.
- c. الطيران.
- d. الأسنان.

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	الدرس / الفصل	الصف
8	4-1	2-1
7	4-1	2-1
6	4-2	2-1
5	4-2	2-1
4	4-1	2-1
3	4-2	2-1
2	4-1	2-1
1	4-1	2-1

مقدمة في النباتات

Introduction to plants

5

الفكرة

الفكرة العامة النباتات مجموعة متنوعة من المخلوقات الحية، أبدعها الباري سبحانه وتعالى.

١ - ٥ النباتات اللاوعائية

الفكرة الرئيسية النباتات اللاوعائية صغيرة، وتنمو عادة في البيئات الرطبة.

٢ - ٥ النباتات الوعائية الابذرية

الفكرة الرئيسية النباتات الوعائية الابذرية عموماً أكبر حجماً، وأفضل تكيفاً للعيش في البيئات الجافة من النباتات اللاوعائية؛ لأنها تحوي أنسجة وعائية.

٣ - ٥ النباتات الوعائية البذرية

الفكرة الرئيسية النباتات الوعائية البذرية من أكثر النباتات انتشاراً على الأرض.

حقائق في علم الأحياء


- عدد الأنواع النباتية ثلاثة أضعاف عدد الأنواع الحيوانية.
- تشكل النباتات ومنتجاتها نحو 98% من الكتلة الحيوية على الأرض.



نبات الصنوبر
لبنان



النخيل
من نباتات المملكة
العربية السعودية




نباتات الأسدار
المملكة العربية السعودية

نشاطات تمهيدية

تصنيف النباتات اعمل المطوية الآتية
لتساعدك على فهم تصنيف النباتات
اللاوعائية.

المطويات منظمات الأفكار

الخطوة 1: ضع ورقتين من دفتر ملاحظاتك بعضها فوق بعض متباينة إحداهما عن الأخرى بمقدار 1.5 cm، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 2، اثنان الأطراف لتكون أربعة ألسنة متتساوية المساحة، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 3: ثبت أوراق المطوية معًا بالدبابيس، واتكتب على كل لسان عنوانًا، كما في الشكل الآتي:

النباتات اللاوعائية
1. قسم الحزازيات
2. قسم الحشائش البوقية
3. قسم الحشائش الكبدية

المطويات استعمل هذه المطوية في القسم 1-5. سجل
وأنت تقرأ هذا القسم ما تعلمته حول تصنيف النباتات.

تجربة *السلالات*

ما الخصائص التي تختلف فيها النباتات؟

يستعمل العلماء صفات محددة لتصنيف النباتات ضمن المملكة النباتية. وستدرس في هذه التجربة بعضًا من صفات النباتات.

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. عنّون خمس عينات نباتية باستعمال الأحرف A، B، C، D، E.
3. ادرس كل نبات بعناية. واغسل يديك جيداً بعد الانتهاء من دراسة هذه النباتات.
4. سجّل بناءً على ملاحظاتك الخصائص التي تصف أوجه التشابه والاختلاف بين هذه النباتات.
5. رتب قائمة الخصائص تنازليًّا حسب أهميتها من وجهة نظرك.

التحليل

1. قارن قائمتك بقوائم زملائك في الصف.
2. صف درجة التنوع بين النباتات التي درستها.
3. سجّل قائمة بالصفات التي لم تستطع دراستها، والتي قد تكون مهمة في تنظيم النباتات في مجموعات.



5-1

الأهداف

- تتعرف تراكيب النباتات اللاوعائية.
- تقارن بين خصائص أقسام النباتات اللاوعائية.

مراجعة المفردات

التكافل Symbiosis: العلاقة التي يعيش بواسطتها مخلوقان معاً وترتبطهما علاقة وثيقة.

المفردات الجديدة

الثالوس

Nonvascular Plants



الفقرة الرئيسية النباتات اللاوعائية صغيرة، وتنمو عادة في البيئات الرطبة.

الربط مع الحياة هل استعملت يوماً خرطوم المياه لري نباتات الحديقة أو غسل سيارة؟ لماذا لا تقل الماء من الصنبور بواسطة الدلو؟ إن استعمال الخرطوم لنقل الماء - كما ترى - طريقة أكثر فاعلية من استعمال الدلو. تفتقر النباتات اللاوعائية إلى تراكيب لنقل الماء والمواد الأخرى. ومع ذلك، فإن صغر حجم هذه النباتات يجعل نقل المواد بالانتشار والخاصية الأسموزية كافياً لسد حاجاتها.

Diversity of Nonvascular Plants

تشكل النباتات اللاوعائية واحدة من أربع مجموعات من النباتات التي تشتراك مع الطحالب بعدة خصائص كما في الشكل (A) 1-5، ومنها: أن الجدار الخلوي في كليهما مكون من السيليلوز، وتخزن النباتات ومعظم الطحالب الغذاء على صورة نشا، وتستخدم النباتات ومعظم أنواع الطحالب نفس النوع من الكلوروفيل في عملية البناء الضوئي. وعموماً، فإن النباتات اللاوعائية صغيرة الحجم، مما يمكن المواد من الانتقال خلالها بسهولة. وتوجد هذه النباتات على الأغلب في المناطق الرطبة الظلية، وهي بيئة تزودها بالماء الذي تحتاج إليه لنقل المواد الغذائية، وتساعدها على عملية التكاثر.


قسم الحزازيات Division Bryophyta أكثرها شيوعاً هي الحزازيات القائمة، انظر الشكل 2-5. وربما تكون قد شاهدت هذه النباتات اللاوعائية الصغيرة نامية على ساق شجرة ميتة أو على حافة جدول. وعلى الرغم من أن الحزازيات ليس لديها أوراق حقيقية إلا أن لها تراكيب شبيهة بالأوراق، وهذه التراكيب التي تقوم بعملية البناء الضوئي تكون عادة من طبقة واحدة من الخلايا. تُنتج الحزازيات القائمة أشباه جذور عديدة الخلايا لشتيتها في التربة أو غيرها من السطوح، كما في الشكل (B) 1-5.



Plant Kingdom

المملكة النباتية

■ **الشكل 2 - 5** من طرائق تصنيف أقسام المملكة النباتية تصنيفها إلى: لابوعائية ووعائية، وإضافة إلى ذلك يمكن أن تصنف النباتات الوعائية إلى نباتات لاذدرية ونباتات بذرية.



ويمكن للماء وما فيه من مواد مذابة أن تنتشر إلى أشواه الجذور. وعلى الرغم من أن للحرازيات أنسجة تنقل الماء والغذاء، إلا أن هذه النباتات ليس لها أنسجة وعائية حقيقة، حيث تنقل الماء والمواد الأخرى خلال أجسام الحرازيات بوساطة الخاصية الأسموزية والانتشار. تُظهر الحرازيات تنوعاً في التركيب والنمو. بعضها له سيقان تنمو عمودياً، وبعضها الآخر سيقان متدرية. وتشكل بعض الحرازيات سجادةً واسعاً يساعد على منع تعرية التربة في المنحدرات الصخرية. ومع مرور الزمن تراكمت كميات من الحراز الطحلبي سفاجنوم *Sphagnum* ومواد نباتية وتعفت وشكلت تربات عميقة كونت فحم الحُث (فحم البيت) peat. حيث يمكن تقطيعه وحرقه واستعماله وقوداً، كما يستعمله الذين يعنون بالأزهار للاحتفاظ بالرطوبة. يقدر العلماء أن حوالي 1% من سطح الأرض مغطى بالحرازيات. تنمو معظم الحرازيات القائمة، الشكل (B-1-5)، في المناطق المعتدلة، ويمكن لها أن تنمو في درجة التجمد دون أن تتلف، كما يمكنها أن تعيش حتى بعد فقد الكثير من الماء وتستعيد نموها عند توافر الرطوبة.

ماذا قرأت؟ وضح كيف يتكون خث الحرازيات؟

قسم الحشائش البو唧ة Division Anthocerophyta يعد هذا القسم أصغر قسم في النباتات اللاوعائية، وقد سميت بهذا الاسم لأن الطور البو唧ي فيها يشبه البو唧 (القرن)، الشكل 3-5. ينتقل الماء والمواد المغذية في الحشائش البو唧ة بالخاصية الأسموزية والانتشار. إحدى الصفات المميزة لهذه النباتات هو وجود بلاستيدة خضراء واحدة كبيرة في كل خلية من خلايا الطور المشيجي وخلايا الطور البو唧ي، ويمكن ملاحظة هذه الصفة بوساطة المجهر. ويتجدد النبات البو唧ي معظم الغذاء الذي يستعمله النبات المشيجي والنبات البو唧ي نفسه. تحوي أنسجة الحشائش البو唧ة فراغات تحيط بالخلية مملوءة بمادة مخاطية وليس بالهواء. وتنمو البكتيريا الخضراء المزرقة من نوع *Nostoc* في هذا المخاط. وتُظهر الحشائش البو唧ة والبكتيريا الخضراء المزرقة علاقة تعايش. كما في تجربة تحليل البيانات 1-5.



■ الشكل 3-5 الطور البو唧ي في الحشائش البو唧ة، وهو يشبه البو唧 (القرن) ملتحم بالطور المشيجي.

مختبر تحليل البيانات 5-1

بناءً على بيانات حقيقة

كون فرضية



كيف تستفيد البكتيريا الخضراء المزرقة من الحشائش البوقية؟ تكون البكتيريا الخضراء المزرقة من نوع نوستوك *Nostoc* علاقات تعايش مع حشائش الكبد ومعظم الحشائش البوقية.

البيانات والملاحظات

تظهر مستعمرات *Nostoc* على صورة بقع داكنة ضمن نسيج الطور المشيجي للنبات، كما في الصورة الآتية:

التفكير الناقد

1. كون فرضية حول الفوائد التي تحصل عليها النوستوك *Nostoc* من الحشائش البوقية .
2. صمم تجربة لاختبار الفرضية.

أخذت البيانات في هذا المختبر من: CostaJ – Let al. 2001. Genetic diversity of *Nostoc* symbionts endophytically associated with two bryophyte species. *Appl. Environ. Microbiol.* 67: 4393 – 4396

قسم الحشائش الكبدية **Hepaticophyta** سُميّت الحشائش الكبدية نظرًا للمظاهر الخارجية؛ ولأنها كانت تستعمل قديمًا في علاج أمراض الكبد. توجد في مواطن مختلفة تتراوح بين المناطق الاستوائية وحتى القطبية. تمثل الحشائش الكبدية إلى النمو موازية لسطح الأرض، وتعيش في مناطق ترداد فيها الرطوبة كالترفة الرطبة، وبالقرب من الماء، أو على أخشاب متعرجة رطبة. ويستطيع قليل من الأنواع العيش في مناطق جافة نسبيًا. ويتنقل الماء والمواد المغذية في الحشائش الكبدية بواسطة الخاصية الأسموزية والانتشار كغيرها من النباتات اللاوعائية. تصنف الحشائش الكبدية إلى **الثالوسيّة (جسمية)** thallose أو ورقية، الشكل 5-4.

■ **الشكل 5-4** يشبه شكل ثالوس الحشائش الكبدية أجزاء الكبد. للحشائش الكبدية الورقية تراكيب تشبه الأوراق ولكنها ليست أوراقًا حقيقة.



الخشائش الكبدية الورقية



ثالوس الحشائش الكبدية

فجسم الحشائش الثالوسيّة له تركيب مجزأً ولين، وأما الورقية الشكل 4-5 فلها سيقان تحمل تراكيب مسطحة رقيقة تشبه الورقة. والخشائش الكبدية لها أشباه جذور، وهي وحيدة الخلايا، ولذا فهي تختلف عن الحزازيات القائمة التي لها أشباه جذور متعددة الخلايا. وقد أثبت تحليل DNA أن الحشائش الكبدية تفتقر إلى تسلسل DNA الذي لمعظم نباتات اليابسة الأخرى. ويشير هذا إلى أن الحشائش الكبدية هي أكثر نباتات اليابسة بساطة في التركيب.

النحو 5-1 التقويم

التفكير الناقد

فهم الأفكار الرئيسية

الخلاصة

1. **الفكرة الرئيسية** تخص خصائص الحزازيات القائمة.
2. حدد العوامل البيئية التي ربما أثرت في تكيف تراكيب النباتات اللاوعائية.
3. ميز بين الحشائش الكبدية والخشائش البوقية.
4. عمّم القيمة الاقتصادية للحزازيات.
5. طبق ما تعرفه عن الخاصية الأسموزية والانتشار لتفسير سبب صغر حجم النباتات اللاوعائية عادةً.
6. توقع التغيرات التي قد تحدث على المستوى الخلوي عندما يجف الحزاز القائم.
7. قارن بين مواطنن الحزازيات القائمة والخشائش البوقية والخشائش الكبدية.

- توزيع النباتات اللاوعائية محدد بقدرتها على نقل الماء والمواد الأخرى داخلها.
- الحزازيات القائمة نباتات صغيرة تستطيع العيش في بيئات مختلفة.
- تعتمد الحزازيات على الخاصية الأسموزية والانتشار لنقل المواد.
- هناك نوعان من الحشائش الكبدية، هما الثالوسيّة والورقية.



النباتات الوعائية اللابذرية

Seedless Vascular Plants

الفكرة **النباتات الوعائية اللابذرية** عموماً أكبر حجماً، وأفضل تكيفاً للعيش في البيئات الجافة من النباتات اللاوعائية؛ لأنها تحوي أنسجة وعائية.

الربط مع الحياة يتدفق الماء من الصنبور عندما تفتحه، فتستعمله للشرب أو لتنظيف الأسنان أو لغسل الأشياء. إن نظام أنابيب الماء في المنزل يحمل إليك الماء من مناطق مختلفة. ويمكن النظر إلى الأنسجة الوعائية على أنها نظام أنابيب للنبات؛ لأنها تنقل الماء والمواد المذابة خلال جسم النبات.

تنوع النباتات الوعائية اللابذرية

Diversity of Seedless Vascular Plants

تشكل الحزازيات الصولجانية - التي تُسمى أيضاً حزازيات السنبلة - مع السرخسيات مجموعة النباتات الوعائية اللابذرية، وتختلف الحزازيات الصولجانية عن الحزازيات التي وردت في القسم السابق. وتشكل هذه المجموعة، الشكل 5-5، واحدة من ثلاث مجموعات نباتية لها أنسجة وعائية. حيث تظهر النباتات الوعائية اللابذرية تنوعاً كبيراً في الشكل والحجم، تكون في العادة طولها أقل من 30 cm، وفي بعض الغابات الاستوائية تستطيع السرخسيات النمو إلى 25 cm. وبغض النظر عن الحجم، فإن الطور البوغي في بعض النباتات الوعائية اللابذرية جبار الله تكتفاً يُسمى **حاملاً بوجياً** strobilus وهو تجمع متراص من التراكيب الحاملة للأبوااغ. وتنتشر الأبوااغ الصغيرة التي يتتجها الحامل البوغي عادة بوساطة الرياح، وعندما يستقر البوغ في بيئة مناسبة، فإنه ينمو ليشكل النبات المشيجي.

حامل أبوااغ



(B) مخلب الذئب *Lycopodium sp.*

- تحدد وتحلل خصائص النباتات الوعائية اللابذرية.

- تقارن خصائص قسم النباتات الصولجانية وقسم السرخسيات.

مراجعة المفردات

البوغ Spore، خلية تكاثيرية أحادية المجموعة الكروموسومية لها غلاف خارجي صلب، ويمكن أن تنتج مخلوقاً حياً جديداً دون أن تتحد بالمشيج.

المفردات الجديدة

الحامل البوغي


النبات المواتي

الرايزوم

محفظة الأبوااغ

الكيس البوغي

■ **الشكل 5 - 5** تُشجع النباتات الوعائية اللابذرية - مثل الحزاز الصولجياني المسمى مخلب الذئب - أبوااغاً في مخاريط بدلاً من البذور.



(A) التركيب التصنيفي للنباتات الوعائية اللابذرية

قسم النباتات الصولجانية Division Lycophyta تشير الأدلة من الأحافير إلى أن النباتات الصولجانية شكلت جزءاً كبيراً من الغطاء النباتي للغابات، فبعضها يصل طوله إلى 30 m. وعندما مات هذا الغطاء النباتي تحولت بقايته مع مرور الزمن وأصبحت في النهاية جزءاً من الفحم الحجري الذي يستخرجه الإنسان من أجل الوقود. إن الطور البوغي للنباتات الصولجانية هو السائد على عكس الحجازيات الحقيقية، وهو يشبه الطور البوغي للحجازيات. وتراكبيها التكاثرية التي تُنبع الأبواغ تكون صولجانية الشكل أو تشبه السنبلة، **الشكل 1 - 5.** للحجازيات الصولجانية جذور وسيقان، ولها تراكيب حرشفية صغيرة تشبه الأوراق (أشباء أوراق). وتسمى أيضاً الصنوبريات الأرضية لأنها تشبه أشجار صنوبر صغيرة. وتكون سيقانها إما متفرعة أو غير متفرعة، وتنمو إما عمودياً أو زاحفة على سطح التربة. وجذورها تنمو من قاعدة الساق. كما يمتد عرق من النسيج الوعائي في منتصف كل ورقة حرشفية. تتمي معظم الحجازيات الصولجانية إلى جنسين، هما: ليكوبوديوم *Lycopodium* وسيلانجينيلا *Selaginella*. **الشكلين 6 - 5** يتبع هذا الحزاز الصولجياني إلى جنس سيلانجينيلا.



سيلانجينيلا

ماذا قرأت؟ حدد أهمية النباتات الصولجانية الاقتصادية.

قسم السرخسيات (النباتات المجنحة) Division Pterophyta يضم هذا القسم الخنشاريات والنباتات المجنحة. لقد وضع التباتات المجنحة (ذيل الحصان) ذات مرة في قسم خاص بها، لكن الدراسات الكيميائية الحيوية الحديثة بينت أنها ذات علاقة قوية بالسرخسيات، لذا يجب أن تجمع معها.



تشتهر أشجار الخنشار بشكل كبير ضمن الغابات الاستوائية.



الخنشار المائي *Azolla* يعيش تكافلياً مع البكتيريا الخضراء المزرقة.




ينمو الخنشار *Dryopteris* على أفضل صورة في البيئات الجافة الظلية.

الشكل 7 - 5 الخنشاريات مجموعة متنوعة من النباتات تعيش في بيئات عديدة.



ينمو نبات قرن الأيل بوصفه نباتاً هوائياً على النباتات الأخرى.



الطور البوغي والطور المشيحي للخنشار



الطور البوги المكتمل النمو للخنشار

■ **الشكل 5-8** يختلف كل من الطور البوغي والطور المشيحي اختلافاً واضحاً في الحجم والمظهر. فالطور البوغي الناضج للخنشار أكبر مرات عديدة من الطور المشيحي.

الربط مع علوم الأرض كانت الخنشاريات خلال الحقبة الطباشيرية -منذ 359 – 300 مليون سنة- أكثر نباتات اليابسة وفرا. فقد وجدت غابات واسعة من الخنشاريات التي تشبه الأشجار، وقد أنتج بعضها تراكيب تشبه البذور. ينمو الخنشار في بيئات مختلفة وعديدة. وعلى الرغم من أنه غالباً يعيش في البيئات الرطبة، إلا أنه يستطيع العيش في الظروف الجافة. وعندما يكون الماء نادراً، تباطأ العمليات الحيوية لبعض أنواع الخنشار لدرجة يبدو معها ميتاً. وعندما يتوافر الماء مرة أخرى يستأنف الخنشار نموه. ويبيّن الشكل 5-7 أمثلة لخنشاريات تنمو في بيئات متباينة.

يكون الطور المشيحي الدقيق أصغر من الدبوس عادة، فهو ينمو من بوغ، وله تراكيب تكاثرية ذكرية وأخرى أنثوية. وبعد الإخصاب ينمو الطور البوغي من الطور المشيحي، ويكون معتمداً عليه لفترة وجiza. أحد تكيفات الخنشار التي تمكّنه من العيش في المناطق الجافة إنتاج الطور البوغي دون إخصاب. وأخيراً يكون الطور البوغي جذوراً، وساقاً سميكـة تحت الأرض تسمى **الرايزوم** rhizome، وهو عضـو لخزن الغذـاء. تموت التراكـيب الواقـعة فوق سطـح التـربـة لـبعض أنـواع الخـنـشارـ فيـ نـهاـيـة فـصـل النـموـ. وعـندـمـا يـبـدـأ النـموـ يـتـحلـلـ الـراـيزـومـ المـخـزنـ لـالـغـذـاءـ ليـحرـرـ الطـاقـةـ الـضرـورـيـةـ الـلاـزـمـةـ لـهـذـاـ النـموـ. إنـ الـجـزـءـ الـمـأـلـوفـ منـ الـخـنـشارـ هوـ تـرـاكـيـهـ الـورـقـيـةـ الـتـيـ تـقـومـ بـعـمـلـيـةـ الـبـنـاءـ الضـوـئـيـ تـسـمـىـ الـأـوـرـاقـ (ـالـسـعـفـةـ)،ـ الشـكـلـ 5-5ـ.ـ تـشـكـلـ هـذـهـ الـأـوـرـاقـ جـزـءـاـ مـنـ الـطـورـ الـبوـغـيـ لـلـخـنـشارـ،ـ وـبـهـ أـنـسـجـةـ وـعـائـيـةـ مـتـفـرـعـةـ،ـ وـهـيـ شـدـيـدـةـ التـبـاـينـ فـيـ الـحـجـمـ.

تـتـكـونـ أـبـوـاغـ الـخـنـشارـ فـيـ تـرـاكـيـهـ تـسـمـىـ مـحـفـظـةـ الـأـبـوـاغـ sporangium،ـ وـتـكـوـنـ تـكـتـلـاتـ الـمـحـافـظـ كـيـسـاـ بـوـغـيـاـ (ـبـثـرـةـ) sorusـ.ـ وـتـقـعـ الـأـكـيـاسـ الـبـوـغـيـةـ عـادـةـ عـلـىـ السـطـحـ السـفـلـيـ لـلـأـوـرـاقـ،ـ الشـكـلـ 5-9ـ.



خنشار عش الطائر



ذيل الحصان

ويبيّن الشكل ٥-٩ كذلك التركيب النموذجي لذيل الحصان، وهو ساق جوفاء مضلعة عليها دوائر من أوراق حرشفية. ويُنتج ذيل الحصان الأبواغ في مخاريط عند قمة الساق التكاثرية، كما هو الحال في الحزازيات الصولجانية. وعندما تنطلق أبواغ ذيل الحصان في البيئة المناسبة فإنها تنمو إلى نبات مشيجي. ومن الأسماء الشائعة لذيل الحصان نباتات التنظيف؛ لأنها كانت تستعمل غالباً في تنظيف القدور وأواني الطبخ في الأزمنة القديمة. ويحتوي ذيل الحصان وهو نبات صغير الحجم على مادة كاشطة تُسمى السيليكا، تستطيع أن تشعر بها عندما تحك إصبعك على طول ساق النبات. وينمو معظمها في المناطق الرطبة كالسبخات والمستنقعات وضفاف الجداول. وتنمو بعض أنواعه في التربة الجافة في الحقول وجوانب الطرق فقط؛ لأن جذورها تنمو في التربة المشبعة بالماء الواقعة تحتها.

■ الشكل ٥-٩ تحتوي الأكياس البوغية في خنشار عش الطائر على أبواغ تشكل خطوطاً على السطح السفلي للورقة. وتنتاج بعض نباتات ذيل الحصان نوعين مختلفين من السيقان في الطور البوغي: خضرية وتكاثرية.

التقويم ٥-٢

التفكير الناقد

٤. صمم تجربة يمكن أن تختبر بها قدرة خصائص مجموعات النباتات الوعائية الطور المشيجي للخنشار على النمو في ترب مختلفة.
٥. قارن بين أفراد الطور البوغي وأفراد أوراق الخنشار.
٦. ارسم مخطط فن تظير فيه خصائص الحزازيات الصولجانية والسرخسيات.
١. **الفكرة الرئيسية** اعمل جدولأً تبين فيه خصائص مجموعات النباتات الوعائية الطور المشيجي للخنشار على النمو في ترب مختلفة.
٢. قارن بين أفراد الطور البوغي وأفراد الطور المشيجي في النباتات الوعائية والنباتات اللاوعائية.
٣. استنتج أهمية الاعتماد المبدئي للطور البوغي في الخنشار على الطور المشيجي.

الخلاصة

- للنباتات الوعائية اللافذرية أنسجة وعائية متخصصة، وتتكاثر بالأبواغ.
- النبات البوغي هو الطور السائد في النباتات الوعائية.
- النباتات الصولجانية والسرخسيات نباتات وعائية لاذرية.

الأهداف

- تقانة بين خصائص النباتات البذرية.
- تعدد أقسام النباتات معراة البذور.
- تلخص دورة حياة النباتات الزهرية.

مراجعة المفردات

التكيف Adaptation: صفة موروثة تنتج عن استجابة المخلوق الحي لعامل بيئي ما.

المفردات الجديدة

الفلقة

المحروط

السنوي

ثنائية الحول

المعمر

Vascular Seed Plants

ال فكرة الرئيسية النباتات الوعائية البذرية من أكثر النباتات انتشاراً على الأرض.

الربط مع الحياة عندما تكتب رسالة فإنك تضعها في مغلف؛ أملاً في حمايتها. وكذلك تحمي البذرة النبات البذري الجديد إلى أن تصبح الظروف البيئية ملائمة للنمو.

Diversity of Seed Plants


تنتج النباتات الوعائية البذرية بذوراً تحتوي كل واحدة منها عادة على طور بوغي صغير يحيط به نسيج لحمايته. وللبذور **فلقة cotyledon** واحدة أو أكثر. والفلقة تركيب يخزن الغذاء أو يساعد النبات البوغي الصغير على امتصاص الغذاء. وتُسمى النباتات التي تشكل بذورها جزءاً من الثمرة بالنباتات **مغطاة البذور**. وتُسمى النباتات التي لا تشكل بذورها جزءاً من الثمرة بالنباتات **مُعراة البذور**. للنباتات البذرية مجموعة من التكيفات لانتشار البذور في البيئة كما في **الشكل 10-5**. ويعُدّ الانتشار مهمّاً؛ لأنّه يمنع التنافس بين النباتات الجديدة وأبائها، أو بين الأبناء أنفسها. الطور البوغي هو السائد في النباتات البذرية، وهو الذي ينبع الأبواغ التي تنقسم انقساماً منصفاً لتشكل النبات المشيجي المذكر (حبوب اللقاح) والنبات المشيجي المؤنث (البوبيضات). ويكون كل نبات مشيجي مؤنث من بوبيضة واحدة أو أكثر تحيط بها أنسجة واقية. ويعتمد الطوران المشيجيان معًا على الطور البوغي في بقاءهما.



بذور الصنوبر تراكيب تشبه الأجنحة تمكّنها من الانتقال بوساطة الرياح.



يستطيع نبات بندق الساحرة (Witch hazel) أن يقذف بذرته أكثر من 12m بعيداً عن النبات الأم.



تساعد تراكيب تشبه المظلة على انتشار بذور حشائش الحليب (Milk weed).



تستطيع ثمرة جوز الهند، والبذرة بداخلها، أن تطفو لمسافات كبيرة مع تيارات المحيط.

الشكل 10-5 افحص هذه التكيفات التركيبة لانتشار البذور.



الكُوك الشائك (Cocklebur) له خطاطيف يمكن أن تعلق بفراء الحيوانات أو ملابس الإنسان.


يُعد الماء ضروريًا لوصول المشيج المذكر إلى البوياضة في كل من النباتات اللاوعائية والوعائية اللافدرية، في حين لا تحتاج معظم النباتات الوعائية البدنية إلى وجود طبقة رقيقة من الماء لهذه العملية. وهذا فرق مهم بين النباتات البدنية والنباتات الأخرى. ويمكن هذا التكيف النباتات البدنية من العيش في بيئات مختلفة، ومنها تلك المناطق التي يندر فيها وجود الماء.

قسم نباتات السيكادات *Division Cycadophyta* يحتوي المخروط *cone* على التركيب التكاثرية الذكرية والأثنوية لنباتات السيكادا وللنباتات المعاشرة البدنية الأخرى **الشكل 11-5**. ويتجزأ المخروط الذكري غيمة من حبوب اللقاح التي تكون النباتات المشيجية الذكرية، في حين تحتوي المخاريط الأنثوية على النباتات المشيجية الأنثوية. فقد يصل طول مخاريط السيكادا 1m، وتزن حوالي 35 kg. وتنمو المخاريط الذكرية والمخاريط الأنثوية على نباتات سيكادا منفصلة.

يعتقد بعض الناس أن نباتات السيكادا قريبة من أشجار النخيل؛ لأن لها أوراقًا كبيرةً مقسمة، وبعضها قد ينمو حتى يصل طولها إلى أكثر من 18 m. لكن السيكادا لها تركيب واستراتيجيات تكاثر مختلفة عن النخيل. فرغم أنها تشبه الأشجار الخشبية إلا أن لها ساقًا طرية تتكون غالباً من نسيج خازن، **الشكل 12-5**.

البيئات الطبيعية للسيكادا هي المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. انتشرت نباتات السيكادا بوفرة منذ 200 مليون سنة، ولكن يوجد منها الآن حوالي 11 جنساً و250 نوعاً فقط.

ماذا قرأت؟ قارن بين مخروط السيكادا وحامل الأبوااغ في النباتات اللافدرية.



■ **الشكل 11-5** يبين خطوط العلاقات التركيبية أعلاه أن المخاريط كانت تكيفاً مبكراً - ولهما الله لها - مع الظروف البيئية.



■ **الشكل 12-5** يوضح الساق الطرية والأوراق المقسمة لنبات السيكادا.

عالم الأخشاب

هو الشخص الذي يهتم بجانب أو أكثر في عملية تحويل الخشب إلى منتجات أخشاب أخرى. ويستطيع عالم الأخشاب أن يجري البحوث ويعمل في الصناعة بوصفه مطوراً للمنتجات أو العمليات أو ضابطاً للنوعية أو الإنتاج أو مهندساً أو مديراً.

قسم نباتات النيتوفايت Division Gnetophyta من النباتات المعاصرة البذور، وتستطيع النباتات في هذا القسم أن تعيش بين 1500-2000 سنة. وهناك ثلاثة أجنس فقط من هذه النباتات، ييدي كل منها تكيفات تركيبية غير عاديّة للبيئة. إذا كنت قد تناولت دواءً للرُّشح أو الحساسية فإنه قد يحتوي على مادة إيفيرين - وهو مركب يوجد بصورة طبيعية في جنس إفيالرا Ephedra من نباتات النيتوفايت. ويشمل الجنس Gnetum نحو 30 نوعاً منأشجار استوائية ونباتات متسلقة تشبه سيقان العنب. أما الجنس الثالث المتبقى Welwitschia فله نوع واحد ومظهره غريب تماماً، الشكل 13-5، ويوجد خصوصاً في صحاري جنوب غرب إفريقيا. ولهذا النبات جذور خازنة كبيرة وورقتان تستمران في النمو، وقد يصل طولهما إلى أكثر من 6 m. ويحصل نبات Welwitschia على الرطوبة من الضباب أو الندى أو المطر بواسطة أوراقه.

قسم النباتات الجنكية Division Ginkgophyta يشمل هذا القسم نوعاً واحداً فقط هو جينكو بيلوبا Ginkgo biloba؛ إذ اكتشف احفورة له في مطلع القرن التاسع عشر، وهي أحد أقسام النباتات المعاصرة البذور.

■ **الشكل 13-5** تحرّك الريح أوراق نبات Welwitschia، مما يؤدي إلى تشقّقها عدّة مرات، بحيث تبدو الورقتان كأنّهما أوراق عديدة.



كيف تتكاثر السرخسيات
والجازيات والمخروطيات؟

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين الإثرائية



لهذه الشجرة المتميزة أوراق صغيرة تشبه المروحة، وهي مثل السيكادا لها أجهزة تكاثرية ذكرية وأنوثية على نباتات منفصلة. وتتنج الشجرة المذكورة حبوب اللقاح في مخاريط تنمو من قاعدة تجمعات الأوراق، **الشكل 14-5**. في حين تنتج الشجرة المؤنثة مخاريط تعطي عند إخضابها بذرة ذات غلاف لحمي ذي رائحة نتنة، **الشكل 14-5**. ولأنها تحمل التلوث لذا فإنها مألفة للمزارعين ومطوري الأرضي في المدن. لكن الشجرة المذكورة مفضلة أكثر عادة؛ لأنها لا تعطي المخاريط اللحمية التتنة الرائحة.

قسم النباتات المخروطيات *Division Coniferophyta* تباين المخروطيات في الحجم من شجيرات قصيرة طولها بضعة سنتيمترات إلىأشجار باسقة يزيد طولها عن 50 m، ويعُد الصنوبر والسرور والتنوب والخشب الأحمر والعرعر والعاذر أمثلة على المخروطيات. والمخروطيات أهم النباتات المعروفة البذور من الناحية الاقتصادية؛ فهي مصدر للأخشاب ولب الورق والمواد الراتنجية مثل زيت التربتين.

تنمو التراكيبيات التكاثرية لمعظم المخروطيات في مخاريط. ومعظم المخروطيات لها مخاريط مذكرة ومخاريط مؤنثة على أغصان مختلفة من الشجرة أو الشجيرة نفسها. وتُتنج المخاريط الذكرية الصغيرة حبوب اللقاح، في حين تبقى المخاريط الأنثوية الكبيرة على النبات إلى أن تنضج البذور. وتتكون المخاريط الذكرية من حراشف تكاثرية تحتوي على المئات من محافظ الأبواغ، حيث تنقسم الخلايا داخل هذه الأبواغ انقساماً منصفاً لتكون أبواغ صغيرة. تتألف حبوب اللقاح - الطور المشيجي للنبات - من أربعة خلايا تنمو من البوغ الصغير. وتنتشر حبوب اللقاح هذه عن طريق الرياح.

■ **الشكل 14-5** تنمو التراكيبيات الذكرية والأنوثية للنباتات الجنكية من قاعدة تجمعات الأوراق ولكن على أشجار مختلفة.

توضيح. كيف تنتقل حبوب اللقاح إلى التراكيبيات التكاثرية الأنوثية؟



تراكيبيات تكاثرية أنوثية



تراكيبيات تكاثرية ذكرية

ويمكن استعمال خصائص المخاريط الأنثوية، الشكل 15-5، لتحديد المخروطيات؛ حيث تبدي هذه المخروطيات تكيفات لبيئاتها مثل كل النباتات. فما العلاقة التي يمكن استنباطها من كون معظم المخروطيات لها أغصان متسلية، والعديد منها ينمو في المناخ الكثير الثلوج؟ ومن التكيفات الأخرى وجود طبقة شمعية خارجية من الكيوتين تغطي أوراق المخروطيات الإبرية أو الحرشفية وتقلل من فقد الماء.

عندما تسمع عبارة "دائمة الخضرة" فهل تفكر في الصنوبر أو المخروطيات الأخرى؟ معظم النباتات في المناطق المعتدلة الشمالية التي تسمى دائمة الخضرة مخروطيات. وفي المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية هناك نباتات أخرى دائمة الخضرة - منها شجرة نخيل جوز الهند. ويعرف علماء النبات النباتات الدائمة الخضرة بأنها نباتات لها أوراق خضراء طوال أيام السنة. ويتيح لها هذا التكيف أن تقوم بعملية البناء الضوئي عندما تكون الظروف مناسبة. ويُسمى النبات الذي يفقد أوراقه في نهاية فصل النمو أو عندما تقل الرطوبة كثيراً نباتاً متساقطاً الأوراق. ويمكن تحديد نوع النبات المخروطي من أوراقه إذا كان دائم الخضرة أو متساقطاً للأوراق، كما هو موضح في التجربة 1-5.

تجربة 1 - 5

استقصص أوراق المخروطيات

- ما أوجه الاختلاف والتتشابه بين أوراق المخروطيات؟
- تُعدّ بعض أشجار المخروطيات من أطول المخلوقات الحية على الأرض وأقدمها. ولعظام المخروطيات أوراق إبرية يختلف بعضها عن بعض. وتعد خصائص الأوراق مهمة في تعرّف المخروطيات.
- خطوات العمل
4. قارن بين الأوراق، وأعد قائمة بالخصائص المهمة في وصف كل عينة من المخروطيات، وسجلها.
 5. طوّر نظاماً لتصنيف عينات المخروطيات وكن مستعداً للدفاع عن نظامك التصنيفي.
 6. اغسل يديك جيداً بعد التعامل مع عينات النبات.
- التحليل
1. وضح المنطق في نظمك التصنيفي.
 2. قارن نظامك التصنيفي بما وضعه زملاؤك. واسرح لماذا يعد نظامك فعالاً في تصنيف عينات المخروطيات التي درستها.
1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
 2. حدد معلمك، ثم سمه.
 3. صمم جدول بيانات لتسجيل ملاحظاتك.





الصنوبر (Pine) - مخاريط خشبية



العرعر (Juniper) - مخاريط عنبية



التنوب (Pacific yew) - مخاريط لحمية


قسم النباتات الزهرية Division Anthophyta تعدد النباتات الزهرية أوسع النباتات انتشاراً بسبب تكيفاتها التي وهبها الله سبحانه وتعالى لها لتمكن من النمو في البيئات اليابسة والمائية. وتسمى النباتات الزهرية أيضاً مغطاة البذور، **الشكل 5-16.**

وتشكل النباتات الزهرية اليوم حوالي 75% من المملكة النباتية. صنف العلماء النباتات الزهرية بطريقة تقليدية إلى ذات الفلقة الواحدة وذات الفلقتين. وتشير الأسماء إلى عدد الفلقات في بذورها؛ فالحادية الفلقة لها فلقة واحدة، وأما الثنائية الفلقة فلها فلقتان.

دورات الحياة تتراوح دورات حياة النباتات الزهرية بين عدة أسابيع أو سنوات. فالنباتات السنوي annual يكمل دورة حياته - أي ينمو من بذرة، ويكبر ويتجدد بذوراً جديدة ثم يموت - في فصل نمو واحد أو أقل، وتضم هذه المجموعة الكثير من نباتات الحديقة ومعظم الأعشاب.

تمتد دورة حياة النبات ثنائي الحول biennial على مدى عامين؛ فهو يتبع الأوراق، وله نظام جذري قوي خلال السنة الأولى، **الشكل 5-17.** وتتخرج بعض النباتات ثنائية الحول - ومنها الجزر واللفت والشمندر - جذوراً لحمية خازنة يمكن جمعها بعد فصل النمو الأول، فإذا لم تجمع فإن جزء النبتة الموجود فوق سطح التربة يموت، لكن الجذور وبعض الأجزاء تحت سطح التربة تبقى حية في حول ثانٍ لأنها تكيفت مع بيئتها. وفي السنة الثانية تنمو السيقان والأوراق والأزهار والبذور، وهكذا تمتد حياة النبات إلى عام آخر وتنتهي بنهاية العام الثاني.

■ **الشكل 5-15** يمكن أن توصف مخاريط المخروطيات الأنثوية بأنها خشبية أو لحمية أو عنبية.



■ **الشكل 5-16** النباتات الزهرية من أكثر أقسام المملكة النباتية انتشاراً.



النمو في السنة الثانية



النمو في السنة الأولى

■ **الشكل 17-5** زهرة الربيع المسائية (Evening primrose) ثنائية الحول وتنج أوراقاً وساقاً تحت الأرض وجذوراً في فصل النمو الأول، وتزهر في السنة الثانية من النمو.

تستطيع النباتات **المعمرة** perennial العيش سنوات عديدة، بما وهبها الحالق سبحانه وتعالى من مميزات. وعادة ما تنتج أزهاراً وبذوراً كل عام. وتستجيب بعض النباتات المعمرة للظروف القاسية بإسقاط أوراقها، وإن تراكيتها فوق سطح الأرض سوف تموت. وهي تستأنف النمو عندما تصبح الظروف البيئية المناسبة للنمو. وتعد أشجار الفواكه والشجيرات وأزهار السوسن والورد والعديد من أنواع النباتات العنبية نباتات معمرة.

ويتم التحكم في دورة حياة النباتات جميعها وراثياً، وهي تعكس التكيفات لمقاومة الظروف القاسية. ومع ذلك فإن دورات حياة النباتات جميعها تتأثر بظروف البيئة.

التقويم 5-3

التفكير الناقد

قوم. رأى مزارع يبيع أشجار الزينة إعلاناً يقول "السرور الأصلع هو طريقك الأفضل لربح سريع. ازرع هذه الأشجار السريعة النمو واحصدها في خمس سنوات فقط". فهل تشكل هذه الأشجار محصولاً مربحاً للمزارع؟ وضح ذلك.

الرياضيات في علم الأحياء أصغر نبات مزهر طوله 1 mm فقط، في حين ينمو أطول نباتات المخروطيات حتى يصل إلى 90 m. فكم مرة يساوي طول هذا النبات طول أصغر النباتات الزهرية؟

فهم الأفكار الرئيسية

1. **الفكرة الرئيسية** صفات مميزات النباتات التي تنتج البذور.
2. قارن بين بذور النباتات المعاشرة وبذور النباتات المغطاة.
3. ميز بين المخروط الذكري والمخروط الأنثوي للمعاشرة البذور.
4. حدد أقسام المعاشرة البذور.
5. قارن بين ذات الفلقة الواحدة وذات الفلقتين.
6. قارن بين الأنواع الثلاثة لدورات حياة النباتات الزهرية.

الخلاصة


- تنتج النباتات الوعائية البذرية بذوراً تحوي الطور البوغي.
- تظهر النباتات الوعائية البذرية عدداً من التكيفات للعيش في بيئات مختلفة.
- هناك خمسة أقسام للنباتات الوعائية البذرية، ولكل قسم صفاتة المميزة.
- النباتات الزهرية إما سنوية أو ثنائية الحول أو معمرة.

مهنة في علم الأحياء: علم حبوب اللقاح الجنائي

الدليل في حبوب اللقاح

يحتوي الغبار والتربة في أغلب الأحيان على كميات كبيرة من حبوب اللقاح والأبoug. كما تعمل الألياف في نسيج الملابس عمل مرشحات تلتقط حبوب اللقاح والأبoug. ويمكن أيضاً أن تحتجز خصلة من الشعر حبوب اللقاح التي تحملها الرياح.

عدد حبوب اللقاح في موقع الجريمة



علم حبوب اللقاح الجنائي يمكن أن تساعد دراسة حبوب اللقاح المحققين على اختصار قائمة المتهمين، مما يجعلها أداة استقصاء قيمة. وأنها تتطلب معرفة واسعة وتدريرياً على جمع العينات وحفظها دون تلوث، لذا فإن علم حبوب اللقاح الجنائي يعد علمًا متخصصاً.

الرياضيات في علم الأحياء

فسّر الرسم البياني افحص الرسم البياني لعدد حبوب لقاح الأشجار. ما نوع حبوب اللقاح التي توقع وجودها في 14/4، وفي 5/19، وفي 2/6؟

يُستعمل علم حبوب اللقاح الجنائي - وهو علم حديث نسبياً - حبوب اللقاح والأبoug دليلاً في القضايا الجنائية لمساعدة الشرطة على حل الجرائم. وفي إحدى القضايا، هو جسم أحد الرياضيين وسحب إلى منطقة حرجية ثم قُتل هناك. فاستجوبت الشرطة متهمًا رئيساً أفاد بأنه كان في المنطقة، لكنه لم يَر الرياضي، ولم يدخل المنطقة الحرجية حيث وجدت الجثة، فهل كان يقول الحقيقة؟

دليل الإدانة تحوي التربة المأخوذة من مسرح الجريمة كميات كبيرة من حبوب لقاح الصنوبر وأبoug الخنشار. وأثبتت المسح الميداني أنه لا يوجد أي موقع آخر قريب يحتوي على أشجار الصنوبر والخنشار. وعندما فتشت الشرطة شقة المتهم وجدت ملابس يعتقد أن المتهم كان يرتديها أثناء ارتكابه الجريمة. وأثبتت الفحص، الذي قامت به عالمة حبوب لقاح وجود حبوب لقاح الصنوبر على ملابس المتهم. وفي النهاية حوكم المتهم، وأدين بارتكاب الجريمة.

علم حبوب اللقاح في موقع الجريمة يجمع المحققون أنواعاً مختلفة من الأدلة من موقع الجريمة، ومن ذلك بصمات الأصابع. فهل يستطيع عالم حبوب اللقاح أن يجمع بصمات الأصابع؟ الجواب، نعم، بطريقة ما. فكل نوع من النباتات البذرية يتتج حبوب لقاح فريدة يمكن النظر إليها على أنها "بصمات" مميزة للنوع، وتساعده في تحديد هويته. وكذلك

مختبر الأحياء

استقصاء ميداني: **كيف تتعرف هوية الأشجار وتصنفها؟**

7. أعد الخطوتين 5، 6 إلى أن تحدد الأشجار المطلوبة كلها في هذا المختبر.

8. راجع جدول البيانات، ثم اختر الخصائص الأكثر فائدة في تعرّف الأشجار. حيث ستتشكل هذه الخصائص أساساً لمفتاح التصنيفي الثنائي التفرع.

9. حدد أي ترتيب في المفتاح التصنيفي الثنائي يبين خصائص الأشجار، ثم صُف كل خاصية منها كتابياً.

10. اعمل مفتاحاً تصنيفياً ثنائياً للتفرع. إن الخصائص التي تصفها في كل خطوة من المفتاح الثنائي هي عادة خصائص مزدوجة متضادة. فمثلاً، قد تقارن في الخطوة الأولى الأوراق الإبرية والحرشفية بالأوراق العريضة.

حل ثم استنتاج

1. فسر البيانات. صُف بناءً على بياناتك التي جمعتها، تنوع النباتات في المنطقة التي درستها.

2. انقد. تبادل المفتاح التصنيفي مع زميلك، واستعمله في تعرّف الأشجار في منطقة الدراسة. ثم قدم اقتراحات لزميلك لتحسين مفتاح التصنيف الخاص به.

3. توقع. كم يكون مفتاح التصنيفي الثنائي مفيداً لشخص يحاول تعرّف الأشجار في منطقة الدراسة؟ وضح ذلك.

4. تحليل الخطأ. ما التغييرات التي يمكن أن تقوم بها لتحسين فاعلية مفتاح التصنيفي الثنائي.

الخلفية النظرية: يستعمل علماء النبات والمهتمون بالنباتات عادة دليلاً ميدانياً ومفتاح تصنيف ثنائي التفرع لتعرّف النباتات. وسوف تستعمل في هذا المختبر، دليلاً ميدانياً لتعرّف النباتات في منطقة ما، ثم ستعد بعد ذلك مفتاحاً تصنيفياً الثنائي التفرع لتحديد النباتات في منطقتك.

سؤال: ما الخصائص التي يمكن استعمالها لتعرّف الأشجار وبناء مفتاح ثنائي التفرع لها؟

المواد والأدوات

- دليل ميداني للأشجار (في منطقتك).
- مسطرة مترية.
- عدسة مكبرة.

احتياطات السلامة

تحذير: ابق ضمن منطقة الدراسة واحذر النباتات والحشرات والمخلوقات الحية الأخرى التي يمكن أن تشكل خطراً.

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. ادرس الدليل الميداني الذي زودك به معلمك، وحدّد طريقة تنظيمه.
3. اكتب قائمة بالخصائص التي تساعدك على تعرّف الأشجار في منطقتك بناءً على قراءاتك للدليل الميداني، وما تعلمته عن خصائص النباتات في هذا الفصل.
4. اعمل جدول بيانات بناءً على القائمة التي أعددتها في الخطوة 3.

5. استعمل الدليل الميداني في تعرّف إحدى الأشجار في منطقتك. وتحقق من ذلك مع معلمك.
6. سجل في جدول بيانات خصائص الشجرة التي حددتها.

مشاركة البيانات

قارن بياناتك ببيانات أخرى جمعها زملاؤك. ما النباتات المشتركة في مفاتيح التصنيف كلها؟

دليل مراجعة الفصل

5



المطويات حدد أقسام النباتات اللاوعائية، موضحاً خواصها، ثم نقشها.

المفردات

١- ٥ النباتات اللاوعائية

المفاهيم الرئيسية

الفكرة **الرئيسة** النباتات اللاوعائية صغيرة وتنمو عادة في البيئات الرطبة.

الثالوس

- توزيع النباتات اللاوعائية محدد بقدرتها على نقل الماء والمواد الأخرى داخلها.
- الحرازيات القائمة نباتات صغيرة تستطيع العيش في بيئات مختلفة.
- تعتمد الحرازيات على الخاصية الأسموزية والانتشار لنقل المواد.
- هناك نوعان من الحشائش الكبدية، هما الثالوسية والورقية.

٢- ٥ النباتات الوعائية الابذرية

الفكرة **الرئيسة** النباتات الوعائية الابذرية عموماً أكبر حجماً، وأفضل تكيفاً للعيش في البيئات الجافة من النباتات اللاوعائية، لأنها تحوي أنسجة وعائية.

الحامل البوغي

النبات الهوائي

الرايزوم

محفظة الأباغ

الكيس البوغي

- للنباتات الوعائية الابذرية أنسجة وعائية متخصصة، وتتكاثر بالأباغ.
- النبات البوغي هو الطور السائد في النباتات الوعائية.
- النباتات الصولجانية والسرخسيات نباتات وعائية لابذرية.

٣- ٥ النباتات الوعائية البذرية

الفكرة **الرئيسة** النباتات الوعائية البذرية من أكثر النباتات انتشاراً على الأرض.

الفلفة


المخروط

السنوي

ثنائية الحول

المعمر

- تُنتج النباتات الوعائية البذرية بذوراً تحوي الطور البوغي.
- تُظهر النباتات الوعائية البذرية عدداً من التكيفات للعيش في بيئات مختلفة.
- هناك خمسة أقسام للنباتات الوعائية البذرية، ولكل قسم صفاته المميزة.
- النباتات الزهرية إما سنوية أو ثنائية الحول أو معمرة.



التقويم

5



5-1


مراجعة المفردات

اكتب جملة تستعمل فيها المصطلح أدناه بصورة صحيحة.

1. الثالوس

ثبت المفاهيم الرئيسية

استعمل الصورة أدناه للإجابة عن السؤال 2.



2. أي الكلمات الآتية لا تصف النبات في الصورة أعلاه؟

a. متعدد الخلايا.

b. لاإعائي.

c. لابذري.

d. ثالوس.

3. أي من الآتي يُعدّ من خصائص الحزازيات؟

a. الأنسجة الوعائية.


b. الأزهار.

c. البذور.

d. أشباه الجذور.

أسئلة بنائية

4. إجابة قصيرة. ارجع إلى الشكل 3-5، وحلّ حاجة النبات البوغي اللاوعائي إلى الاستمرار في اعتماده على الطور المشيجي.



10. أي المصطلحات الآتية تناسب ملء الفراغ في الشكل أعلاه؟

a. لاؤعائية.

b. زهرية.

c. وعائية.

d. متتجة للبذور.

5-3

مراجعة المفردات

ضع المصطلح المناسب من صفحة دليل مراجعة الفصل بدل كل كلمة تحتها خط في الأسئلة الآتية.

17. جذر البذرة يزوردها بالغذاء عندما تنمو.

18. النبات الذي ينمو لعدة فصول هو الرايزوم.

19. تحوي الزهرة في المعّراء البذور تراكيب التكاثر الذكرية والأثنوية.

ثبت المفاهيم الرئيسية

20. أيّ الآتي يضم النباتات التي لها أوراق إبرية أو حرشفية؟

- a. نباتات النيتفايت.
- b. النباتات الزهرية.
- c. النباتات المخروطية.
- d. النباتات السيكادية.

استعمل الصورة أدناه للإجابة عن السؤال 21.



21. أيّ النباتات الآتية تتبع تراكيب تكاثر أنوثوية كما في الصورة؟

- a. المخروطيات.
- b. النباتات الزهرية.
- c. النيتفايت.
- d. النباتات الجنكية.


11. أيّ التراكيب الآتية يحوي تجمعاً من محافظ الأباغ؟

- a. الكيس البوغي.
- b. السعفة.
- c. الساق.
- d. النصل.

12. أيّ الآتي لا يشكّل جزءاً من الخنشار؟

- a. الرايزوم.
- b. البثرة.
- c. ورقة الخنشار أو السعفة.
- d. شبه الجذر.

13. أيّ الصور الآتية تظهر البثرة (الأكياس البوغية)؟



أسئلة بنائية

14. إجابة قصيرة. لخُص خصائص الخنشار.

15. إجابة قصيرة. ميّز بين قسم النباتات المجنحة وقسم النباتات الصولجانية.

التفكير الناقد

16. استنتج المزايا التي يمنحها وجود بثرات الخنشار على السطح السفلي لأوراق الخنشار بدلاً من السطح العلوي.

تقويم إضافي

27. **الكتابة في علم الأحياء** تخيل نفسك واحداً من النباتات التي تعرضت للظروف البيئية القاسية على اليابسة . فما القصص التي يمكن أن تخبرها لأحفادك حول الصعوبات التي واجهتها؟

22. ما الذي يصف أهمية انتشار البذور؟

- a. تنتج جميع أنواع النباتات.
- b. تنشرها في الهواء فقط.
- c. يحدّ من التنافس فيما بين الآباء، وبينها وبين النباتات الناتجة الأخرى (الأبناء).
- d. تنتشر في الصحراe فقط.

أسئلة بنائية

23. نهاية مفتوحة. ما الميزة التكيفية المحتملة لاعتماد النبات المشيجي الوعائي على النبات البوغي؟

24. إجابة قصيرة. اكتب قائمة بالصفات التي قد تستعملها في التمييز بين المخروطيات والنباتات الزهرية.

التفكير الناقد

25. قارن بين المخاريط وحامل الأباغ.

26. استنتاج. لماذا تتكاثر المخروطيات على نحو أكبر من النباتات الزهرية في البيئات الباردة؟




اختبار مقتني


أسئلة الاختيار من متعدد

5. كيف تختلف الحشائش الكبدية عن النباتات اللاوعائية الأخرى؟

- a. ينتقل الماء والمواد المغذية في خلاياها بوساطة الانتشار والخاصية الأسموزية.
- b. تحوي خلاياها نوعاً من البكتيريا الخضراء المزيفة.
- c. تصنف إلى حشائش ثالوسيّة أو ورقية.
- d. تحوي البلاستيدات الخضراء في بعض خلاياها.



استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 6.



7. أي الأرقام في الشكل أعلاه يمثل مكان وجود النباتات السيكادية؟

- 3 .c
- 4 .d

- 1 .a
- 2 .b



استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 1.

1. في أيِّ أقسام النباتات البذرية تتوقع وجود التركيب الموضح أعلاه؟

- a. النباتات الزهرية.
- b. النباتات المخروطية.
- c. النباتات السيكادية.
- d. النباتات الجِنْكية.

2. افترض أن خلية من ورقة خنشار تحوي 24 كروموسوماً. فكم تتوقع أن يكون عدد الكروموسومات في الأباغ؟

- 6 .a
- 12 .b
- 24 .c
- 48 .d

3. أيِّ تركيب في النباتات اللاوعائية تساعد على امتصاص المواد المغذية من التربة؟

- a. البلاستيدات الخضراء.
- b. الصمغ النباتي.
- c. أشباه الجذور.
- d. الطور البوغي.

4. في أثناء الطقس الجاف تتطاير قطع من الحزاز الحقيقي بواسطة الرياح. وعندما تمطر تنمو هذه القطع فتكون نباتاً جديداً. ما العملية التي تمثل هذه الظاهرة:

- a. تعاقب الأجيال.
- b. تكاثر الطور المشيجي.
- c. الطور البوغي.
- d. التكاثر الخضري.

اختبار مقنن

- أوجه الشبه والاختلاف.
15. اذكر صفتين للنباتات اللاوعائية تعوض بهما عن فقدهما للأنسجة الناقلة.
16. لأحد أنواع الخنشار 14 كروموسوماً. ما عدد الكروموسومات في الثالوس الأولي؟ فسر لماذا؟
17. اشرح الفوائد التي تجنيها النباتات اللاوعائية من وجود أشباه جذور رقيقة وتراكيب تشبه الأوراق.
18. تخيل أن صديقَالك يعيش في منطقة باردة أعطاك بذوراً لنبات، فزرعته في منطقة حارة ولكنها لم تنمو. توقع أسباب عدم نمو البذور في المنطقة الحارة.

سؤال مقالٍ

تخيل أنك تخطط لتحويل مساحة من الأرض قرب مدرستك إلى حديقة صغيرة، حيث يمكنك أن تشتري بذوراً لزراعتها، ويمكنك أن تنقل إليها نباتات صغيرة. لكن هدفك الرئيس هو وجود بعض النباتات التي تنمو في الحديقة في كل فصلٍ من السنة.

استعمل المعلومات في الفقرة أعلاه للإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقال.


19. بناءً على ما تعرفه عن النباتات وعن المناخ في المنطقة التي توجد فيها مدرستك، ما أفضل نوع من النباتات يمكن زراعتها؟ صِف خطتك في صورة مقال منظم، ووضح كيف تتلاءم النباتات المختلفة التي تنوي استعمالها مع خصائص الحديقة المطلوبة؟

8. ما الذي يسبق الجيل الأحادي المجموعة الكرومосومية في النباتات الوعائية اللافذرية؟
- a. النباتات الهوائية المتسلقة.
- b. الأطوار المشيجية.
- c. الرايزومات.
- d. الأباغ.

أسئلة الإجابات القصيرة

9. قارن بين الطور البوغي في النباتات اللاوعائية والطور البوغي في النباتات الوعائية اللافذرية.
10. فسر سبب انتشار معظم النباتات المنتجة للأباغ في المناطق الرطبة؟
11. اذكر طريقتين لتكيف بهما النباتات الوعائية اللافذرية أفضل من النباتات اللاوعائية لعيش في البيئات المتغيرة.
12. ما أهمية الجيل المشيجي في النباتات البدنية؟

استعمل المخطط أدناه للإجابة عن السؤال 13.



13. انظر إلى المخطط الموضح أعلاه. ما الكلمة أو العبارة التي تصف نقطتي التفرع A و B؟

14. استعمل خريطة المفاهيم لتنظيم المعلومات المتعلقة بالنباتات السنوية وثنائية الحول والمعمرة من حيث

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	الصف	الدرس/الفصل
1	الصف الرابع	الدرس 1
2	الصف الخامس	الدرس 1
3	الصف السادس	الدرس 1
4	الصف السادس	الدرس 2
5	الصف السادس	الدرس 2
6	الصف السادس	الدرس 2
7	الصف السادس	الدرس 2
8	الصف السادس	الدرس 2
9	الصف السادس	الدرس 2
10	الصف السادس	الدرس 2
11	الصف السادس	الدرس 2
12	الصف السادس	الدرس 2
13	الصف السادس	الدرس 2
14	الصف السادس	الدرس 2
15	الصف السادس	الدرس 2
16	الصف السادس	الدرس 2
17	الصف السادس	الدرس 2
18	الصف السادس	الدرس 2
19	الصف السادس	الدرس 2

تركيب النبات ووظائف أجزائه

Plant Structure and Function

6

الفصل

الفكرة العامة تعود طبيعة التنوع في النباتات إلى اختلاف تراكيبها التي خلقها الله سبحانه وتعالى.

1- 6 خلايا النبات وأنسجته

الفكرة الرئيسية تكون أنسيجة النباتات من خلايا مختلفة.

2- هرمونات النباتات واستجاباتها

الفكرة الرئيسية يمكن أن تؤثر الهرمونات في استجابات النبات لبيئته.

حقائق في علم الأحياء

- يحتوي التوت على تراكيز عالية من مادة الانثوسينين، التي تساعد على محاربة سرطان القولون، سرطان المريء، وسرطان الجلد.

- زرع الإنسان النباتات منذ أكثر من 2000 سنة من أجل الألياف التي توجد في الساق التي تنسج ليصنع منها الأقمشة.

- ما عدا نسبة قليلة من هذه الجذور هناك 80-90 % من جذور النباتات تنمو في الثلاثين سنتمراً العليا من التربة.

مقطع عرضي في ورقة النبات

صورة بالمجهر المركب مصبوغة 75X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●


نشاطات تمهيدية

الهرمونات النباتية وعملها اعمل
المطوية الآتية لساعدك على استقصاء
الهرمونات النباتية وعملها.

الخطوة 1: ضع ثلاثة أوراق من دفتر الملاحظات بعضها فوق بعض على أن تكون حوافها على المستوى نفسه، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 2: اثنِ مجموعة الأوراق عند المنتصف، ثم ثبّتها جيداً بالمكبس لتصنع منها كتيباً من ست صفحات، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 3: ارسم الخطوط الخارجية لنبات ما على الصفحة الأولى، وعنون هذه الصفحة بالهرمونات النباتية. كما في الشكل الآتي:



الخطوة 4: اكتب عنوانين الصفحات الخمس الباقية للمطوية مرتبة على التحول الآتي: هرمون الأكسين، هرمون الجبريلين، هرمون الإثيلين، هرمون السايتو كاينين.

المطويات استعمل هذه المطوية في القسم 2-6. وأنت تقرأ هذا القسم اكتب وصفاً لكل هرمون ووظيفته على الصفحة الخاصة به.

المطويات منظمات الأفكار

تجربة الاستهلاكية

ما التراكيب التي لدى النباتات؟

لدى معظم النباتات تراكيب تمتص الضوء، وأخرى لتحصل على الماء والمواد المغذية. وستفحص في هذه التجربة نباتاً، وتلاحظ تراكيبه التي تساعدته على العيش والبقاء، ثم تصفها.

خطوات العمل

- املاً بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
- افحص بلطف النبات المزروع في الأصيص الذي زرّوك به معلمك. واستعمل عدسة يدوية لتفحص النبات. وضع قائمة بكل نوع تلاحظه من التراكيب.
- انزع النبات برفق من الأصيص، ولاحظ تراكيب النبات التي في التربة، واحذر من تفتيت التربة حول جذور النبات. وسجل ملاحظاتك، ثم أعد النبات إلى الأصيص.
- ارسم رسمياً تخطيطياً لأجزاء النبات، واتّب عليه اسم كل جزء.

التحليل

- قارن قائمتك بقوائم الطلاب الآخرين. ما التراكيب المشتركة في كل النباتات؟
- استنتاج. كيف يمكن أن يرتبط كل تركيب مع وظيفة من وظائف النبات؟
- توقع أنواع التكيفات التركيبية لنبات يعيش في بيئه جافة.

6-1

الأهداف

- تصف الأنواع الرئيسية لخلايا النبات.
- تحدد الأنواع الرئيسية لأنسجة النبات.
- تميّز بين وظائف خلايا النبات وأنسجتها.

مراجعة المفردات

الفجوة Vacuole : هي غرفة محاطة بغشاء، وتقوم بوظيفتي النقل وتخزين الغذاء.

المفردات الجديدة

الخلية البرنشيمية

الخلية الكولنشيمية

الخلية الإسكلرنشيمية

النسيج المولد (المريتني)

الكامبيوم الوعائي

الكامبيوم الفليني

البشرة

الخلية الحارسة

الخشب

الأوعية الخشبية

القصيبات

اللحاء

الأنباب الغربالية

الخلايا المرافقية

النسيج الأساسي

■ **الشكل 1-6** من الصفات الفريدة للخلية النباتية الجدار الخلوي والفجوة المركزية الكبيرة. وتحتوي خلايا النبات كذلك بلاستيدات خضراء يتم فيها عملية البناء الضوئي.

استنتاج: لماذا لا تعدد البلاستيدات الخضراء من مكونات الخلايا النباتية كلها؟



خلايا النبات وأنسجتها

Plant Cells and Tissues


الفكرة الرئيسية تتكون أنسجة النباتات من خلايا مختلفة.




الربط مع الحياة تتكون المبني من مواد متنوعة، ومنها الدرج والأنباب والأبواب وأنظمة الكهرباء التي تُبنى من مواد مختلفة؛ ولكل منها وظيفة مختلفة. وبالطريقة نفسها فإن تركيب النبات المختلفة لها خلايا وأنسجة تعمل بكفاءة تامة لإنجاز وظائف محددة.

خلايا النبات

تستطيع أن تعرف الخلية النباتية في **الشكل 1-6**؛ بسبب وجود جدار خلوي وفجوة مركزية كبيرة لها. كما تحوي خلايا النبات بلاستيدات خضراء، مع العلم بأن هناك أنواعاً مختلفة من خلايا النبات - وكل منها له واحد أو أكثر من التكيفات التي تمكّنه من إنجاز وظائف محددة. وتشكل ثلاثة أنواع من خلايا النبات معظم الأنسجة النباتية، تؤدي وظائف التخزين وإنتاج الغذاء وتتوفر قوة دعامة ومرنة للنبات.

الخلايا البرنشيمية Parenchyma cells خلايا رقيقة الجدران توجد بكثرة في النبات، وتمتاز بمرنونتها. وتشكل الأساس لمعظم تركيب النبات، وهي قادرة على إنجاز عدد كبير من الوظائف، ومنها التخزين والبناء الضوئي وتبادل الغازات والحماية. وهذه الخلايا كروية الشكل، ولكن جذرها مسطحة قليلاً عندما تكون هذه الخلايا متراصّة بعضها إلى بعض، **الجدول 1-6**. ومن صفاتها المهمة أنها قادرة على الانقسام عندما يكتمل نموّها لوجود النواة. فعندما يتلف جزء من النبات تنقسم **الخلايا البرنشيمية** parenchyma cells فتساعد على إصلاح الجزء التالّف.



الجدول 1-6	خلايا النبات ووظائفها	الوظائف
نوع الخلية	مثال	
البرنشيمية	 تحتوي على البلاستيدات	<ul style="list-style-type: none"> التخزين. البناء الضوئي. تبادل الغازات. الحياة. تعويض الأنسجة التالفة أو استبدالها.
الكولنشيمية	 الجدار الخلوي	<ul style="list-style-type: none"> دعم الأنسجة المحيطة. إعطاء النبات المرونة. تعويض الأنسجة التالفة أو استبدالها.
الإسكلرنشيمية	 خلايا حجرية	<ul style="list-style-type: none"> الدعامة. النقل.
	 أنيف	

للخلايا البرنشيمية سمات خاصة، بناءً على الوظيفة التي تقوم بها؛ فبعض الخلايا البرنشيمية تحوي العديد من البلاستيدات الخضراء، **الجدول 1-6**. وتوجد مثل هذه الخلايا على الأغلب في الأوراق والسيقان الخضراء، ويمكن أن تقوم بعملية البناء الضوئي فتنتج الجلوكوز. وبعض الخلايا البرنشيمية - ومنها تلك الموجودة في الجذور والثمار - لها فجوات مركبة واسعة تستطيع خزن المواد المختلفة، ومنها النشا أو الماء أو الزيوت.

الخلايا الكولنشيمية *Collenchyma cells* إذا كنت قد أكلت يوماً نبات الكرفس فإن الخلايا الكولنشيمية مألفة لديك بلا شك. إنها تشكل تلك الخيوط الطويلة التي يمكن أن تسحبها من ساق الكرفس. **والخلايا الكولنشيمية** *collenchyma cells* خلايا نباتية تكون غالباً مستطيلة الشكل، وتوجد على صورة سلاسل أو أسطوانات طويلة تدعم الخلايا المجاورة لها. وكما يبين **الجدول 1-6**، فإن للخلايا الكولنشيمية جدراناً خلوية سميكه على نحو غير متساوٍ. وعندما تنمو الخلايا الكولنشيمية فإن أجزاءها الرقيقة المرنّة تتمدد، مما يجعل النبات قادرًا على الانثناء دون أن ينكسر. والخلايا الكولنشيمية كالخلايا البرنشيمية لديها القدرة على الانقسام عندما يكتمل نموها لوجود النواة.



الخلايا الإسكلرنشيمية Sclerenchyma cells تفتقر إلى السيتوبلازم والنواء والمكونات الحية الأخرى عندما يكتمل نموها، على عكس النوعين السابقين، لكن جدرانها الخلوية السميكة الصلبة تبقى. ويوفر بعض هذه الخلايا الدعامة للنبات، في حين يقوم ببعضها الآخر بوظيفة النقل داخل النبات. وهي تكون النسبة العظمى من الخشب الذي نستعمله في البناء ومنتجات الورق، ونستخدمه وقوًداً. هناك نوعان من **الخلايا الإسكلرنشيمية** sclerenchyma cells، هما: الخلايا الحجرية، والألياف، الجدول 1-6. وربما تكون قد أكلت بعض الخلايا الحجرية؛ فهي تشكّل القوام الخشن لثمار الإيجاص. ويمكن أن تتوزع الخلايا الحجرية على نحو عشوائي خلال النبات، وتكون عادة أقصر من الألياف وذات شكل غير منتظم. إن قساوة غلاف البذور وصلابة قشور الجوز والمكسرات تنتج عن وجود الخلايا الحجرية. وتقوم الخلايا الحجرية بالنقل أيضًا. أما الألياف فتكون إبرية الشكل، ولها جدار سميك وذات فراغ داخلي صغير. وعندما تلتتصق نهايات الألياف معًا تشكّل نسيجاً مرنًا وقوياً. وقد استعمل الإنسان الألياف في صناعة الجبال والأقمصة والخيام والأشرعة منذ قرون، كما في الشكل 2-6.



■ **الشكل 2-6** استعملت خلايا الألياف في الصناعة منذ القدم، في الأقمصة وغيرها من الأدوات.

تجربة 1-6

ملاحظة خلايا النبات

5. ضع قطرة من الصبغة عند إحدى حافتي غطاء الشرحية، ثم ضع منشفة ورقية عند الحافة المقابلة من غطاء الشرحية لسحب الصبغة من تحت الغطاء. استعمل المجهر لدراسة شريحة الكرفس ودون ملاحظاتك.

6. احصل على كمية صغيرة من نسيج ثمرة الإيجاص، وضعها على الشرحية وغطتها بغطاء الشرحية.

7. اضغط بحذر ولكن بقوة، مستعملاً ممحاة قلم على غطاء الشرحية، إلى أن يُصبح نسيج الإيجاص طبقة رقيقة جدًا، واستعمل المجهر لملاحظته. ثم سجل ملاحظاتك.

التحليل

1. حدد نوع خلية النبات المتخصصة التي تلاحظها في كل شريحه.
2. استنتج لماذا توجد أنواع مختلفة من الخلايا في أنسجة البطاطس والكرفس والإيجاص؟

كيف يمكن استعمال المجهر لتمييز أنواع خلايا النبات؟
تفحص الأنواع الثلاثة المختلفة من خلايا النبات بتحضير شرائح لبعض أجزاء النبات الشائعة ودراستها.



تحذير: اليود مادة سامة إذا ابتلاعت، بالإضافة إلى أنه يصبغ الأيدي والملابس.

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.

2. احصل على شريحة بطاطس رقيقة وقطع عرضي لساقي الكرفس من معلمك.

3. ضع شريحة البطاطس على شريحة زجاجية، وأضف إليها قطرة من اليود ثم غطتها بغطاء الشرحية. استعمل المجهر المركب لملاحظة شريحة البطاطس، ودون ملاحظاتك.

4. ضع شريحة الكرفس على شريحة زجاجية وأضف إليها قطرة من الماء، وغطتها بغطاء الشرحية.

الأنسجة النباتية Plant Tissues

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

عالم المروج Turf Scientist

تحتاج ملاعب الجولف والمتزهات وملعب الرياضة مهارات عالم المروج لكي يحافظ على الحشائش التي تنمو فيها. وتشتمل خلفيته التعليمية على دراسة العلوم وإدارة الأعمال.

تعلمت سابقاً أن النسيج مجموعة من الخلايا تعمل معًا للقيام بوظيفة معينة. والنسيج النباتي يمكن أن يتكون من نوع أو أكثر من الخلايا، بناءً على وظيفته. هناك أربعة أنواع مختلفة من الأنسجة في النبات هي: الأنسجة المولدة (المرستيمية)، والأنسجة الخارجية، والأنسجة الوعائية، والأنسجة الأساسية.

النسيج المولد Meristematic tissue تستمر النباتات خلال حياتها في إنتاج خلايا جديدة في أنسجتها المولدة. وتكون **الأنسجة المولدة meristem tissue** مناطق تقسم خلاياها بسرعة. الخلايا المولدة ذات نوى كبيرة وفجوات صغيرة، وتتحول هذه الخلايا في أثناء نموها إلى أنواع عديدة و مختلفة من خلايا النبات. وتوجد الأنسجة المولدة في مناطق مختلفة من جسم النبات.

الأنسجة المولدة القمية Apical meristems نسيج مولد موجود عند قمم الجذور والسيقان، يُنتج خلايا تسبب زيادة في طول النبات، الشكل 3-6، ويسمى هذا بالنمو الابتدائي. ولأن النباتات ثابتة في مكانها فإنه يمكن للسيقان والجذور دخول بيئات مختلفة أو مناطق مختلفة من البيئة نفسها.

الأنسجة المولدة البيئية Intercalary meristems يرتبط أثر هذا النوع من الأنسجة بقص حشائش الحديقة. ويوجد هذا النسيج في موقع أو أكثر على طول سيقان العديد من ذوات الفلقة الواحدة. ويُنتج خلايا جديدة تسبب زيادة في طول الساق أو الأوراق. فلو كان للحشائش نسيج مولد قمي فقط فسوف تتوقف عن النمو بعد عملية القص الأولى، ولكنها تستمرة في النمو؛ لأن لها أكثر من نوع واحد من الأنسجة المولدة.


الأنسجة المولدة الجانبية Lateral meristems تنتج الزيادة في قطر الساق والجذر من النمو الثانوي الذي ينتجه عن نوعين من النسيج المولد الجانبي. ويحدث النمو الثانوي في النباتات البذرية اللازهرية (معراة البذور) وذوات الفلقتين وقليل من ذوات الفلقة الواحدة فقط. يوضح الشكل 3-6 **الكامبیوم الوعائی vascular cambium**، وهو أسطوانة رقيقة من النسيج المولد تمتد على طول الساق والجذر. وهو يُنتج خلايا جديدة تختص بالنقل في بعض الجذور والسيقان. ويوجد في بعض النباتات نسيج مولد جانبي آخر هو **الكامبیوم الفليني cork cambium** الذي يُنتج خلايا تكون جدرًا قاسية. وتشكل هذه الخلايا طبقة خارجية واقية على السيقان والجذور. في حين يشكل نسيج الفلين القلف الخارجي على النباتات الخشبية، ومنها البلوط. تذكر أن خلايا نسيج الفلين هي تلك التي لاحظها روبرت هوك عندما شاهدها بمجهره البسيط.




Meristematic Tissues

الأنسجة المولدة

■ **الشكل 3-6** يحدث معظم نمو النبات من إنتاج خلايا جديدة بواسطة الأنسجة المولدة. فالسيقان والجذور تزداد في الطول بسبب إنتاج خلايا جديدة بواسطة النسيج المولد القمي غالباً. أما الكامبيوم الوعائي للنبات فيتيح خلايا تعمل على زيادة قطر الساق والجذر.



■ **الشكل 4-6** يتكون سطح الورقة من خلايا بشرة متراصة تساعد على حماية النبات، وتنعّم بخمر الماء. ويفتح الثغور وتُغلق للسماح للغازات بالدخول والخروج.




الأنسجة الخارجية Dermal Tissue تكون الأنسجة الخارجية من **البشرة The epidermis** وهي طبقة من الخلايا التي تكون الغطاء الخارجي للنبات، الشكل 4-6. ويمكن أن تُفرز معظم خلايا البشرة مادة دهنية تُكون الكيتوتكل. وقد درست سابقاً أن الكيتوتكل يُساعد على تقليل فقد الماء من النباتات بإبطائه عملية التبخر. كما يمكن أن يساعد الكيتوتكل على منع البكتيريا والمخلوقات الحية الأخرى المسؤولة للأمراض من دخول النبات.

الثغور Stomata قد يكون للنباتات عدة تكيفات في بشرتها. فالبشرة في معظم الأوراق وبعض السيقان الخضراء تحوي الثغور، أي فتحات صغيرة يدخل خلالها ثاني أكسيد الكربون والماء والأكسجين وغازات أخرى. وتسمى الخليةان اللتان تشَكَّلان الثغر **الخليتين الحراسين guard cells**، ويتجزء عن التغيرات في شكل الخليتين الحراسين فتح الثغور أو إغلاقها، الشكل 4-6.

الشعيرات Trichomes تُنتج بعض خلايا البشرة على الأوراق والسيقان نتوءات تشبه الشعر تُسمى **الشعيرات الورقية**، الشكل 5-6. وتعطي الشعيرات الأوراق مظهراً زغبياً قد يساعد على حماية النبات من الحشرات والحيوانات المفترسة. وقد تُطلق بعض الشعيرات مواد سامة عند لمسها؛ كما أن الشعيرات تحفظ النبات بارداً لأنها تعكس أشعة الشمس.

الشعيرات الجذرية Root hairs لبعض الجذور شعيرات جذرية، وهي امتدادات هشة تخرج من خلايا البشرة في الجذر، الشكل 5-6. وتزيد الشعيرات الجذرية المساحة السطحية للجذر، وتمكنه من امتصاص كمية من المواد أكبر مما لو خلا الجذر من هذه الشعيرات.

■ **الشكل 5-6** تساعد التكيفات الخارجية لورقة النبات على البقاء. فالغدد الصغيرة الموجودة على قمم الشعيرات قد تحوي مواد سامة، في حين تزيد الشعيرات الجذرية مساحة سطح الجذر.
استنتاج ما أهمية رئي النباتات المعاد زراعتها؟



الشعيرات الورقية

الشعيرات الجذرية

تجربة استهلاكية

مراجعة بناءً على ما قرأت عن تركيب النبات، كيف تجيب الآن عن أسئلة التحليل.

الأنسجة الوعائية Vascular tissues يُنقل الماء والغذاء والمواد الأخرى خلال جسمك عبر الأوعية الدموية. أما في النباتات فيكون نقل الماء والغذاء والمواد المذابة الوظيفة الرئيسية لنوعين من الأنسجة الوعائية، هما الخشب واللحاء.


الخشب Xylem يدخل الماء الذي يحتوي على الأملاح المعدنية المذابة عبر الجذور إلى النبات. ويستعمل بعض الماء في عملية البناء الضوئي. أما الأملاح المعدنية المذابة فلها وظائف عديدة في الخلايا. وينقل الماء وما به من أملاح معدنية مذابة في النبات عبر نظام الخشب، فيتدفق بشكل مستمر من الجذور وحتى الأوراق. **والخشب xylem** هو النسيج الوعائي الناقل للماء، ويتألف من خلايا متخصصة هي الأوعية الخشبية والقصيبات.

الأوعية الخشبية يتكون الوعاء الخشبي عند نضجه من الجدر الخلوية فقط. إن افتقار هذه الخلايا للنواة والسيتو بلازم عند نضجها يسمح للماء بالتدفق بحرية خلال هذه الخلايا. **الأوعية الخشبية vessel elements** فتشكل أشرطة من الخشب تُسمى الأوعية. ويكون الوعاء الخشبي مفتوحاً عند طرفيه ما عدا شريطاً يشبه الحاجز عند كل فتحة. وفي بعض النباتات تفقد الأوعية جدرانها الطرفية تماماً، مما يسمح للماء والمواد المذابة فيه بالانتقال بحرية من وعاء خشبي إلى آخر أما النوع الآخر من خلايا الخشب فهو القصيبات.


القصيبات النوع الآخر من خلايا الخشب هو القصيبات. **القصيبات tracheids** خلايا أسطوانية الشكل طويلة ذات أطراف مثقبة، وتكون عند نضجها من جدر خلوية فقط. تصفق القصيبات طرفاً لطرف، وتشكل شريطاً يشبه الأنابيب. وللقصيبات جدران طرفية، بخلاف الأوعية الخشبية الناضجة. لذا، تكون القصيبات أقل كفاءة من الأوعية الخشبية في نقل المواد. انظر الشكل 6-6، وقارن بين تركيب القصيبات والأوعية الخشبية. يتكون الخشب من قصيبات بصورة كاملة تقريباً في معّرة البذور (النباتات البذرية اللازهرية). أما في النباتات الزهرية فيتكون الخشب من قصيبات والأوعية الخشبية. ولأن الأوعية الخشبية أكثر كفاءة في نقل الماء والمواد لهذا فإن العلماء يفترضون أن ذلك يفسر سبب نمو النباتات الزهرية في بيئات مختلفة عديدة.

اللحاء Phloem النسيج الرئيس الذي ينقل الغذاء في النبات؛ فهو ينقل السكريات المذابة والمركبات العضوية الأخرى. تذكر أن الخشب ينقل المواد بعيداً عن الجذور، أما **اللحاء phloem** فينقل المواد من الأوراق والسيقان إلى جميع أجزاء النبات.


يوجد في اللحاء خلايا حجرية وألياف، لكنها لا تستعمل في النقل؛ إذ إن هذه الخلايا الصلبة توفر دعماً للنبات فقط. يتكون اللحاء من نوعين من الخلايا: **الأنبوب الغريالية sieve tube member** والخلايا المرافقـة companion cells.



■ الشكل 6 – 6 القصيبات والأوعية الخشبية هما الخلايا الناقلة في الخشب.



تحتوي عناصر الأنابيب الغربالية على السيتوبلازم، ولكنها تفتقر إلى النوى والرايوبوسومات عندما تكون ناضجة.



■ الشكل 6-7 لاحظ وجود ثقوب في الصفائح الغربية الموجودة بين الأنابيب الغربية.

يحيط بالأنابيب الغربية خلايا مرافق، كل منها لها نواة. ويعتقد العلماء أن هذه النواة تساعد الخلية المرافقة الأنابيب الغربية المكتمل النمو المجاور لها بالطاقة اللازمة لعمله وتحكم في عملية النقل داخله. ويوجد في النباتات الراهية تركيب سمى الصفائح الخلوية (الصفائح الغربية) عند طرف كل أنبوب غربي، انظر الشكل 6-7. هذه الصفائح لها ثقوب واسعة تسمح بمرور المواد المذابة من خلالها. يتم عملية أيض بعض الجلوكوز الناتج من عملية البناء الضوئي في الأوراق والأنسجة الأخرى في النبات. لكن بعضه الآخر يتحول إلى كربوهيدرات، وينتقل ليخزن في مناطق التخزين في النبات. وتعد الخلايا البرنشيمية الموجودة في الجذور أمثلة على مناطق التخزين.

الأنسجة الأساسية **Ground tissues** الأنسجة التي لا تدرج تحت الأنسجة المرستيمية أو الوعائية تعد أنسجة أساسية. وتكون **الأنسجة الأساسية** **ground tissues** من خلايا برنشيمية وكولنشييمية وإسكلرنشييمية، ولها وظائف متنوعة، منها البناء الضوئي والخزن والدعامة. ويكون معظم النبات من نسيج أساسى. يحتوي النسيج الأساسي في الأوراق والسيقان الخضراء على خلايا بها العديد من البلاستيدات الخضراء التي تنتج الجلوكوز للنبات. وفي بعض السيقان والجذور والبذور تحتوي خلايا النسيج الأساسي على فجوات كبيرة تخزن السكريات والنشا والزبيوت أو المواد الأخرى. كما تساعد الأنسجة الأساسية في وظيفة الدعامة عندما تنمو بين أنواع أخرى من الأنسجة.

التقويم 6-1

التفكير الناقد

فهم الأفكار الرئيسية

الخلاصة

6. اعمل جدولًا يلخص تركيب الأنسجة النباتية المختلفة ووظائفها، مستعملاً المعلومات الواردة في هذا القسم.
7. قرئ فوائد عدم وجود جدران في نهايات الأوعية الخشبية.
8. **الكتابة في علم الأحياء** ألف قطعة نثرية تصف فيها نسيجاً نباتياً.

1. **الفكرة الرئيسية** صفات الأنواع المختلفة للخلايا النباتية الموجودة في الأنسجة النباتية.
2. قارن بين أنواع الخلايا النباتية.
3. صفات الشعيرات الجذرية وبين وظيفتها.
4. حدّد موقع الكامبیوم الوعائي ووظيفته.
5. قارن بين نوعي خلايا الخشب المتخصصة.

- هناك ثلاثة أنواع من خلايا النبات هي: البرنشيمية والكولنشييمية والإسكلرنشييمية.
- يرتبط تركيب الخلية النباتية مع وظيفتها.
- هناك أنواع عدّة من الأنسجة النباتية، منها المرستيمية والخارجية والوعائية والأساسية.
- يُشكّل الخشب واللحاء الأنسجة الوعائية.

تحدد الأنواع الرئيسية لهرمونات النبات.

تشرح كيف تؤثر الهرمونات في نمو النباتات.

تصف وتحلل الأنواع المختلفة من استجابات النبات.

مراجعة المفردات

النقل النشط: Active transport
حركة المواد عبر الغشاء البلازمي من التركيز الأقل إلى التركيز أعلى، ويحتاج إلى طاقة.


المفردات الجديدة

الأكسين:サイトوكاين

الجبريلين:استجابة الحركة

الإثيلين:الانتحاء

■ **الشكل 6-8** يحفز الأكسين تدفق أيونات الهيدروجين عبر جدار الخلية مما يضعفه، ليدخل الماء وبالتالي تستطيل الخلية.



الربط مع الكيمياء يبني الأكسين استطالة الخلايا. وتشير البحوث إلى أن هذه العملية غير مباشرة في الخلايا الصغيرة، ويشجع كذلك على تدفق أيونات الهيدروجين بوساطة مضخة الهيدروجين من السيتوبلازم إلى جدار الخلية. وهذا يكون وسط أكثر حموضة، مما يضعف الوصلات بين ألياف السيليلوز في الجدار. كما أنه يحفز إنزيمات معينة تساعد على تحليل الجدار الخلوي. ونتيجة لفقدان أيونات الهيدروجين في السيتوبلازم فإن الماء يدخل إلى الخلايا، الشكل 6-6. وينجم عن ضعف جدران الخلايا وزيادة ضغطها الداخلي استطالة الخلية. يختلف تأثير الأكسين في النبات بصورة كبيرة بناءً على تركيزه وموقع عمله.



هرمونات النباتات واستجاباتها

Plant Hormones and Responses

الفكرة الرئيسية يمكن أن تؤثر الهرمونات في استجابات النبات لبيئته.

الربط مع الحياة أن استجابات الجسم المختلفة تسيطر عليها الهرمونات. فعندما تأكل ترسل الهرمونات إشارات لخلايا الجهاز الهضمي؛ لكي تطلق إنزيماتها الهاضمة. ورغم أن النبات ليس له جهاز هضمي يفرز إنزيمات إلا أن الهرمونات تسيطر على نواحٍ متعددة من نموه.

الهرمونات النباتية Plant Hormones

الهرمونات مركبات عضوية تُصنع في جزء معين من المخلوق الحي، وتنتقل إلى جزء آخر؛ حيث تؤثر فيه. ويحتاج المخلوق الحي إلى كمية ضئيلة من الهرمون لإحداث تغيير فيه. هل يفاجئك معرفة أن النباتات تنتج هرمونات؟ يمكن أن تؤثر هرمونات النبات في انقسام الخلايا ونموها وتمايزها. وتشير نتائج الأبحاث إلى أن هرمونات النبات تؤدي عملها بالارتباط كيميائياً مع موقع محدد على الغشاء البلازمي تسمى المستقبلات البروتينية. ويمكن أن تؤثر هذه المستقبلات في إظهار أثر الجينات أو نشاط الإنزيمات أو نفاذية الغشاء البلازمي، كما درست سابقاً في هرمونات جسم الإنسان.

الأكسين Auxin أول هرمون نباتي تم اكتشافه. وهناك أنواع عديدة منه، غير أن إندول حمض الخليك (الأكسين) من أكثرها دراسة، حيث يُسَجُّن في القمة النامية والبراعم والأوراق الصغيرة والأنسجة الأخرى السريعة النمو. وهو يتنتقل عبر النبات من خلية برشيمية إلى أخرى بوساطة نوع من النقل النشط. وقد قيست سرعة انتقال **الأكسين** auxin فوجدها 1 cm/h ، وتنتقل بعض الأكسينات في اللحاء. ويتنتقل الأكسين في اتجاه واحد فقط، بعيداً عن مكان إنتاجه.





■ الشكل 6-9

العلوية: يبطّأ الأكسين نموًّا الأغصان الجانبيّة. السفلية: تقلّل إزالة القمة الناميّة للنبات من كمية الأكسين، ولذا تنمو الأغصان الجانبيّة.

فمثلاً نجد أن الترکیز الذي يشجع نمو الساق يمكن أن يبطّأ نمو الجذر في بعض النباتات. وتنبه الترکیز المنخفضة من الأكسین عادة استطاله الخلیة، فی حين قد تسبّب الترکیز الأعلى أثراً معاكِسَاً. وجود هرمونات أخرى يمكن أن يعدل أثر الأكسین. يسبب وجود الأكسین ظاهرة تسمى سيادة القمة الناميّة، ويكون فيها نمو النبات غالباً نحو الأعلى، ولا يوجد إلا القليل منه في الفروع الجانبيّة. فالأكسین الذي تُنتجه القمة الناميّة يبطّأ نمو الأغصان الجانبيّة. إن إزالة القمة الناميّة للنبات يقلّل من كمية الأكسين الموجودة، وهذا يشجع نمو الفروع الجانبيّة، ويبيّن الشكل 6-9، الفرق الذي تحدثه هذه الإزالة.

تؤثّر الأكسينات في تكوين الثمار، وتؤخر سقوطها. وتشير البحوث إلى أن إنتاج الأكسين يتباين بزيادة نضج الخلية. فعند نهاية فصل النمو تؤدي قلة كميات الأكسين في الأشجار والشجيرات إلى سقوط الثمار الناضجة إلى الأرض، وسقوط الأوراق قبل الشتاء.

ماذا قرأت؟قارن كيف يمكن أن تؤثّر الترکیز المختلفة للأكسين في النبات؟

الجبريلينات Gibberellins تسبّب هذه المجموعة من هرمونات النبات والتي تسمى **الجبريلينات** gibberellins استطاله الخلية، وتحفّز انقسامها، كما تؤثّر في نمو البذور. وتنتقل الجبريلينات في الأنسجة الوعائية. وتفتقر النباتات القصيرة إلى الجينات المنتجة للجبريلينات أو إلى الجينات المنتجة لمستقبلاتها. وعندما تعالج هذه النباتات بالجبريلينات فإن تلك التي تفتقر إلى الجينات المنتجة للجبريلينات ولكن لديها الجينات المنتجة لمستقبلاتها تزداد طولاً. إن معاملة النبات بالجبريلينات يمكن أن يسبّب زيادة في طوله، الشكل 6-10.

الإثيلين Ethylene الهرمون الغازّي الوحيد المعروفة بالإثيلين، وهو مركب بسيط مكوّن من ذرتين كربون وأربع ذرات هيدروجين. ويوجد الإثيلين في الثمار الناضجة والأوراق والأزهار المتتساقطة.



■ الشكل 6-10 هذه النباتات ليس لديها جينات لإنتاج الجبريلينات. لكن النبات الذي على اليمين نما عندما تم معالجته بالإثيلين.

عالم وظائف أعضاء النبات (فيسيولوجي)**النبات (Plant physiologist)** يدرس

مواضيع عديدة، منها كيمياء النباتات وكيف تعمل الهرمونات. يعمل العديد ومنهم في التعليم والبحث في الجامعات.

ولأن الإيثيلين غاز فإنه يمكن أن ينتشر بين الخلايا، كما أنه يتنتقل عبر أووية اللحاء. وعلى الرغم من أن الإيثيلين يمكن أن يؤثر في أجزاء أخرى من النبات إلا أن تأثيره الأساسي هو في الشمار في مرحلة النضج. يجعل الإيثيلين جدران خلايا الشمار غير الناضجة ضعيفة، ويؤدي إلى تحليل الكربوهيدرات المعقدة فيها إلى سكريات بسيطة. وتنتيجة ل تعرض الشمار للإيثيلين فإنها تصبح طرية أكثر، كما تصبح أكثر حلاوة من الشمار غير الناضجة. ولأن الشمار الناضجة معرضة للإصابة بالكدمات بسهولة في أثناء الشحن فإن المزارعين غالباً يشحون ثمارهم غير ناضجة، وما أن تصل إلى وجهتها فإنهم يعالجونها بالإيثيلين، مما يسرّع في نضجها.

السايتوكاينينات Cytokinins هرمونات تحفز النمو، يتم إنتاجها في الخلايا السريعة الانقسام. وهي تنتقل إلى الأجزاء الأخرى من النبات عبر أووية الخشب. تشجع **السايتوكاينينات cytokinins** انقسام الخلايا بتحفيزها على بناء البروتينات الضرورية للانقسام المتساوي وانقسام السيتوبلازم. وحيث إن السايتوكاينينات تزيد معدل النمو فإنها تضاف غالباً إلى الوسط الغذائي المستعمل في زراعة الأنسجة النباتية، وهي تقنية تتم في المختبر لتنمية نباتات من قطع أنسجة نباتية. يؤثر وجود الهرمونات الأخرى، وبخاصة الأكسين، في عمل السايتوكاينينات. فمثلاً ينبع هرمون الأكسين (إندول حمض الخليك) وحده في استطالة الخلايا، ولكن عند إضافته إلى السايتوكاينين فإنه يشجع الانقسام السريع للخلايا، ويؤدي إلى نموّ سريع.

ماذا قرأنا؟ صفح طرفيتين تؤثر بهما الهرمونات في النباتات.

تجربة 6-2

استقصاء استجابة النبات

- كيف تستجيب النباتات للمعبيات الخارجية؟ تحتوي النباتات على مجموعة من الآليات التي تستجيب من خلالها للظروف البيئية المحيطة، ومنها الضوء، وفي هذه التجربة ستتعرف استجابة النباتات للضوء.
4. ضع الأصص الثلاثة في مكان مضاء ثم غطِ اثنان منها بالصناديق الكرتونية بحيث يكون الشق في أحد الصندوقين مواجهًا للضوء، واترك الثالث تحت الضوء مباشرة.
 5. لاحظ النباتات بعد 24 ساعة من التجربة وسجل ملاحظاتك.

التحليل

1. حدد نوع الهرمون الضروري لتحفيز النباتات على تغيير اتجاه نموها.
2. التفكير الناقد. إذا كررت التجربة مرة أخرى، بحيث عملت شقان في وجهين متقابلين من الصندوق الكرتوني أحدهما باتجاه الضوء، ماذا توقع أن يحدث؟

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. ازرع بذور البازلاء في ثلاثة أصص في كل منها 4 بذور، قبل أربعة أيام من بدء التجربة، وسجل ملاحظاتك حولها.
3. أحضر صندوقين من الكرتون قاعدهما مفتوحة، ثم اعمل شقًا أفقيًا في متصف أعلى أحد الأوجه الجانبية لأحدهما بطول 12 cm وعرضه 3 cm

استجابات النبات

هل تساءلت يوماً عن سبب نمو أوراق نباتات المنزل الداخلية متوجهة نحو الشبابيك أو عن سبب تسلق أغصان شجرة العنبر أحد الأعمدة؟ إن هذه الظواهر وأحداثاً كثيرة غيرها - منها نمو الجذور نحو الأسفل، ونمو الساق نحو الأعلى، وإسقاط النباتات لأوراقها، واصطياد أوراق بعض النباتات للحشرات - كلها استجابات من النباتات لبيئتها.

استجابة الحركة Nastic responses إن استجابة النبات التي تسبب الحركة بغض النظر عن اتجاه المنبه تسمى **استجابة الحركة** nastic response. وهذه ليست استجابة نمو، بل هي استجابة مؤقتة، ويمكن تكرارها مرات عديدة.

يشكّل انطلاق أوراق النبتة آكلة الحشرات (فينوس) مثالاً آخر على استجابات الحركة. وتبين البحوث الحديثة أن هذا ينبع عن حركة الماء في نصف من الورقة الصائدة. وتسبب الحركة تمدداً غير متساوٍ إلى أن يتغير الشكل المقوس للورقة فجأة ويطبق المصيدة، كما يعد نمو نباتات تبع الشمس وحركته تبعاً لمكان وجود الشمس من الأمثلة على استجابات الحركة.

استجابات النمو Tropic responses ماذا تلاحظ على النباتات في الجدول 2-6؟ إنها جميعها أمثلة على استجابات النمو أو الانتحاء. **فالانتحاء** tropism هو نمو النبات استجابةً لمنبه خارجي. فإذا كان نمو النبات نحو المنبه سُمي انتحاءً موجباً، وإذا كان النمو بعيداً عن المنبه سُمي انتحاءً سالباً. وهناك أنواع عديدة من الانتحاء تشمل الانتحاء الضوئي والانتحاء الأرضي والانتحاء اللمسي. فالانتحاء الضوئي هو استجابة نمو النبات للضوء، وسببه التوزيع غير المتساوي للأكسجين. ويوجد القليل من الأكسجين في جانب النبات المعرض للضوء، والكثير منه في الجانب بعيد عن مصدر الضوء. ولأن الأكسجين يسبب استطالة الخلايا فإن الخلايا على الجانب بعيد من مصدر الضوء تستطيل، مما يجعل ذلك الجانب من الساق أطول، فتكون النتيجة أن ينحني الساق في اتجاه مصدر الضوء. أما الانتحاء الأرضي فهو استجابة نمو النبات نحو مركز الجاذبية الأرضية. وتُظهر الجذور عادةً انتحاءً أرضياً موجباً. إن نمو الجذور إلى أسفل في التربة يساعد على تثبيت النبات، ويجعل الجذور ملامسةً للماء والأملأح المعدنية. لكن الساق تُظهر انتحاءً أرضياً سالباً عندما تنمو إلى أعلى بعيداً عن مركز الجاذبية الأرضية. وهذا النمو يوزع الأوراق بحيث تتعرّض لأكبر كمية من الضوء. وهناك نوع ثالث من الانتحاء في بعض النباتات، ألا وهو الانتحاء اللمسي. وهذا النوع هو استجابة نمو النباتات للمؤثرات الآلية (الميكانيكية)، ومنها ملامسة جسم ما أو مخلوق ما أو حتى الريح. إن الانتحاء اللمسي واضح في النباتات المتسلقة التي تلتف حول أي تركيب قريب منها كشجرة أو سياج.



الاتجاه النباتات	الجدول 2-6
الاتجاه	المنبه/ الاستجابة
مثال	
	<p>الضوء • النمو نحو مصدر الضوء</p> <p>الانتحاء الضوئي Phototropism</p>
	<p>الجاذبية • موجب: نمو نحو الأسفل • سالب: نمو نحو الأعلى</p> <p>الانتحاء الأرضي Gravitropism</p>
	<p>ميكانيكى • نمو نحو نقطة التماس أو الملامسة.</p> <p>الانتحاء اللمسى Thigmotropism</p>

التقويم 6-2

الخلاصة

- تُسْتَجِعُ الهرمونات النباتية بكميات قليلة.
- قد تؤثِرُ الهرمونات في انقسام الخلية، والنمو وتمايز الخلايا.
- استجابات الحركة لا تعتمد على اتجاه المنبه.
- الانتحاء هو استجابة للمنبهات من اتجاه محدد.

الفكر الناقد

1. **الفكرة الرئيسية** حدد الهرمونات النباتية وصنفها بناءً على تأثيراتها في النباتات.
2. سُمِّ ثلاثة أنواع من الانتحاءات في النباتات وصفها.
3. قارن بين الانتحاءات واستجابات الحركة.
4. صَمِّ نموذجاً يبيّن كيف ينتقل الأكسين من خلية إلى أخرى.
5. احْكُم على أساس علمي على المقوله الشائعة "تفاحة متعرنة واحدة تتلف صندوقاً كاملاً".

اكتشافات في علم الأحياء

النباتات ودفاعاتها



عندما تغذى يرقة الفراشة (اليسروع) على النبات فإن لعب اليرقة يجعل النبات يفرز مواد كيميائية في الهواء تجذب نوع من الدبابير المتطفل - وهو مفترس ليرقة الحشرة.

وقد أكدت الدراسات أن المواد الكيميائية المستعملة في الإشارة ليست مخزونه في النبات السليم. ولكن النباتات تطلق الإشارات الكيميائية بمجرد البدء بقضفهم، كما أنها تحرّرها بكمية أكبر في الوقت الذي يكون فيه الأعداء الطبيعيون أكثر نشاطاً. علماً بأن آكلات الأعشاب المختلفة تطلق أيضاً إشارات كيميائية مختلفة. وعلى الرغم من أن التقدم في التقنيات الكيميائية والتقنيات الحيوية قد سارع في اكتشاف إشارات النباتات الطبيعية التي قد تساعده على حماية المحاصيل إلا أن الدليل يبين أن الإشارات الكيميائية قد تساعده على اكتشاف الغذاء أيضاً.

الكتابة في علم الأحياء

إعلان تصور أنك طورت مبيداً حشرياً جديداً فعالاً لمقاومة الآفات يستعمل دفاعات النباتات الطبيعية. اكتب إعلاناً تصف فيه المنتج، وكيف يختلف عن المنتجات الأخرى المتوافرة؟ وكيف يمنع نمو الآفات المقاومة؟

عندما تفكّر في السلسلة الغذائية قد يتبدّل إلى ذهنك صورة مفترس يطارد فريسة ويقبض عليها. لكن النباتات مستقرة وجالسة، وهي لا تستطيع الهرب من أكل الأعشاب. فهل تدافع النباتات عن نفسها ضد المفترسات؟ إن فهم الدفاعات الكيميائية للنباتات يساعد الإنسان على ابتكار استراتيجيات لحماية المحاصيل والنباتات الأخرى.

دافع أو مت وهب الله سبحانه وتعالى بعض النباتات تكيفات متنوعة، منها الشعيرات، والأشوак المختلفة الحجوم على بشرتها لردع المفترسات. ولبعضها الآخر ترسّبات من السيليكا داخل أوراقها تجعلها صعبة القضم، وقد تتلف أسنان المفترس. تفرز عديد من النباتات مركبات ثانوية ليست مهمة في أيضن النبات، بعض هذه المركبات قد تكون مُرّة الطعم أو سامة للمفترس، وبعضها الآخر قد يؤثّر في هضم المفترس أو نموه أو تكاثره. وقد اكتشف الباحثون عام 2005 م أن جذور نوع من الملفوف تنتج مواد تحمي النبات بقتلها أنواعاً عديدة من البكتيريا في التربة.

هل هي حشرة أم لا؟ من المعروف أن النباتات تميز بين هجوم حشرة وأنواع أخرى من التلف في أجزائها، ومنها التقليم بوساطة المزارع. بعض النباتات تستجيب لمواد كيميائية معينة في لعب الحشرة. فقد وجد مجموعة من علماء الكيمياء الحيوية أنه عندما تقضم حشرة أوراق نبات ما تنشر إشارة كيميائية في جسم النبات كاملاً. وهذه الإشارة تحفز زيادة إنتاج مادة سامة في أوراق النبات جميعها، وليس في الورقة التي قُضمت فحسب.

طلب النجدة عندما تهاجم آكلات الأعشاب بعض النباتات، يطلق النبات إشارات كيميائية (روائح مثلاً) تجذب الأعداء الطبيعيين لأكل الأعشاب هذا. بعض النباتات مثلًا - في الصورة - يرشد بعض أنواع الدبابير المتطفلة إلى يرقة الفراشة (اليسروع) التي قضمت أوراقه.

مختبر الأحياء

الإنترنت: كيف تستجيب النباتات القزمة للجبريلينات؟

6. صمم جدولًا لتسجل بيانات التجربة.
7. تأكد أن معلمك قد أقرّ خطتك قبل أن تبدأ العمل.
8. اجمع المتطلبات التي تحتاج إليها، وجهز بياناتك التجريبية والضابطة.
9. أكمل التجربة كما أقرّها لك معلمك.
10. سجل قياساتك ولاحظاتك عن النباتات في جدول البيانات.
11. مثل بيانيًّا بيانات كل من المجموعتين التجريبية والضابطة.
12. التنظيف والتخلص من الفضلات أعد حمض الجبريليك غير المستعمل إلى معلمك للتخلص منه. وفرّغ زجاجات الرش جيدًا واغسلها بالماء. تخلص من أعواد القطن بطرحها في سلة النفايات، وتخلص أيضًا من النباتات حسب إرشادات المعلم.

حل ثم استنتج

1. حل الرسم البياني الخاص بك، وحدد تأثير حمض الجبريليك في النباتات القزمة.
2. كون فرضية بناءً على نتائجك، وشرح سبب تفزّم نباتات البازلاء.
3. التفكير الناقد. لماذا يُعد التغيير الوراثي - ومنه ذلك الذي يجعل نباتات البازلاء لا تُنتج الجبريلينات - مشكلةً للنباتات في البيئات الطبيعية؟
4. تحليل الخطأ. ما الذي تعتقد أنه حدث في تجربتك وجعل نتائجك غير دقيقة؟ وكيف يمكن أن تغير من خطوات عملك؟

شارك ببياناتك

مراجعة قارن رسومك البيانية برسوم الطلبة الآخرين الذين أكملوا هذه التجربة.

الخلفية النظرية: تفتقر بعض النباتات القزمة إلى جين إنتاج الجبريلين، وبعضها يفتقر إلى مستقبلات الجبريلين. ستتصمم في هذا المختبر تجربة تحديد فيها هل يمكن أن تغير نمط نمو بادرات نبات بازلاء قرم بإضافة حمض الجبريليك (شكل من أشكال الجبريلينات) إليها؟
سؤال: هل تستطيع استعمال الجبريلينات لتغيير نمو نباتات البازلاء القزمة؟

المواد والأدوات

- حمض الجبريليك بتراكيز مختلفة.
- ورق مقوى.
- سائل غسل الأطباق (عامل ترطيب).
- بادرات نبات البازلاء القزمة في قواريرها.
- زجاجات لرش الماء (رشاش ماء).
- أعواد قطن لتنظيف الأذن.
- أكياس بلاستيك كبيرة.
- ماء مقطّر.
- ورقة رسم بياني.
- مصدر ضوء.
- سماد للنباتات.
- مسطرة مترية.

اختر المواد الملائمة لهذا المختبر.

إجراءات السلامة

خطط ونفذ التجربة

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. كُون فرضية تتضمن كيفية تأثير الجبريلينات في نمو نباتات البازلاء القزمة.
3. صمم تجربة لاختبار فرضيتك، وتحقق من شمولها المجموعة الضابطة.
4. ضع قائمة بالعوامل التي يجب أن تبقى ثابتة في مجموعاتك التجريبية والضابطة.
5. حدد طريقة لإضافة حمض الجبريليك إلى النباتات، وقرر كم مرة ستضيفه.



المطويات وضع على الوجه الخلفي للمطوية، ووضح دور الهرمونات النباتية وآلية عملها.

المفاهيم الرئيسية

المفردات

١- ٦ خلايا النبات وأنسجته

الفكرة الرئيسية تكون أنسجة النباتات من خلايا مختلفة.

- هناك ثلاثة أنواع من خلايا النبات، هي: البرنشيمية والكولنشيمية والإسكلرنشيمية.
- يرتبط تركيب الخلية النباتية مع وظيفتها.
- هناك أنواع عدّة من الأنسجة النباتية، منها: المرستيمية والخارجية والوعائية والأساسية.
- يشكّل الخشب واللحاء الأنسجة الوعائية.

الخلية الحارسة

الخشب

الأوعية الحشبية

القصيبات

اللحاء

الأنباب الغربالية

الخلية المراقة

النسيج الأساسي

الخلية البرنشيمية

الخلية الكولنشيمية

الخلية الإسكلرنشيمية

النسيج المولّد (مرستيمي)

الكامبيوم الوعائي

الكامبيوم الفلبيني

البشرة

٢- ٦ هرمونات النبات واستجاباتها

الفكرة الرئيسية يمكن أن تؤثر الهرمونات في استجابات النبات لبيئته.

- تُنتَج الهرمونات النباتية بكميات قليلة.
- قد تؤثر الهرمونات في انقسام الخلية، والنمو وتمايز الخلايا.
- استجابات الحركة لا تعتمد على اتجاه المنبه.
- الانتحاء هو استجابة للمنبهات من اتجاه محدد.

الأكسين

الجبريلين

الإنثيلين

السياتوكاينين

استجابة الحركة

الانتحاء



اللّغة العربية

6

اللّغة العربية

6-1

مراجعة المفردات

ميّز بين كل كلمتين فيما يأتي:

1. الإسكلرنشيسي، الكولنشيسي.
2. الخشب، اللحاء.
3. البشرة، الخلية الحراسة.

تثبيت المفاهيم الرئيسية

4. ما النسيج الوعائي الذي ينقل الماء والأملاح المعدنية المذابة من الجذور إلى الأوراق؟


- a. البشرة.
- b. البرنشيمي.
- c. الخشب.
- d. اللحاء.

5. أي المناطق الآتية تحوي خلايا تنقسم باستمرار؟

- a. القمة النامية.
- b. النسيج الوعائي.
- c. النسيج الخارجي.
- d. النسيج المولد الجانبي.


6. أي الخلايا الآتية تقوم بعملية البناء الضوئي؟

- a. الخلايا الكولنشيسي.
- b. الخلايا البرنشيمي.
- c. الخلايا الإسكلرنشيسي.
- d. الشعيرات الجذرية.



.B

.A



.D

.C

8. أي الصور تظهر فيها الخلايا البرنشيمية؟

- a.
- b.
- c.
- d.

9. أي مما يأتي يشكّل فرقاً بين النباتات البذرية اللازهرية والنباتات البذرية الزهرية؟

- a. وجود الثغور في الجذور.
- b. كمية السكر المخزنة في الجذور.
- c. وجود القصبيات والأوعية.
- d. تركيب الخلايا البرنشيمية.



6

تقويم الفصل

6-2

مراجعة المفردات

اشرح الفرق بين كل زوج من المصطلحات الآتية، ثم وضع
كيف يرتبطان معًا:

15. الهرمون، الأكسين.

16. الإثيلين، الجبريلين.

17. استجابة النمو، استجابة الحركة.

ثبت المفاهيم الرئيسية

18. ما الذي يصف الارتفاع الضوئي الموجب؟

- a. ينمو النبات بعيداً عن مصدر الضوء.
- b. ينمو النبات نحو مصدر الضوء.
- c. ينمو النبات نحو مركز الجاذبية.
- d. ينمو النبات بعيداً عن مركز الجاذبية.

19. أيّ مما يأتي له دور في نقل الجبريلينات عبر النبات؟

- a. الكامبيوم الفليني.
- b. الخلايا الحارسة.
- c. النسيج الوعائي.
- d. القمة النامية.

أسئلة بنائية

استعمل الصورة أدناه للإجابة عن السؤال 10.



10. إجابة قصيرة. اشرح فائدة واحدة لهذه الأوعية.

11. إجابة قصيرة. قارن بين النسيج المولد والنسيج الأساسي.

12. نهاية مفتوحة. هل تعتقد أن تعيش النباتات دون وجود النسيج الأساسي؟ ادعم إجابتك بدليل.


التفكير الناقد

13. ارسم منظماً تخطيطياً يضم كل نوع من الأنسجة الأربع المختلفة، ووظائفها وأنواع الخلايا التي تحتويها.

14. قارن بين الأنسجة الخارجية للنبات وجلدك، وادرك بعض الخصائص التي يجعل جلدك أكثر كفاءة من بشرة النبات.



استعمل الصور أدناه للإجابة عن السؤال 22.



22. أي السيقان في الصور السابقة تظهر انتحاءً أرضيًّا سالبًا؟

C .c

D .d

A .a

B .b

أسئلة بنائية

23. **نهاية مفتوحة.** ناقش ما يؤيد وما ينافق نقل الأكسين من خلية برنسيمية إلى أخرى بدلاً من نقله عبر النسيج الوعائي.

24. **إجابة قصيرة.** ارجع إلى الشكل 8-6 ووضح كيف يسبب الأكسين استطالة الخلية؟

25. **إجابة قصيرة.** أشرح لماذا تكون استجابات الانتفاء دائمًا، في حين تكون استجابات الحركة مؤقتة؟

استعمل الصور للإجابة عن السؤالين 20، 21.



20. ما الذي تبينه هذه الصور؟

a. سيادة القمة النامية.

b. التفزم.

c. سقوط الأوراق.

d. استجابة الحركة.

21. ما الهرمون الذي يسيطر على هذه الحالة النباتية؟

a. الأكسين.

b. الجبريلين.

c. الإثيلين.

d. السايتوكاينين.

6

تقويم الفصل


تقويم إضافي

29. **الكتابة في علم الأحياء** لو تمكنت من تطوير هرمون نباتي جديد، فما الذي تود أن يقدمه للنبات؟ وكيف سيعمل؟ وماذا تسميه؟

أسئلة المستندات

درس فريق من علماء الأحياء تأثيرات درجة الحرارة وثاني أكسيد الكربون في الصنوبر. والرسم البياني أدناه يُمثل كميات القصبيات وأقطارها المختلفة التي نمت عند درجات حرارة مختلفة. استعمل الرسم البياني للإجابة عن السؤالين 30، 31.

درجة الحرارة وقطر القصبيات



30. كيف تؤثر درجة الحرارة في قطر خلايا القصبيات في أثناء نموها؟

31. كيف ترتبط درجة الحرارة وقطر القصبيات مع وظيفة القصبيات؟

التفكير الناقد

26. صمم تجربة تحدد فيها ما إذا كانت نباتات الفول تظهر سيادة للقمة النامية.

27. قوم المقوله الآتية: "البذور التي تُنقع في الجبريلينات تنمو أسرع من البذور التي لم تُنقع".

28. مهن مرتبطة مع علم الأحياء يتبعون على المزارعين أن يستعملوا الهرمونات النباتية لزيادة إنتاج المحاصيل. ترى، هل هذه فكرة صائبة؟ قارن ذلك باستعمال هرمونات النمو التي تستعمل لزيادة إنتاج الحليب في الأبقار.




اختبار مقتني

أسئلة الاختبار من متعدد

4. أي مما يأتي يساهم في نقل الغذاء في الأشجار؟
a. تعاقب الأجيال.
b. الازهار.
c. البدور.
d. الأنسجة الوعائية.
5. أي مما يأتي يعد مثالاً على استجابات الحركة:
a. نبات الخيزران الذي ينمو في اتجاه الضوء.
b. جذور نبات الذرة التي تنمو إلى الأسفل.
c. نباتات تبع الشمس التي تتوجه نحو الشمس.
d. نبات أكل الحشرات الذي ينمو على الأشجار.
6. ما وظيفة النسيج المولد القمي في الجذر؟
a. إنتاج خلايا جديدة لنمو الجذر.
b. مساعدة أنسجة الجذر على امتصاص الماء.
c. حماية أنسجة الجذر في أثناء نموه.
d. توفر الدعامة لأنسجة الجذر.

استعمل الرسم التخطيطي أدناه للإجابة عن السؤال 7.



7. أي التركيب في الرسم أعلاه يتبع خلايا ينجم عنها زيادة طول الجذر؟

3. c

1. a


4. d

2. b

1. ما النسيج الوعائي المكون من خلايا أنبوبية حية تنقل السكر من الأوراق إلى أجزاء النبات الأخرى؟

- a. الكامبيوم.
b. اللحاء.
c. البرنشيمي.
d. الخشب.

استعمل الرسم أدناه للإجابة عن السؤال 2.



2. أي الهرمونات الآتية يحفز عملية نضج الثمار:

- a. الأكسين.
b. السيتوكاينين.
c. الإثيلين.
d. الجبريلين.

3. ما أهمية الخلايا الإسكليرنشيمية في النباتات:

- a. تبادل الغازات.
b. البناء الضوئي.
c. تخزين الغذاء.
d. الدعامة.

اختبار مقنن

سؤال مقالى

الماء مهم لوظائف النبات؛ فهو مثلاً أحد المواد المتفاعلة في تفاعلات البناء الضوئي. يدخل الماء النبات بوساطة الانتشار. ومعظم الماء الذي يدخل إلى النبات يتشر عبر الجذور. لذا فإن الماء يجب أن يكون أعلى تركيزاً في التربة منه في الجذور. وبعد دخول الماء إلى الجذور ينتقل خلال الأنسجة الوعائية إلى الأنسجة التي تحتوي على البلاستيدات الخضراء، ثم ينتشر في الخلايا النباتية كذلك، فيجعلها أكثر صلابة.

استعمل المعلومات في الفقرة أعلاه في الإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقالة.


13. يذبل النبات عندما تكون كمية الماء التي يفقدها أكثر من تلك التي يكتسبها. اشرح دور الخلايا الحارسة في تنظيم كمية الماء في النبات.

أسئلة الإجابات القصيرة

8. سُمِّ ثلاثة أنواع من الخلايا النباتية واذكر وظائفها.
9. اذكر وظائف كل نوع من أنواع الأنسجة الوعائية الموجودة في النباتات، وصفه.

أسئلة الإجابات المفتوحة

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 10.



10. بناءً على خصائص الخلية الموضحة أعلاه، كيف تصنف المخلوق الذي أخذت منه هذه الخلية؟ برر طريقة تصنيف لهذا المخلوق.
11. استنتج كيف تدعم الخلايا الكولتشيمية أنسجة النبات المجاورة لها.
12. انقد الفكرة القائلة إن جذور النباتات في التربة لا تحتاج إلى الأكسجين لتعيش.

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

													الصف
													الدرس / الفصل
													السؤال
2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	الدرس
6-1	6-1	6-1	6-1	6-1	6-1	6-1	6-1	6-2	6-1	6-1	6-2	6-1	الفصل
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	السؤال

التكاثر في النباتات الزهرية

Reproduction in Flowering Plants

7

الـ



الفكرة **العامة** تتضمن دورات حياة النباتات طرائق مختلفة للتکاثر.

1 - 7 الأزهار

الفكرة **الرئيسية** الأزهار هي التراكيب التكاثرية في النباتات الزهرية.

2 - 7 النباتات الزهرية

الفكرة **الرئيسية** يمكن أن تنمو البذور والثمار في النباتات الزهرية من الأزهار بعد الإخصاب.

حقائق في علم الأحياء

- تنمو أكبر زهرة في العالم على النبات الاستوائي *Rafflesia arnoldii*، ولها رائحة تشبه رائحة اللحم المتعفن.

- من أضخم البذور بذرة جوز الهند *Lodoicea maldivica* من النوع والتي تنمو في جزر المالديف، إذ قد تزن أكثر من 20 Kg عند نضجها.

نشاطات تمهيدية

دورة حياة نبات زهري اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم ما تعلمته حول دورة حياة النباتات الزهرية.


المطويات

منظمات الأفكار

الخطوة 1: ضع علامة على منتصف ورقة من دفتر ملاحظاتك. ثم اطوي الحافتين العليا والسفلى على أن تتطابقا وتكونا مساحتين متساويتين، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 2: اطو الورقة نصفين كما في الشكل الآتي:



الخطوة 3: افتح الورقة المطوية، واقطع بالقص عند خطوط الطي لتكون أربعة ألسنة، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 4: استعمل قلم تلوين لرسم مراحل الطور البوغي للنباتات الزهرية على الألسنة الثلاثة وتسميتها. استعمل لوناً مختلفاً لرسم الطور المشيجي على اللسان الرابع ثم عنونه.

المطويات استعمل هذه المطوية في القسم 2-7. في أثناء دراستك لهذا القسم، ارسم مخططًا، وسجل ما تعلمته حول ظاهرة تعاقب الأجيال في النباتات الزهرية.

تجربة الأشجار الالالية

ما تراكيب التكاثر في النبات؟

هل لاحظت أن الأزهار تظهر فجأة أحياناً على الأشجار والشجيرات والنباتات الأخرى في الربيع؟ هل التقطرت يوماً مخروطاً من تحت شجرة صنوبر، وتساءلت لماذا تكون هذه الأشجار المخاريط؟ للنباتات تراكيب تكاثر؛ وهي تتکاثر جنسياً، مثلها مثل الكثير من المخلوقات. أما الحزازيات والسرخسيات والمخروطيات والنباتات الزهرية فلها تراكيب تكاثر فريدة. استقص هذه التراكيب خلال هذه التجربة.

خطوات العمل

- اماً بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
- اعمل جدول بيانات لتسجيل ملاحظاتك وقياساتك للتراكيب التكاثرية في النباتات التي يزودك بها معلمك.
- لاحظ تراكيب التكاثر في المخروطيات وفي نبات زهري، ثم سجل ملاحظاتك في جدول البيانات.

التحليل

- حدّد أوجه التشابه والاختلاف بين تراكيب التكاثر في النباتات.
- صف. بناءً على ما تعرفه عن النباتات، كيف يمكن أن تستعمل النباتات الزهرية الأزهار في تكاثرها؟



الأهداف

- تُحدَّد أجزاء الزهرة ووظائفها.
- تصف الأزهار الكاملة، والناقصة، والأحاديَّة الجنس، والثنائيَّة الجنس.
- تميِّز بين أزهار ذوات الفلقة الواحدة وأزهار ذوات الفلقتين.
- ترتبط بين آلية تلقيح الزهرة وتركيبها.
- توضِّح الفترة الضوئية.

مراجعة المفردات

ليلي Nocturnal: نَسْطُ في الليل فقط.

المفردات الجديدة

السبلة

البتلة

السَّدَادَة

الكريبلة (المتاع)

الفترة الضوئية

الفترة الحرجة

نباتات النهار القصير

نباتات النهار الطويل

نباتات النهار المتوسط

نباتات النهار المحايد

- الشكل 1-7 للزهرة النموذجية أربعة أعضاء، وهي: السبلات والبتلات والأسدية وكربلة واحدة أو أكثر.

الأزهار Flowers


الفكرة الرئيسية الأزهار هي التراكيب التكاثرية في النباتات الزهرية.

الربط مع الحياة هل سبق أن ارتديت طوقاً مُرِّيناً بالأزهار؟ أو لعلك أعطيت والدتك زهرة لتشعرها بمدى تقديرك لها. ربما تستطيع أن تتذَّكر العديد من المواقف التي كانت الأزهار تعني لك شيئاً مهماً. إن الدور الأهم للأزهار في النباتات الزهرية من وجهة النظر العلمية هو التكاثر الجنسي.

أعضاء الزهرة Flower Organs

تُستعمل تعبيرات عديدة لوصف الأزهار، منها البرتقالي والأرجواني الداكن والأبيض وذات الرائحة المنعشة أو العفنة وغيرها. إن لون الأزهار وشكلها وحجمها يحدُّده التكوين الوراثي لكل نوع. ومن المهم أن تذَّكر أن الأزهار تختلف في الشكل والتركيب من نوع إلى آخر.

وللأزهار عدة أجزاء؛ فبعض الأجزاء تقدم الدعامة أو الحماية، ولبعضها الآخر علاقة مباشرة بعملية التكاثر. وللزهرة عموماً أربعة أعضاء، هي السبلات والبتلات والأسدية وكربلة واحدة أو أكثر، **الشكل 1-7**. تحمي **السبلات** sepals برام الأزهار، وقد تبدو في صورة أوراق خضراء، أو تشبه أوراق البتلات. وتكون **البتلات** petals ملوّنة عادة، ويمكن أن تجذب الملقطات، وتتوفر لها موضع للوقوف على الزهرة. وإذا وجدت السبلات والبتلات فإنها تكون عادة متصلة بعنق الزهرة.



المفردات.....	stamens
الاستعمال العلمي مقابل الاستعمال الشائع	anther
Stigma	filament
الميس	pollen grains
الاستعمال العلمي: هو قمة الكربلة في الزهرة حيث يحدث الإخصاب.	الكربلة pistil
أما الاستعمال الشائع: فيشير إلى الحسن والجمال.	stigma

معظم الأزهار لها مجموعة **أسدية** stamens، أي تراكيب تكاثر ذكرية. وتتكون السداة من جزأين، هما: الخيط filament والمتك anther، والخيط هو الذي يحمل المتك ويدعمه. يوجد داخل المتك خلايا تنقسم انقساماً منصفاً، ثم تنقسم انقسامات متساوية لتكون حبوب اللقاح pollen grains. ويكونون في النهاية مشيجان مذكرة أن داخل كل حبة لقاح. **الكربلة** pistil هي عضو التكاثر الأنثوي، ويوجد كربلة واحدة أو أكثر في مركز الزهرة. وتكون من ثلاثة أجزاء، هي: الميس stigma والقلم style والمبيض ovary. ويشكل الميس قمة الكربلة، وهو المكان الذي يحدث فيه التلقيح. أما القلم فهو الجزء الذي يربط الميس بالمبيض، ويكونون داخل كل نبات مشيجي مؤنث بويضة ناضجة.

تكيفات الزهرة Flower Adaptations

إن أعضاء الزهرة التي وصفت في الفقرة السابقة توجد في معظم الأزهار. لكن العديد من الأزهار لها تكيفات في عضو أو أكثر من هذه الأعضاء. ويصنف العلماء الأزهار في ضوء هذه التكيفات.

الفرق التركيبية Structural differences تسمى الأزهار التي لها سبلات وبتلات وأسدية وكربلة واحدة أو أكثر أزهاراً كاملة complete. أمّا الأزهار التي تفتقر إلى واحد أو أكثر من هذه الأعضاء فهي أزهار ناقصة incomplete، فأزهار الزنجيل البرية مثلاً أزهار ناقصة؛ لأنها ليس لها بتلات. ومن الصفات الأخرى للأزهار أنها: ثنائية الجنس perfect، ومنها نباتات تباع الشمس، أو أحادية الجنس imperfect، ومنها نباتات النخيل. فالأزهار التي لها أسدية وكربل تسمى ثنائية الجنس. ولبعض النباتات - ومنها الخيار والقرع - أزهار أحادية الجنس؛ إذ إن لها إما أسدية أو كرابيل نشطة تؤدي وظائفها. وتُطلق الأزهار الذكرية - أي التي تحوي أسدية - حبوب اللقاح. وتشمل الشمار بعد الإخصاب في الأزهار الأنثوية، والمحتوية على الكرابل. يختلف عدد أجزاء الزهرة من نوع إلى آخر. لكن عدد أجزاء الزهرة يستعمل للتمييز بين كل من ذوات الفلقتين وذوات الفلقة الواحدة. فعندما يكون عدد البتلات أربعًا أو خمسًا أو مضاعفاتهما يكون النبات عادة من ذوات الفلقتين. وعادة يكون عدد الأعضاء الأخرى كالسبلات والكرابل والأسدية أربعة أو خمسة أو مضاعفاتهما أيضًا.



تجربة علمية
كيف تنمو الزهرة؟

ارجع إلى دليل التجارب العلمية على منصة عين الإثرية



ذوات الفلقة الواحدة



ذوات الفلقتين



فالأفراد العائلة الخردلية مثلاً أزهار لها أربع سبلات وأربع بتلات، الشكل 2-7. أمّا ذوات الفلقة الواحدة فلها أعضاء زهرية عددها ثلاثة أو مضاعفاتها، كما في الشكل 2-7. فمثلاً زنابق النهار لها ثلاثة سبلات وثلاث بتلات وست أسدية.

آليات التلقيح **Pollination mechanisms** لأنواع النباتات الزهرية المختلفة أزهار متميزة في الحجم والشكل واللون وترتيب البتلات. ويرتبط العديد من هذه التكيفات التي أبدعها الخالق عز وجل مع التلقيح.

التلقيح بوساطة الحيوانات **Animal pollination** للعديد من الأزهار التي تُلقح بوساطة الحيوانات ألوان زاهية، الشكل 3-7، ولها رائحة قوية، أو تنتج سائلًا حلو المذاق يسمى الرحيق. وعندما تنتقل الحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى من زهرة إلى أخرى باحثة عن الرحيق فإنها تحمل معها حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى. كما تجمع حشرات أخرى حبوب اللقاح غذاءً لها. فالألوان الناصعة والرائحة الطيبة للأزهار التفاح والورد والليليك *Lilacs* تجذب حشرات، ومنها النحل والفراش والخنافس والدبابير. والأزهار البيضاء أو الصفراء الفاتحة أكثر وضوحاً عند الغسق وفي الليل، وتتجذب الحيوانات لليلة المعيشة، ومنها العث والخفافش. وتتجذب الرائحة التي تشبه رائحة الفاكهة لبعض الأزهار الخفافش الذي يتغذى على الفواكه، ويساعد في تلقيح أزهارها. وتتجذب زهرة رافليسيا *Rafflesia* - التي لها رائحة اللحم الفاسد - إليها الذباب الملقط. ولا تفرز الأزهار التي تُلقح بوساطة الطيور الكثير من الروائح عادةً لأن الطيور لها إحساس محدود بالروائح عادةً، وهي غالباً تحدد موقع الأزهار بالنظر.

التلقيح بوساطة الرياح **Wind pollination** الأزهار التي تفتقر إلى الأجزاء الزهرية ذات المظهر الواضح أو التي تفرز الروائح القوية تُلقح عادةً بفعل الرياح، الشكل 3-7. وتنتج هذه الأزهار كميات كبيرة من حبوب اللقاح الخفيفة الوزن، مما يساعد على ضمان سقوط بعض حبوب اللقاح على مياسم أزهار من النوع نفسه. وتقع أسدية الأزهار التي تلقطها الرياح غالباً تحت مستوى البتلات، مما يعرضها للرياح. وتكون مياسم هذه الأزهار عادةً كبيرة وواسعة، مما يضمن سقوط حبوب اللقاح عليها واستقرارها. وتُلقح أزهار معظم الأشجار والمحشائش بوساطة الرياح.

■ **الشكل 2-7** يمكن تعرّف بعض النباتات على أنها ذوات فلقة أو ذوات فلقتين بوساطة أزهارها.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

مُهْجِنُ النَّبَاتَاتِ

إن معرفة تركيب الزهرة وآليات التلقيح والوراثة ضروري لهذه المهنة، حيث يجري مُهْجِنُ النَّبَاتَاتِ تهجيناً انتقائياً، بأن يختار نباتات ذات صفات مرغوب فيها ويزاوج بينها، ثم يسجل النتائج.

التلقيح

Pollination

■ **الشكل 3 – 7** للأزهار عدة تكيفات لضمان التلقيح. فحبوب اللقاح يمكن أن تحملها الرياح أو الحيوانات. وعند تناول الحيوان غذاء يمكن أن تلتصق به حبوب اللقاح، فينقلها إلى الزهرة التي ينتقل إليها بعد ذلك.



بعثر الرياح حبوب لقاح
البلوط الخفيفة الوزن التي
يمكن أن تسبب الحساسية
للعديد من البشر. فالأزهار
الدانية تتسلق نحو الأسفل،
وتتارجح مع الرياح.



ينجذب الطائر الطنان إلى الأزهار الحمراء،
ويصل منقاره الطويل إلى الرحيق في قاعدة
الأزهار. بعض أصباب الأزهار الصفراء
والبرتقالية تعكس ضوءاً غير المرئي لعين
الإنسان. ولكن النحل وحشرات أخرى
تميّزه.



عندما يحل الظلام يجعل الرائحة والألوان
الفاتحة العث أكثر قدرة على تحديد موقع
بعض الأزهار.



لنسبة الجيفية رائحة متننة تجذب إليها الذباب
والخنافس الملقة.



تجذب الأزهار التي تنتج الرحيق الحشرات
الملقة في أثناء بحثها عن الغذاء غالباً.



■ **الشكل 4 – 7** ينقل النحل والحشرات الأخرى حبوب اللقاح من زهرة ذكيرية إلى زهرة أنثوية، أثناء تنقلها بينهن، فيتم التلقيح وت تكون اللاقحة.

حدّد. هل زهرة نبات القرع أحادية أم ثنائية الجنس؟

التلقيح الذائي والخلطي self and cross pollination إن الأزهار الذاتية التلقيح يمكن أن تلقيح نفسها، كما يمكن أن تلقيح زهرة أخرى على النبات نفسه. وبعض الأزهار يجب أن تلقيح خلطياً، حيث تستقبل الأزهار حبوب اللقاح من نبات آخر. ويُعد هذا واحداً من الأسباب التي تجعل الملحقات تؤدي دوراً مهماً في تكاثر النباتات الزهرية. وتقديم الملحقات طريقة لنقل حبوب اللقاح إلى الأزهار التي يجب أن تلقيح خلطياً، كما تضمن أيضاً هذه الملحقات تكاثر الأزهار الأحادية الجنس، ومنها القرع، الشكل 4-7.

الفترة الضوئية Photoperiodism لاحظ علماء النبات أن بعض النباتات تزهر في أوقات معينة من السنة فقط. لذا قدموا التجارب لتفسير هذه الظاهرة. وقد انصب اهتمام الباحثين على عدد ساعات ضوء النهار التي تتعرض لها النباتات. لكن الباحثين اكتشفوا لاحقاً أن العامل الحاسم الذي يؤثر في الإزهار كان عدد ساعات الظلام المتواصلة التي يتعرض لها النبات، لا عدد ساعات الضوء التي يتعرض لها. ويُسمى هذا العامل بعامل **الفترة الضوئية photoperiodism**. كما عرف العلماء أيضاً أن بداية نمو الزهرة في كل نوع من النبات هو استجابة لعدد من ساعات الظلام، وتسمى **الفترة الحرجة The critical period** للنبات. وتصنف النباتات الزهرية في واحدة من المجموعات الأربع الآتية - نباتات النهار القصير، ونباتات النهار الطويل، ونباتات النهار المتوسط، والنباتات المحايدة لطول النهار. ويعتمد هذا التصنيف على الفترة الحرجة. ويعكس الاسم هنا التركيز الأصلي للباحثين، أي عدد ساعات ضوء النهار. ومن المهم أن نتذكر أن المصطلح الأكثر دقة لنباتات النهار القصير مثلاً هو نباتات الليل الطويل. انظر الشكل 5-7 في أثناء قراءتك لوصف هذه النباتات.

تجربة استهلاكية

مراجعة بناءً على ما قرأته حول تلقيح النبات، كيف تجيب الآن عن أسئلة التحليل.

الفترة الضوئية لنباتات النهار القصير **نباتات النهار القصير short-day plants** عندما تتعرض يومياً لعدد معين من ساعات الظلام أكبر من الفترة الحرجة لها. فمثلاً قد يزهر نبات النهار القصير عندما يتعرض لـ 16 ساعة من الظلام. وتزهر نباتات النهار القصير في الشتاء والربيع والخريف عندما يصبح عدد ساعات الظلام أكثر من عدد ساعات الضوء. ومن نباتات النهار القصير التي قد تعرفها البنفسج والبونسييه والتيوليب *Tulips* و *Poinsettia*.

الفترة الضوئية لنباتات النهار الطويل **نباتات النهار الطويل long-day plants** عندما تكون ساعات الظلام أقل من الفترة الحرجة، حيث تزهر هذه النباتات في الصيف عادة، ومنها الخس والسبانخ والبيتونيا *Petunias* والبطاطس والنجمة *Aster* وغيرها.

نباتات النهار القصير	نباتات النهار الطويل
	
أقصر من الفترة الحرجة	أطول من الفترة الحرجة
النباتات المحايدة	نباتات النهار المتوسطة
	
ليل قصير	ليل طويل
فترة حرجة متوسطة	أطول أو أقصر من الفترة الحرجة

■ الشكل 5 – 7 تحدد الفترة الحرجة للنبات موعد إزهاره.

الفترة الضوئية لنباتات النهار المتوسط عديد من نباتات المناطق الاستوائية من **نباتات النهار المتوسط intermediate-day plants**. وهذا يعني أنها سترث ما دام عدد ساعات الظلام ليس كبيراً ولا صغيراً. ومن أمثلة هذه النباتات قصب السكر وبعض الحشائش.

الفترة الضوئية للنباتات المحايدة **Day-neutral photoperiodism** تزهر بعض النباتات بغض النظر عن عدد ساعات الظلام ما دامت تستقبل كمية كافية من الضوء اللازم لعملية البناء الضوئي ودعم النمو. إن النبات الذي يزهر في مدى فوق عدد ساعات الظلام هو **نبات النهار المحايد day-neutral plant**. ومن هذه النباتات الحنطة السوداء والذرة والقطن والطماطم والورد.

تجربة 7-1

المقارنة بين تراكيب الأزهار

كيف تختلف تراكيب الأزهار؟ إن إلقاء نظرة سريعة على حديقة أزهار أو محل بيع الأزهار تبين أن هناك تنوعاً واسعاً من الأزهار.

استقص كيف تختلف هذه الأزهار من نوع إلى آخر؟

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.

التحليل

2. اعمل جدول بيانات لتسجيل الملاحظات والقياسات المتعلقة بتراكيب الأزهار.

3. احصل على الأزهار المطلوبة لهذه التجربة من معلمك.

التحليل

1. قارن بين تراكيب الأزهار التي درستها.

2. استنتج. لماذا كانت بتلات الأزهار مختلفة الألوان؟

3. اقترح تفسيراً لاختلاف حجوم هذه الأزهار وأشكالها.

التقويم 7-1

- التفكير الناقد**
5. صمم تجربة لعمل أزهار لنباتات النهار الطويل في أثناء الشتاء.
 6. قوم أهمية الملقيّحات للأزهار في الأزهار الأحادية الجنس.
 7. **الكتابة في علم الأحياء** اكتب وصفاً من وجهة نظر إحدى الملقيّحات في أثناء زيارة لزهرة.

فهم الأفكار الرئيسية

1. **الفكرة الرئيسية** قارن بين وظائف كلٌ من الأجزاء الأربع للزهرة.
2. صف خصائص زهرة كاملة من نباتات ذات الفلقة الواحدة وزهرة كاملة من نباتات ذات الفلقتين.
3. قارن بين الأزهار الكاملة والناقصة.
4. توقع نوع الفترة الضوئية التي يمكن أن تتسّج أزهاراً في هذا الوقت من السنة.

الخلاصة

- الزهرة الكاملة لها سبلات وبتلات وأسدية وكربلة واحدة أو أكثر.
- يختلف شكل الأزهار من نوع إلى آخر.
- تميز بعض تراكيب الأزهار: نباتات ذات الفلقة الواحدة عن نباتات ذات الفلقتين.
- تجذب تكيفات الأزهار الملقيّحات بصورة أكبر.
- يمكن أن يؤثر طول الفترة الضوئية في موعد الإزهار.



7-2

الأهداف

- تتابع دورة حياة نبات زهري.
- تصف عملية الإخصاب وتكوين البذرة في نبات زهري.
- تشخص إنبات البذرة.

مراجعة المفردات

الهيكل الخلوي Cytoskeleton: ألياف البروتين الطويلة الرفيعة التي تشكل هيكل الخلية.

المفردات الجديدة

النواتين القطبيتين
الإندوسيبروم
غلاف البذرة

الإنبات

الجزير

السويقة تحت الفلقية

الكُمون (الراحة)

النباتات الزهرية

Flowering plants

الفكرة الرئيسية يمكن أن تنمو البذور والشمار في النباتات الزهرية من الأزهار بعد الإخصاب.


الربط مع الحياة هل تعدد شمار الطماطم من الخضروات أو من الفواكه؟ علماً بأن الطماطم ليست حلوة المذاق. قرر في أثناء قراءتك لهذا القسم ما إذا كانت الطماطم من الخضروات أو من الفواكه.

دورة الحياة

إن النباتات الزهرية هي الأكثر تبايناً وتوزيعاً بين مجموعات النبات، وهي فريدة لأن لها أزهاراً. للنباتات الزهرية دورات حياة متميزة، وهي - كغيرها من النباتات - تظهر تعاقباً للأجيال. الجيل البوغي في النباتات الزهرية هو السائد، ويدعم الجيل المшиجي، وهي بهذا تشبه المخروطيات. ومع ذلك فإن هناك عديد من التباينات في عمليات تكاثر النباتات الزهرية.

نمو الطور المşıيжи Gametophyte development يبدأ نمو الطور المşıيжи الذكري والأثني في النباتات الزهرية في الزهرة غير المكتملة النمو. فالنباتات الزهرية مختلفة الأبواغ، أي أن الكرابيل تنتج الأبواغ الأنوثية الكبيرة، في حين أن الأسدية تنتج الأبواغ الذكرية الصغيرة. تنقسم خلية متخصصة في البوياضة داخل الكربلة انقساماً منصفاً، فتنتج أربعة أبواغ كبيرة، تتحلل ثلاثة منها وتضمحل عند فتحة التقير، ثم تنقسم نواة البوغ الكبير المتبقية (البعيدة عن التقير) ثلاثة انقسامات متساوية دون أن ينقسم السيتوبلازم، وتتواصل هذه الانقسامات المتساوية، وينمو البوغ الكبير إلى أن يصبح مكوناً من خلية واحدة كبيرة داخلها ثمانية نوى، أربع منها عند كل طرف. تنتقل نواتان منها نحو المركز، وتشكل أغشية حول النوى الست الأخرى، الشكل 6-7. فت تكون النتيجة تكوين ثلاث نوى عند كل جانب من جانب الخلية، نواتان منها في المركز تُسمى **النواتين القطبيتين** polar nuclei، وتتحول واحدة من النوى الثلاث الموجودة قرب فتحة التقير إلى البيضة. إن الخلية التي تحوي البيضة والنوى السبع تمثل الطور المşıيжи الأنثوي الناضج.

■ **الشكل 6 - 7** تنتج الأبواغ الكبيرة عن انقسام منصف، في حين تنتج البوياضة عن انقسام متساوٍ. لهذا النبات 12 كروموسوماً. استنتاج. عدد الكروموسومات في البوياضة.



قد يحدث نمو الطور المشيحي الأنثوي والطور المشيحي الذكري في الوقت نفسه، وقد لا يحدث. أما في المتك فتنقسم خلايا متخصصة انتقاماً منصفاً، وتنتج أبواجاً صغيرة، وتنقسم النواة في كل بوج ذكري صغير انتقاماً متساوياً ينبع عنه نواتان إحداهما كبيرة تسمى النواة الأنبوية (الخضريّة)، والأخرى تسمى النواة المولدة (التناسليّة). ويتكوّن جدار خلية سميك واقِ حول البوج الصغير. وعند هذه المرحلة يُعد البوج الصغير حبة لقاح أو طوراً مشيحيّاً غير ناضج. يمكن أن يتعرّف العلماء فصيلة النباتات أو الجنس الذي تنتهي إليه حبة اللقاح بوساطة الطبقة الخارجية المميزة لجدره الخلوي. إن هذه الصفة مهمة للعلماء والمحققين الجنائيين. فقد استعمل علماء الطب الجنائي لأكثر من خمسين عاماً الدليل المتوافر من حبوب اللقاح لتحديد مكان حدوث بعض الجرائم التي ارتكبت وزمانها. ويمكن لعلماء الآثار القديمة أن يتبعوا التاريخ الزراعي لمناطق محددة باستعمال أحافير حبوب اللقاح.

التلقيح والإخصاب Pollination and fertilization تعلمت في مطلع هذا الفصل أن تكيفات الأزهار المختلفة قد تساعده على ضمان الانتقال الناجح لحبوب اللقاح من المتك إلى المياسم في الكرابيل. وعندما يحدث التلقيح تكون حبة اللقاح أنبوب اللقاح وهو امتداد من حبة اللقاح - وينمو هذا الأنبوب عادة نحو الأسفل داخل القلم في اتجاه المبيض. وتنتقل نواتان حبة اللقاح في أنبوب اللقاح نحو البوiese.

الربط الكيميائي قد يحتوي الجدار المزخرف لحبة اللقاح على مركبات تتفاعل مع المواد الكيميائية لميسّم الكربلة. يمكن أن تحفز هذه التفاعلات نمو أنبوب اللقاح أو تبيّنه. فمثلاً في بعض أنواع الخشخاش يتلف تفاعل كيميائي تكوين الهيكل الخلوي لحبة اللقاح، مما يبطّن نمو أنبوب اللقاح، كما تمنع آليات مختلفة حبوب اللقاح غير المتطابقة مع الميسّم من إنتاج أنبوبة لقاح نشطة. عندما تستقر حبة اللقاح متطابقة على الميسّم فإنها تمتّص مواد من الميسّم، ويفيد أنبوب اللقاح في التشكّل، الشكّل 7-7، فتوجه النواة الأنبوية نمو هذا الأنبوب، وإن كانت البحوث الحديثة قد أشارت إلى أن نمو أنبوب اللقاح نحو البوiese هو استجابة جذب كيميائية. وفي بعض النباتات وجد أن الكالسيوم يؤثّر في اتجاه نمو أنبوب اللقاح. يعتمد طول أنبوب اللقاح على طول الميسّم، وقد يتراوح بين عدة سنتيمترات إلى أكثر من 50 cm في بعض نباتات الذرة. وتنقسم النواة المولدة في أثناء نمو أنبوب اللقاح انتقاماً متساوياً، فتشكّل بذلك نواتي مشيحيّن مذكرين ليس لهما أسواط. وتتصبّح حبة اللقاح الآن طوراً مشيحيّاً ذكريّاً ناضجاً. وعندما يصل أنبوب اللقاح إلى البوiese فإنه يمر عبر فتحة النمير ويحرّر نواتي المشيحيّن المذكرين إلى المبيض، فتتحد إحدى النواتين مع البيضة مكونة اللاقحة، أي الطور البوغي الجديد. أمّا نواة المشيح المذكّر الثانية فتتحد مع النواتين القطبيتين في المركز لتشكّل خلية ثلاثة المجموعة الكروموسومية (3n) أو الإندوسيبرم.

المفردات

مفردات أكاديمية

Compatible متطابق مع

قابل للعمل مع بعضها.

لأن حبوب لقاح الذرة الزراعية

متطابقة مع حبوب لقاح الذرة الحلوة،

لذا يجب ألا يزرع المحسولان أحدهما

قريب من الآخر لكي لا تتفاوت الذرة


الحلوة أو تتلوث.

المطويات

ضمّن مطويتك معلومات من

هذا القسم.


■ الشكل 7 – 7 تتضمن دورة حياة نبات زهري، مثل الخوخ، طوراً مشيجياً وآخر بوغياً. ويُحيط الطور المشيجي الذكري والأنثوي بأنسجة الطور البوغي.



ونظرًا للحدث العملي إخضاب في بويضة النباتات الزهرية فإن الإخضاب يسمى إخضاباً مزدوجاً، الشكل 8-7. يحدث الإخضاب المزدوج في النباتات الزهرية فقط. وتنمو بعد الإخضاب كلّ من البويضة لتكون البذرة والمبيض ليكون الثمرة.

نتائج التكاثر Result of Reproduction

■ الشكل 8 – 7 يتّسّع عن الإخضاب المزدوج تكوين أنسجة ثلاثة المجموعة الكروموسومية.




يُعد الإخضاب بدايةً فقط لعملية طويلة تنتهي بتكوين البذرة. والبذرة في النباتات الزهرية جزء من الثمرة التي تتكون من المبيض، وأحياناً من أجزاء أخرى من الزهرة.

نمو البذرة والثمرة Seed and fruit growth يبدأ الطور البوغي حياته على صورة بويضة مخصبة، أو خلية ثنائية المجموعة الكروموسومية ($2n$). الانقسامات المتعددة للخلية تُنتج مجموعة من الخلايا تنموا أخيراً، فتصبح جنيناً طولي الشكل له فلقة واحدة في نباتات ذات الفلقة الواحدة، أو له فلقتان في نباتات ذات الفلقتين. أما الخلية الثلاثية المجموعة الكروموسومية التي تشكّلت نتيجة للإخضاب المزدوج فتتم بعدة انقسامات، وتشكّل نتيجة لذلك نسيج يسمى **الإندوسيرم endosperm** يوفر التغذية للجنين. وتحدث هذه الانقسامات بسرعة في البداية ودون تكون جدار خلوي. أما الجدر الخلوي فتتكون عندما ينضج الإندوسيرم. يشَكّل الإندوسيرم في بعض ذات الفلقة الواحدة المكوّن الأساسي للبذرة، ويشكّل معظم كتلتها. فتخيل جوز الهند مثلًا أحادي الفلقة، ويشكّل السائل الموجود داخل الثمرة الطازجة إندوسيرم سائلاً، أي خلايا دون جدر خلوي. وفي ذات الفلقتين تمتّص الفلقتان معظم نسيج الإندوسيرم في أثناء نضج البذرة.

■ **الشكل 9-7** تختلف بذور نباتات ذات الفلقة الواحدة عن بذور نباتات ذات الفلقتين.

حده مصدر غذاء الجنين في كل بذرة.



لذا فإن الفلقتين في هذه المجموعة من النباتات توفر معظم الغذاء للجنين. ويبيّن الشكل 9-7 أمثلة لبذور ذات الفلقة وذوات الفلقتين. تتصلب الطبقات الخارجية للبوبيضة وتشكّل نسيجاً واقياً يسمى **غلاف البذرة** seed coat، في أثناء نضج الإنديسبيرم. وربما تكون قد لاحظت غلاف بذرة الفاصولياء أو الباذلاء في أثناء أكلهما. إن غلاف البذرة هو الطبقة الرقيقة التي تسليخ أو تشقق عند نقع البذور بالماء. هل أكلت يوماً ثمرة الطماطم أو الخيار، ولا حظت عدد البذور داخلها؟ قد يحتوي المبيض على واحدة من البوبيضات أو على عدة مئات، اعتماداً على نوع النبات، فتحدث تغييرات في المبيض تؤدي إلى تكوين الثمرة، في حين تحول البوبيضة إلى بذرة. تتكون الثمار عادة من جدار المبيض. وفي بعض الحالات تتشكّل الثمار من جدار المبيض ومن أعضاء زهرية أخرى. فبذور التفاح مثلاً توجد داخل لب يتحول من المبيض. أما النسيج الطري الذي نأكله فيتيّج عن أجزاء أخرى من الزهرة. بعض الثمار - ومنها التفاح والبرتقال والدراق - لحمية طرية، في حين أن بعضها الآخر جاف وصلب، ومنه الجوز والحبوب. ادرس الجدول 1-7 لتعرف أنواع الثمار.

ماذا قرأت؟ قارن بين تكوين البذور والثمار.

أنواع الثمار		الجدول 1-7
الوصف	أمثلة للأزهار والثمار	نوع الشمرة
ثمار لحمية بسيطة، قد تحتوي على بذرة واحدة أو أكثر. ومنها ثمار التفاح والممشمش والعنب والبرتقال والطماطم والقرع والخوخ.	  الخوخ	ثمار لحمية بسيطة
تتكوّن الثمار المجمعة من أزهار ذات أعضاء زهرية عديدة يتّحد بعضها بعض عندما تنضج الشمرة. ومنها الفراولة وأنواع العليق.	  الفراولة	ثمار مجمعة (ملتحمة)


<p>تكون الشمار المركبة من أزهار عديدة تلتحم معاً عندما تنضج الشمار. ومنها التين والأناناس والتوت وبرتقال الهند والخمر.</p>		 أناناس	الشمار المركبة (المضاعفة)
<p> تكون هذه الشمار جافة عندما تنضج. ومنها القرون والمكسرات والحبوب.</p>		 القرون	شمار جافة

انتشار البذور Seed dispersal تساعد الشمار على انتشار البذور بالإضافة إلى حمايتها. ويزيد انتشار البذور بعيداً عن النبات الأم من معدل بقاء النسل. فمثلاً، عندما تنمو نباتات عديدة في بقعة واحدة سيكون هناك تناقص على الضوء والماء والمعنديات في التربة. فالبذور التي تنمو بالقرب من النبات الأم وبالقرب من نباتات النسل الأخرى تتنافس جميعها على هذه المصادر. إن الشمار التي تجذب الحيوانات إليها تستطيع أن تنتقل بذورها مسافات بعيدة جداً عن النبات الأم.

الحيوانات التي تجمع الشمار أو تدفنه أو تخزنها لا تأكلها جميعها عادة، لذا فقد ينمو بعضها مرة أخرى. وتلتهم بعض الحيوانات -ومنها الغزلان والدببة والطيور- الشمار. وتمر البذور خلال قناتها الهضمية دون أن تتلفها ثم تخرجها مع البراز. ولبعض البذور تحورات تركيبية تمكنها من الانتقال بوساطة الماء والحيوانات والرياح.

نبات البذور Seed germination تسمى عملية بدء نمو الجنين للنبات germination. وهناك عوامل عددة تؤثر في الإنبات، منها الماء والأكسجين ودرجة الحرارة. ولمعظم البذور درجة حرارة مثلية للإنبات. فمثلاً يمكن لبعض البذور أن تنبت عندما تكون التربة باردة، في حين تحتاج بذور أخرى إلى تربة أكثر دفئاً. ويفيد الإنبات عندما تمتص البذرة الماء، إما بصورة السائلة أو على هيئة بخار ماء. وعندما تمتص الخلايا الماء تنتفخ البذرة، مما يؤدي إلى تششق غلافها. كما ينقل الماء المواد الضرورية إلى المناطق النامية في البذرة. تساعد إنزيمات هاضمة على تحليل الغذاء المخزون داخل البذرة. ويشكّل هذا الغذاء المتحلّل والأكسجين المواد الخام لعملية التنفس الخلوي التي ينتج عنها تحرر الطاقة، واستعمالها في نمو الجنين.





يسمى الجزء الأول من الجنين الذي يظهر خارجًا من البذرة **الجذير** radicle، وهو الذي يبدأ امتصاص الماء والمواد المغذية من البيئة. وينمو الجذير لاحقاً إلى جذر النبات، **الشكل 10-7**.

وتسمى المنطقة من الساق الأقرب إلى البذرة **السويقية تحت الفلقة** hypocotyl، وهي في عديدٍ من النباتات أول جزء من البادرة يظهر فوق سطح التربة. وعندما

الشكل 10 - 7 يختلف إنبات بذور ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين.

مختبر تحليل البيانات 7-1

بناءً على بيانات حقيقة

المميز بين السبب والنتيجة

ما التأثير الجيني المسبب للمرض؟ تنتج بعض النباتات مواد كيميائية تؤثر في النباتات المجاورة لها في الطبيعة. ويسمى هذا بالتأثير الجيني المسبب للمرض. درس بعض العلماء العلاقة بين التأثير الجيني المسبب للمرض وانتشار بعض الأنواع النباتية غير المستوطنة منها خردل الثوم *Alliaria petiolata*. لقد استقصوا أثر خردل الثوم في إنبات بذور النباتات المستوطنة، ومنها:


Geum urbanum, *Geum laciniatum*.

التفكير الناقد

1. صفا أثر خردل الثوم في إنبات البذور.

2. صفت تجربة. نبات الفا - الفا (البرسيم) المعروف بتأثيره الجيني المثبط لإنبات بعض البذور. استعمل بادرات البرسيم لاستقصاء أثرها في بذور تخثارها.

البيانات والملاحظات



أخذت البيانات في هذا المختبر من:

Prati, . and . Bossdorf. 2004. Allelopathic inhibition of germination by *Alliaria petiolata* (Brassicaceae). *Amer. Journal of Bot.* 91 (): 285- 288

تنمو "السويقة تحت الفلقية" في بعض ذوات الفلقتين تسحب الفلقتين والأوراق الجنينية خارج التربة. وعندما تصبح خلايا البادرة المحتوية على البلاستيدات الخضراء فوق التربة وتتعرض للضوء يبدأ البناء الضوئي.

يكون نمو البادرات مختلفاً بعض الشيء في ذوات الفلقة الواحدة؛ لأن الفلقة تبقى في التربة عادة عندما يخرج الساق من التربة.

تستطيع بعض البذور البقاء في ظروف البيئة القاسية، ومنها الجفاف والبرودة. وتنبت بعض البذور حالاً بعد انتشارها، في حين ينمو بعضها الآخر بعد فترات طويلة. بعض بذور القيقب Maple seed يجب أن تنمو خلال أسبوعين من انتشارها وإلا فلن تنمو على الإطلاق. وتدخل معظم البذور الناتجة عند نهاية فصل النمو في مرحلة **الكمون dormancy**، وهي فترة لا يوجد فيها نموًّا إطلاقاً، أو يوجد فيها نمو قليل جداً. إن فترة الكمون تُعد تكيفاً يزيد معدل بقاء البذور المعرضة لظروف قاسية . ويختلف طول فترة الكمون من نوع إلى آخر.

التقويم 7-2

التفكير الناقد

6. قوم الآلية التي تمنع حبوب اللقاح غير المتطابقة مع الميسim من إنتاج أنبوب اللقاح.
7. قارن بين الإنبات في بذور ذوات الفلقة وبذور ذوات الفلقتين.
8. **الرياضيات في علم الأحياء**
يمكن أن يتكون ثلاثة ملايين من البذور في قرن نبات الأوركيدا. فما نسبة الإنبات إذا زُرع ثلاثة ملايين بذرة ونبت منها 1,860,000 فقط؟

فهم الأفكار الرئيسية

1. **الفكرة الرئيسية** ارسم مخطط لخطوات دورة حياة نبات زهري.
2. تخص نمو الطور المشيجي الذكري.
- 3.وضح التركيب الداخلي لبذرة نبات من ذوات الفلقتين.
4. نقش أهمية الإخصاب المزدوج.
5. اكتب تبريراً لاعتبار الطماطم من الخضروات لا من الفواكه.

الخلاصة

- تشمل دورة حياة النباتات الزهرية تعاقباً للأجيال.
- يحدث نمو الطور المشيجي في الزهرة.
- الإخصاب المزدوج خاصية فريدة بين النباتات الزهرية.
- توفر البذور الغذاء والحماية للنبات البوغي الجنيني.
- تحمي الثمار البذور وتساعد على انتشارها.
- تؤثر الظروف البيئية في إنبات البذور.

علم الأحياء والمجتمع

Genetically Modified Plants

ما فوائد النباتات المعدلة وراثياً؟ بالإضافة إلى الطماطم التي لا تتلف بسرعة أنتجت تعديلات أخرى بذوراً لها قيمة غذائية محسّنة يمكن استعمالها في المنتجات الصناعية. كما تم إنتاج نباتات ذات مقاومة للمبيدات العشبية وللفيروسات والأمراض، ومنتجات نباتية ذات فترة تخزين أطول. كما أنتجت نباتات مقاومة للظروف البيئية الصعبة. وهكذا أصبح لدى المزارعين محاصيل أكثر إنتاجاً، واستعملوا الأراضي بصورة أكثر كفاءة. ويجري في الوقت الحاضر اختبار قدرة النباتات المعدلة وراثياً على إنتاج أدوية ضد بعض الأمراض مثل: الإيدز والتدرن الرئوي والسكري والسعار.

ما عيوب النباتات المعدلة وراثياً؟ يكمن العيب الرئيس للنباتات المعدلة وراثياً في أخطارها المحتملة البعيدة المدى. كما أن هناك خطراً يتمثل في احتمال دخول الجينات المعدلة إلى مجموعات المخلوقات الحية البرية (الأصلية). وقد بين العلماء فعلاً أن النباتات الناقلة للجينات (العابرة) أقدر على التلقيح الخلطي مع النباتات الأخرى عشرين مرة من النباتات التي تحدث بها الطفرات الطبيعية.

يُعدّ الجين الفاصل (جين النهاية) terminator أكثر التعديلات الوراثية إثارة للجدل. فالنباتات التي لديها هذا الجين لا تستطيع بذورها الإثبات. وهذا يعني أن المزارع لا يستطيع أن يتقيى بذوراً من محصوله الحالي من أجل الزراعة مستقبلاً. ويُعدّ جمع البذور في كثير من البلدان الوسيلة الوحيدة للحصول على مصدر للبذور للزراعة في فضول قادمة. وقد توقفت الشركة صاحبة براءة الاختراع عن تطويره، وإن كان لديها الخيار في استئناف نشاطها في المستقبل.

مناظرة في

علم الأحياء

ناقشت هل يجب أن يستمر تعديل أنواع النباتات وراثياً دون مراقبة وتنظيم؟ قدم الأدلة العلمية التي تدعم رأيك لإقناع وجهة النظر المعارضة.

النباتات المعدلة وراثياً (جينياً)

هل سبق أن تناولت رقائق الذرة وعصير البرتقال أو الخبز الممحّص في إفطارك؟ إذا كنت قد ابتعتها من محل بقالة فإنها غالباً أغذية معدلة وراثياً. لقد عدل الإنسان في صفات النباتات منذ قرون بوساطة التهجين الانتقائي. ولم يتمكن العلماء من تعديل التكوين الوراثي للنباتات إلا حديثاً.

ما النباتات المعدلة وراثياً؟ قبل معرفة الهندسة الوراثية، كان هناك التهجين الانتخابي. فإذا أصاب العفن محصول الذرة مثلًا فإن المزارع يتقيى البذور من النباتات التي لم تظهر عليها الإصابة. وإذا استمر المزارع في انتخاب بذور من نباتات لم تصب بالفطر تتكون لدينا سلالة مقاومة للفطريات بمرور الزمن.



ثمرة الطماطم هذه لا تبدو مختلفة، ولكنها كانت قد عُدلت لكي لا تصبح طرية قبل النضج فتتلاف.

تمكن العلماء في السنوات الحديثة من نقل الجينات بين أنواع من النباتات لتغييرها. فجينات مقاومة الحشرات أو الأمراض نُقلت من سلالات من نباتات إلى سلالات أخرى من النوع نفسه. وبصورة عامة فإن النباتات التي تنتج عن نقل للجينات بين الأنواع تعد آمنة للأكل.

وقد أُنتج عام 1994 أول غذاء معدل وراثياً، وهو ثمار طماطم لا تنضج قبل الأوان، فلا تصبح عرضة للتلف سريعاً، وأصبحت متوفّرة للناس كافة.

مختبر الأحياء

كيف تقارن بين أزهار ذوات الفلقة وذوات الفلقتين؟

7. أعد الخطوة 6 باستعمال رسم زهرة من ذوات الفلقتين.

8. التنظيف والتخلص من الفضلات تخلص من أجزاء الأزهار بصورة صحيحة. ونظف جميع الأدوات، كما يرشدك معلمك، وأعد كل شيء إلى مكانه الصحيح.



حل ثم استنتاج

1. قارن بين خصائص أزهار نباتات ذوات الفلقة الواحدة وأزهار ذوات الفلقتين.

2. استنتاج. أي الأزهار التي فحصتها كانت من ذوات الفلقة الواحدة؟ وأيها من ذوات الفلقتين؟

3. تحليل الخطأ. قارن بين بياناتك وبيانات زملائك في الصف. واشرح أي فروق تجدها.

طبق مهاراتك

استقصاء ميداني زر محل بيع أزهار أو بيتاً زجاجياً أو حديقة نباتات وحدك أو مع أحد أصدقائك. وضع قائمة بالنباتات ذوات الفلقة والنباتات ذوات الفلقتين التي شاهدتها في الموقع، بناءً على تركيب أزهارها. استأند قبل لمس النباتات.

الخلفية النظرية: الأزهار هي تراكيب التكاثر في النباتات الزهرية، وهناك تنوع كبير في أشكال الأزهار. يصنف العلماء النباتات الزهرية في مجموعتين، هما: ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين، بناءً على تركيب ذورها. لكن تراكيب أزهارهما تختلف أيضاً. استقص الفروق بين هاتين المجموعتين من النباتات بتنفيذ هذه التجربة.

سؤال: ما الفروق التركيبية بين أزهار ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين؟

المواد والأدوات

- أزهار نباتات ذوات فلقة واحدة.
- أزهار نباتات ذوات فلقتين.
- أقلام ملونة.
- آخر مواد أخرى تناسب هذه التجربة.

احتياطات السلامة

تحذير: استعمل أدوات التشريح بحذر شديد.

خطط ونفذ التجربة

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. اختبر بعض الصفات لأزهار ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين لملاحظتها والمقارنة بينهما.
3. صمم جدول بيانات لتسجيل ملاحظاتك حول أزهار المجموعتين، وضمنه رسماً تخطيطياً لكل نوع من الأزهار.

4. تأكد أن معلمك قد أقر خطتك قبل البدء في تنفيذها.
5. اجمع الملاحظات كما خططت لها.
6. استعمل الألوان لكتابة أسماء كل من التراكيب التكاثرية الذكرية والأنثوية على أجزاء الزهرة من ذوات الفلقة الواحدة التي رسمتها.

دليل مراجعة الفصل

٧



المطويات ◀ وَضَّحَ كَيْفَ يَحْدُثُ الْإِخْصَابُ الْمَزْدُوجُ فِي النَّبَاتَاتِ الزَّهْرِيَّةِ.

المفردات

١ – ٧ الأزهار

المفاهيم الرئيسية

- الفكرة الرئيسية** الأزهار هي التراكيب التكاثرية في النباتات الزهرية.
- الزهرة الكاملة لها سبلات وبتلات وأسدية وكربلة واحدة أو أكثر. يختلف شكل الأزهار من نوع إلى آخر.
 - تميز بعض تراكيب الأزهار بنباتات ذات الفلقة الواحدة عن نباتات ذات الفلقين.
 - تجذب تكيفات الأزهار الملقطات بصورة أكبر.
 - يمكن أن يؤثر طول الفترة الضوئية في موعد الإزهار.

السبلة

البتلة

السداة

الكربلة (المتاع)

الفترة الضوئية

الفترة الحرجة

نباتات النهار القصير

نباتات النهار الطويل

نباتات النهار المتوسط

نباتات النهار المحايد

٢ – النباتات الزهرية

- الفكرة الرئيسية** يمكن أن تنمو البذور والثمار في النباتات الزهرية من الأزهار بعد الإخصاب.
- تشمل دورة حياة النباتات الزهرية تعاقبًا للأجيال.
 - يحدث نمو الطور المنشيجي في الزهرة.
 - الإخصاب المزدوج خاصية فريدة بين النباتات الزهرية.
 - توفر البذور الغذاء والحماية للنبات البوغي الجنيني.
 - تحمي الثمار البذور وتساعد على انتشارها.
 - تؤثر الظروف البيئية في إنبات البذور.

النواتين القطبيتين

الإندوسبيرم

غلاف البذرة

الإنبات

الجذير

السوقة تحت الفلقية

الكمون (الراحة)



اللّوّح 7 التّقويم

7-1

استعمل الشكل أدناه للإجابة عن السؤال 6



6. أي المفردات الآتية تصف الزهرة السابقة؟
- a. ثنائية الجنس، كاملة.
 - b. ثنائية الجنس، ناقصة.
 - c. أحادية الجنس، ناقصة.
 - d. أحادية الجنس، كاملة.
7. أفضل وصف لإنتاج حبوب اللقاح في أزهار تلقيحها الرياح هو:
- a. كمية قليلة من حبوب اللقاح.
 - b. حبوب اللقاح أكبر حجمًا.
 - c. كمية أكبر من حبوب اللقاح.
 - d. كمية أكبر من الرياح.

مراجعة المفردات

ميّز بين المفردات في كل مجموعة مما يأتي:

1. الكربلة، الأسدية.
2. نبات النهار الطويل، نبات النهار القصير.
3. البتلة، السبلة.

ثبت المفاهيم الرئيسية

4. أي أعضاء الزهرة الآتية يتتج حبوب اللقاح؟

- a. السداة.
- b. الكربلة.
- c. البتلات.
- d. السبلات.

5. ما ظروف الضوء والظلام التي تنتج أزهاراً في نباتات النهار القصير؟

- a. ساعات الظلام أكثر من ساعات الضوء.
- b. ساعات الظلام أقل من ساعات الضوء.
- c. ساعات الظلام مساوية لساعات الضوء.
- d. ساعات الظلام وساعات الضوء ليست عوامل مهمة.



7-2

مراجعة المفردات

- اشرح العلاقة بين المفردات في كل زوجٍ من الآتي:
14. الكُمون، الإنبات.
 15. السويقة تحت الفلقية، الجذير.
 16. النواتان القطبيتان، الإندوسيبرم.

تشبيت المفاهيم الرئيسية

17. أيٌّ من الآتي لا يُعد جزءاً من البذرة؟
 - a. الفلقة.
 - b. الجنين.
 - c. الإندوسيبرم.
 - d. حبة اللقاح.
18. ما الذي يصف جنين النباتات الزهرية؟
 - a. ثنائيي المجموعة الكروموسومية.
 - b. أحادي المجموعة الكروموسومية.
 - c. يتكون من ثلاثة طبقات من الخلايا.
 - d. ثلاثي المجموعة الكروموسومية.

8. أيٌّ المصطلحات الآتية يصف أزهار ذوات الفلقة الواحدة؟

- a. أربع سبلات، أربع بتلات.
- b. خمس سبلات، عشر بتلات.
- c. اثنتا عشرة سبلة، اثنتا عشرة بتلة.
- d. أربع سبلات، ثمانى بتلات.

أسئلة بنائية

9. إجابة قصيرة. اشرح لماذا لا يُعد مصطلاحاً النهار القصير والنهار الطويل مناسبين لوصف هذين النوعين من النباتات الزهرية.

10. نهاية مفتوحة. اقترح تكييفاً في الزهرة يجعل الماء ضروريًّا للتلقيح. بِرَّ اقتراحك.

11. إجابة قصيرة. وضّح كيف أن التكيف في تركيب الزهرة يجعل التلقيح أكثر نجاحاً.

التفكير النقدي

12. صمم تجربة تختبر بها قدرة الفراشات على التمييز بين زهرة حقيقية وزهرة اصطناعية.

13. قوم مزايا الفترة الضوئية.



أسئلة بنائية


22. إجابة قصيرة. اشرح لماذا يكون انتشار الثمار أو البذور مهمًا.

23. نهاية مفتوحة. كون فرضية حول سبب إنتاج الطور المшиجي الأنثوي في نبات الزهرية للعديد من النوى، علمًا بأنه يحتاج إلى نواتين فقط من أجل الإخصاب.

24. نهاية مفتوحة. عندما تنبت بذرة، كما في الشكل 10–7، يكون الجذر أول تركيب يشق غلاف البذرة عادة، لماذا يُعد هذا مفيدًا للجنين؟

التفكير الناقد

استعمل الرسم البياني أدناه للإجابة عن السؤالين 25، 26.




25. قارن بين تأثير كل من المواد المضافة إلى التربة في معدل الإنبات مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتعرض للمواد المضافة.

19. أيِّ التراكيب الآتية تنمو منها حبة اللقاح؟

- a. البوبيضة.
- b. الجنين.
- c. الإندوسيبريم.
- d. البوغ الصغير.

استعمل الشكل أدناه للإجابة عن السؤال 20.



20. أيِّ التركيب في الشكل أعلاه تكون الشمرة عادة؟

- | | |
|------|------|
| 3 .c | 1 .a |
| 4 .d | 2 .b |

21. ما الفترة غير النشطة للبذرة؟

- a. تعاقب الأجيال.
- b. الكُمون.
- c. الإخصاب.
- d. طول الفترة الضوئية.

تقويم إضافي

28. **الكتابة في علم الأحياء** اكتب قصة قصيرة حول

حياة حبة لقاح.

أسئلة المستندات



يزهر نبات النهار المتعادل بسرعة أكبر عندما يتم تطعيمه مع نبات النهار القصير سبق تعريضه للفترة الحرجة. كما أن نبات نهار متعادل آخر يزهر بسرعة أكبر عندما يتم تطعيمه مع نبات نهار طويل سبق تعريضه للفترة الحرجة. بناء على ما سبق ، اجب على الأسئلة التالية.

29. افحص الرسمين، وضع فرضية حول إزهار نبات النهار المتعادل **المطعم** قبل نبات النهار المتعادل **غير المطعم**.

30. توقع ما الذي يحدث لو أن نبات نهار طويل **طُعم** مع نبات نهار قصير و**عرض** للفترة الحرجة لنبات النهار القصير.

31. صمم تجربة تحديد بها "أطول نهار" يمكن أن تزهر فيه نباتات النهار الطويل.

26. قارن بين تأثير كل من المواد المضافة إلى التربة في معدل الإنبات مقارنة بتأثيرها في المجموعة الضابطة.

27. صمم تجربة تختبر فيها أثر الكميات المختلفة من المواد المضافة إلى التربة في معدل الإنبات. واختر إحدى المواد المضافة إلى التربة المدرجة في الشكل أعلاه.

اختبار مقنن

اسئلة الاختيار من متعدد

أسئلة الإجابات القصيرة

5. طلب إليك أن تستخلص بعض الصبغات من نباتات بغلية أوراقها وأزهارها وبتلاتها في محلول. ما الأدوات الالزمة لهذه التجربة التي تحقق شروط السلامة في استعمالها؟ وما الأسباب التي دعتك لاختيارها؟

1. أي التراكيب في الشكل أعلاه يُعد جزءاً من أعضاء التكاثر الذكرية في الزهرة؟

1. a
2. b

2. تعداد ثمار الأناناس من:

- a. الثمار الجافة.
b. الثمار الملتحمة (المجمعة).
c. الثمار اللحمية البسيطة.
d. الثمار المركبة المضاعفة.

3. ما الملحق الأساسي للمخروطيات؟

- a. الطيور.
b. الحشرات.
c. الماء.
d. الرياح.

4. أي الألوان الآتية أكثر جذباً للملحقات، مثل الخفافيش وحشرة العث؟

- a. الأزرق.
b. الأحمر.
c. النبي.
d. الأبيض.

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

الصف	الفصل / القسم	السؤال
2-1	2-1	5
7-1	7-1	4

تركيب الخلية ووظائفها

Cell Structure & Functions

8



الفكرة العامة الخلايا هي وحدات التركيب والوظيفة في كل المخلوقات الحية.



8-1 التراكيب الخلوية والعضيات

الفكرة الرئيسية يساعد الغشاء البلازمي على المحافظة على الاتزان الداخلي للخلية، كما تسمح العضيات الموجودة في الخلايا الحقيقة التوازن بالقيام بوظائف متخصصة داخل الخلية.

8-2 كيمياء الخلية

الفكرة الرئيسية تكون خلايا المخلوقات الحية من مركبات عضوية يدخل في تركيبها الكربون بوصفه عنصراً أساسياً.

حقائق في علم الأحياء

- يتكون جسم الإنسان من عشرة تريليونات خلية.
- أكبر قطر لخلية في جسم الإنسان تساوي قطر شعرة تقريباً.
- هناك 200 نوع من الخلايا في جسم الإنسان مصدرها خلية واحدة.

نشاطات تمهيدية

الإنزيمات أعمل المطوية الآتية لتساعدك على فهم تركيب الإنزيمات ووظائفها.

المطويات

منظمات الأفكار


الخطوة 1: ارسم خطأً على طول متصف ورقة، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 2: اطو الورقة نصفين، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 3: اطو الورقة عمودياً مرة أخرى إلى نصفين كما في الشكل الآتي:



الخطوة 4: افتح الورقة المطوية، واقطع بالمقص عند خطوط A, B, C, D، ثم اكتب أحد الرموز: D, C, B, A على كل لسان، كما في الشكل الآتي:



المطويات استعمل هذه المطوية في القسم 8-2. سجل وأنت تقرأ الدرس ما تعلمته عن الإنزيمات. وعلى الوجه الخلفي للمطوية ارسم الخطوات الأربع العامة في نشاط الإنزيم.

تجربة استئناف

ما الخلية؟

تتكون الأشياء كلها من ذرات وجزيئات، وتنقسم الذرات والجزيئات في المخلوقات الحية فقط لتكون خلايا. تستخدم في هذه التجربة المجهر المركب لمشاهدة شرائح لمخلوقات حية وأخرى غير حية.

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. اعمل جدول بيانات لتسجيل ملاحظاتك.
3. احصل على شرائح لعينات متنوعة.
4. استخدم المجهر المركب في مشاهدة الشرائح، مستخدماً قوة التكبير التي يحددها معلمك.
5. املأ جدول البيانات الذي أعددته في أثناء مشاهدتك الشرائح.

التحليل

1. صف بعض الطائق التي تستخدم للتمييز بين المخلوقات الحية والأشياء غير الحية.
2. اكتب تعريفاً للخلية اعتماداً على ملاحظاتك.



8-1



التركيب الخلوي والعضيات Cellular structures and organelles

الفكرة الرئيسية يساعد الغشاء البلازمي على المحافظة على الاتزان الداخلي للخلية، كما تسمح العضيات الموجودة في الخلايا الحقيقة النواة بالقيام بوظائف متخصصة داخل الخلية.


الربط مع الحياة عندما تدخل إلى مدرستك تمر عبر بوابة متصلة بسور يحيط بالمدرسة. يمنع هذا السور غير المعنين من دخول المدرسة، في حين يُسمح بدخول الطلاب والعاملين والأباء. ولكل من الخلية البدائية النواة والحقيقة النواة تركيب يحافظ على البيئة الداخلية لها. وفي مدرستك يقوم المعلمون بتدريس المواد، كل بحسب تخصصه، مما يؤدي في النهاية إلى كيان تربوي متكملاً يؤدي وظيفة واحدة هي التعليم. وكذلك تؤدي تركيب الخلايا الحقيقة النواة مهام معينة لأعضاء المدرسة تماماً.

الأنواع الأساسية للخلايا

تعد الخلايا الوحدات الأساسية للمخلوقات الحية جميعها. وتوجد بأشكال وحجوم مختلفة. كما تختلف بناءً على الوظيفة التي تؤديها في المخلوقات الحية. تشتراك جميع الخلايا في صفة شكلية هي الغشاء البلازمي. **والغشاء البلازمي** في الشكل 1-8، هو حاجز خاص يساعد على ضبط ما يدخل إلى الخلية وما يخرج منها. وللخلايا عادةً عدد من الوظائف المشتركة. فمثلاً تحوي جميع الخلايا مادة وراثية تعطي معلومات وتعليمات للخلية لإنتاج مواد تحتاج إليها.


■ **الشكل 1-8** حجم الخلية البدائية النواة عن اليسار أصغر وأقل تعقيداً من الخلية الحقيقة النواة عن اليمين. تم تكبير الخلية البدائية النواة لغرض المقارنة.

صورة محسنة بالمجهر الإلكتروني الماسح النافذ: التكبير × 15,000



خلية بداعية النواة

صورة ملونة بالمجهر الإلكتروني الماسح النافذ: التكبير غير معروف



خلية حقيقة النواة

كما تحلل الخلايا الجزيئات لإنتاج الطاقة اللازمة لعمليات الأيض. وقد قسم العلماء الخلايا إلى مجموعتين، هما: الخلايا البدائية النواة Prokaryotic cells، والخلايا الحقيقة النواة Eukaryotic cells. يبين الشكل 1-8 صورة بالمجهر الإلكتروني النافذ لهذه الخلايا. وعادة ما تكون الخلايا الحقيقة النواة أكبر من الخلايا البدائية النواة، بل قد يزيد حجمها عليها مئة مرة.

ماذا قرأت؟ قارن بين أحجام الخلايا البدائية النواة والحقيقة النواة.

قارن بين أنواع الخلايا في الشكل 1-8، ستلاحظ أن هناك اختلافات بينهما في تراكيبهما الداخلية؛ ولذلك وضعها العلماء في مجموعتين مختلفتين. فكلتاهما تحوي غشاء بلازمياً، إلا أن إدراهما تحوي تراكيب داخلية مميزة تسمى **العضيات** organelles، وهي تراكيب خاصة تقوم بوظائف محددة.

تجربة استهلاكية

مراجعة بناءً على ما قرأته عن الخلية، كيف تجيب الآن عن أسئلة التحليل؟

تحوي الخلايا الحقيقة النواة نواة وعضيات أخرى محاطة بأغشية؛ أما النواة فهي عضية مركبة مميزة تحوي المادة الوراثية على شكل DNA. تسمح العضيات للخلية بالقيام بوظائفها في أجزاء مختلفة من الخلية في الوقت نفسه. وتتكون معظم المخلوقات الحية من الخلايا الحقيقة النواة. كما أن بعض المخلوقات الحية الوحيدة الخلية - ومنها بعض الطلائعيات كالطحالب والفطريات كالخميرة - من المخلوقات حقيقة النواة. أما الخلايا البدائية النواة فهي خلايا ليس لها نواة أو عضيات محاطة بغشاء. ومعظم المخلوقات الحية الوحيدة الخلية - ومنها البكتيريا - خلايا بدائية النواة؛ لذا سميت الخلايا البدائية النواة.


وظيفة الغشاء البلازمي

درست سابقاً أن عملية المحافظة على اتزان البيئة الداخلية للمخلوقات الحية تسمى الازان الداخلي، وهي ضرورية لبقاء الخلية. ويعد الغشاء البلازمي أحد التراكيب المسؤولة أساساً عن الازان الداخلي؛ فهو حاجز فاصل رقيق مرن بين الخلية وبيتها يسمح بمرور المواد المغذية إلى الخلية وخروج الفضلات والمواد الأخرى. تحوي جميع الخلايا البدائية والحقيقة النواة غشاءً بلازمياً يفصلها عن البيئة السائلة التي توجد فيها.

تعد خاصية **النفاذية الاختيارية** selective permeability إحدى الصفات المهمة للغشاء البلازمي؛ إذ يسمح الغشاء البلازمي بمرور بعض المواد إلى الخلية، ويعين مرور أخرى.

اعتبر أن شبكة الصيد تمثل النفاذية الاختيارية، فالشبكة المبنية في الشكل 2-8،





تسمح للماء والمواد الأخرى بالمرور، ولكنها لا تسمح بمرور السمك من خلالها. وبناءً على حجم الثقوب في الشبكة، فقد تمر بعض أنواع الأسماك من الثقوب، في حين لا تمر أنواع أخرى. ويوضح المخطط في الشكل 8-2 النفاذية الاختيارية للغشاء البلازمي، كما تبين الأسماء المواد التي تمر من الخلية وإليها عبر الغشاء البلازمي. ويحدد تركيب الغشاء البلازمي السيطرة على كمية المواد التي تدخل إلى الخلية أو تخرج منها، ومتى تدخل أو تخرج، وطريقة انتقالها.

■ الشكل 8-2

يمين: تحجز شبكة الصيد السمك، وتسمح بمرور الماء وما فيه من سائر المواد.
يسار: يحدد الغشاء البلازمي – بصورة مشابهة لشبكة صيد السمك – المواد التي تدخل إلى الخلية أو تخرج منها.


ماذا قرأت؟ وضح المقصود بالنفاذية الاختيارية.

Structure of Plasma Membrane

تركيب الغشاء البلازمي

الربط الكيميائي معظم الجزيئات في الغشاء البلازمي دهون. والدهون جزيئات كبيرة مكونة من الجليسروول وثلاثة أحماض دهنية. فإذا حل مكان أحد الأحماض الدهنية مجموعة فوسفات تكون الدهون (الليبيادات) المفسفرة. والدهون المفسفرة جزيئات تكونت من سلسلة أساسية من الجليسروول وسلسلتين

■ الشكل 8-3 تبدو الطبقة المزدوجة من الدهون المفسفرة كالشطيرة، مع بقاء الرأس القطبي (المحب للماء) في اتجاه الخارج والذيل غير القطبي (الكاره للماء) نحو الداخل. استنتاج كيف تعبّر المواد الكارهة للماء الغشاء البلازمي؟



المفردات
الاستخدام العلمي مقابل
الاستخدام الشائع
القطبي	polar

الاستخدام العلمي: التوزيع غير المتساوي للشحنات.

يجذب الطرف الموجب لجزيء القطبي الطرف السالب لجزيء قطبي آخر.

الاستخدام العام: مرتبط جغرافيًا بالمنطقة القطبية.

يبلغ سمك الغطاء الجلدي القطبي في بعض المناطق 1.6 km تقريرًا.....

من الأحماض الدهنية ومجموعة فوسفات. ويكون الغشاء البلازمي من طبقتين من **الدهون المفسفرة المزدوجة** phospholipid bilayer، تترتب ذيلاً مقابل ذيل، كما في **الشكل 3-8**؛ وبطريقة تسمح بأن يبقى الغشاء البلازمي قائماً في بيئة سائلة.

طبقة الدهون المفسفرة المزدوجة The phospholipid bilayer

تلاحظ في **الشكل 3-8** أن كل طبقة دهون مفسفرة رسمت على شكل رأس له ذيلان؛ حيث تكون مجموعة الفوسفات رأساً قطبياً في كل طبقة من الدهون المفسفرة. وينجذب الرأس القطبي إلى الماء؛ لأن الماء قطبي أيضاً. أمّا ذيلا الأحماض الدهنية فهما غير قطبيين ويتناقضان مع الماء.

تشكل جزيئات طبقيي الدهون المفسفرة ما يشبه الشطيرة، حيث تكون فيها ذيول الأحماض الدهنية الجزء الداخلي (الأوسط) من الغشاء البلازمي، في حين تكون رؤوس الدهون المفسفرة مواجهة للبيئة السائلة داخل الخلية وخارجها، كما في **الشكل 3-8**. وبعد التركيب المزدوج مهمًا في تكوين الغشاء البلازمي وأدائه لوظيفته. تترتب الدهون المفسفرة بطريقة تجعل الرؤوس القطبية هي الأقرب إلى جزيئات الماء، والذيلان غير القطبية هي الأبعد عنها. وعندما تجتمع جزيئات الدهون المفسفرة معًا بهذا النمط فإنها تشكل حاجزاً سطحه قطبي وأوسطه غير قطبي. ولذلك لا تمر المواد الذائبة في الماء بسهولة عبر الغشاء البلازمي؛ لأن وسط الغشاء غير القطبي يعيقها. وهكذا يستطيع الغشاء البلازمي فصل بيئة الخلية الداخلية عن بيئتها الخارجية.

مكونات الغشاء البلازمي الأخرى

Other components of plasma membrane

يوجد على السطح الخارجي للغشاء البلازمي بروتينات، تسمى المستقبلات، ترسل إشارات إلى داخل الخلية. كما تقوم بروتينات الغشاء البلازمي الموجودة على السطح الداخلي له بربطه مع تركيب الدعم الخلوي الداخلية، مما يعطي الخلية شكلاً مميزاً. كما تخترق بروتينات أخرى الغشاء كله فتكون قنوات تدخل من خلالها بعض المواد إلى الخلية أو تخرج منها. وتنقل **البروتينات الناقلة transport proteins** المواد التي تحتاج إليها الخلية أو الفضلات عبر الغشاء البلازمي. ومن المواد التي تنتقل عبر طبقة الدهون المفسفرة في الغشاء البلازمي الكوليسترول، والبروتينات والكريبوهيدرات. فتلاحظ أن البروتينات تسهم في خاصية النفاذية الاختيارية للغشاء البلازمي.

 **ماذا قرأت؟** صف فوائد التركيب الطبقي المزدوج للغشاء البلازمي.

حدّد موقع جزيئات الكوليسترول في **الشكل 3-8**. ينافر الماء والكوليسترول غير القطبي ولهذا نجد الكوليسترول بين الدهون المفسفرة.


إرشادات الدراسة

مناقشة اطلب من الطلاب العمل في مجموعات ثنائية، وأن يسأل بعضهم بعضاً أسئلة تتعلق بالغشاء البلازمي، ويناقشوا معًا في إجاباتهم، على أن يأخذ كل منهم دوره في المناقشة وطرح الأسئلة.

يساعد الكوليسترول على منع التصاق ذيول الأحماض الدهنية في طبقة الدهون المفسفرة المزدوجة بعضها مع بعض، مما يسهم في سلامة الغشاء البلازمي. وعلى الرغم من التوصية بعدم تناول المواد الغنية بالكوليسترول بكثرة، إلا أن الكوليسترول يؤدي دوراً مهماً في تركيب الغشاء البلازمي، ويعد مكوناً مهماً أيضاً في الحفاظ على الاتزان الداخلي للخلية.

وهناك مواد أخرى في الغشاء البلازمي، ومنها الكربوهيدرات المرتبطة مع البروتينات لتحديد خصائص الخلية وتساعدها على معرفة الإشارات الكيميائية. فمثلاً، تساعد الكربوهيدرات الموجودة على الغشاء البلازمي الخلايا المقاومة للمرض على تمييز الخلية الضارة وتهاجمها. تكون الدهون المفسفرة المزدوجة "بحراً" تعم فيه الجزيئات. ومفهوم البحر هذا هو أساس **النموذج الفسيفاسي للسائل** fluid mosaic model في الغشاء البلازمي. وتحرك الدهون المفسفرة جانبياً داخل الغشاء البلازمي. وفي الوقت نفسه، تتحرك مكونات أخرى - ومنها البروتينات خلال الدهون المفسفرة. وبسبب وجود مواد مختلفة في الغشاء البلازمي يتكون نمط فسيفاسي على سطح الخلية، الشكل 4-8. كما أن مكونات الغشاء البلازمي في حركة دائمة وثابتة، وينزلق بعضها فوق بعض.

■ **الشكل 4-8** يشير النموذج الفسيفاسي للسائل إلى غشاء بلازمي قادر على نقل المكونات من خلاله.



مختبر تحليل البيانات 8-1

بيانات حقيقة على بناءٍ

السنانات والملاحظات


تفسير الشكل

كيف تسهم قنوات البروتين في موت الخلايا العصبية بعد السكتة الدماغية؟ تحدث السكتة الدماغية عندما تسد خثرة دم تدفق الدم المؤكسج إلى جزء من الدماغ. وأن الخلايا العصبية التي تطلق حمض الجلوتاميت حساسة لنقص الأكسجين؛ فتطلق كمية كبيرة من حمض الجلوتاميت عندما يقل مستوى الأكسجين. ويؤدي التدفق الكبير لحمض الجلوتاميت إلى تدمير مضخة الكالسيوم. ويعثر هذا في حركة الكالسيوم داخل الخلية العصبية وخارجها. وعندما تحتوي الخلايا على فائض من الكالسيوم يحدث خلل في الاتزان الداخلي.

التفكير الناقد

١. فَسْرُ كِيفِ يَدْمِرْ تَدْفُقَ حَمْضِ الْجَلُوتَامِيتِ مَضِيَّةَ الْكَالْسِيُومِ؟
 ٢. تَوْقِعُ مَاذَا يَحْدُثُ إِذَا انْخَفَضَتْ مَسْتَوَيَاتُ الْكَالْسِيُومِ فِي خَلِيلِ عَصْبَيَّةِ خَلَا، السَّكَنَةِ الدَّمَاغَةِ؟

أخذت السنانات في هذا المختبر من:



Choi, D.W. 2005 Neurodegeneration: cellular defence destroyed. *Nature* 433: 696–698


Cytoplasm and Cytoskeleton

السيتوبلازم والهيكل الخلوي

تعرفت جزء الخلية الذي يعمل حاجزاً بين بيئة الخلية الداخلية والخارجية. فالبيئة داخل الخلية شبه سائلة وتسمى السيتوبلازم. اكتشف علماء الأحياء أن العضيات لا تتبع في الخلية، ولكن تدعيمها تراكيب داخل السيتوبلازم، كما في الشكل 5-8. والهيكل

الخلوي cytoskeleton شبكة مكونة من خيوط بروتينية طويلة تدعم الخلية وتعطيها شكلها، وثبتت العضيات داخل الخلايا. كما يساعد الهيكل الخلوي على حركة الخلية وأنشطتها الأخرى.


الشكل 5-8 يتكون الهيكل الخلوي من الأنسات الدقيقة والخيوط الدقيقة.



الهيكل الخلوي

Cells

■ **الشكل 6-8** قارن بين مكونات خلية حيوانية وخلية نباتية وخلية بدائية النواة في الرسموم أدناه. توجد بعض العضيات في الخلايا النباتية فقط، وتوجد عضيات أخرى في الخلايا الحيوانية فقط. كما لا توجد عضيات محاطة بغشاء في الخلايا البدائية النواة.



المفردات	
أصل الكلمة	
Cytoplasm	سيتوبلازم
Cytoskeleton	هيكل خلوي
Cyte	يرجع أصل مقطع: - إلى اللغة اليونانية، ويعني الخلية.

يتكون الهيكل الخلوي من تراكيب ثانوية تسمى **الأنيبيات الدقيقة والخيوط الدقيقة**. والأنيبيات الدقيقة تراكيب أسطوانية طويلة مجوفة من البروتين تكون هيكلًا صلبة للخلية، وتساعد على حركة المواد داخل الخلية. أما الخيوط الدقيقة فهي خيوط بروتينية رفيعة تساعده على إعطاء الخلية شكلها، وتمكن الخلية كاملة أو جزءاً منها من الحركة. وتتجمع الأنبيبات والخيوط الدقيقة أو تفرق لينزلق بعضها فوق بعض، مما يسهم في حركة الخلية.


trakib alkhilya

هناك مناطق منفصلة في المchanan مخصصة لأداء مهام مختلفة. وكذلك الخلية الحقيقية النواة لها مناطق مختلفة للقيام بالمهام. ويؤدي وجود العضيات المحاطة بالغشاء إلى القيام بعمليات كيميائية مختلفة في الوقت نفسه وفي أجزاء مختلفة من السيتوبلازم. كما تقوم العضيات بالعمليات الخلوية الضرورية، ومنها بناء البروتين، وتحويل الطاقة، وهضم الغذاء، وإخراج الفضلات، وانقسام الخلية. ولكل عضية تركيب ووظيفة مميزة. ويمكنك مقارنة العضيات بمكاتب المصنع، وخطوط التجميع، ومناطق أخرى مهمة تحافظ على استمرار الإنتاج. ارجع إلى مخططات الخلايا النباتية والحيوانية في الشكل 6-8، عند دراسة كل من هذه العضيات.

النواة Nucleus تحتاج الخلية إلى عضية لتنظيم عملياتها؛ فالنواة، في الشكل 7-8، هي التركيب الذي ينظم عمليات الخلية. وتحوي النواة معظم DNA الخلية الذي يخزن المعلومات التي تستخدم في بناء البروتينات اللازمة لنموها، ووظيفتها وتكاثرها. تحاط النواة بغشاء مزدوج يسمى الغلاف النووي، وهو مشابه للغشاء البلازمي إلا أن للغلاف النووي ثقباً تسمح للمواد الأكبر حجماً بدخول النواة والخروج منها. كما تنتشر المادة الكروماتينية داخل النواة، وهي عبارة عن DNA معقد يرتبط ببروتين.

ماذا قرأت؟ صف دور النواة.

■ **الشكل 7-8** يمين: شكل نواة الخلية ثلاثي الأبعاد. وتيين الصورة يسايراً مقطعاً عرضياً في النواة.
استنتج فسر لماذا لا تتشابه جميع المقاطع العرضية للنواة؟





الرايبيوسومات Ribosomes من وظائف الخلية إنتاج البروتين. وتسمى العضيات التي تساعد الخلية على صنع البروتين الرايبيوسومات. تكون الرايبيوسومات من مكونين رئيسيين، هما RNA والبروتين، ولا تحاط الرايبيوسومات بغشاء كباقي العضيات في الخلية. ويتم إنتاج الرايبيوسومات في النوية داخل النواة، الشكل 7-8.

تحوي الخلايا الكثيرة من الرايبيوسومات التي تنتج بروتينات مختلفة تستخدمنها الخلية أو تنتقل إلى خارج الخلية لاستخدامها خلايا أخرى. كما تسبح بعض الرايبيوسومات بحرية في السيتوبلازم، في حين يرتبط بعضها الآخر مع عضيات أخرى تسمى الشبكة الإنديوبلازمية. وتتجه الرايبيوسومات الحرة بروتينات تستخدم داخل سيتوبلازم الخلية. أما الرايبيوسومات المرتبطة فتنتج بروتينات يتم إاحتتها بغشاء أو تستخدمها خلايا أخرى.

الشبكة الإنديوبلازمية Endoplasmic reticulum هي نظام يتكون من قنوات متصلة ومترادفة محاطة بغشاء مزدوج تعمل بوصفها موقع لبناء البروتين والدهون؛ حيث تزودها الانثناء والصفائح التي داخلها بمساحة سطح أكبر لكي تُنجذب الوظائف الخلوية. وعندما ترتبط الرايبيوسومات مع منطقة على الشبكة الإنديوبلازمية فإن هذه المنطقة تسمى الشبكة الإنديوبلازمية الخشنة. لاحظ الشكل 8-8 حيث تبدو الشبكة الإنديوبلازمية الخشنة كثيرة التواءات والبروزات. وهذه البروزات هي الرايبيوسومات التي تتجه البروتين تمهيداً لنقله إلى الخلايا الأخرى. يبين الشكل 8-8 أيضاً وجود مناطق على الشبكة الإنديوبلازمية لا ترتبط بها رايبيوسومات. والأجزاء من الشبكة الإنديوبلازمية التي لا ترتبط معها رايبيوسومات تسمى الشبكة الإنديوبلازمية الملساء. وعلى الرغم من عدم وجود رايبيوسومات في الشبكة الإنديوبلازمية الملساء إلا أنها تقوم بوظائف مهمة في الخلية. منها بناء الكربوهيدرات والدهون المعقدة، ومنها الدهون المفقرة. كما تعمل الشبكة الإنديوبلازمية الملساء في الكبد على إزالة السموم الضارة من الجسم.

■ **الشكل 8-8** الرايبيوسومات ترافق بسيطة تتكون من RNA وبروتين، وقد ترتبط مع سطح الشبكة الإنديوبلازمية الخشنة. حيث تشبه الرايبيوسومات البروزات على سطح الشبكة الإنديوبلازمية.





الشكل 9-8 مجموعه من الأغشية التي تكون جهاز جولي.

جهاز جولي **Golgi apparatus** بعد تصنيع التلفاز في مصانع الأجهزة الكهربائية توضع كل قطعة مع ملحقاتها في صندوق ثم تشحن؛ ويقوم جهاز جولي بعمل مشابه، فيبعد بناء بعض البروتينات بواسطة الريبوسومات على سطح الشبكة الإندوبلازمية يتقل بعضه بواسطة حويصلات تنفصل عن الشبكة الإندوبلازمية لتصل إلى جهاز جولي، **الشكل 9-8**. وجهاز جولي مكون من مجموعة من الأغشية المتراسصة تعديل البروتينات وترتبها وتغلفها داخل أكياس تسمى الحويصلات تنشق عن جهاز جولي، ثم تلتزم الحويصلات بالغشاء البلازمي لتحرير البروتينات إلى بيئة الخلية الخارجية، انظر **الشكل 9-8**.

مختبر تحليل البيانات 2-8

بيانات حقيقة على بناءٍ

فسر البيانات


كيف يتم تنظيم انتقال الحويصلات من الشبكة الإنديوبلازمية إلى جهاز جولي؟ تُصنّع الرابيوبسومات بعض البروتينات على سطح الشبكة الإنديوبلازمية (ER)، وتغلف هذه البروتينات بـحوصلات تنقلها بعد ذلك إلى جهاز جولي. لتعديلها ويدرس العلماء حالياً الجزيئات التي تدخل في عملية التثامن هذه الحويصلات الإنديوبلازمية بـجهاز جولي.


التفكير الناقد

١. فسر المخطط سمّ مركبين موجودين على جهاز جوّالجي لهما دور في عملية التحام الحويصلات الإندو بلازمية.
 ٢. كون فرضية تفسر فيها انتقال الحويصلات الإندو بلازمية، بناءً على ما قرأته عن: المستهلاك الـ H_2 وكذا الخلume.

أخذت السنانات في هذا المختبر من:

Brittle, E. E., and Wates, M. G. 2000. ER-to-Golgi traffic—this bud's for you. *Science* 289: 403–404.






صورة محسنة بالمجهر الإلكتروني النافذ: التكبير $\times 11,000$

الفجوات Vacuoles يوجد في الخلية حويصلات محاطة بغشاء، تسمى الفجوات، تقوم بتخزين المواد بصورة مؤقتة في السيتوبلازم. والفجوة -الموجودة في خلية النبات- كيس يستخدم في تخزين الغذاء والإنزيمات والمواد الأخرى التي تحتاج إليها الخلية، الشكل 10-8. وتخزن بعض الفجوات الفضلات. ومن المثير للاهتمام أن الخلية الحيوانية عادة لا تحوي فجوات، وإذا حدث ذلك فإن الفجوات تكون أصغر كثيراً مما هي عليه في الخلية النباتية.

■ **الشكل 10-8** تحوي خلايا النبات حويصلات تخزين كبيرة محاطة بغشاء، تسمى الفجوات.


الأجسام المحتلة (الليسوسومات Lysosomes) يوجد في الخلية الحيوانية حويصلات تحوي مواد تهضم، أو تحلل العضيات وجزيئات المواد المغذية الزائدة، تسمى الأجسام المحتلة، الشكل 11-8. تهضم الأجسام المحتلة أيضاً البكتيريا والفيروسات التي تدخل الخلية. ويعمل الغشاء المحيط بالأجسام المحتلة الإنزيمات الهاضمة داخلها من تحليل الخلية. وقد تلتزم الأجسام المحتلة مع الفجوات، ثم تطرح إنزيماتها في هذه الفجوات لتهضم الفضلات داخليها.

■ **الشكل 11-8** تحوي الأجسام المحتلة إنزيمات هاضمة تحلل الفضلات في الفجوات.



الجسم المحتل (ليسوسوم)






■ **الشكل 12-8** تتكون المريكلات من الأنيبيات الدقيقة وتؤدي دوراً مهماً في انقسام الخلية.


المريكلات Centrioles يتكون المريكل من مجموعة من الأنيبيات الدقيقة، كما في **الشكل 12-8**، تعمل في أثناء انقسام الخلية. وتوجد المريكلات في سيتوبلازم الخلايا الحيوانية ومعظم الطلائعيات، وهي قريبة من النواة.

الميتوكندريا Mitochondria تحتوي الخلايا على عضيات تنتج الطاقة تسمى الميتوكندريا، وهي تحول جزيئات المواد المغذية (وخصوصاً السكريات) إلى طاقة قابلة للاستخدام. ويبيّن **الشكل 13-8** أن للميتوكندريون (مفرد ميتوكندريا) غشاءً خارجياً وغشاءً داخلياً كثير الطيات والانثناءات ليزودا الميتوكندريون بمساحة سطح كبيرة تساعده على تكسير الروابط بين جزيئات السكر. وتُخزن الطاقة الناتجة ضمن روابط كيميائية في جزيئات أخرى لاستخدامها الخلية لاحقاً. ولهذا السبب، غالباً ما تسمى الميتوكندريا "مصنع الطاقة" في الخلايا.

■ **الشكل 13-8** تنتج الميتوكندريا الطاقة وتجعلها متوفّرة للخلية.
صف تركيب الغشاء في الميتوكندريون.



البلاستيدات الخضراء



الثيالاكويد

البلاستيدات الخضراء Chloroplasts للخلايا النباتية طريقتها الخاصة في استخدام الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى الميتوكندريا تحتوي خلايا النباتات وبعض الخلايا الأخرى الحقيقة النواة على **البلاستيدات الخضراء** chloroplasts، وهي عضيات تمتص الطاقة الضوئية وتحولها إلى طاقة كيميائية بواسطة عملية البناء الضوئي. تفحّص الشكل 14-8، تلاحظ وجود حجرات صغيرة وعديدة على شكل أقراص تسمى الثيالاكويدات داخل الغشاء الداخلي. حيث يتم امتصاص الطاقة الشمسية وتجمعها في الثيالاكويدات بواسطة صبغة الكلوروفيل التي تعطي الأوراق والسيقان اللون الأخضر.


وقد تؤدي البلاستيدات الخضراء في النبات عدة وظائف، ومنها التخزين؛ إذ تخزن بعض البلاستيدات النشا والدهون. كما يحوي بعضها الآخر - ومنها البلاستيدات الملونة - أصباغاً حمراء أو برتقالية أو صفراء تمتص طاقة الضوء وتعطي الألوان المميزة لتركيب النبات ومنها الأزهار والأوراق.

الجدار الخلوي Cell wall تركيب آخر يوجد في الخلايا النباتية، الشكل 15-8. **والجدار الخلوي** cell wall شبكة من الألياف السميكة الصلبة تحيط بالغشاء البلازمي من الخارج لتحمي الخلية وتتوفر لها الدعامة. ويساعد الجدار الخلوي الصلب النباتات على الوصول إلى ارتفاعات مختلفة - تترواح بين أنساب الحشائش وغابات الشجر الأحمر. كما تتكون الجدران الخلوية في النباتات من كربوهيدرات معقدة تسمى السيليلوز الذي يعطي الجدار خاصية الصلابة.

صورة محسنة بالمجهر الإلكتروني:

التعبير × 37,000

■ **الشكل 14-8** تختص البلاستيدات الخضراء في النبات الطاقة الضوئية وتحوّلها إلى طاقة كيميائية.



صورة محسنة بالمجهر الإلكتروني النافذ: التكبير $\times 38,000$

■ **الشكل 15-8** يبين الشكل خلايا نباتية وجود رايتها الخلوية. قارن هذا بصورة المجهر الإلكتروني النافذ، التي تبين الجدارن الخلويه للخلايا النباتية المتلاصقة.

الأهداب والأسواط Cilia and flagella يغطي سطوح بعض الخلايا الحقيقية النواة تراكيب خاصة تُسمى الأهداب والأسواط، تمتد خارج الغشاء البلازمي. وكما في **الشكل 16-8**، فالأهداب cilia زوائد قصيرة كثيرة العدد تشبه الشعر، وحركتها تشبه حركة المجاديف في القارب. أما **الأسوط flagella** فهي أطول من الأهداب وأقل عدداً. وت تكون الأهداب والأسواط من الأنبيبات الدقيقة، حيث تترتب في صورة محيط دائرة، أي أن تسعه مجموعات مزدوجة من الأنبيبات تحيط بأنبيتين منفردين في المركز، ويعرف هذا النمط التركيب بالنمط (9+2). وعادة ما يكون للخلية سوط أو اثنان فقط.

وتحوي الهدبيات Pili والأسواط في الخلايا البدائية النواة سيتوبلازمًا محاطاً بغشاء بلازمي. ويكون كل منها من وحدات بنائية من البروتين. وعلى الرغم من أن الأهداب والأسواط تُستخدم في حركة الخلية إلا أن الأهداب توجد أيضاً في خلايا ثابتة وغير متحركة، ومنها الخلايا المبطنة للجهاز التنفسى في الإنسان والتي تغطيها الأهداب، **الشكل 16-8**. وي بين الجدول 1-8 قائمة تضم التراكيب الخلوية.

■ **الشكل 16-8** التراكيب الشعرية الدقيقة في الصورة هي الأهداب، والتراكيب التي تشبه الذيل هي الأسواط.

استنتاج أين تتوقع أن تجد الأهداب في أجسام الحيوانات؟



صورة ملونة بالمجهر الإلكتروني الماسح ومكير $\times 2,000$



صورة ملونة بالمجهر الإلكتروني النافذ: التكبير غير معروف



الجدول 1-8

خلاصة تراكيب الخلية			الجدول 1-8
نوع الخلية	الوظيفة	مثال	تركيب الخلية
يوجد في الخلايا النباتية والفطريات وبعض الخلايا بدائية النوى وايضاً في الطلائعيات الشبيهة بالنباتات(الطحالب).	حاجز غير مرن يعطي الدعامة والحماية للخلية النباتية.		الجدار الخلوي
الخلايا الحيوانية ومعظم خلايا الطلائعيات.	أنبيبات تظهر على شكل أزواج تؤدي دوراً في انقسام الخلية.		المريكزات
الخلايا النباتية فقط.	عصيّات لها غشاء مزدوج وثايلاكويّادات موجودة في الغشاء بها صبغة الكلوروفيل، ويتم فيها عمليّة البناء الضوئي.		البلاستيدات الخضراء
بعض الخلايا الحيوانية وبعض الخلايا الحقيقية النوى.	امتدادات من سطح الخلية تسهم في الحركة والتغذى، وسحب المواد نحو سطح الخلية.		الأهداب
جميع الخلايا الحقيقية النواة.	شبكة في الخلية توجد داخل السيتوبلازم.		المهيكل الخلوي
جميع الخلايا الحقيقية النواة.	غشاء كثير الطيات يساعد على بناء البروتين.		الشبكة الاندوبلازمية
بعض الخلايا الحيوانية وبعض الخلايا النباتية والخلايا البدائية النواة.	امتدادات تسهم في الحركة والتغذى.		الأسواد
جميع الخلايا الحقيقية النواة.	أغشية أنبوبية متراصة ومسطحة تقوم بتغليف البروتين وتعديلها لنقله خارج الخلية.		جهاز جوليجي
الخلايا الحيوانية فقط.	حويصلة تحتوي على إنزيمات هاضمة تحلل المواد الخلوية الزائدة.		الأجسام المحللة (الليسوسومات)
جميع الخلايا الحقيقية النواة.	عصية محاطة بغشاء يوفر الطاقة للخلية.		الميتوكوندريون
جميع الخلايا الحقيقية النواة.	مركز السيطرة في الخلية، وتحتوي على تعليمات مشفرة لإنتاج البروتينات وانقسام الخلية.		النواة
جميع الخلايا الحقيقية النواة والخلايا البدائية النواة.	حاجز مرن ينظم حركة المواد من الخلية وإليها.		الفشاع البلازمي
جميع الخلايا.	عصيّات تُعد موقعاً لبناء البروتينات.		الرسيبيوسومات
الخلايا النباتية تحوي فجوة كبيرة أما الخلايا الحيوانية فتحوي القليل من الفجوات الصغيرة الحجم.	حويصلة محاطة بغشاء لتخزين مؤقت للمواد.		الفجوات

العضيات عندما تعمل

في ضوء الفهم الأساسي للتراكيب الموجودة في الخلية يصبح فهم كيفية عمل هذه التراكيب معًا، وكيفية قيامها بوظيفتها الخلوية أسهل. فلو أخذنا مثلاً بناء البروتين فإنه يبدأ في النواة بحسب المعلومات التي يحويها DNA. حيث يتم نسخ هذه المعلومات الوراثية وينقلها إلى جزيء وراثي آخر يسمى الحمض النووي الريبيوزي RNA. ينتقل RNA، وكذلك الريبيوسومات التي تنتج في النواة، من خلال ثقوب في الغلاف النووي إلى السيتوبلازم. وتسمم كل من الريبيوسومات و RNA في إنتاج البروتينات. ولكل بروتين يتكون على سطح الشبكة الإندوبلازمية الخشنة وظيفة محددة؛ فربما يصبح بروتيناً يكون جزءاً من الغشاء البلازمي، أو بروتيناً يُنقل خارج الخلية، أو بروتيناً ينتقل إلى عضيات أخرى. وتعمل الريبيوسومات الأخرى الحرة في السيتوبلازم على بناء البروتينات أيضًا.

تنقل معظم البروتينات التي تصنع على سطح الشبكة الإندوبلازمية الخشنة إلى جهاز جولجي؛ حيث تُغلف البروتينات في حويصلات لنقلها إلى العضيات الأخرى أو إلى خارج الخلية. وتستخدم العضيات الأخرى البروتينات للقيام بالعمليات الخلوية. فمثلاً، تستخدم الأجسام المحللة (الليسوسومات) البروتينات، وخصوصاً الإنزيمات؛ لتهضم الغذاء والفضلات. وتستخدم الميتوكندريا الإنزيمات لإنتاج الطاقة اللازمة للخلية.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

اختصاصي التواصل العلمي
Science Communications

يُوظف الكثير من الناشرين في مجال العلوم أشخاصاً يختصون بالكتابة حول البحوث وأهميتها للرأي العام وغالباً ما يتحقق ذلك من خلال الإعلام والإعلانات والكتيبات والبريد الموجه.



التقويم 8-1

الخلاصة

- هناك نوعان رئيسيان من الخلايا هما: الخلايا البدائية النواة والخلايا الحقيقة النواة.
- تحتوي الخلايا الحقيقة النواة على النواة والعضيات.
- النفاذية الاختيارية خاصية الغشاء البلازمي التي تسمح للخلية بالسيطرة على ما يدخل إليها أو يخرج منها.
- يتكون الغشاء البلازمي من طبقة مزدوجة من جزيئات الدهون المفسفرة.
- يسهم الكوليسترول والبروتينات الناقلة في وظيفة الغشاء البلازمي.
- يصف النموذج الفسيفسائي السائل الغشاء البلازمي.
- تحوي الخلايا الحقيقة النواة عضيات محاطة بغشاء في السيتوبلازم، تؤدي وظائف الخلية.
- الرايوسومات موقع لبناء البروتين.
- الميتوكندريا مصانع الطاقة في الخلية.

فهم الأفكار الرئيسية

التفكير الناقد

1. **الفكرة الرئيسية** صفات كيف يساعد الغشاء البلازمي على الحفاظ على الازن الداخلي للخلية؟
 2. ميز بين الغشاء البلازمي والعضيات.
 - 3.وضح كيف يبقى داخل الخلية منفصلًا عن خارجها؟
 4. ارسم مخططاً للغشاء البلازمي، وحدد عليه الأجزاء.
 5. حدد جزيئات الغشاء البلازمي التي تشكل التركيب الأساسي للغشاء، وتسهم في تمييز الخلية، وسيولة الغشاء.
 6. حدد دور النواة في الخلية الحقيقة النواة.
 7. لخص دور الشبكة الإندوبلازمية.
 8. استنتاج لماذا لا يعد بعض العلماء الرايوسومات من عضيات الخلية.
12. **الكتابة في علم الأحياء**
بناءً على ما تعرفه عن مصطلح "فسيفسائي". اكتب فقرة تصف فيها تركيّباً حيوياً فسيفسائياً آخر.
13. رتب التراكيب والعضيات في الجدول 8-1 في قائمة تعتمد على نوع الخلية، ثم ارسم خريطة مفاهيمية توضح هذا التنظيم.



8-2


كيمياء الخلية Cell Chemistry

الفكرة الرئيسية تكون خلايا المخلوقات الحية من مركبات عضوية يدخل في تركيبها الكربون بوصفه عنصراً أساسياً.

الربط مع الحياة يستمتع الأطفال بلعبة القطار؛ لأنهم يربطون مجموعة من العربات معًا، ويكونون أشكالاً متنوعة منها من خلال ربط عربات ذات ألوان أو وظائف مشابهة معًا. وكذلك الأمر في علم الأحياء؛ فهناك جزيئات كبيرة تتكون من الكثير من الوحدات الصغيرة المتصلة معًا.


الكيمياء العضوية Organic Chemistry

خلق الله سبحانه وتعالى معظم الحياة على سطح الأرض تعتمد على الكربون؛ لأن عنصر الكربون يدخل في تركيب معظم الجزيئات الحيوية. ولما كان الكربون عنصراً ضرورياً فقد خصص العلماء فرعاً كاملاً في الكيمياء يُسمى الكيمياء العضوية؛ لدراسة المركبات العضوية، أي المركبات التي تحتوي على الكربون. تستطيع ذرة كربون واحدة تكوين أربع روابط مشتركة مع الذرات الأخرى؛ وذلك لأن الكربون يحوي أربعة إلكترونات في مداره الأخير، كما في الشكل 17-8، حيث تمكّن هذه الروابط ذرات الكربون من الارتباط معًا، مما يتبع عنها مركبات عضوية متنوعة، قد تكون على صورة سلسل مستقيمة، أو متفرعة، أو على صورة مركبات حلقة، كما في الشكل 17-8.



■ **الشكل 17-8** يعتمد التنوع المدهش في الحياة على تنوع المركبات الكربونية التي أوجدها الخالق جل وعلا. فوجود أربعة إلكترونات في المدار الأخير للكربون يسمح بتكوين جزيئات ذات سلسل مستقيمة أو متفرعة أو حلقة.

ذرة الكربون



الأهداف

- تصف أهمية عنصر الكربون في المخلوقات الحية.
- تلخص المجموعات الأربع الرئيسة للجزئيات الحيوية الكبيرة.
- تقارن بين وظائف كل مجموعة من الجزيئات الحيوية الكبيرة.
- تلخص أهمية الإنزيمات في المخلوقات الحية.

مراجعة المفردات

الإنزيم: بروتين يسرّع من معدل التفاعل الكيميائي.

المفردات الجديدة


الجزيئات الكبيرة
البولимер
الحمض الأميني
طاقة التنشيط
المحفز
الموقع النشط
الحمض النووي
النيوكليوتيدات



الجزيئات الكبيرة Macromolecules


يمكن أن ترتبط ذرات الكربون معاً لتكون جزيئات الكربون. وبالطريقة نفسها، تخزن معظم الخلايا مركبات كربونية صغيرة تعمل عمل وحدات بناء أساسية للجزيئات الكبيرة. **الجزيئات الكبيرة macromolecules** جزيئات ضخمة، تتكون من ارتباط جزيئات عضوية أصغر. وتسمى هذه الجزيئات الكبيرة البولимерات. **البولимерات polymers** جزيئات مكونة من وحدات متكررة من مركبات متشابهة أو قريبة التشابه تسمى الوحدات الأساسية (مونومرات monomers) ترتبط معاً بسلسلة من الروابط المشتركة (التساهمية). وكما في الجدول 8-8، تقسم الجزيئات الحيوية الكبيرة إلى أربع مجموعات رئيسية، هي الكربوهيدرات، والدهون، والبروتينات، والأحماض النووية.

ماذا قرأت؟ استخدم التشابه في وصف الجزيئات الكبيرة.

الجزيئات الكبيرة		الجدول 8-8
الوظيفة	المثال	المجموعة
• تخزن الطاقة. • توفر دعماً تركيبياً.	 خبز	الكربوهيدرات
• تخزن الطاقة. • تشكل حواجز.	 خلية نحل	الدهون
• نقل المواد. • تزيد سرعة التفاعل. • تعطي دعماً تركيبياً. • تكون المرمونات.	 الهيماوجلوبين	البروتينات
• تخزن المعلومات الوراثية وتنقلها.	 يُخزن DNA المعلومات الوراثية في نواة الخلية	الأحماض النووية

إرشادات الدراسة

ملاحظات ثنائية اطبع ورقة طويلاً نصفين، واكتب العنوان المكتوب بالخط الغامق الذي يظهر تحت عنوان الجزيئات الكبيرة على الجانب الأيمن (البولимерات). وسجل الملاحظات حول الأفكار المهمة والمفردات في أثناء قراءتك النص.




■ **الشكل 18-8** الجلوکوز من السكريات الأحادية. يتكون السكروز (سكريات ثنائية) من الجلوکوز والفركتوز، وكلاهما من السكريات الأحادية. الجلايكوجين من السكريات المتعددة ومترفرع، ويتشكل من الجلوکوز بوصفه وحدات أساسية.

الكربوهيدرات Carbohydrates تسمى المركبات التي تتكون من الكربون والهيدروجين والأكسجين بالنسبة التالية (ذرة أكسجين واحدة وذرتين هيدروجين في كل ذرة كربون) الكربوهيدرات. وتكتب الصيغة العامة للكربوهيدرات في صورة CH_2O^n ؛ حيث تمثل n عدد وحدات CH_2O في السلسلة. وتسمى الكربوهيدرات في أجسام المخلوقات الحية السكريات البسيطة (أو السكريات الأحادية) إذا كانت قيمة n فيها 1-3، ويؤدي الجلوکوز وهو من السكريات الأحادية المبين في **الشكل 18-8**، دوراً أساسياً بوصفه مصدراً للطاقة في المخلوقات الحية.

يمكن أن ترتبط جزيئات أحادية التسکر لتكون جزيئات أكبر. ويرتبط جزيئان من السكريات الأحادية معًا ليتّنجز السكريات الثنائية. وتشبه السكريات الثنائية الجلوکوز في أنها مصدر للطاقة. فالسكروز (سكر المائدة) المبين في **الشكل 18-8**، واللاكتوز الذي هو أحد مكونات الحليب هما سكريات ثنائية. أما جزيئات الكربوهيدرات الأطول فتسماى السكريات المتعددة. والجلايكوجين المبين في **الشكل 18-8** واحد من الأمثلة على هذه السكريات المهمة. فالجلايكوجين شكل آخر من الجلوکوز وهو مخزن للطاقة، ويوجد في الكبد والعضلات الهيكلية. وعندما يحتاج الجسم إلى الطاقة خلال التمارين الرياضية أو بين الوجبات يتحلل الجلايكوجين إلى جلوکوز. بالإضافة إلى دور الكربوهيدرات بوصفها مصدراً للطاقة؛ فهي تؤدي وظائف أخرى مهمة. وفي النبات، يوفر السيليلوز (نوع من الكربوهيدرات) دعماً تركيبياً للجدار الخلوي، كما في **الشكل 19-8**.

■ **الشكل 19-8** السيليلوز في خلايا النبات يعطي دعماً تركيبياً للأشجار لتبقى متتصبة في الغابة.



مختبر تحليل البيانات 3-8


بناءً على بيانات حقيقة

فسّر البيانات

هل تؤثر الألياف الذائبة في مستويات الكوليسترول؟ يرتبط وجود كميات كبيرة من الستيريدات، تسمى الكوليسترول، في الدم مع ظهور أمراض القلب. ويدرس الباحثون آثار الألياف الذائبة في الطعام في الكوليسترول.

البيانات والملاحظات

قامت هذه التجربة أثر ثلاثة ألياف ذائبة في مستويات الكوليسترول في الدم، وهي: البكتين (PE)، وعلكة الجوار gum (PSY)، والسيلبيوم (GG). وتم استخدام السيليلوز (CNT) بوصفه مجموعة ضابطة.



التفكير الناقد

- احسب نسبة التغير في مستويات الكوليسترول مقارنة بالمجموعة الضابطة.
- صف أثر الألياف الذائبة في مستويات الكوليسترول في الدم.

أخذت البيانات في هذا المختبر من:

Shen, et al. 1998. Dietary soluble fiber lowers plasma LDL cholesterol concentrations by altering lipoprotein metabolism in female Guinea pigs, *Journal of Nutrition*. 128: 1434 – 1441

يتكون السيليلوز من سلاسل جلوكوز ترتبط معًا بألياف صلبة تناسب تماماً دورها التركيبي. ويعد الكايتين من المركبات العديدة التسكر التي تحوي النيتروجين. وهو المكون الرئيس لصدفة الروبيان الخارجية، وسرطان البحر وبعض الحشرات، وكذلك الجدار الخلوي لبعض الفطريات.


الدهون Lipids تحتوي جزيئات الدهون غالباً على الكربون، والهييدروجين، وهي تكون الشحوم، والزيوت والشمع. وتتكون الدهون من وحدات بنائية هي الأحماض الدهنية والجليسرونول، ومكونات أخرى. والوظيفة الرئيسية للدهون هي تخزين الطاقة. ومن هذه الدهون ثلاثي الجليسيريد، وقد يكون دهنًا إذا كان صلباً في درجة حرارة الغرفة، وزيتاً إذا كان سائلاً في درجة حرارة الغرفة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تخزين ثلاثي الجليسيريد في الخلايا الدهنية في الجسم. كما تُغطى أوراق الأشجار بدهون تُسمى شمع الكيويتيل تمنع فقدان الماء. وتكون حجرات خلية النحل من شمع النحل.

الدهون المشبعة وغير المشبعة

Saturated and unsaturated fats تحتاج المخلوقات الحية إلى الدهون لإتمام وظائفها. ويتضمن التركيب الأساسي للدهون الأحماض الدهنية، كما في الشكل 20-8. حيث تتكون هذه الأحماض من سلسلة من ذرات الكربون التي يرتبط بعضها مع بعض من جهة ومع الهيدروجين من جهة أخرى بروابط أحادية أو ثنائية. فإذا كانت الروابط بين ذرات الكربون أحادية، سُميَّ الدهون المشبعة. أما الدهون التي تحوي رابطة ثنائية واحدة على الأقل بين ذرات الكربون في سلسلة الحمض الدهني فتسُمي الدهون غير المشبعة. وتسمى الدهون التي تحوي أكثر من رابطة ثنائية واحدة الدهون غير المشبعة المتعددة.

الدهون المفسفرة Phospholipids يبيّن الشكل 20-8 دهوناً خاصة تسمى الدهون المفسفرة، وهي مسؤولة عن تركيب الغشاء الخلوي ووظيفته. فالدهون كارهة للماء، وهذا يعني أنها لا تذوب فيه. وهذه الخاصية مهمة؛ لأنها تسمح للدهون أن تعمل حاجزاً في الأغشية الحيوية.





■ **الشكل 20-8** لا توجد رابطة ثنائية بين ذرات الكربون في حمض الستيريك. في حين توجد رابطة ثنائية واحدة في حمض الأوليك. وتحوي الدهون المفسفرة رأساً قطبياً وسلسلتين غير قطبيتين من الأحماض الدهنية.

الستيرويدات Steroids هناك مجموعة أخرى مهمة من الدهون، وهي مجموعة الستيرويدات التي تضم مواد منها الكوليسترول والهرمونات. وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع الذي يعدها دهوناً ضارة، إلا أن الكوليسترول يُعد نقطة البداية في إنتاج دهون ضرورية أخرى، ومنها فيتامين D وهرمونات الإستروجين والتستوستيرون.

البروتينات Proteins من الوحدات البنائية الأخرى في المخلوقات الحية البروتين. ويتكوّن البروتين من مركبات كربونية صغيرة تسمى الأحماض الأمينية. **الأحماض الأمينية amino acids** مركبات صغيرة مكونة من كربون، ونيتروجين، وأكسجين، وهيدروجين وأحياناًكبريت. وتشترك الأحماض الأمينية جميعها في التركيب العام نفسه.

تركيب الحمض الأميني Amino acid structure توجد ذرة كربون مركبة في الأحماض الأمينية، **الشكل 21-8**. ويكون الكربون أربع روابط مشتركة، وإحدى هذه الروابط مع الهيدروجين والروابط الثلاث الأخرى مع كل من مجموعة الأمين (NH_2-)، ومجموعة الكاربوكسيل (COOH) والمجموعة المتريرة ($\text{R}-$). وتجعل المجموعة المتريرة كل حمض أميني مختلفاً عن الآخر. وهناك 20 مجموعة متغيرة مختلفة. يتكون البروتين من الارتباط المتنوع بين جميع الأحماض الأمينية العشرين المختلفة. وترتبط عدة روابط مشتركة - تسمى الروابط البيتايدية - للأحماض الأمينية معًا لتكون البروتينات، **الشكل 21-8**. وتكون الرابطة البيتايدية بين مجموعة الأمين لحمض أميني ومجموعة الكاربوكسيل لحمض أميني آخر.

■ **الشكل 21**

يمين: يحوي التركيب العام للحمض الأميني أربعمجموعات حول ذرة كربون مركبة. يسار: تتكون الرابطة البيتايدية في البروتينات نتيجة تفاعل كيميائي.

فسر ما الجزيء الآخر الناتج عن تكون رابطة بيتايدية؟



وظيفة البروتين Protein function تشكل البروتينات حوالي 15% من كتلة الجسم، وتسهم في كل وظيفة من وظائفه تقريباً. فمثلاً، تكون عضلاتك وجلدك وشعرك من البروتينات. وتحوي خلايا الجسم حوالي 10,000 بروتين مختلف توفر دعماً تركيبياً، وتنقل المواد إلى داخل الخلية وبين الخلايا، وتوصيل الإشارات داخل الخلية وبين الخلايا، وتزيد من معدل سرعة التفاعلات الكيميائية، وتساهم في نمو الخلايا.


الإنزيمات Enzymes تحدث مجموعة هائلة من التفاعلات الكيميائية في جميع المخلوقات الحية. وتحدث هذه التفاعلات الكيميائية ببطء عندما تتم في المختبر؛ لأن طاقة التنشيط لها عالية. **طاقة التنشيط activation energy** هي الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل الكيميائي. وحتى يكون الأمر مفيداً للمخلوقات الحية دون الحاجة إلى استهلاك المزيد من الطاقة، يجب أن يكون هناك مواد إضافية لضمان حدوث التفاعل الكيميائي، على أن تقلل طاقة التنشيط، وتسمح للتفاعل بأن يكتمل بسرعة.

المحفز catalyst مادة تقلل طاقة التنشيط التي يتطلبها بدء التفاعل الكيميائي. وعلى الرغم من أن المحفز يؤدي دوراً مهماً في تسريع التفاعل الكيميائي، إلا أنه لا يزيد من كمية نواتج التفاعل ولا يستهلك في التفاعل. ويستخدم العلماء أنواعاً عديدة من المحفزات لحدث التفاعلات بصورة أسرع آلاف المرات مما لو حدث التفاعل من دون المحفز. هناك أنواع خاصة من البروتين تسمى الإنزيمات، وهي محفزات حيوية خلقها الله سبحانه وتعالى لكي تزيد سرعة التفاعل الكيميائي في العمليات الحيوية؛ فالإنزيمات ضرورية للحياة. قارن بين مسار التفاعل في الشكل 22-8، لتعرف أثر الإنزيم في التفاعل الكيميائي. والإنزيم كأي محفز لا يتم استهلاكه في أثناء التفاعل الكيميائي. فيمكن استخدامه مرة أخرى بعد أن يسهم في أي تفاعل كيميائي.

ومن الإنزيمات الأميليز، وهو مهم في اللعاب. وتببدأ عملية الهضم في الفم عندما يسرّع إنزيم الأميليز تحليل سكر الأميلوز، أحد مكونات النشا. وكما هو الحال في الأميليز، فإن معظم الإنزيمات تختص بتفاعل واحد فقط.

تكون الإنزيمات على درجة عالية من التخصص بنوع من التفاعلات. وهي في هذا تختلف عن العوامل المساعدة الكيميائية الأخرى؛ فهي اختيارية في تفاعلاتها، فكل إنزيم ينشط تفاعلاً واحداً أو عددًا قليلاً من التفاعلات، ولا تحدث تفاعلات جانبية غير مرغوبة.


يعمل الإنزيم على تقليل طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل، بحيث يحدث عند درجة حرارة الخلية، فكيف يقلل الإنزيم طاقة التنشيط لبدء التفاعل؟ تتبع الشكل 23-8 لتعلم كيف يعمل الإنزيم.



■ **الشكل 22-8** عندما يعمل إنزيم محفزاً حيوياً يحدث التفاعل بسرعة تستفيد منها الخلية. قارن بين طاقة تنشيط التفاعل من دون وجود الإنزيم وطاقة تنشيطه مع وجود الإنزيم.

المطويات

ضمّن مطويتك معلومات من هذا القسم.



■ **الشكل 8-23** تفاعل المادة المتفاعلة مع الإنزيم في أماكن خاصة تسمى المواقع النشطة. حيث ترتبط معه المواد التي يتاسب شكلها مع شكل المواقع النشطة.

تسمى المواد التي ترتبط مع الإنزيم المواد المتفاعلة substrates. ويسمى موقع ارتباط المادة المتفاعلة مع الإنزيم **الموقع النشط active site**. وللموقع النشط والمادة المتفاعلة شكل متماثل أو متطابق يمكن المادة المتفاعلة والإنزيم من الارتباط بأسلوب دقيق مشابه لطريقة ثبيث قطع الأحاجي بعضها مع بعض. وكما هو مبين في **الشكل 8-23** يتحد الإنزيم بالمادة المتفاعلة التي لها نفس حجم الموقع النشط وشكله.


عندما ترتبط المادة المتفاعلة مع الموقع النشط يغير هذا الموقع شكله ويكون معقد الإنزيم-المادة المتفاعلة. ويساعد الإنزيم المادة المتفاعلة على تكسير الروابط الكيميائية في المواد المتفاعلة، وت تكون روابط جديدة؛ حيث تتفاعل المادة المتفاعلة لتكون ناتجاً يحرره الإنزيم بعد ذلك.

تؤثر عوامل - منها الرقم الهيدروجيني، ودرجة الحرارة، ومواد أخرى - في نشاط الإنزيم. فمثلاً تكون معظم الإنزيمات في خلايا الإنسان في أقصى نشاط لها عند درجة حرارة مُثلَى قريبة من 37°C . ولكن الإنزيمات في المخلوقات الحية الأخرى كالبكتيريا تكون نشطة عند درجة حرارة مختلفة.

تؤثر الإنزيمات في الكثير من العمليات الحيوية. فعندما تلسع فأفعى سامة شخصاً ما يُحلل إنزيم موجود في سمهـا الغشاء البلازمي في خلايا دمهـا الحمراء، وكذلك ينضج التفاح الأخضر القاسي نتيجة نشاط الإنزيم، وتعطي عملية البناء الضوئي والتنفس الطاقة للخلية بمساعدة الإنزيمات. ولما كان النحل العامل مهمـاً في بقاء خلية النحل، فإن الإنزيمات أيضـاً مهمة في الخلية.

الأحماض النووية Nucleic acids المجموعة الرابعة من الجزيئات الحيوية الكبيرة هي الأحماض النووية. **الأحماض النووية nucleic acids** جزيئات كبيرة معقدة تخزن المعلومات الوراثية وتنقلها. يتكون الحمض النووي من وحدات بنائية صغيرة مكررة تسمى **النيوكليوتيدات nucleotides**. وتتكون النيوكليوتيدات من ذرات كربون ونيتروجين وأكسجين، وفوسفور وهيدروجين، **الشكل 8-24**. هناك ستة نيوكلويوتيدات رئيسة، كلها تحوي ثلات وحدات، هي الفوسفات والقاعدة النيتروجينية وسكر الرايبيوز الخماسي.





■ الشكل 24-8

يمين: ترتبط النيوكليوتيدات معاً نتيجة وجود روابط بين مجموعة السكر ومجموعة الفوسفات.

يسار: تحوي النيوكليوتيدات الـDNA سكر الرايبوز المقوص الأكسجين، في حين تحوي الـRNA سكر الرايبوز.

وهناك نوعان من الأحماض النووية في المخلوقات الحية، هما الحمض النووي الرايبوزي المنقوص الأكسجين (DNA)، والحمض النووي الرايبوزي (RNA). ففي الأحماض النووية مثل DNA و RNA، يرتبط سكر الرايبوز في أحد النيوكليوتيدات مع مجموعة فوسفات لنيوكليوتيد آخر. أما القاعدة النيتروجينية التي تبرز خارج السلسلة فهي قابلة لتكوين رابطة هيدروجينية مع قواعد أخرى في نيوكلويوتيدات أخرى.

يسمي النيوكليوتيد الذي يحوي ثلاثمجموعات من الفوسفات بالأدينوسين الثلاثي الفوسفات (ATP)، وهو الجزيء الذي يخزن الطاقة الكيميائية التي تستخدمها الخلايا في تفاعلاتها المختلفة، حيث تحرر الطاقة عند تكسير الرابطة بين مجموعة الفوسفات الثانية والثالثة.

التقويم 8-2

الخلاصة


- المركبات الكربونية جزيئات البناء الأساسية في المخلوقات الحية.
- تكون الجزيئات الحيوية الكبيرة بواسطة ارتباط مركبات كربونية صغيرة لتكون البولимерات.
- هناك أربعة أنواع من الجزيئات الحيوية الكبيرة.
- ترتبط الأحماض الأمينية برابطة ببتيدية لتكون البروتين.
- تكون سلسلة النيوكليوتيدات الأحماض النووية.
- الإنزيمات محفّزات حيوية.

التفكير الناقد

6. تَخَصِّنْ نَتْيَجَةَ وَجُودِ الْكَثِيرِ مِنِ الْبَرْوِتِينَاتِ فِي الْجَسْمِ، وَفَسَّرْ لِمَاذَا يَعْدُ شَكْلُ الْإِنْزِيمِ مِهْمَّاً لَوْظِيفَتِه؟
7. ارْسِمْ تَرْكِيَيْنِ (أَحَدُهُمَا سَلْسَلَةً مُسْتَقِيمَةً وَأَخْرِيًّا حَلْقِيَّةً) لَكَرْبُوَهِيدَرَاتٍ صِيغَتِهَا الكِيمِيَائِيَّةُ $(\text{CH}_2\text{O})_6$.
1. الْفَكِرَةُ > الرَّئِيسَةُ فَسِرِّيْ إِذَا تمَ تَحْدِيدُ مَادَةٍ غَيْرِ مَعْرُوفَةٍ وَجُدِّتُ فِي النَّيْزِكِ وَلَا تَحْتَوِي عَلَى بَقَايَا كَرْبُونَ، فَهَلْ يُسْتَطِعُ الْعُلَمَاءُ اسْتِنْتَاجُ أَنْ هَنَاكِ حَيَاةٌ فِي النَّيْزِكِ؟
2. اعْمَلْ قَائِمَةً تَقَارِنُ فِيهَا بَيْنَ الْجَزِئَاتِ الْحَيَوِيَّةِ الْكَبِيرَةِ الْأَرْبَعَةِ.
3. حَدَّدْ مَكَوْنَاتِ الْكَرْبُوَهِيدَرَاتِ وَالْبَرْوِتِينَاتِ.
4. ثَاقِشْ أَهْمَيَّةَ تَرْتِيبِ الْحَمْضِ الْأَمِينِيِّ فِي وَظِيفَةِ الْبَرْوِتِينِ.
5. صَفِّ أَهْمَيَّةَ الْإِنْزِيمَاتِ فِي الْمُخْلُوقَاتِ الْحَيَّةِ.

مستجدات في علم الأحياء

استكشاف تقنية النانو Exploring Nanotechnology



تبين هذه الصورة المأخوذة بوساطة الحاسوب قطعة دقيقة جدًا لها أذرع من رقائق حيوية. وتحتوي الرقائق الحيوية على مواد عضوية قد تكون قادرة على إصلاح الأضرار في الخلية العصبية يومًا ما.

الليزر Lasers طور العلماء تقنية الليزر التي تسمح لهم بالتعامل مع أجزاء الخلية الداخلية أو علاجها دون إحداث ضرر بالغشاء الخلوي أو التراكيب الخلوية الأخرى. تخيل أن لك القدرة على القيام بجراحة دقيقة جدًا على المستوى الخلوي.

وربما تكون تقنية النانو في المستقبل خط الدفاع الأول في معالجة السرطان، وربما تصبح أيضًا التقنية المعيارية لفحص أدوية جديدة أو العلاج المفضل المستخدم في العلاج الجيني.

الكتابة في علم الأحياء

مراجعة اكتب تلخيصاً حول استخدام تقنية النانو في الطب والرعاية الصحية، وصف فوائدها وتحدياتها، وتستطيع أن تُضمن تقريرك عرضًا توضيحيًا.

تخيل أنه يمكن اكتشاف خلايا السرطان والقضاء عليها الواحدة تلو الأخرى، أو أن دواءً جديداً يمكن اختباره على خلية واحدة لتقويم فاعليته السريرية. إن التقدم التقني هو الذي سمح للعلماء بالتركيز على خلايا محددة، و يجعلها حقيقة في المستقبل القريب.

إن علم تقنية النانو فرع من العلوم يدرس تطور آلات تعمل بمقاييس دقيق جدًا هو النانو، واستخدامها. والنano يساوي واحدًا من البليون من المتر (m^{-9}). ولوضع هذا المقياس في منظوره الحقيقي لاحظ أن معظم خلايا الإنسان يتراوح قطرها بين 10,000–20,000 nm.

مجهر القوة الذرية *Atomic force microscope* يستخدم الباحثون تقنية النانو في مجهر القوة الذرية ليعملوا على خلية مفردة. ويستخدم هذا المجهر إبرة دقيقة جدًا. ويعطي هذا النوع من المجاهر صورة للخلية باستخدام مجس قطرها 200 nm تقريباً إلى الخلية دون إلحاق ضرر بغضائها. كما تساعد الإبرة الدقيقة العلماء على دراسة كيف تستجيب الخلية لعلاج جديد، أو كيف تختلف كيمياء خلية مريضة عن الخلية السليمة. هناك تطبيق آخر للإبرة الدقيقة يتم بإدخال سلاسل DNA مباشرة إلى نواة الخلية لفحص تقنية علاج جيني جديد لمعالجة الأمراض الوراثية.

مختبر الأحياء

استقصاء ميداني: ما المواد التي تنتقل خلال غشاء شبه منفذ؟

6. أعد الخطوة رقم 5 مستخدماً المحلول الثاني.
7. بعد 45 دقيقة انقل بعض الماء من كل دورق في أنابيب اختبار.
8. أضف بضع قطرات من محليل الاختبار المناسبة إلى الماء.
9. سجّل نتائجك، وحدّد ما إذا كان توقيعك صحيحاً. ثم قارن نتائجك بتائج مجموعات أخرى من زملاء صفك، وسجل النتائج للمحلولين اللذين أعددتهم للفحص.
10. التنظيف والتخلص من الفضلات. اغسل جميع المواد، ثم أعدها إلى مكانها. وتخلص من المحليل وأنابيب дилеза التي استخدمت وفق إرشادات معلمك. اغسل يديك جيداً بعد استخدام أي مادة كيميائية.

حل ثم استنتاج

1. قوم. هل انتقلت جزيئات المحلول الذي فحصته عبر أنبوب дилеза؟ فسر إجابتك.
2. التفكير الناقد. ما خصائص الغشاء البلازمي التي تجعله ينظم حركة الجزيئات بدرجة أكبر من غشاء дилеза؟
3. تحليل الخطأ. كيف يؤدي عدم غسل كيس дилезة بالماء المقطر قبل وضعه في الدورق إلى اختبار موجب كاذب لوجود جزيئات مذابة؟ وما مصادر الخطأ الأخرى التي تؤدي إلى نتائج غير صحيحة؟

عرض الملصقات

تواصل. يظهر مرض التليف الكيسي عندما يفتقر الغشاء البلازمي إلى وجود جزيء يساعد على نقل أيون الكلور. ابحث عن هذا المرض، ثم اعرض ما واجده على صفك مستخدماً الملصقات.

الخلفية النظرية: جميع الأغشية في الخلايا - ومنها الغشاء البلازمي والأغشية التي تحيط بالغضيات في الخلايا الحقيقية النواة - شبه منفذة. وفي هذه التجربة تفحص حركة بعض الجزيئات الحيوية المهمة عبر غشاء ديلز مشابه للغشاء البلازمي. ولأن الغشاء ذو ثقوب، لذا فهو يسمح بنفاذ الجزيئات الصغيرة الحجم فقط.

سؤال: ما المواد التي تنتقل عبر غشاء الديلز؟

المواد والأدوات

- أنابيب ديلز من السيليلوز (2).
- دورق 400 mL (2).
- سلك.
- مقصات.
- ماء مقطر.
- صحن بلاستيكي صغير.
- محلول نشا.
- محلول البيومون.
- محلول جلوكوز.
- محلول NaCl.
- قطارة.
- محلول يود (الفحص النشا).
- أنابيب اختبار (2).
- حامل أنابيب.
- قمع.
- قلم شمعي.

احتياطات السلامة



خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. اعمل جدول بيانات وفق تعليمات معلمك.
3. خذ قطعتين من أنابيب дилезة ودورقين سعة كل منها 400 mL، ومحولين أعددتهم للفحص من قبل.
4. اكتب على الدوارق نوع المحلول الذي وضعته في أنبوب дيلز.
5. حضّر مع زميلك أحد أنابيب дилезة، واملاه بأحد محليل، واغسل الكيس من الخارج جيداً، ثم ضع كيس дилезة المملوء في دورق يحوي ماء مقطرًا.



دليل مراجعة الفصل

المطويات

اكتب تقريراً عن أهمية الإنزيمات في المخلوقات الحية، وفسّر أهمية وجودها في العديد من التفاعلات في الخلية.

المفاهيم الرئيسية

المفردات

1-8 التراكيب الخلوية والعضيات

الفكرة الرئيسية يساعد الغشاء البلازمي على المحافظة على الازان الداخلي للخلية، كما تسمح العضيات الموجودة في الخلايا الحقيقة النواة بالقيام بوظائف متخصصة داخل الخلية.

- هناك نوعان رئسان من الخلايا، هما الخلايا البدائية النواة والخلايا الحقيقة النواة.
- تحتوي الخلايا الحقيقة النواة على النواة والعضيات.
- النفاذية الاختيارية خاصية الغشاء البلازمي التي تسمح للخلية بالسيطرة على ما يدخل إليها أو يخرج منها.
- يتكون الغشاء البلازمي من طبقة مزدوجة من جزيئات الدهون المفسفرة.
- يسهم الكوليسترول والبروتينات الناقلة في وظيفة الغشاء البلازمي.
- يصف النموذج الفسيفسائي السائل الغشاء البلازمي.
- تحوي الخلايا الحقيقة النواة عضيات محاطة بغشاء في السيتوبلازم، تؤدي وظائف الخلية.
- الرايبوسومات موقع لبناء البروتين.
- الميتوكندريا مصانع الطاقة في الخلية.

الغشاء البلازمي
العضيات
النفاذية الاختيارية
طبقة الدهون المفسفرة المزدوجة
البروتين الناقل
النموذج الفسيفسائي السائل
الميكل الخلوي
البلاستيدات الخضراء
الجدار الخلوي
المدب
السوط

2-8 كيمياء الخلية

الفكرة الرئيسية تتكون خلية الحية من مركبات عضوية يدخل في تركيبها الكربون بوصفه عنصراً أساسياً.

- المركبات الكربونية جزيئات البناء الأساسية في المخلوقات الحية.
- تتكون الجزيئات الحيوية الكبيرة بواسطة ارتباط مركبات كربونية صغيرة لتكون البولимерات.
- هناك أربعة أنواع من الجزيئات الحيوية الكبيرة.
- تربط الرابطة البيتيدية الأحماض الأمينية معًا لتكون البروتين.
- تكون سلاسل النبوكليلويات الأحماض النووي.
- الإنزيمات محفّزات حيوية.

الجزيئات الكبيرة
البوليمير
الحمض الأميني
طاقة التنشيط
المحفز
الموقع النشط
الحمض النووي
النيوكليوتيدات

اللّغة العربية

8



8-1

مراجعة المفردات

استبدل الكلمة التي تحتها خط بكلمة أخرى من دليل

مراجعة الفصل لتصبح الجملة صحيحة:

1. النواة تركيب يحيط بالخلية ويساعد على ضبط ما يدخل إلى الخلية أو يخرج منها.

2. للخلية البدائية النواة عضيات محااطة بغشاء.

3. العضيات هي جزيئات البناء الأساسية في المخلوقات الحية.

أكمل الجمل الآتية مستخدماً مفردات من دليل مراجعة

الفصل:

4. _____ تعد الجزيء التركيبية الأساسية الذي يكون الغشاء البلازمي.

5. _____ بروتينات ضرورية لنقل المواد أو الفضلات خلال الغشاء البلازمي.

6. _____ الخاصية التي تسمح لبعض المواد فقط بالدخول إلى الخلية والخروج منها.

اماً الفراغ في الجمل الآتية بمصطلح من صفحة دليل


مراجعة الفصل:

7. _____ تخزن الفضلات.

8. _____ تنتج رايبوسومات.

9. _____ تولد طاقة للخلية.

10. _____ توزع البروتينات في حويصلات.



صورة ملونة بالمجهر الإلكتروني النافذ تكبير $\times 5000$

ثبت المفاهيم الرئيسية


11. أي التراكيب الآتية تتوقع أن تجد فيها الجدار الخلوي؟

- a. خلية من جلد الإنسان.
- b. خلية من شجر بلوط.
- c. خلية دم من قطة.
- d. خلية كبد من فأر.

استخدم الصورة الآتية في الإجابة عن السؤال 12.



استخدم المخطط أدناه في الإجابة عن السؤالين 15 و 16.



15. ما التركيب الذي يُصنع البروتينات التي تستخدمها الخلية؟

- a. المادة الكروماتينية.
- b. النوية.
- c. الريبوسومات.
- d. الثقب النووي.

16. أين تتجزأ الريبوسومات؟

- a. المادة الكروماتينية.
- b. النوية.
- c. الثقب النووي.
- d. الشبكة الإندوبلازمية.

أسئلة بنائية




17. حلّ. ربما تكون المادة الموجودة في نيزكٍ ما خلية. ما الصفات التي ينبغي وجودها في المادة حتى تُعدّ خلية؟

18. إجابة قصيرة. فسر كيف يحافظ الغشاء البلازمي على الاتزان الداخلي في الخلية؟

19. نهاية مفتوحة. فسر ما الفسيفساء؟ ولماذا يستخدم مصطلح "النموذج الفسيفسيائي المائع" في وصف الغشاء البلازمي؟

20. إجابة قصيرة. كيف يسمح ترتيب الدهون المفسفرة في الطبقة المزدوجة للخلية بالتفاعل مع البيئة الداخلية والخارجية؟

13. ما الترتيب الأفضل للدهون المفسفرة الذي يمثل طبقة الدهون المفسفرة المزدوجة في الغشاء البلازمي؟



14. ما الوضع الذي يزيد من سiolة طبقة الدهون المفسفرة المزدوجة؟

- a. انخفاض درجة الحرارة.
- b. زيادة عدد البروتينات.
- c. زيادة عدد جزيئات الكوليسترول.
- d. زيادة عدد الأحماض الدهنية غير المشبعة.

8-2

مراجعة المفردات

صل بين المصطلح في القائمة اليمنى مع ما يناسبه في القائمة اليسرى في كل مما يأتي:


- .29. طاقة التنشيط. A. بروتين يزيد من سرعة التفاعل.
- .30. المادة B. مواد تحوي روابط كيميائية جديدة.
- .31. الإنزيم. C. الطاقة اللازمة لبدء التفاعل.
- .32. المادة الناتجة. D. المادة التي ترتبط مع الإنزيم.

تبسيط المفاهيم الرئيسية

- .33. أيٌ مما يأتي مادة تقلل من طاقة التنشيط؟
a. المحفز.
b. المواد المتفاعلة.
c. الأيون.
d. مادة الإنزيم المتفاعلة.
- .34. ما العناصر التي توجد في الأحماض الأمينية?
a. النيتروجين والكربون.
b. الكربون والأكسجين.
c. الهيدروجين والفوسفور.
d. الكبريت والأكسجين.
- .35. ما الذي يربط الأحماض الأمينية بعضها مع بعض?
a. الروابط الببتيدية.
b. قوى قان درفال.
c. الروابط الهيدروجينية.
d. الروابط الأيونية.
- .36. ما المادة التي لا تعد جزءاً من النيوكليوتيدات?
a. الفوسفات.
b. القاعدة النيتروجينية.
c. السكر.
d. الماء.

21. إجابة قصيرة. صُف لماذا يُعد الهيكل الخلوي في السيتوبلازم اكتشافاً حديثاً؟

22. إجابة قصيرة. قارن بين تركيب ووظيفة الميتوكندريا والبلاستيدية الخضراء في الرسم أدناه.



23. نهاية مفتوحة. اقترح سبيباً يبين لماذا تتحد البروتينات المعلقة التي تم تجميعها في الفجوة مع الأجسام محللة؟

التفكير الناقد

24. إجابة قصيرة. قارن بين الخلايا البدائية النواة والخلايا الحقيقة النواة.

25. كون فرضية. كيف تتأثر الخلية إذا فقد غشاءها البلازمي القدرة على النفاذية الاختيارية؟

26. توقع. ما الذي يحدث للخلية إذا لم تعد تستطيع إنتاج الكوليسترول؟

27. حدّد مثلاً يساعد فيه جدار الخلية على بقاء النبات في بيئته الطبيعية.


28. استنتج. فسر لماذا تحوي خلايا النبات التي تنقل الماء عكss اتجاه الجاذبية الأرضية ميتوكندريا أكثر مما تحوي الخلايا النباتية الأخرى؟

تقويم إضافي

44. **الكتابة في علم الأحياء** اكتب مقالة تصف فيها وظائف خمس عضيات في الخلية على الأقل.

أسئلة المستندات

يعد النشا المخزن الرئيس للكربون في النباتات. أجريت تجارب لتحديد ما إذا كان لسكر تريهالوز Trehalose دور في تنظيم إنتاج النشا في النباتات؛ حيث قُطعت أوراق نباتات في صورة أفراد، ووضعت في حاضنة مدة 3 ساعات في محلول السربتول (المجموعة الضابطة)، والسكروز (سكر المائدة)، والتريهالوز. ثم تم قياس مستويات النشا والسكروز في الأوراق. استخدم البيانات في المخطط أدناه للإجابة عن الأسئلة التي تليه:



45. لخص معدل إنتاج النشا والسكروز في المحاليل الثلاثة.

46. ما الاستنتاجات التي توصل إليها الباحثون بناءً على هذه البيانات؟

أسئلة بنائية

37. إجابة قصيرة. ما خصائص الإنزيمات؟
38. نهاية مفتوحة. حدد ثم صف العوامل التي تؤثر في نشاط الإنزيمات.
39. نهاية مفتوحة. لماذا تحتوي الخلايا على الجزيئات الكبيرة والمركبات الكربونية الصغيرة معًا؟
40. نهاية مفتوحة. لماذا لا يستطيع الإنسان هضم جميع أنواع الكربوهيدرات؟

التفكير الناقد

- استعمل الرسم البياني الآتي في الإجابة عن السؤالين 41 و 42.



41. صف أثر درجة الحرارة في معدل التفاعلات مستعملاً المخطط أعلاه.
42. استنتج. أي الإنزيمات أكثر نشاطاً في خلية إنسان؟ ولماذا؟
43. اعمل. ارسم جدولًا يضم الجزيئات الحيوية الأربع الكبيرة مضمناً الجدول تركيبها ووظيفة كل منها.


اختبار مقتني

أسئلة الاختيار من متعدد

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤالين 3 و4.



استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤالين 1 و2.



3. أيِّ الجزيئات الكبيرة لها تركيب يشبه الشكل السابق؟

- a. كربوهيدرات.
- b. دهون.
- c. نيوكليوتيد.
- d. بروتين.

4. أيِّ وظائف الجزيئات تحتاج إلى انشاءات في أشكالها؟

- a. سلوك مركب غير قطبي.
- b. عندما تؤدي وظيفة الموضع النشط.
- c. الانتقال عبر الغشاء البلازمي.
- d. عندما تؤدي وظيفة تخزين طاقة الخلية.

1. أيِّ الأرقام يمثُّل الموقع الذي تتوقع فيه وجود مواد غير ذائبة في الماء؟

- 1 .a
- 2 .b
- 3 .c
- 4 .d

2. ما مأثر وجود جزيئات مرتبة من الدهون المفسفرة القطبية وغير القطبية بالنمط المبين في الشكل أعلاه؟

- a. تسمح بتحرك البروتينات الناقلة بسهولة خلال الغشاء.
- b. تسيطر على حركة المواد عبر الغشاء.
- c. تساعد الخلية على الحفاظ على خصائصها الشكلية.
- d. تكون فراغات كثيرة داخل طبقة الدهون المفسفرة المزدوجة.

اختبار مقمن


استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 7.



7. ما دور الرقم (1) في نشاط الإنزيم؟

- a. يؤدي إلى حدوث التفاعل ببطء أكبر.
- b. يوفر المزيد من المواد المتفاعلة.
- c. يوفر بقعة فريدة من أجل ارتباط المادة المتفاعلة.
- d. يرفع طاقة تنشيط التفاعل.

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 5.



5. البروزات التي تخرج من التركيب أعلاه هي:


- a. الأهداب.
- b. الأنبيبات الدقيقة.
- c. الخملات المعاوية.
- d. الأسوات.

6. ما الذي يسهم في النفاذية الاختيارية للغشاء الخلوي؟

- a. الكربوهيدرات.
- b. الأيونات.
- c. الأملاح المعدنية.
- d. البروتينات.

أسئلة الإجابات القصيرة

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 17.



17. يبيّن الرسم تأثير إنزيم معين يتدخل في تحليل البروتينات في الجهاز الهضمي. وضح فيم يختلف هضم البروتين عند الشخص الذي ليس لديه هذا الإنزيم؟
18. ما العضية التي تتوقع أن وجودها بأعداد كبيرة داخل الخلايا التي تضخ حمض المعدة إلى خارج المعدة ضد فرق التركيز؟ وضح إجابتك.

8. استخدم المخطط التنظيمي في تنظيم المعلومات التي تتعلق ببعضيات الخلية وصنع البروتين. وفي كل خطوة حلّل دور كل عضية في صنع البروتين.

9. قارن بين وظائف كل من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والأحماض النوويّة.

10. ماذا يحدث إذا لم يكن الغشاء اللازمي شبه منفذ؟

11. لماذا تعد عملية ارتباط الإنزيمات مع مادتها المتفاعلة الخاصة بها مهمًا جدًا؟

12. اذكر ثلاثة مكونات لغشاء الخلية اللازمي، ثم وضح لماذا تعدد كل منها مهمة في وظائف الخلية؟

13. قارن بين تركيب الجدار الخلوي وتركيب الغشاء اللازمي.

14. اذكر ثلاثة مكونات في الخلية، ووضح أهمية كل مكون لوظائفها.

أسئلة الإجابات المفتوحة

15. صف وظيفة الأنبيبات الدقيقة، ثم توقع ما يحدث إذا لم تحو الخلية الأنبيبات الدقيقة.

16. رغم أن البلاستيدات الخضراء والميتوكندريا تؤديان وظائف مختلفة، إلا أن تركبيهما متتشابهان، اربط بين تركبيهما المتتشابهين ووظائفها.



اختبار مقتني

سؤال مقالى

توجد العضيات نفسها في العديد من أنواع الخلايا المختلفة في جسم الحيوان. وعلى الرغم من ذلك، هناك اختلافات في عدد العضيات الموجودة؛ بناءً على وظيفة الخلايا المختلفة. فمثلاً تحتوي الخلايا التي تتطلب كمية كبيرة من الطاقة لأداء وظيفتها على أعداد أكبر من الميتوكندريا.

استخدم المعلومات الواردة في النص أعلاه للإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقال.

20. كيف يختلف نوعان من الخلايا الحيوانية من حيث نوع العضيات التي يحتويان عليها؟ اكتب فرضية حول الفروق الخلوية بين نوعين من الخلايا الحيوانية، ثمصمّم تجربة لاختبار فرضيتك.

يوجد في المخلوقات الحية الكثير من الجزيئات التي تتكون من ترابط وحدات صغيرة (مونومر) بعضها مع بعض في تسلسل مختلف، أو في أنماط مختلفة. فعلى سبيل المثال، تستخدم المخلوقات الحية عدداً قليلاً من النيوكليوتيدات لبناء الأحماض النوويه. ويتوفر وجود آلاف النيوكليوتيدات المتسلسلة المختلفة في الأحماض النوويه الشفرة الأساسية للمعلومات الوراثية في المخلوقات الحية.

استخدم المعلومات الواردة في الفقرة أعلاه في الإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقال:

19. صُفِّ كيف تُعد عملية استخدام الوحدات الأساسية (المونومر) مهمة لبناء جزيئات كبيرة معقدة في المخلوقات الحية.

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	الدرس / الفصل	الصف
20	8-1	2-1
19	8-2	2-1
18	8-1	2-1
17	8-2	2-1
16	8-1	2-1
15	8-1	2-1
14	8-1	2-1
13	8-1	2-1
12	8-2	2-1
11	8-1	2-1
10	8-2	2-1
9	8-1	2-1
8	8-2	2-1
7	8-1	2-1
6	8-2	2-1
5	8-1	2-1
4	8-2	2-1
3	8-1	2-1
2	8-1	2-1
1	8-1	2-1


الطاقة الخلوية

Cellular Energy


9



الجلوكوز



البلاستيدية الخضراء



الفكرة العامة تُحول عملية البناء الضوئي الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية، في حين يستعمل التنفس الخلوي الطاقة الكيميائية لإتمام الوظائف الحيوية.

٩-١ كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة؟

ال فكرة الرئيسية تستخدم جميع المخلوقات الحية الطاقة ل القيام بوظائفها الحيوية.

٩-٢ البناء الضوئي

الفكرة الرئيسية تحول الطاقة الضوئية بعد امتصاصها إلى طاقة كيميائية في أثناء عملية البناء الضوئي.

٩-٣ التنفس الخلوي

الفكرة الرئيسية تحصل المخلوقات الحية على الطاقة بتحليل الجزيئات العضوية في أثناء عملية التنفس الخلوي.

حقائق في علم الأحياء


- تأكل الأغنام أنواعاً مختلفة من الأعشاب للحصول على الجلوكوز الذي يعد مصدراً للطاقة.
- الأعشاب لونها أخضر لأنها تحتوي على الكلوروفيل، وهو صبغة موجودة في البلاستيدات الخضراء.
- قد يستهلك عداؤو الماراثون 4.5 g من الجلوكوز كل دقيقة لتزويد عضلاتهم بالطاقة.

نشاطات تمهيدية


مراحل التنفس الخلوي اعمل المطوية الآتية لتساعدك على فهم آلية حصول المخلوقات الحية على طاقتها من المواد المغذية في أثناء عملية التنفس الخلوي.

المطويات منظمات الأفكار


الخطوة 1: اثن لساناً عرضه 5.5 cm على طول ورقة كما في الشكل الآتي:



الخطوة 2، اثن الورقة لتكون ثلاثة أجزاء كما في الشكل الآتي:



الخطوة 3: ثبت الحواف الخارجية للألسنة باستخدام الصمغ أو الدباسة لتكون مطوية في صورة كليب من ثلاثة جيوب، ثم عنون الجيوب كما في الشكل. استخدم بطاقات صغيرة لتسجيل المعلومات، ثم ضعها في الجيب (المحفظة) المناسب.



المطويات استعمل هذه المطوية في القسم 3-9. سجل - وأنت تقرأ الدرس - ما تعلمته حول مراحل التنفس الخلوي الآتية: التحلل السكري، حلقة كربس، نقل الإلكترون.

تجربة (الشماءلية)

كيف تحول الطاقة؟

يسير على تدفق الطاقة في الأنظمة البيئية الحيوية تفاعلاتٌ وعمليات كيميائية متنوعة. تحول الطاقة من طاقة الشمس الضوئية إلى طاقة كيميائية، ثم إلى أشكال أخرى من الطاقة. ستلاحظ في هذه التجربة عمليتين مرتبتين مع تحولات الطاقة.

خطوات العمل



1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. استخدم مخبأً مدرجًا لقياس mL 100 من الماء، ثم ضعها في كأس زجاجية سعتها 250 mL. استعمل مقياس الحرارة لتسجل درجة حرارة الماء.
3. زن g 40 من مادة كلوريد الكالسيوم اللامائي CaCl_2). استخدم ساق تحريرٍ زجاجية لإذابة كلوريد الكالسيوم في الماء. ثم سجل درجة حرارة محلول كل 15 ثانية مدة ثلاث دقائق.
4. كرر الخطوتين 2 و3 باستخدام g 40 من ملح إبسوم (كبريتات الماغنسيوم المائية MgSO_4) بدلاً من CaCl_2 .
5. مثل بياناتك بالرسم البياني مستخدماً ألواناً مختلفة لكل عملية.

التحليل

1. صف الرسم البياني للبيانات التي جمعتها.
2. توقع ما تحولات الطاقة التي حدثت في العمليتين؟



9-1

كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة؟

How Organisms Obtain Energy?

الفكرة الرئيسية تستخدم جميع المخلوقات الحية الطاقة للقيام بوظائفها الحيوية. **الربط مع الحياة** يطلق على بعض المدن أحياناً "مدينة لا تنام"؛ لعدم توقف الحركة فيها. وهي في ذلك تشبه الخلايا الحية التي تقوم بنشاطات مستمرة وثابتة.

تحولات الطاقة Energy Transformations

معظم التفاعلات والعمليات الكيميائية في خلايا الجسم مستمرة، حتى لو ظنت أنك لا تستهلك أي طاقة. فالجزئيات الكبيرة تبني وتحلل، وتنقل المواد عبر الغشاء الخلوي، وكذلك تنقل المعلومات الوراثية. هذه الأنشطة الخلوية جماعتها تحتاج إلى الطاقة energy، وهي القدرة على إنجاز شغل. وبين الشكل 9-1 وبعض المحطات الرئيسية في دراسة الطاقة الخلوية. أما الدينамиكا الحرارية thermodynamics فهي دراسة تدفق الطاقة وتحولها في الكون.

قوانين الديناميكا الحرارية Laws of Thermodynamics يُسمى القانون الأول في الديناميكا الحرارية قانون حفظ الطاقة، وينص على أن الطاقة يمكن أن تتحول من شكل إلى آخر، ولكن لا يمكن أن تفنى أو تُستحدث إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فمثلاً تتحول الطاقة المخزنة في المواد المغذية إلى طاقة كيميائية عندما تأكل، وتتحول إلى طاقة ميكانيكية عندما تركض أو تركل الكرة.

الأهداف

- تلخص قانوني الديناميكا الحرارية.
- تقارن بين المخلوقات ذاتية التغذى وغير ذاتية التغذى.
- تصف آلية عمل جزء الطاقة ATP في الخلية.

مراجعة المفردات

المستوى الغذائي: كل خطوة في السلسلة الغذائية أو الشبكة الغذائية.

المفردات الجديدة

الطاقة الدينamiكا الحرارية عملية أيض التنفس الخلوي ADenosine Triphosphate ATP

الشكل 9-1


فهم الطاقة الخلوية

أدت الاكتشافات العلمية إلى فهم أكبر لعملية البناء الضوئي والتنفس الخلوي.



■ **الشكل 2-9** سخر الله جلَّ وعلا
الشمس لتكون المصدر الرئيس لمظنم الطاقة
في المخلوقات الحية، وتنتقل الطاقة من
المخلوقات الذاتية التغذوي إلى المخلوقات غير
الذاتية التغذوي.

اربط بين قانوني الديناميكا الحرارية والمخلوقات
الحية في الشكل.



.....
المفردات
.....
أصل الكلمة
ذاتي التغذوي *Autotrophos*
من الكلمة اليونانية *Autotrophos*
وتعني "بناء المخلوق الحي
غذاءه بنفسه".....

ينص القانون الثاني في الديناميكا الحرارية على حدوث فقدان في الطاقة عند تحولها من شكل إلى آخر . وعموماً، فإن الطاقة التي تُفقد أو تُضييع ، تتحول إلى طاقة حرارية . وتعد السلسلة الغذائية مثلاً واضحاً على القانون الثاني للديناميكا الحرارية . ومن المعروف أن كمية الطاقة القابلة للاستخدام والمتوفرة في المستوى الغذائي الأعلى تتناقص على نحو مستمر في السلسلة الغذائية .

ذاتية التغذوي وغير ذاتية التغذوي

خلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات ذاتية التغذوي لكي تكون قادرة على صنع غذائها ب نفسها . وبعض ذاتية التغذوي - التي تُسمى ذاتية التغذوي كيميائياً - تستخدم المواد غير العضوية مثل كبريتيد الهيدروجين مصدرًا للطاقة . أما بعضها الآخر - ومنها النباتات ، كما في **الشكل 2-9** - فتسمى المخلوقات ذاتية التغذوي ضوئية؛ لأنها تقوم بتحويل الطاقة الضوئية من الشمس إلى طاقة كيميائية . أما المخلوقات غير الذاتية التغذوي مثل حشرة المن والدعسوقة في **الشكل 2-9** ، فهي مخلوقات حية تحتاج إلى ابتلاع الطعام وهضميه للحصول على الطاقة .

2002م اقترحت جوزفين موديكا- نابولييانو
أن الاختلافات بين الميتوكوندريا السليمة
والسرطانية قد تؤدي إلى الكشف المبكر عن
السرطان، وربما إلى علاجات جديدة له.

1980م اكتشفت جيمي ميكيل في أثناء
دراساتها الميتوكوندريا في ذباب الفاكهة
والفئران أن توقف الميتوكوندريا عن
العمل يسبب الهرم.

1993م اكتشفت مستحاثات (أحافير)
تدل على أن بعض الخلايا البدائية تقوم
بعملية البناء الضوئي.

2000

1980


1960



عملية الأيض Metabolism

يُشار إلى جميع التفاعلات الكيميائية في الخلية بعملية تسمى **عملية الأيض** metabolism. وتحتاج سلسلة التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الماء الناتجة عن أحد تفاعلاتها مادةً متفاعلة لتفاعل التالي مسار الأيض. ومسارات الأيض نوعان: مسارات الهدم، ومسارات البناء. ففي مسار الهدم تتحرر الطاقة نتيجة تحليل الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات صغيرة. أما مسار البناء فيستخدم الطاقة الناتجة عن مسار الهدم في بناء جزيئات كبيرة من جزيئات صغيرة. ويتجزأ عن العلاقة بين مسارات الهدم والبناء تدفق مستمر للطاقة في المخلوق الحي.

تنقل الطاقة باستمرار بين عمليات الأيض داخل المخلوقات الحية في النظام البيئي. فعلى سبيل المثال تعد عملية البناء الضوئي photosynthesis مسار بناء، حيث تحول طاقة الشمس الضوئية إلى طاقة كيميائية تستخدمها الخلية. وفي هذا التفاعل تستخدم المخلوقات الحية الذاتية التغذى طاقة الضوء من الشمس وثاني أكسيد الكربون والماء لتكون سكر الجلوكوز والأكسجين. وكما يبين **الشكل 3-9**، يمكن للطاقة المخزنة بين جزيئات سكر الجلوكوز الناتج عن عملية البناء الضوئي أن تنتقل إلى مخلوقات حية أخرى عند استهلاك هذه الجزيئات في صورة غذاء.



■ **الشكل 3-9** في النظام البيئي، يكون البناء الضوئي والتنفس الخلوي دورة مستمرة.
حدد مسارات الهدم والبناء في الشكل.

تجربة استهلاكية

مراجعة بناءً على ما قرأته عن تحولات الطاقة، كيف تجيب الآن عن أسئلة التحليل؟

تجربة 1 - 9

ربط البناء الضوئي بالتنفس الخلوي

كيف يعمل البناء الضوئي والتنفس الخلوي معاً في النظام البيئي؟ استخدم كاشفاً كيميائياً لاختبار انتقال ثاني أكسيد الكربون خلال عملية البناء الضوئي والتنفس الخلوي.

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. اعمل جدول بيانات لتسجل محتويات أنبوب اختبار، وظروف التعامل مع كل منها، واللون في البداية واللون النهائي لمحتوياتها بعد التفاعل.
3. أضف mL 100 من محلول بروميثيمول الأزرق (BTB) إلى كأس زجاجية باستخدام ماصة، انفخ في محلول برفق إلى أن يتحول إلى اللون الأصفر.

تحذير: لا تنفس بقوة حتى لا تخرج الفقاعات من محلول، أو تُصاب بالصداع، وإياك وشفط محلول بالماصة.

4. املأ $\frac{3}{4}$ أنبوب اختبار كبيرين بمحلول BTB الأصفر الناتج من الخطوة 3.
5. غط أحده الأنبوبين بورق الألومنيوم، ثم ضع نباتاً مائياً طوله 6 cm في كلا الأنبوبين. وأغلقهما بإحكام، ثم ضعهما في حامل أنابيب في ضوء خافت طوال الليل.
6. سجل ملاحظاتك في جدول البيانات الناتج عن الخطوة 3.

التحليل

1. استنتاج الهدف من تعطية الأنابيب بورق الألومنيوم.
2. فسر كيف توضح نتائجك اعتماد البناء الضوئي والتنفس الخلوي أحد هما على الآخر؟

يعد التنفس الخلوي cellular respiration مسار هدم تحلل فيه المواد العضوية لتحرير الطاقة اللازمة للخلية. حيث يُستخدم الأكسجين في التنفس الخلوي لتحليل المواد العضوية، فينتج عنها ثاني أكسيد الكربون والماء. لاحظ الدورات الطبيعية لهذه العمليات في الشكل 3-9؛ حيث تعد المواد الناتجة عن أحد التفاعلات مواد متفاعلة لتفاعل آخر.


ATP: The Unit of Cellular Energy وحدة الطاقة الخلوية

الربط الكيميائي توجد الطاقة في أشكال عدّة، منها: الطاقة الضوئية، والطاقة الميكانيكية، والطاقة الحرارية، والطاقة الكيميائية. ففي المخلوقات الحية يتم تخزين الطاقة الكيميائية داخل الجزيئات الحيوية، ويمكن تحويلها إلى أشكال أخرى من الطاقة عند الحاجة. فمثلاً تحول الطاقة الكيميائية المخزنة في الجزيئات الحيوية إلى طاقة ميكانيكية عند انقباض العضلات.

ويعد جزيء الطاقة **أدينوسين ثلاثي الفوسفات** ATP من أهم الجزيئات الحيوية التي تزود الخلايا بالطاقة الكيميائية.

تركيب جزيء الطاقة ATP structure يعد جزيء ATP مخزنًا للطاقة الكيميائية التي تستخدمناها الخلايا في التفاعلات المتنوعة. وعلى الرغم من وجود جزيئات ناقلة أخرى للطاقة خلال الخلايا، فإن جزيء ATP يعد من الجزيئات الناقلة الأكثر انتشاراً في خلايا جميع أنواع المخلوقات الحية. وكما يبيّن الشكل 4-9 فإن جزيء ATP عبارة عن نيوكليوتيد يتكون من قاعدة نيتروجينية هي: الأدينين، وسكر الرايبوز، وثلاث مجموعات من الفوسفات.

■ **الشكل 4-9** يبيّن تحلل جزيء ATP طاقة تدعم الأنشطة الخلوية في المخلوقات الحية.



وظيفة جزيء الطاقة ATP function يُحرر جزيء (ATP) الطاقة عندما تتكسر

الرابطة بين مجموعة الفوسفات الثانية والثالثة، مكوناً جزيئاً يُسمى أدينوسين ثنائي الفوسفات (ADP) ومجموعة فوسفات حرة، الشكل 4-9. تخزن الطاقة في الرابطة الفوسفاتية التي تتشكل عندما يرتبط جزيء (ADP) مع مجموعة فوسفات أخرى ليتكون جزيء (ATP). ويمكن أن تحول جزيئات (ATP) و(ADP) بإضافة أو حذف مجموعة فوسفات، كما في الشكل 4-9، وفي بعض الأحيان يتتحول جزيء ADP إلى جزيء أدينوسين أحادي الفوسفات (AMP) بفقد مجموعة فوسفات إضافية، والطاقة المتحررة بفعل هذا التفاعل قليلة جدًا، لذا فإن معظم تفاعلات الطاقة في الخلية تتضمن جزيئات ATP و ADP.

التقويم 1-9

التفكير الناقد

5. **الكتابية في علم الأحياء** اكتب مقالة تصف فيها قوانين الديناميكا الحرارية مستخدماً أمثلة من علم الأحياء في دعم أفكارك.
6. استخدم التشابه لتوضيح العلاقة بين عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي.

فهم الأفكار الرئيسية

1. **الفكرة الرئيسية** حدد المصدر الرئيس للطاقة في المخلوقات الحية.
2. اشرح قانون الديناميكا الحرارية الأول.
3. قارن بين مساري البناء والهدم.
4. فسر كيف يُخزن جزيء ATP الطاقة، ويحررها؟

الخلاصة

- تسيطر قوانين الديناميكا الحرارية على انتقال الطاقة وتحولها من شكل إلى آخر في المخلوقات الحية.
- تصنّع بعض المخلوقات الحية غذاءها بنفسها، في حين يحصل بعضها الآخر على الطاقة من الغذاء الذي يتناوله.
- تخزن الخلايا الطاقة وتحررها بتفاعلات الهدم والبناء.
- الطاقة المتحررة من تحلل جزيء ATP تدعم الأنشطة الخلوية.



9-2

البناء الضوئي Photosynthesis



رابط المدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

الفكرة الرئيسية تتحول الطاقة الضوئية بعد امتصاصها إلى طاقة كيميائية في أثناء عملية البناء الضوئي.

الربط مع الحياة تتحول الطاقة من حولنا كل يوم. حيث تتحول البطاريات الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، ويحول الراديو الطاقة الكهربائية إلى طاقة تحملها الموجات الصوتية. وبطريقة مشابهة تحول بعض المخلوقات الحية الذاتية التغذى الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية من خلال عملية البناء الضوئي.

عملية البناء الضوئي Photosynthesis

معظم المخلوقات الذاتية التغذى، ومنها النباتات، قادرة على صنع المركبات العضوية مثل السكر بعملية البناء الضوئي. وتتحول الطاقة الضوئية في أثناء عملية البناء الضوئي إلى طاقة كيميائية. والمعادلة الكيميائية الآتية تمثل عملية البناء الضوئي:



تحدث عملية البناء الضوئي في مرحلتين؛ في المرحلة الأولى تحدث التفاعلات التي تعتمد على الضوء (التفاعلات الضوئية)، حيث يتم امتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كيميائية على شكل ATP و NADPH. أما في المرحلة الثانية فهي التفاعلات التي تحدث في الضوء ولكن لا تعتمد عليه (التفاعلات اللاضوئية) وتسمي حلقة كالفن، بحيث يتم استخدام جزيئات ATP و NADPH التي تكونت في المرحلة الأولى لإنتاج الجلوكوز. وعندما يتتج الجلوكوز يتحدد مع جزيئات سكريات بسيطة أخرى لتكوين جزيئات أكبر، وهذه الجزيئات هي كربوهيدرات معقدة مثل النشا. وقد يستخدم الناتج النهائي لعملية البناء الضوئي في بناء جزيئات عضوية أخرى مثل البروتينات والدهون والأحماض النووية.

الأهداف

- تلخص مرحلتي عملية البناء الضوئي.
- توضح وظيفة البلاستيدية الخضراء في أثناء التفاعلات الضوئية.
- تصف عملية نقل الإلكترونات وترسمها.

مراجعة المفردات

الكربوهيدرات: مركبات عضوية تحتوي الكربون، والميدروجين والأكسجين فقط بحسب (1:2:1) بالترتيب.

المفردات الجديدة

الثايلاكتويد

الغرانا


الخشوة (اللحمة)

الصبغة

حلقة كالفن

إنزيم روبيسكو





المرحلة الأولى: التفاعلات الضوئية

يُعد امتصاص الضوء الخطوة الأولى في عملية البناء الضوئي؛ حيث تحتوي النباتات على عضيات خاصة تمتص الطاقة الضوئية. وبعد امتصاص الطاقة يتم إنتاج جزيئات تخزن الطاقة، هي ATP و NADPH؛ لاستخدامهما في التفاعلات التي لا تعتمد على الضوء (اللاضوئية).

البلاستيدات الخضراء Chloroplasts عضيات كبيرة تمتص الطاقة الضوئية في المخلوقات الحية التي تقوم بعملية البناء الضوئي. وتوجد البلاستيدات الخضراء في النباتات بشكل رئيس في خلايا الأوراق. والبلاستيدات كما في الشكل 5-9، عضيات تشبه القرص، وتحتوي على جزأين ضروريين لعملية البناء الضوئي. يسمى الجزء الأول **ثايلاكويدات thylakoids**، وهي مجموعة من الأغشية المسطحة تشبه الكيس، تترتب في رزم متراصة تسمى **الغرانا grana**. وتحدث التفاعلات الضوئية في الثايلاكويدات. أما الجزء الثاني المهم فيسمى **الحشوة (اللحم)** stroma، وهي سائل يملأ الفراغات المحيطة بالغرانا، وتعد مكان حدوث التفاعلات اللاضوئية في المرحلة الثانية من عملية البناء الضوئي، انظر الشكل 5-9.


ما زلت مهتمًا؟ ميز بين الثايلاكويد والحشوة (اللحم).

الأصباغ Pigments تسمى الجزيئات الملونة التي تمتص الضوء **الأصباغ pigments**، وتوجد في أغشية الثايلاكويد في البلاستيدات الخضراء. وتمتص الأصباغ المختلفة أطوالًا موجية محددة من الضوء، الشكل 6-9. والصبغة الأساسية في النباتات هي الكلوروفيل، وهناك أنواع من صبغة الكلوروفيل، ومن أهمها الكلوروفيل (a) والكلوروفيل (b).

يختلف تركيب الكلوروفيل من جزيء إلى آخر، مما يسمح لجزيئات الكلوروفيل بامتصاص الضوء عند مناطق محددة من طيف امتصاص الضوء المرئي.

■ **الشكل 5-9** تحدث عملية البناء الضوئي داخل عضيات صبغية تسمى **البلاستيدات الخضراء**.

■ **الشكل 6-9** تختلف الأصباغ الملونة التي توجد في أوراق الأشجار في قدرتها على امتصاص أطوال موجية محددة من الضوء. **كون فرضية** إذا لم يحتوى النبات على كلوروفيل b، فما أثر ذلك في امتصاص الضوء؟





الشكل ٧-٩ عندما يتحلل الكلوروفيل في أوراق بعض الأشجار، تصبح الأصياغ الأخرى أكثر وضوحاً.

وعموماً يزداد معدل امتصاص الضوء بواسطة الكلوروفيل في منطقة الطيف الممحصورة بين الأزرق والبنفسجي من طيف الضوء المرئي، ويعكس الضوء في المنطقة الخضراء من الطيف. وهذا يفسر سبب رؤية الإنسان لأجزاء النبات التي تحوي الكلوروفيل باللون الأخضر.

تحوي معظم المخلوقات الحية التي تقوم بعملية البناء الضوئي أصياغاً إضافية بالإضافة إلى الكلوروفيل، تسمح للنباتات بامتصاص طاقة ضوئية إضافية من مناطق أخرى من الطيف المرئي. ومن هذه الأصياغ مجموعة أصياغ الكاروتينات، ومنها صبغة β كاروتين (بيتا-كاروتين) التي تمتلك الضوء في المناطق الزرقاء والخضراء من الطيف، في حين تعكس أغلب الضوء في المناطق الصفراء والبرتقالية والحمراء، الشكل ٧-٩. وتعد أصياغ الكاروتين المسئولة عن ألوان كل من الجزر والبطاطا الحلوا. تعد صبغة الكلوروفيل في الأوراق أكثر شيوعاً ووفرة من الأصياغ الأخرى، لذلك فهي تطغى عليها، وتمتنع ظهور ألوان الأصياغ الأخرى. ومع ذلك يمكن أن يظهر اللون الأصفر والأحمر والبرتقالي في الأوراق في فصل الخريف نتيجة تحلل جزيئات الكلوروفيل، مما يسمح بظهور ألوان الصبغات الأخرى.

نقل الإلكترون Electron Transport يُشكّل تركيب غشاء الثايلاكويد الأساس في الانتقال الفعال للطاقة في أثناء نقل الإلكترون؛ حيث يتميز غشاء الثايلاكويد بمساحة سطح كبيرة، مما يوفر المساحة اللازمة للاحتفاظ بأعداد كبيرة من الجزيئات الناقلة للإلكترون، وكذلك وجود نوعين من البروتينات المعقدة التي تسمى الأنظمة الضوئية.

تجربة ٢ - ٩

ملاحظة البلاستيدات الخضراء

كيف تبدو البلاستيدات الخضراء؟ تعتمد معظم الأنظمة البيئية والمخلوقات الحية في العالم على عضيات صغيرة جداً تسمى البلاستيدات الخضراء.
اكتشف كيف تبدو البلاستيدات الخضراء في هذا الاستقصاء؟

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.

2. لاحظ شرائح خلايا نباتية وأخرى للطحالب الخضراء بالمجهر المركب.

3. حدد البلاستيدات الخضراء في الخلايا التي تلاحظها.

4. اعمل جدول بيانات لتسجيل ملاحظاتك، ثم ارسم البلاستيدات الخضراء داخل الخلايا.

التحليل

1. قارن بين خصائص البلاستيدات الخضراء التي لاحظتها في الخلايا المختلفة.

2. كون فرضية لماذا تختلف أوراق النبات الخضراء في لونها؟

يحتوي النظامان الضوئيان (I و II) أصباغاً تمت صنعها، وببروتينات تؤدي دوراً مهماً في التفاعلات الضوئية.

تتبع الشكل 8-9 في أثناء قراءتك عن نقل الإلكترون.

- أولاًً تحفظ الطاقة الضوئية الإلكترونات في النظام الضوئي II، كما تؤدي الطاقة الضوئية إلى تحلل جزيء الماء المنتجة إلكترونًا واحدًا إلى نظام نقل الإلكترون وأيون هيدروجين H^+ (يسمي أيضاً البروتون) – إلى الفراغ في الثايالاكويد – وكذلك الأكسجين (O_2) بوصفه ناتجاً غير مستخدم.
- تنقل الإلكترونات المحفوظة من النظام الضوئي II إلى جزيء مستقبل للإلكترون يوجد في غشاء الثايالاكويد.
- ينقل الجزيء المستقبل للإلكترون لاحقاً الإلكترونات عبر سلسلة من نواقل الإلكترون إلى النظام الضوئي I.
- ينقل النظام الضوئي I مع وجود الضوء الإلكترونات إلى بروتين يسمى فيرودوكسين، ويتم تعويض الإلكترونات المفقودة في النظام الضوئي I بـ الإلكترونات من النظام الضوئي II.
- وأخيراً ينقل بروتين فيرودوكسين الإلكترونات إلى ناقل الإلكترون $NADP^+$ مكوناً الجزيء المخزن للطاقة $NADPH$.

الأسموزية الكيميائية Chemiosmosis بالتزامن مع نقل الإلكترون يتم إنتاج جزيء ATP بعملية تسمى الأسموزية الكيميائية، وهي عملية يتم فيها إنتاج ATP نتيجة انتقال الإلكترونات مع تدرج التركيز. ولا تقتصر أهمية عملية تحمل جزيء الماء على توفير الإلكترونات اللازمة لبناء سلسلة نقل الإلكترون فقط، بل توفر أيضاً البروتونات H^+ الضرورية لتنشيط عملية بناء جزيء ATP خلال عملية الأسموزية الكيميائية. وتتراكم أيونات H^+ التي تحررت خلال عملية نقل الإلكترون على الجانب الداخلي للثايالاكويد. وبسبب التركيز العالي من أيونات H^+ داخل الثايالاكويد وانخفاض تركيزها في الحشوة، تنتقل أيونات H^+ مع تدرج التركيز من داخل الثايالاكويد إلى الحشوة عبر قنوات أيونية في الغشاء، كما في الشكل 8-9، وهذه القنوات عبارة عن إنزيمات تسمى إنزيمات بناء الطاقة (ATP synthases). وكلما انتقلت أيونات H^+ عبر إنزيمات بناء الطاقة تكون ATP في الحشوة.

ماذا قرأت؟ تُختَصِّ وظيفة الماء في أثناء الأسموزية الكيميائية في عملية البناء الضوئي.




علمية ما الذي يؤثر في معدل عملية البناء الضوئي؟

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين الإثباتية

Electron Transport

نقل الالكتروني

■ **الشكل 8-9** تنتقل الإلكترونات النشطة من جزء آخر على طول غشاء الثايلاكوايد في البلاستيда الخضراء. وتستخدم الطاقة الناتجة عن الإلكترونات في تكوين فرق في تركيز أيونات البروتونات H^+ ، وكلما انتقلت البروتونات مع تدرج التركيز تضاف مجموعة فوسفات إلى جزء ADP، فت تكون جزء ATP.



المرحلة الثانية : حلقة كالفن Phase two: Calvin Cycle

على الرغم من أن جزيئات NADPH و ATP تزود الخلايا بكميات كبيرة من الطاقة إلا أنها جزيئات غير مستقرة بصورة كافية حتى تخزن الطاقة الكيميائية فترات زمنية طويلة. لذا هناك مرحلة ثانية من عملية البناء الضوئي تسمى حلقة كالفن calvin cycle، يتم فيها تخزين الطاقة في جزيئات عضوية مثل الجلوكوز. وتعد حلقة كالفن من التفاعلات التي لا تعتمد على الضوء. تتبع الشكل 9-9 في أثناء دراستك خطوات حلقة كالفن.


- في الخطوة الأولى من حلقة كالفن تتحدد سته جزيئات من CO₂ الجوي مع ستة جزيئات من سكر الرايبولوز الثنائي الفوسفات (سكر خماسي الكربون) تسمى هذه العملية (تشييت الكربون) ليتتج 6 جزيئات من مركب سداسي الكربون.
- في الخطوة الثانية، تنتقل الطاقة الكيميائية المخزنة في جزيئات ATP و NADPH إلى جزيئات (3-PGA) لتكوين جزيئات ذات طاقة عالية تسمى جليسير ألدヒيد-3-الفوسفات (G3P). فجزيئات ATP تحفز مجموعة الفوسفات على تكوين (G3P)، في حين يوفر جزء NADPH أيونات الهيدروجين والإلكترونات.
- في الخطوة الثالثة، يخرج جزيئاً (G3P) من الحلقة ليستخدماً في إنتاج الجلوكوز ومركبات عضوية أخرى.
- في الخطوة النهائية من حلقة كالفن يحول إنزيم يسمى روبيسكو rubisco، الجزيئات العشرة المتبقية من (G3P) إلى سته جزيئات خماسية الكربون تسمى رايبولوز-5-أحادي الفوسفات، التي تتحول فيما بعد إلى سته جزيئات من رايبولوز-1،5-ثنائي الفوسفات (RuBp). تتحدد هذه الجزيئات مجدداً مع جزيئات جديدة من ثاني أكسيد الكربون لإعادة الحلقة مرة أخرى. وبعد إنزيم روبيسكو واحداً من أهم الإنزيمات الحيوية، لأنّه يحول جزيئات CO₂ غير العضوية إلى جزيئات عضوية تستخدماً للطاقة فإن النبات يستخدمه بوصفه وحدات بناء أساسية في الكربوهيدرات المعقدة، ومنها السيليلوز الذي يوفر الدعم للنبات.

اختصاصي كيمياء النبات

عالم الأحياء Phytochemist

الذي يدرس النواتج الكيميائية للنباتات، ويقوم بالأبحاث الطبية لإيجاد علاجات جديدة للأمراض.





■ **الشكل 9-9** تربط حلقة كالفن ثانٍ أكسيد الكربون مع الجزيئات العضوية داخل الحشوة في البلاستيدات الخضراء. **حدّ** المركب الذي يخزن الطاقة في نهاية حلقة كالفن.

مسارات بديلة Alternative Pathways

تؤثر البيئة التي يعيش فيها المخلوق الحي في قدرته على القيام بعملية البناء الضوئي؛ فالبيئة التي لا يوجد فيها كميات كافية من الماء أو ثاني أكسيد الكربون تقلل من قدرة المخلوق الحي الذي يقوم بعملية البناء الضوئي على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية. فمثلاً تُعرض النباتات التي تعيش في البيئات الجافة والحرارة إلى فقدان كميات كبيرة من الماء؛ مما يقلل من عملية البناء الضوئي. وتحوي النباتات التي تعيش في مناخات قاسية مسارات بديلة في عملية البناء الضوئي تمكّنها من تحويل الحد الأقصى من الطاقة.

نباتات C_4 : C_4 plants وَهُبَّ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - للنباتات تكيفاً في أحد المسارات التي تساعدها على الحفاظ على عملية البناء الضوئي بأقل حدّ ممكن من فقدان الماء، يسمى مسار C_4 . ويحدث هذا المسار في نباتات منها قصب السكر والذرة، وتُسمى هذه النباتات نباتات C_4 ؛ لأنها ثبّتَ ثاني أكسيد الكربون وتربيطه مع مركبات رباعية الكربون بدلاً من مركبات ثلاثية الكربون في أثناء حلقة كالفن، كما أن نباتات C_4 تكيفات تركيبية مهمة في ترتيب الخلايا في الأوراق. وعموماً تعمل نباتات C_4 على إغلاق ثغورها في الأيام الحارة، في حين تنتقل المركبات رباعية الكربون إلى خلايا خاصة، حيث يدخل فيها ثاني أكسيد الكربون، مما يسمح باستهلاك كمية كافية من ثاني أكسيد الكربون، ويقلل كمية الماء المفقودة.

نباتات أيض الحمض العشبي CAM plants من مسارات التكيف الأخرى التي تستخدمها النباتات للقيام بعملية البناء الضوئي بأقصى فاعلية مسار يُسمى **أيض الحمض العشبي** (Crassulacean Acid Metabolism) CAM.

يحدث هذا المسار في النباتات التي تحفظ بالماء وتعيش في الصحراوة والمستنقعات المالحة وأي بيئة أخرى؛ حيث الوصول إلى الماء محدود جدًا. ومنها الصبار والسلحفاة والأناناس في الشكل 9-10، التي تسمح لثاني أكسيد الكربون بالدخول إلى الأوراق في الليل فقط، أي عندما يميل الجو إلى البرودة والرطوبة. وفي الليل تقوم النباتات بتشييت ثاني أكسيد الكربون في مركبات عضوية. وفي أثناء النهار يتم تحرير ثاني أكسيد الكربون من هذه المركبات، ويدخل حلقة كالفن. كما يسمح هذا المسار باستهلاك كمية كافية من ثاني أكسيد الكربون وتقليل فقدان الماء.



■ الشكل 9-10 نبات الأناناس مثال على نباتات CAM.

التقويم 9-2

- التفكير الناقد**
6. توقع كيف تؤثر العوامل البيئية مثل كثافة الأشعة الضوئية ومستويات CO_2 في معدلات البناء الضوئي؟
 7. **الكتابة في علم الأحياء** ابحث في آثار الاحتباس الحراري في عملية البناء الضوئي، واتكتب مقالة تلخص فيها ما توصلت إليه.

فهم الأفكار الرئيسية

1. **الفكرة الرئيسية** **لخُص** كيف تتكون الطاقة الكيميائية من الطاقة الضوئية في أثناء عملية البناء الضوئي.
2. اربط تركيب البلاستيدية الخضراء مع مراحل عملية البناء الضوئي.
3. فسر أهمية الماء في التفاعلات الضوئية.
4. **لخُص** الخطوات في حلقة كالفن.
5. ارسم آلية نقل الإلكترون وفسّرها.

الخلاصة

- تحتوي النباتات على بلاستيدات خضراء وأصباغ تمتلك الضوء، وتحوّل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية.
- تمر عملية البناء الضوئي بمراحلتين تضم تفاعلات ضوئية وحلقة كالفن.
- في التفاعلات الضوئية، تمتلك المخلوقات الحية الذاتية التغذى الطاقة الضوئية، وتحولها إلى طاقة كيميائية في صورة ATP و NADPH.
- في حلقة كالفن تستخدم الطاقة الكيميائية المخزنة في جزيئات ATP و NADPH لإنتاج الكربوهيدرات ومنها الجلوكوز.

٩-٣

التنفس الخلوي

Cellular Respiration

الفكرة الرئيسية تحصل المخلوقات الحية على الطاقة بتحليل العجزيات العضوية في أثناء عملية التنفس الخلوي.

الربط مع الحياة يجب أن تتغذى طيور الخرشنة القزوينية (خرشنة بحر قزوين) *Sterna caspia* باستمرار للتزود بالطاقة لاستمرار حياتها في أثناء هجرتها الشتوية إلى المملكة كل عام. وكذلك الإنسان والمخلوقات الحية الأخرى تحتاج إلى مصادر غذائية متنوعة تزودها بالطاقة الضرورية لبقاءها ونموها.

التنفس الخلوي

تحصل المخلوقات الحية على الطاقة بعملية تسمى التنفس الخلوي. وتمثل وظيفة التنفس الخلوي في جمع الإلكترونات من المركبات الكربونية، مثل الجلوكوز، واستخدام طاقتها في إنتاج جزيء ATP، الذي يزود الخلايا بالطاقة لتؤدي وظائفها. وتمثل المعادلة الآتية التنفس الخلوي:



لاحظ أن عملية التنفس الخلوي تحدث في عكس اتجاه عملية البناء الضوئي. يحدث التنفس الخلوي في مرحلتين رئيسيتين، هما: التحلل السكري والتنفس الهوائي. المرحلة الأولى: التحلل السكري **عملية لاهوائية** anaerobic process لا تتطلب وجود الأكسجين. أما **التنفس الهوائي** aerobic respiration فيشمل حلقة كربس ونقل الإلكترون، وهو **عملية هوائية** aerobic process تتطلب وجود الأكسجين. ويلخص الشكل ١١-٩ التنفس الخلوي الهوائي.

- تلخص مراحل التنفس الخلوي.
- تحدد دور ناقل الإلكترونات في كل مرحلة من مراحل التنفس الخلوي.
- تقاون بين التخمر الكحولي والتخمر اللبني.


مراجعة المفردات


البكتيريا الخضراء المزرقة: نوع من البكتيريا، الذاتية التغذى، تقوم بعملية البناء الضوئي.

المفردات الجديدة

عملية لاهوائية
التنفس الهوائي
عملية هوائية
التحلل السكري
حلقة كربس
التخمر

■ **الشكل ١١-٩** يحدث التنفس الخلوي في الميتوكوندريا التي تعد مصنع الطاقة في الخلية.





■ **الشكل 12-9** يتحلل الجلوكوز خالل عملية التحلل السكري داخل سيتوبلازم الخلايا. **لخص المواد المتفاعلة والناتجة عن عملية التحلل السكري.**

التحلل السكري Glycolysis

يتحلل الجلوكوز في السيتوبلازم خالل عملية **التحلل السكري** glycolysis. ويكون جزئان من ATP وجزئان من NADH، عند تحلل جزيء واحد من الجلوكوز. تتبع الشكل 12-9 في أثناء قراءتك خطوات التحلل السكري.

أولاً: تربط مجموعتا فوسفات مع الجلوكوز بعد انفصالهما عن جزئين من ATP. لاحظ أن التفاعلات التي تنتج طاقة الخلية تحتاج إلى طاقة بسيطة (جزئين ATP) لكي تبدأ، حيث يتحلل جزيء الجلوكوز السادس الكربون إلى مركبين ثلاثيي الكربون.

ثانياً: تضاف مجموعتا فوسفات، ثم تتحد الإلكترونات وأيونات H^+ مع جزئين من NAD⁺ فيتكون جزئان من NADH. يشبه جزيء NAD⁺، جزيء NADP، وهو ناقل إلكترونات يستخدم خالل عملية البناء الضوئي.

ثالثاً: تتحول أخيراً المركبات الثلاثيي الكربون إلى جزئين من بيروفيت، وفي الوقت نفسه يتم إنتاج أربعة جزئات ATP.

ماذا قرأت؟ فسر لماذا يكون الناتج النهائي من الطاقة في عملية التحلل السكري جزئين فقط من ATP وليس أربعة جزئات.

المفردات

أصل الكلمة

Glycolysis التحلل السكري

أصل الكلمة من اليونانية:

Glykys- وتعني "حلو".

-lysis - وتعني "تحلل أو تحطم" ...

المطويات

ضمّن مطويتك معلومات من هذا القسم.



حلقة كربس

يتيج عن عملية التحلل السكري جزيئاً ATP وجزيئان من البيروفيت، ومعظم الطاقة الناتجة عن تحلل سكر الجلوكوز لا تزال مخزنة في جزيئات البيروفيت. ينتقل البيروفيت في وجود الأكسجين، إلى الحشوة في الميتوكندريا؛ حيث يتحول في النهاية إلى CO_2 . وتسمى سلسلة التفاعلات التي يتحلل فيها البيروفيت إلى ثاني أكسيد الكربون حلقة كربس [Krebs cycle] أو دورة TCA (حمض الكربوكسيل الثلاثي)، ويشار إلى هذه الحلقة أيضاً بحلقة حمض الستريك.


خطوات حلقة كربس

قبل أن تبدأ حلقة كربس يتفاعل البيروفيت مع مrafق إنزيم-أ (CO-A)، فيتجزء مركب وسيط ثنائي الكربون إلى جزيئين من CO_2 وجزيئان من NADH. تتبع الشكل 9-13 في أنتهاء قراءتك خطوات حلقة كربس.

- تبدأ حلقة كربس بارتباط أستيل CoA مع مركب رباعي الكربون لتكوين مركب سداسي الكربون يسمى حمض الستريك.
- يتحلل حمض الستريك في سلسلة الخطوات اللاحقة من التفاعل، متراجعاً إلى جزيئين من CO_2 ومولداً جزيئاً واحداً من ATP، وثلاثة جزيئات NADH وجزيئاً واحداً من FADH₂. وبعد جزيء FADH₂ ناقلاً إلكترونياً آخر شبيهاً بجزيء NADP⁺ وجزيء NAD⁺.
- وأخيراً يتم إعادة تكوين أستيل CoA، وحمض الستريك لكي تستمر الحلقة. تذكر أن جزيئين من البيروفيت يتكونان خلال عملية التحلل السكري، مما يتبع عنهما دورتا كربس -لكل حلقة- من جزيء السكر الواحد. وتكون النواتج النهائية لحلقة كربس على النحو التالي: ستة جزيئات من CO_2 ، وجزيئي ATP، وثمانية جزيئات NADH وجزيئي FADH₂. تنتقل جزيئات NADH و FADH₂ لدوراً مهماً في المرحلة التالية من التنفس الهوائي.


إرشادات الدراسة

جملة توضيحية أعمل مع أحد زملائك على قراءة النص ومناقشة الكلمات غير المألوفة والفاهم الصعب. واتكتب فقرة توضيحية تلخص فيها حلقة كربس.



■ **الشكل 9-13** يتحلل البيروفيت داخل الخلايا إلى ثاني أكسيد الكربون خلال حلقة كربس في الميتوكندريا.
تتبع مسار جزيئات الكربون التي تدخل حلقة كربس وتخرج منها.





■ الشكل ١٤-٩ تحدث سلسلة نقل الإلكترون على طول غشاء الميتوكوندريا. قارن بين سلسلة نقل الإلكترون في التنفس الخلوي وعملية البناء الضوئي.

سلسلة نقل الإلكترون Electron Transport

تعد سلسلة نقل الإلكترون في التنفس الهوائي الخطوة النهاية من عملية تحويل سكر الجلوكوز، وهي أيضاً النقطة التي يتم فيها إنتاج معظم جزيئات ATP. وتستخدم الإلكترونات العالية الطاقة وأيونات الهيدروجين من جزيئات NADH و FADH_2 التي أُنتجت في حلقة كربس لتحويل ADP إلى ATP.

ويمكنك تتبع هذه العملية كما يبين الشكل ١٤-٩، والتي تحدث كالتالي:

أولاًً: تنتقل الإلكترونات على طول غشاء الميتوكوندريا من بروتين إلى آخر، وعندما تتحرر جزيئات الإلكترونات من نواقل الإلكترون NADH و FADH_2 فإنها تحول إلى NAD^+ و FAD، وتتحرر كذلك أيونات الهيدروجين (H^+) في اتجاه حشوة الميتوكوندريا.

ثانياً: يتم ضخ أيونات H^+ من الحشوة عبر الغشاء الداخلي للميتوكوندريا.

ثالثاً: بسبب اختلاف فرق التركيز لأيونات H^+ على جانبي الغشاء الداخلي للميتوكوندريا فإنها تنتشر لتعود مرة أخرى من الحيز بين الغشائي للميتوكوندريا (الأكثر تركيزاً من H^+) إلى الحشوة عبر الغشاء الداخلي مروراً بجزيئات إنزيم بناء ATP بواسطة العملية الأسموزية الكيميائية. تتشابه عملية الأسموزية الكيميائية وسلسلة نقل الإلكترون في التنفس الخلوي مع العمليات التي تحدث في البناء الضوئي. ويعد الأكسجين المستقبل النهائي للإلكترون في سلسلة نقل الإلكترون في عملية التنفس الخلوي؛ حيث تنتقل البروتونات والإلكترونات إلى الأكسجين لإنتاج الماء.

يتبع عن عملية نقل الإلكترون 24 جزيئاً من ATP. وكل جزيء NADH يتبع ثلاثة جزيئات ATP. ويعطي كل جزيء FADH_2 جزيئين من ATP. وفي المخلوقات الحية الحقيقية النواة يتبع عن تحلل كل جزيء من الجلوكوز 38 جزيئاً من ATP، يستهلك منهما الجزيئان اللذان يتبعان عن عملية التحلل السكري عند انتقال البيروفيت إلى حشوة الميتوكوندريا.

المفردات.....

الاستعمال العلمي مقابل

الاستعمال الشائع

Concentration التركيز

الاستعمال العلمي: الكمية النسبية من المادة المذابة في مادة أخرى.

تركيز أيونات الهيدروجين في جانب واحد من الغشاء أكبر من الجانب الآخر.

الاستعمال الشائع: الاهتمام، الانتباه.

كان تركيز الطلاب موجهاً نحو الامتحان....

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

عالم الطاقة الحيوية

Bioenergetist باحث يدرس انتقال الطاقة في الخلايا. وبعض علماء الطاقة الحيوية يدرسون الميتوكوندريا وعلاقتها بالشيخوخة والمرض.

ينتقل البيروفيت إلى الميتوكندريا في المخلوقات الحية الحقيقية النواة، أما في المخلوقات الحية البدائية النواة فهذه الخطوة غير ضرورية؛ إذ توفر على الخلية البدائية النواة جزيئين من ATP. ليصبح الناتج النهائي من عملية التنفس الخلوي 38 جزيئاً من ATP بدلًا من 36 جزيئاً في الخلايا الحقيقة النواة.


التنفس اللاهوائي Anaerobic Respiration

يمكن أن تعمل بعض الخلايا لفترة زمنية قصيرة عندما تكون مستويات الأكسجين منخفضة. وبعض بدائيات النوى مخلوقات لاهوائية، أي تستطيع أن تنمو وتتكاثر دون وجود الأكسجين. وستمر هذه الخلايا في بعض الأحيان في إنتاج ATP عن طريق التحلل السكري. ومع ذلك فهناك مشكلات تنتج عن الاعتماد على التحلل السكري وحده في الحصول على الطاقة. فالتحلل السكري يزود الخلية بجزئي ATP فقط لكل جزيء جلوكوز. ولأن للخلية كمية محددة من جزيء NAD⁺، توقف عملية التحلل السكري عند استهلاك جميع جزيئات NAD⁺، وخصوصاً عند عدم وجود عملية تعوض النقص في هذه الجزيئات. فالمسار اللاهوائي الذي يتبع عملية التحلل السكري هو التنفس اللاهوائي أو التخمر. ويحدث التخمر **fermentation** في السيتوبلازم، وهو يعيد تزويد الخلية بجزئيات NAD⁺، ويتيح كمية قليلة من جزيئات ATP. والتخمر نوعان: التخمر اللبناني (تخمر حمض اللاكتيك) والتخمر الكحولي.

الربط مع الصحة تحمر حمض اللاكتيك Lactic acid fermentation

عند تخمر حمض اللاكتيك تحول الإنزيمات البيروفيت -الذي تكون في أثناء عملية التحلل السكري - إلى حمض اللاكتيك، كما في **الشكل 9-15B**. وتضم العملية نقل الإلكترونات العالية الطاقة والبروتونات من NADH. وتنتج العضلات الهيكيلية حمض اللاكتيك عند عدم وجود الأكسجين الكافي في الجسم نتيجة القيام بالتمارين الرياضية المجهدة مثلاً.

الشكل 9-15 عند وجود الأكسجين بكمية محدودة أو عدم وجوده تحدث عملية التخمر. **قارن** بين التخمر الكحولي والتخمر اللبناني.



وعندما يتجمع حمض اللاكتيك يحدث إجهاد للخلايا العضلية، وتشعر بالألم. كما ينتج حمض اللاكتيك بواسطة العديد من المخلوقات الحية الدقيقة التي تُستخدم في إنتاج أطعمة معينة، مثل الجبن واللبن الرائب (الزبادي) والقشدة الحامضة.

التخمر الكحولي **Alcohol fermentation** يحدث التخمر الكحولي في الخميرة، وبعض أنواع البكتيريا. انظر الشكل 9-15 الذي يُبيّن التفاعل الكيميائي الذي يحدث في أثناء التخمر الكحولي؛ حيث يتحول البiero فيت إلى الكحول الإيثيلي وثاني أكسيد الكربون. وتتوفر جزيئات NADH الإلكترونات، كما في تخمر حمض اللاكتيك، وتتحول إلى جزيئات NAD⁺.

عمليتا البناء الضوئي والتفس الخلوى

Photosynthesis and Cellular Respiration

كما تعلمت سابقاً فإن البناء الضوئي والتفس الخلوى عمليتان مهمتان تستخدمنهما الخلايا في الحصول على الطاقة، وهما من المسارات الأيضية التي تُنتِج الكربوهيدرات البسيطة وتحللها. ويبيّن الشكل 9-16 الارتباط بين هاتين العمليتين.


مختبر تحليل البيانات 9-1

بناء على بيانات حقيقة

فسر البيانات

كيف تؤثر العدوى الفيروسية في التفس الخلوى؟ يمكن للالتهابات الناجمة عن الفيروسات أن تؤثر في عملية التفس الخلوى، وفي قدرة الخلايا على إنتاج ATP. ولاختبار أثر الالتهابات الفيروسية في مراحل التفس الخلوى في الخلايا المصابة بالفيروسات تم قياس كمية حمض اللاكتيك وجزيئات ATP الناتجة.

التفكير النقدي



1. حلّل كيف يؤثر الفيروس في إنتاج حمض اللاكتيك في الخلايا؟

2. احسب بعد مرور 8 ساعات، ما نسبة ارتفاع إنتاج حمض اللاكتيك في الفيروس مقارنة بالمجموعة الضابطة؟ وما نسبة انخفاض إنتاج جزيئات ATP؟


3. استنتج ما سبب شعور الإنسان المصاب بفيروس الأنفلونزا بالتعب الشديد؟

أخذت البيانات في هذا المختبر من:

El-Bacha, T., et al. 2004. Mayaro virus infection alters glucose metabolism in cultured cells through activation of the enzyme

6-phosphofructo-1-Kinase. *Molecular and Celluar biochemistry*. 266: 191 – 198.

■ الشكل ٩-١٦ تشكل عمليات البناء الضوئي والتنفس الخلوي دورة؛ فالمواد الناتجة عن أحد هذه المسارات الأيضية تشكل مواد متفاعلة لمسار الأيضي الآخر.



تذكر أن المواد الناتجة عن عملية البناء الضوئي هي الأكسجين والجلوكوز، وهي المواد المتفاعلة التي تتطلبها عملية التنفس الخلوي. والمواد الناتجة عن عملية التنفس الخلوي هي ثاني أكسيد الكربون والماء، وهي المواد المتفاعلة اللازمة لعملية البناء الضوئي.

التقويم ٩-٣

التفكير الناقد

5. **الرياضيات في علم الأحياء** ما عدد جزيئات FADH_2 و NADH و ATP في كل خطوة من خطوات التنفس الخلوي؟ كيف يختلف عدد جزيئات ATP الناتجة (الفعالية) عن عدد جزيئات ATP الكلية (المتوترة)؟
6. قارن بين نوعي التخمر.

فهم الأفكار الرئيسية

1. **الفكرة الرئيسية** سُمّ الشكل النهائي من الطاقة الكيميائية الناتجة عن الخلايا في أثناء التنفس الخلوي.
2. حدد ما عدد ذرات الكربون من جزيء جلوكوز واحد التي تدخل في دورة كربس واحدة؟
3. فسر كيف تُستخدم الإلكترونات العالية الطاقة في سلسلة نقل الإلكترون؟
4. صِف دور التخمر في الحفاظ على مستويات ATP و NAD^+ .

الخلاصة

- تستخدم العديد من المخلوقات الحية عملية التنفس الخلوي لتحليل الجلوکوز.
- تضم مراحل التنفس الخلوي التحلل السكري وحلقة كربس ونقل الإلكترون.
- NADH و FADH_2 نواقل الإلكترونات مهمة جدًا في عملية التنفس الخلوي.
- تقوم الخلايا بعملية التحلل السكري بواسطة التخمر عند عدم توافر الأكسجين.

مستجدات في علم الأحياء

البناء الضوئي الاصطناعي Artificial photosynthesis



كيف يمكن أن يبدو نظام البناء الضوئي الاصطناعي؟ الشكل الأساسي لهذا النظام عبارة عن لفافة رقيقة من طبقات تشبه البلاستيك - وهي كالقماش العالي الأداء في ستة المطر - يمكن بسطها وطيها حسب الحاجة. وتمتص الطبقة العلوية منها الماء وثاني أكسيد الكربون من الجو، أما الطبقة التالية فتقتضي ضوء الشمس ومن ثم استخدامه في إنتاج الوقود. ومن خلال فصل الوقود عن طريق غشاء فإنه لن يتسرّب إلى الهواء بل يمر عبر الجزء السفلي من الطبقات التي تشبه البلاستيك إلى صهريج تجميع لاستخدامه فيما بعد.

ينقسم الماء إلى غاز الهيدروجين والأكسجين بفعل أشعة الشمس. ومن الممكن تحويل غاز الهيدروجين إلى وقود سائل، أو حمله على التفاعل مع ثاني أكسيد الكربون، أو معالجته لإنتاج وقود سائل يمكن استخدامه في الحياة اليومية. وبدلاً من ذلك فإن المحفزات، كما في أنظمة البناء الضوئي الطبيعية، يمكنها تحويل غاز CO_2 مباشرة إلى ميثانول أو ميثان. لقد زودتنا التطورات الحديثة في علوم النانو والمواد والكيمياء والفيزياء بالأدوات اللازمة لتحقيق تقدم سريع في هذا المجال، لنسخدمها في إنتاج الطاقة النظيفة القادرة على توفير الأساس لمستقبل الطاقة الآمنة المستدامة.

على مدى عقود، كان تطوير الطاقة المتعددة يركز إلى حد كبير على توليد الطاقة الكهربائية. ولكن ما يزيد على 60% من الطاقة في العالم يوفرها الوقود الأحفوري على الرغم من الرغم من آثاره السلبية على البيئة، خصوصاً ظاهرة الاحتباس الحراري؛ نتيجة للانبعاثات الكربونية إلى الغلاف الجوي الناتجة عن احتراق الكربون. ولكن هل يوجد بديل قابل للتطوير لا ينبعث عنه غازات ضارة؟

هناك تقنية واحدة تقوم على البناء الضوئي الاصطناعي، الذي يستخدم مواد غير حية لإنتاج الطاقة من ضوء الشمس مباشرة، حيث تعد الشمس مصدراً متعددًا من مصادر الطاقة. ويجمع البناء الضوئي الاصطناعي بين هذه الميزات في تقنية قابلة للتطبيق واحدة بأمن الطاقة والاستدامة البيئية والاستقرار الاقتصادي.

وفي حين يزودنا البناء الضوئي الطبيعي في النباتات بالطاقة التي يحولها من ضوء الشمس، فإن حدودًا كبيرة تقيد أداؤه. فمن المعروف أن جزءًا بسيطًا من الطاقة الشمسية يستخدم فعليًا في عملية البناء الضوئي في النباتات، ولا يتجاوز صافي تحويل الطاقة السنوية 1%， كما تستهلك كميات كبيرة من الطاقة داخل خلايا النبات للحفاظ على عملياتها الحيوية، ومنها عملية البناء الضوئي؛ ويختزن الباقى من الطاقة في أشكال متعددة من المركبات الكربونية. ومع ذلك فإن البناء الضوئي الاصطناعي، المستلهم من البديل الطبيعي، أظهر إمكانية للأداء الفعال؛ حيث يوفر الطاقة في شكل يمكن استخدامه.

فكما يعمل الكلوروفيل على امتصاص الضوء في عملية البناء الضوئي الطبيعية، فإن المواد المناسبة مطلوبة لامتصاص ضوء الشمس اللازم لتكسير جزيئات الماء في الأنظمة الاصطناعية، كما يحتاج النظام أيضًا إلى محفزات لتسهيل الإنتاج الفعال للوقود. ولا بد أن تكون هذه المحفزات عالية النشاط، ومستقرة.

مخترِب الأَحِيَاء

هل تؤثر أطوال الموجات الضوئية المختلفة في معدل حدوث عملية البناء الضوئي؟

5. اعمل جدول بيانات لتسجيل ملاحظاتك وقياساتك.
6. تأكد من موافقة معلمك على خطتك قبل بدء العمل.
7. ابدأ بإجراء تجربتك كما اتفق عليها.
8. التنظيف والخلاص من الفضلات نظف جميع الأجهزة بحسب التعليمات، وأعد كل شيء استخدمته إلى مكانه المناسب. وخلاص من النبات بحسب توجيهات معلمك، ثم أغسل يديك جيداً بالماء والصابون.

حل ثم استنتاج

1. حدد المجموعة الضابطة والمتغيرات في تجربتك.
2. فسر طريقة حسابك لمعدل حدوث عملية البناء الضوئي.
3. مثل بياناتك بالرسم.
4. صُفْ كيف تأثّر معدل حدوث البناء الضوئي بأطوال الموجات الضوئية المختلفة بناءً على بياناتك؟
5. نقاش ما إذا كانت بياناتك تدعم توقعك أم لا.
6. تحليل الخطأ. حدد مصادر الخطأ المحتملة في تصميم التجربة، وخطوات العمل وجمع البيانات.
7. اقترح كيف يمكنك تقليل مصادر الخطأ هذه إذا كررت التجربة؟

تواصل

مراجعة اعرض بياناتك على زملائك، ثم نقاش ما عرضه زملاؤك، واستخدم ملاحظاتهم في الصنف لتحسين أدائك.

الخلفية النظرية: تحتاج المخلوقات الحية التي تعتمد على عملية البناء الضوئي إلى الضوء لإتمامها. يتكون الضوء الأبيض من ألوان مختلفة توجد في الطيف الضوئي المائي. ولكل لون من الضوء طول موجي محدد. وفي هذا المختبر تصمم تجربة لاختبار أثر أطوال الموجات الضوئية المختلفة في معدل حدوث عملية البناء الضوئي.

سؤال: كيف تؤثر أطوال الموجات الضوئية المختلفة في معدلات حدوث عملية البناء الضوئي؟

المواد والأدوات

اختر المواد التي تراها مناسبة للتجربة التي تصممها.

- أنابيب اختبار سعتها (15 mL).
- نبات مائي.
- مخبار مدرج سعته (10 mL).
- ساعة إيقاف.
- مسطرة مترية.
- محلول صودا الخبز (0.25 %).
- مصباح مع عاكس ومصباح صغير.
- ورق سلوفان ملون.
- بقدرة 150 واط.
- ورق ألومنيوم.
- دورق زجاجي مخروطي.

احتياطات السلامة



خطط ونفذ التجربة

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. توقع كيف تؤثر أطوال الموجات الضوئية المختلفة في معدل حدوث عملية البناء الضوئي في النبات؟
3. صمم تجربة لاختبار توقعك، واكتب قائمة بالخطوات التي تتبعها، وحدد المجموعة الضابطة والمتغيرات التي ستستخدمها.
4. وضح كيف تولد ضوءاً بأطوال موجية مختلفة؟ وزوّد النبات بشاني أكسيد الكربون، واحسب كمية الأكسجين التي يتوجهها النبات.



المطويات قارن ما أوجه التشابه والاختلاف بين عملية نقل الإلكترون في الميتوكوندريا وعملية نقل الإلكترون في البلاستيدات الخضراء.

المفاهيم الرئيسية

المفردات

1-9 كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة؟

الفكرة الرئيسية تستخدم جميع المخلوقات الحية الطاقة للقيام بوظائفها الحيوية.

- تسسيطر قوانين الديناميكا الحرارية على انتقال الطاقة وتحولها من شكل إلى آخر في المخلوقات الحية.
- تصنّع بعض المخلوقات الحية غذاءها بنفسها، في حين يحصل بعضها الآخر على الطاقة من الغذاء الذي يتناوله.
- تخزن الخلايا الطاقة وتحررها بتفاعلات المدم والبناء.
- الطاقة المتحررة من تحمل جزء ATP تدعم الأنشطة الخلوية.

الطاقة

الдинاميكا الحرارية

عملية أيض

التنفس الخلوي

أدينوسين ثلاثي الفوسفات ATP

2-9 البناء الضوئي

الفكرة الرئيسية تتحول الطاقة الضوئية بعد امتصاصها إلى طاقة كيميائية في أثناء عملية البناء الضوئي.

- تحتوي النباتات على بلاستيدات خضراء وأصباغ متخصصة الضوء، وتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية.
- تمر عملية البناء الضوئي بمراحلتين تضم تفاعلات ضوئية وحلقة كالفن.
- في التفاعلات الضوئية متخصصة المخلوقات الحية الذاتية التغذىي الطاقة الضوئية وتحولها إلى طاقة كيميائية في صورة ATP و NADPH.
- في حلقة كالفن تستخدم الطاقة الكيميائية المخزنة في جزيئات ATP و NADPH لإنتاج الكربوهيدرات مثل الجلوكوز.

الثايالاكويد

الغرانا

الحشوة (اللحمة)

الصيغة

حلقة كالفن

أنزيم روبيسكو

3-9 التنفس الخلوي

الفكرة الرئيسية تحصل المخلوقات الحية على الطاقة بتحليل الجزيئات العضوية في أثناء عملية التنفس الخلوي.

- تستخدم العديد من المخلوقات الحية عملية التنفس الخلوي لتحليل الجلوكوز.
- تضمن مراحل التنفس الخلوي التحلل السكري، حلقة كربس ونقل الإلكترون.
- NADH و FADH₂ نواقل إلكترونات مهمة جدًا في عملية التنفس الخلوي.
- تقوم الخلايا بعملية التحلل السكري بواسطة التخمر عند عدم توافر الأكسجين.

عملية لاهوائية

التنفس الهوائي

عملية هوائية

التحلل السكري

حلقة كربس

التخمر

٩-١

مراجعة المفردات

استبدل الكلمة التي تحتها خط بكلمة أخرى من صفحة

دليل مراجعة الفصل لتصبح الجملة صحيحة:

١. الذاتية التغذى جزء الطاقة في الخلية.

٢. تسمى دراسة تدفق الطاقة وتحويلها من شكل إلى آخر الطاقة.

٣. توجد الطاقة الحيوية في أشكال كثيرة.

٤. تسمى التفاعلات الكيميائية المتنوعة التي تنتج الطاقة في الخلية المخلوقات الحية الذاتية التغذى.

٥. تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية خلال عملية ضوء الشمس.

ثبت المفاهيم الرئيسة

٦. أيّ مما يأتي ليس من خصائص الطاقة؟

a. لا يمكن أن تفنى أو تُستحدث إلا بمشيئة الله.

b. القدرة على القيام بالعمل.

c. توجد بأشكال عده، منها الكيميائية والضوئية

والميكانيكية.

d. تتغير تلقائياً من عشوائية إلى منظمة.

٧. أيّ المخلوقات الحية الآتية تعتمد على مصادر خارجية للمركيبات العضوية؟

a. الذاتية التغذى.

b. غير الذاتية التغذى.

c. الذاتية التغذى الكيميائية.

d. الذاتية التغذى الضوئية.

أسئلة بنائية

١٠. إجابة قصيرة. فيم تختلف المخلوقات الحية الذاتية التغذى وغير الذاتية التغذى في طريقة حصولها على الطاقة؟

١١. نهاية مفتوحة. استخدم التشابه في وصف دور جزء ATP في المخلوقات الحية.

التفكير الناقد


١٢. صف. كيف تتحرر الطاقة من جزء ATP؟

١٣. اربط بين تفاعلات الهدم والبناء، ثم وضح التشابه في العلاقة بين عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي.



9-2

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 21.



21. ما الطول الموجي للضوء الذي تمتص عنده أصباغ الكاروتينات أعلى نسبة من الضوء؟

- .a. 600 .c. 400
- .b. 700 .d. 500

أسئلة بنائية

22. إجابة قصيرة. لخُص مراحل عملية البناء الضوئي، وصف أين تحدث كل مرحلة في البلاستيدية الخضراء؟

23. إجابة قصيرة. لماذا يعد تحرير أيونات الهيدروجين ضروريًا لإنتاج ATP في أثناء عملية البناء الضوئي؟

24. إجابة قصيرة. فسّر لماذا تعتمد حلقة كالفن على التفاعلات الضوئية.

التفكير الناقد

25. فسر الجملة الآتية: الأكسجين المتحرر من عملية البناء الضوئي مجرد ناتج ثانوي يتكون في أثناء إنتاج جزيئات ATP والكريبوهيدرات.

26. توقعُ أثر فقدان الغابات في عملية التنفس الخلوي عند المخلوقات الحية الأخرى.

27. صُف مسارين بديلين لعملية البناء الضوئي في النباتات، واقتصر كيف يمكن أن تساعد هذه التكيفات النباتات؟


مراجعة المفردات

اختر المصطلح الصحيح من صفحة دليل مراجعة الفصل، الذي يمثل كلاً من التعريفات الآتية:

14. مكان حدوث التفاعلات الضوئية.
15. رزمه من أقراص الثايلاكوايد.
16. جزيء ملون يمتص الضوء.
17. عملية يتم فيها تخزين الطاقة في الجزيئات العضوية.

ثبت المفاهيم الرئيسية

استخدم المعادلة الآتية للإجابة عن السؤال 18.



18. ما ناتج عملية البناء الضوئي الذي يتحرر إلى البيئة؟

- .a. CO₂ .c. O₂
- .b. NH₃ .d. H₂O

19. أيٌ مما يأتي يمثل الغشاء الداخلي للبلاستيدية الخضراء المنظم في صورة أكياس غشائية مسطحة؟

- a. الثايلاكوايد.
- b. الميتوكنديريا.
- c. الكيس (الغمد).
- d. الحشوة.

20. ما مصدر الطاقة اللازمة لبناء الكربوهيدرات في أثناء حلقة كالفن؟

- .a. ATP و CO₂ .c. H₂O و NADPH
- .b. O₂ و H₂O .d. NADPH و ATP

9

تقويم الفصل

35. أيٌّ مما يأتي لا يعد من مراحل التنفس الخلوي؟
 a. التحلل السكري. c. سلسلة نقل الإلكترون.
 b. حلقة كربس. d. تخمر حمض اللاكتيك.
36. ما الذي يتبَعُ عند مغادرة الإلكترونات سلسلة نقل الإلكترون في التنفس الخلوي وارتباطها مع المستقبل النهائي للإلكترونات في السلسلة؟
 .CO₂ .H₂O .a
 .CO .O₂ .b
37. في نهاية عملية التحلل السكري، ما الجزيء الذي يتم فيه تخزين معظم الطاقة الناتجة عن الجلوكوز؟
 a. البيروفيت. b. أستيل CoA
 c. ATP. d. NADH

أسئلة بنائية

38. إجابة قصيرة. ناقش دور كل من FADH₂ و NADH في عملية التنفس الخلوي.
39. إجابة قصيرة. في التنفس الخلوي، ما مصدر الإلكترونات في سلسلة نقل الإلكترون؟ وما وجهتها النهائية؟
40. إجابة قصيرة. لماذا تشعر بالألم في عضلاتك بعد القيام بتمارين رياضية مرهقة؟

9-3


مراجعة المفردات

عرف المفردات الآتية بجملة تامة:

28. حلقة كربس.
 29. عمليات التنفس اللاهوائية.
 30. التخمر.
 31. هوائي.
 32. التحلل السكري.

ثبت المفاهيم الرئيسة

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 33 و 34.



33. ما العضية التي يوضحها الشكل أعلاه؟
 a. جهاز جولجي. c. التواة.
 b. الميتوكوندريون.
34. ما العملية التي لا تحدث في العضية في الشكل أعلاه؟
 a. التحلل السكري.
 b. حلقة كربس.
 c. تحول البيروفيت إلى أستيل CoA.
 d. سلسلة نقل الإلكترون.




تقويم إضافي

44. **الكتابة في علم الأحياء** اكتب مقالة توضح أهمية النباتات في نظام بيئي مستخدماً ما تعرفه عن العلاقة بين عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي.

أسئلة المستندات

الكادميوم من العناصر الثقيلة السامة للإنسان والنباتات والحيوانات. وعادة ما يوجد بوصفه أحد الملوثات في التربة. استخدم البيانات الآتية في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتأثير الكادميوم في عملية البناء الضوئي في نبات الطماطم.



45. ما أثر عنصر الكادميوم في حجم الورقة، ومحظى الكلوروفيل، ومعدل البناء الضوئي؟

46. أي تركيز من الكادميوم كان له الأثر الأكبر في حجم الورقة، وفي محظى الكلوروفيل، وفي معدل عملية البناء الضوئي؟

47. توقع الآثار في عملية التنفس الخلوي إذا تناول حيوان الطماطم الملوثة بالكادميوم.

التفكير الناقد

41. فـّسر النواتج النهائية في عملية التنفس الخلوي هي: H_2O و CO_2 . من أين جاءت ذرات الأكسجين في جزيء CO_2 ? ومن أين جاءت ذرات الأكسجين في جزيء H_2O ؟

42. استنتاج. ما مزايا عمليات الأيض عند وجود الأكسجين (عمليات هوائية) مقارنة بعمليات الأيض عند غياب الأكسجين (عمليات لا هوائية) من حيث إنتاج الطاقة في المخلوقات الحية؟


43. قارن بين نقل الإلكترون في عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي.

اختبار مقتني

5. ما مصدر الإلكترونات في مرحلة سلسلة نقل الإلكترون في التنفس الخلوي؟

- a. تكون الأستيل CoA في أثناء حلقة كربس.
- b. إنتاج جزيئات NADH و F_2H في أثناء حلقة كربس.
- c. تخمر حمض اللاكتيك.
- d. تكسير الروابط خلال عملية التحلل السكري.

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 6.



6. أي المجموعتين في جزء ATP في الشكل أعلاه يجب أن تتكسر الرابطة بينهما حتى تتحرر الطاقة التي يستخدمها المخلوق الحي؟

- a. 1 و 2
- b. 2 و 3
- c. 2 و 4
- d. 3 و 4

أسئلة الاختيار من متعدد

1. أي الخطوات الآتية تحدث في حلقة كالفن؟

- a. تكوين جزيئات ATP.
- b. تكون السكريات السادسية الكربون.
- c. تحرير غاز الأكسجين.
- d. نقل الإلكترونات بواسطة NADP^+ .

2. أي تحولات الطاقة الآتية يحدث في المخلوقات الحية الذاتية التغذوية فقط؟

- a. من الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الميكانيكية.
- b. من الطاقة الكهربائية إلى الطاقة الحرارية.
- c. من الطاقة الضوئية إلى الطاقة الكيميائية.
- d. من الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الحرارية.

3. أي المركبات التي تحوي الكربون يتم إنتاجها خلال عملية التحلل السكري؟

- a. أستيل CoA.
- b. الجلوكوز.
- c. حمض اللاكتيك.
- d. البيروفيت.

4. أي الجزيئات الكبيرة الآتية يمكن أن تكون باستخدام السكريات التي تنتج خلال عملية البناء الضوئي في النباتات؟

- a. السيليلوز.
- b. DNA.
- c. الدهون.
- d. البروتين.




اختبار مقتني

10. اربط بين روابط مجموعات الفوسفات في جزيء ATP وتحرير الطاقة عندما يتحول جزيء ATP إلى جزيء ADP.
11. كيف يمكن أن يكون المخلوق الحي ذاتي وغير ذاتي التغذى في الوقت نفسه؟
12. اذكر إنزيمين مرتبطين مع عملية البناء الضوئي، وصف دوريهما.
13. في أي أجزاء النبات تتوقع وجود خلايا تحوي أكبر كمية من البلاستيدات الخضراء؟ فسر إجابتك.
14. عادة ما يتحدث عداؤو المسافات الطويلة عن التدريب الذي يهدف إلى رفع العتبة اللاهوائية. العتبة اللاهوائية هي النقطة التي لا تحصل فيها عضلات معينة على كمية من الأكسجين تكفيها للقيام بالتنفس الهوائي، لذا تبدأ بالتنفس اللاهوائي. كون فرضية تبين أهمية رفع العتبة اللاهوائية للعدائين المتنافسين.
15. افترض أن تركيز CO_2 في بيت زجاجي قد انخفض. فسر كيف يمكن أن تتأثر عملية البناء الضوئي بهذا التغير، ثم توقع أثر ذلك في النباتات.
16. أي العمليات الحيوية تحدث في كل من غشاء الثايالكويد وغشاء الميتوكندريا؟ أعط سبباً يفسر أهمية هذه العملية أو عدم أهميتها.
7. أي مراحل البناء الضوئي تتطلب وجود الماء لإتمام التفاعل الكيميائي؟
- عمل إنزيم بناء الطاقة ATP على ADP.
 - تحويل جزيئات RuBP إلى GAP.
 - تحويل NADP^+ إلى NADPH.
 - تحويل الطاقة الكيميائية لتكوين جزيئات GAP.
8. أي العمليات الخلوية الآتية تخزن الطاقة؟
- تحلل سلسلة الدهون.
 - تحول ATP إلى ADP.
 - بناء البروتينات من كودونات RNA.
 - نقل الأيونات عبر الغشاء.

أسئلة الإجابات القصيرة

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 9.



9. سُمِّيَ الجزأين في الشكل أعلاه الذي يمثل بلاستيد خضراء، وحدِّد مراحل البناء الضوئي التي تحدث في كل جزء.

اختبار مقنن

سؤال مقالى


يتفاعل جسم الإنسان بصورة مستمرة مع البيئة؛ فهو يحصل على بعض المواد، ويخرج مواد أخرى. وللعديد من المواد التي يحصل عليها الإنسان دور محدد في المحافظة على العمليات الخلوية الأساسية ومنها التنفس، ونقل الأيونات وبناء الجزيئات الكبيرة المختلفة. كذلك، فإن العديد من المواد التي يخرجها الجسم هي فضلات ناتجة عن هذه العمليات الخلوية.

استخدم المعلومات في الفقرة أعلاه للإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقال:

18. كيف يحصل الإنسان على المواد الضرورية لعملية التنفس الخلوي؟ وكيف يتخلص من فضلات هذه العملية؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 17.



17. لخُص خطوات الحلقة في الشكل السابق.

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	الدرس / الفصل	الصف
1	9-2	2-1
2	9-1	2-1
3	9-3	2-1
4	9-2	2-1
5	9-3	2-1
6	9-1	2-1
7	9-2	2-1
8	9-1	2-1
9	9-3	2-1
10	9-2	2-1
11	9-1	2-1
12	9-2	2-1
13	9-3	2-1
14	9-2	2-1
15	9-3	2-1
16	9-2	2-1
17	9-3	2-1
18	9-2	2-1

المصطلحات

مسرد المصطلحات



مسرد المصطلحات

(أ)

الإثيلين ethylene: هرمون نباتي غازي يؤثر في نضج الثمار.

الانتحاء tropism: استجابة النبات لمؤثرات خارجية في اتجاه محدد.

الإندوسبرم endosperm: نسيج يوفر الغذاء للجنين النامي في بذرة النباتات المزهرة.

الإنبات germination: بداية نمو جنين البذرة.

استجابة الحركة Nastic responses: استجابة النبات التي تسبب الحركة بغض النظر عن اتجاه المنبه.

الأوعية الخشبية xylem: نسيج نباتي وعائي ينقل الماء والمعادن المذابة فيه من الجذور عبر النبات، ويكون من الأوعية الخشبية والقصيبات.

أدينوسين ثلاثي الفوسفات adenosine triphosphate ATP: جزيء حيوي ناقل للطاقة، يدفع عند تحطمها الخلية للقيام بالأنشطة الخلوية.

الأذين atrium: أحد حجرات القلب التي تستقبل الدم من الجسم.

الأنبوب الغربالي tracheid element: خلايا في اللحاء تحوي السيتوبلازم وليس بها نوى.

إنزيم روبسكي rubisco: إنزيم يحول ثاني أكسيد الكربون غير العضوي إلى مركبات عضوية خلال المرحلة الأخيرة من حلقة كالفن.

الأكسين auxin: هرمون نباتي ينتقل في اتجاه واحد فقط، أي بعيداً عن الجانب الذي ينتج فيه ويسبب استطالة الخلايا.

(ب)

طاقة كيميائية من خلال البناء الضوئي.

البوليمر Polymers: جزيئات مكونة من وحدات متكررة من مركبات متشابهة أو قريبة التشابه.

البيضة الرهيلية الأمنيوتية amniotic egg: بيضة توفر بيئة كاملة لنمو الجنين؛ فبالإضافة إلى كيس المح الذي يغذي الجنين هناك أغشية داخلية، وكذلك قشرة خارجية للحماية.

البذرة seed: تركيب نباتي متكيف في النباتات الوعائية تحوي الجنين ومواد مغذية، ومحاطة بطبقة واقية.

البروتين الناقل transport protein: بروتين ينقل المواد أو الفضلات عبر الغشاء الخلوي.

البطين ventricle: حجرتا القلب السفليتان، تضخ إدراهما الدم من القلب إلى الرئتين، والأخرى من القلب إلى جميع أنحاء الجسم.

البشرة epidermis: نسيج خارجي يشكل الغطاء الخارجي للنبات.

البتلة Petal: تركيب ملون في الزهرة يجذب الملقطات، ويشكل محطة للوقوف عليها.

البلاستيد الخضراء chloroplast: عضية ذات غشاء مزدوج، تلتقط الطاقة الضوئية وتحولها إلى

(ت)

التنفس الخلوي cellular respiration: مسار هدم، يتم فيه تحليل الجزيئات العضوية لإطلاق الطاقة اللازمة للخلية.

التنفس الهوائي aerobic respiration: عملية أيضية يتم فيها تحليل البيروفيت، و تستعمل الجزيئات الناقلة للإلكترون لإنتاج الطاقة من ATP خلال عملية انتقال الإلكترونات.

التحلل السكري glycolysis: عملية لاهوائية، وهي المرحلة الأولى من عملية التنفس الخلوي؛ حيث يتحلل سكر الجلوكوز إلى جزيئين من البيروفيت.

التخمر fermentation: عملية يتم فيها توليد جزيئات NAD⁺، مما يسمح للخلايا بالقيام بعملية انحلال السكر في غياب الأكسجين.

(ث)

الثالوس Thallus: تركيب مجزاً ولين في الحشائش الكبدية.

ثنائية الحول biennial: نبات يتم دورة حياته في عامين.

ثايلاكويد thylakoid: يوجد في داخل البلاستيدات الخضراء، وهو أحد الأغشية المكدة والمسطحة والمحتوية على الصبغات، وتحدث فيه التفاعلات الضوئية.

ثابت درجة الحرارة endothermic: حيوان يمكن أن ينظم حرارة جسمه داخلياً عن طريق عمليات الأيض.

الثدييات القيسية marsupials: ثدييات تنمو صغارها لفترة قصيرة داخل الرحم، وبعد الولادة يستمر نموها فترة أطول داخل كيس (جراب).

الثدييات الأولية monotremes: ثدييات تتکاثر بوضع البيض. ومن الثدييات الأولية التي تعيش حالياً آكل النمل الشوكي ومنقار البط.

الثدييات المشيمية placental mammal: ثدييات لها مشيمة، تلد صغاراً مكتملة النمو لا تحتاج إلى النمو داخل كيس (جراب).



(ج)

جهاز وعائي مائي water vascular system: جهاز يمتلك بالسوائل، وأنابيب مغلقة تمكّن شوكيات الجلد من ضبط الحركة والحصول على الغذاء.

جدار الخلية cell wall: الجدار الصلب في النباتات الذي يحيط بالغشاء البلازمي، ويكون من السيليلوز، ويوفر الدعم والحماية للخلية.

الجزيئات الكبيرة Macromolecules: جزيئات ضخمة تتكون من ارتباط جزيئات عضوية أصغر.

مسرد المصطلحات

الجبريلينات Gibberellins: مجموعة هرمونات نباتية تنتقل بواسطة الأنسجة الوعائية، وتأثير في نمو البذرة، وتبني انقسام الخلايا، وتسبب استطالتها.

الجذير radicle: الجزء الأول من الجنين، الذي ينمو من البذرة، ويبدأ بامتصاص الماء والمواد المغذية من البيئة.

جهاز الخط الجانبي lateral line system: مستقبلات حسية تمكن الأسماك من اكتشاف الاهتزازات أو الأمواج الصوتية في الماء.

جيوب بلعومية pharyngeal Pouch: أحد التراكيب الزوجية، متصل بأنبوب عضلي يبطن التجويف الفم والبلعوم في أجنة الحجليات.

(ح)

الحامل البوغي strobilus: وهو تجمّع متراصّ من التراكيب الحاملة للأبوااغ. وتنشر الأبوااغ الصغيرة التي يتتجها الحامل البوغي عادة بواسطة الرياح، وعندما يستقر البوغ في بيئه مناسبة، فإنه ينمو ليشكّل النبات المшиجي.

حلقة كالفن calvin cycle: تفاعلات لاضوئية تحدث في أثناء المرحلة الثانية من البناء الضوئي، يتم فيها اختران الطاقة في الجزيئات العضوية مثل الجلوکوز.

حلقة كربس krebs cycle: سلسلة من التفاعلات، يتم فيها تحطيم البيروفيت إلى ثاني أكسيد الكربون داخل ميتوکندریا الخلايا، ويطلق عليها أيضًا اسم دورة الأحماس الثلاثية الكربوكسیل ودورة حمض الستيريك.

الحمض الأميني Amino acids: مركبات صغيرة مكونة من كربون ونيتروجين وأكسجين وهيدروجين وأحياناً الكبريت.

الحمض النووي nucleic acids: جزيئات كبيرة معقدة تخزن المعلومات الوراثية وتنقلها.

حبل ظهرى notochord: تركيب من يشبه العصا، يمتد على طول جسم الحيوان الفقاري، ويساعد على انحناء الجسم وأداء حركاته الجانبية.

حجليات chordates: حيوانات من شعبة الحجليات لها حجل عصبي ظهري أنبوبي، وحجل ظهري، وجีوب بلعومية، وذيل خلف شرجي في بعض مراحل النمو.

حبل ظهرى notocord: تركيب من يشبه القصيّب، ويمتد على طول جسم الحجليات، ويمكن الجسم من الانثناء متراجعاً حركات من جانب إلى جانب آخر.

حبل عصبي ظهري أنبوبي dorsal tubular nerve cord: حبل عصبي في الحجليات يشبه الأنوب، يستقر فوق أعضاء الهضم.

الحضانة incubation: تعني إبقاء الظروف ملائمة لفقس الصغار، وترقد الطيور على البيض لحضنه.

حويصلة عضلية ampulla: كيس عضلي يوجد في شوكيات الجلد ينقبض لدفع الماء إلى الأنوب القديمي، مما يؤدي إلى تمدد.

الحجاب الحاجز diaphragm: صفيحة عضلية تقع تحت الرئتين، تفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني في الثدييات.

الحمل gestation: مدة زمنية يتم خلالها نمو الجنين في الرحم قبل أن يولد، وتعتمد مدتها على نوع المخلوق الثديي.

(خ)

خلوية سميكة قاسية توفر الدعامة للنبات كما تنقل المواد.

الخلية الحارسة Guard Cell: واحدة من الخلايا المزدوجة تعمل على فتح ثغور النباتات وإغلاقها عن طريق تغيير شكلها.

ال الخلية المرافقة Companion cell: خلية نباتية ذات نواة تزود أجزاء الأنابيب الغربالية الناضجة بالطاقة الالزامية لنقل المواد المذابة في لحاء النباتات الوعائية.

الخشب xylem: هو النسيج الوعائي الناقل للماء، ويتألف من خلايا متخصصة، هي الأوعية الخشبية والقصيبات.

الخلايا البرنشيمية parenchyma cells: خلايا نباتية كروية الشكل رقيقة الجدران توجد في معظم أجزاء النبات، وتقوم بعملية البناء الضوئي وتبادل الغازات والحماية وخزن المواد وتعويض التالف من الأنسجة واستبدالها.

الخلايا الكولتشيمية collenchyma cells: خلايا نباتية طولية الشكل عادة، وتعطي النبات مرونة، كما توفر الدعم للأنسجة المجاورة، وتقوم باستبدال الأنسجة التالفة أو إصلاحها.

الخلايا الإسكلرنشيمية sclerenchyma cells: خلايا نباتية تفتقر إلى السيتوبلازم والمكونات الحية الأخرى عندما تنضج، فتشكل بذلك جدرًا صدفة السلحفاة.



(د)

ديناميكا حرارية thermodynamics: دراسة تدفق الطاقة وتحولها في الكون.

درع بطني plastron: الجزء البطني لدرع السلحفاة.

الدرع الظاهري (الواقي) carapace: الجزء الظاهري من صدفة السلحفاة.

(ذ)

ذيل خلف شرجي Postanal tail: تركيب في الجبليات يستخدم بشكل أساسى في الحركة.

(ر)

جسم الطائر وأجنحته وذيله، ويحدد شكل الجسم.

الرايزوم Rhizome: ساق تحت أرضية سميكة للخنشار تعمل كعضو مخزن للغذاء.

الرحم uterus: عضو عضلي أنثوي يشبه الكيس، ينمو الجنين داخله.

ريش feather: نمو متخصص لجلد الطيور يستعمل للطيران والعزل.

ريش زغبي down feather: ريش طري تحت ريش الطائر المحيطي، وظيفته العزل عن طريق حجز الهواء.

ريش محيطي contour feather: ريش ذو قصبات يغطي

(ز)

زعنفة fin: تركيب يشبه المجاذف في السمسكة أو بعض المخلوقات المائية الأخرى يستعمل للسباحة والاتزان والاندفاع.

(س)

سدادة stamen: أعضاء التكاثر الذكرية في معظم الأزهار؛ وتتكون من الخيط والمتك.

السنوي annual: نبات يكمل دورة حياته في فصل نمو واحد أو أقل

السوط Flagella: تغطي سطوح بعض الخلايا الحقيقية النواة، وتمتد خارج الغشاء السيتوبلازم.

السبلات Sepals : أعضاء زهرية تحمي البرعم الزهرى.

السوية تحت الفقية hypocotyl: منطقة من الساق الأقرب إلى البذرة.

السايتوكاينينات Cytokinins : هرمونات تحفز النمو، يتم إنتاجها في الخلايا السريعة الانقسام. وهي تنتقل إلى الأجزاء الأخرى من النبات عبر أوعية الخشب.

(ش)

الشق البلعومي pharyngeal pouch: في أجنة الفقاريات، أحد التراكيب المزدوجة، يربط بين الأنابيب العضلية الذي يبطن تجويف الفم والمريء.

(ص)

الصبغة pigment: جزيء ملون يمتص الضوء، مثل الكلوروفيل والكاروتين، ويوجد في الأغشية الثايلاكويدية للبلاستيدات الخضراء.

(ط)

البلازمي التي تتكون من جزيئات الدهون المفسفرة، تترتب بحيث تكون الرؤوس القطبية للخارج والذيل غير القطبية للداخل.

طاقة التنشيط Activation energy: الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل الكيميائي.

الطاقة ATP (أديتوسين ثلاثي الفوسفات): جزيء حيوي يزود خلايا الجسم بالطاقة الكيميائية.

الطاقة energy: المقدرة على أداء شغل ، لا يمكن إنتاج الطاقة أو تدميرها من الإنسان ويمكن تحويلها فقط.

طبقة الليبيادات المفسفرة المزدوجة phospholipid bilayer : طبقات الغشاء

(ع)

العصيات organelles: مجموعة من التراكيب التي تنتشر داخل الخلية، و تقوم بوظائف محددة.

عملية التنفس اللاهوائي anaerobic process: عملية أيضية لا تتطلب وجود الأكسجين.

عملية التنفس الهوائي aerobic process: عملية أيضية تتطلب وجود الأكسجين.

عملية الأيض metabolism: جميع التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل جسم المخلوق الحي.

عرف عصبي neural crest: مجموعة من الخلايا تتكون من الطقة الخارجية للجنين وتساهم في تكوين العديد من تراكيب الفقاريات.

عظمة القص sternum: عظمة صدر كبيرة تتصل بها العضلات التي تستخدم في تحليق الطيور وطيرانها.

عضو جاكوبسون jacobson's organ: تركيب يشبه الكيس، يحس برائحة المواد، ويوجد على قاع التجويف الفموي للأفاعي.

(غ)

الغرانا Grana: مجموعة من الأغشية المسطحة تشبه الكيس تترتب في رزم متراصة.

الغضروف cartilage: مادة مرنة قاسية، تكون هيكل الفقاريات أو أجزاء منها.

الغطاء الخيشومي operculum: قطعة متحركة واقية تغطي خياشيم الأسماك، وتساعد على ضخ الماء الذي يدخل الفم، ويتحرك فوق الخياشيم.

غلاف البذرة seed coat: طبقة من النسيج تتشكل من تصلب الأغلفة الخارجية للبويبة.

الغشاء الرهلي (الأمنيون) amnion: غشاء يحيط بالجنين مباشرةً، مملوء بسائل رهلي يحمي الجنين خلال فترات نموه.

الغدة gland: عضو أو مجموعة من الخلايا تفرز مادة تستعمل في مكان آخر في الجسم.

غدة دهنية (زيتية) oil gland: غدة تفرز الزيت، توجد بالقرب من قاعدة ذيل الطائر.

غدة لبنية mammary gland: غدة تنتج وتفرز الحليب لتغذية الصغير النامي وتوجد في الثديات.

الغشاء الرامش nictitating membrane: جفن شفاف يتحرك على سطح العين، يحميها من الجفاف على اليابسة، ويحميها أيضًا تحت الماء، ويوجد في البرمائيات.

غشاء الطبلة ear drum: غشاء بيضاوي الشكل، رقيق شبه شفاف، يفصل الأذن الوسطى عن الأذن الداخلية، ويسمى أيضًا طبلة الأذن.

الغشاء البلازمي plasma membrane: غشاء مرن، يمتاز بخاصية النفاذية الاختيارية التي تساعده على التحكم في المواد الداخلة والخارجة من الخلية.



(ف)

الفترة الحرجة *The critical period*: بداية نمو الزهرة في كل نوع من النباتات استجابةً لعدد من ساعات الظلام.

الفلقة *cotyledon*: تركيب في البذرة يخزن الغذاء أو يساعد على امتصاص الغذاء للنبات البوغي في النباتات الوعائية البذرية.

الفترة الضوئية *Photoperiodism*: استجابة النبات أو الحيوان إلى طول فترة الضوء أو الظلمة التي يتعرض لها.

(ق)

القشور *scales*: تراكيب صغيرة، منبسطة، تشبه الصفيحة توجد قريبة من سطح الجلد عند معظم الأسماك، يمكن أن تكون دائيرية أو معينية أو لوحية أو مشطية الشكل.

قدم أنبوبية *tube feet*: قدم عضلية صغيرة، أنابيب تمتلئ بالسائل وتنتهي بマصة تشبه الفنجان، تتمكن شوكيات الجلد من الحركة وجمع الغذاء.

القصيبات *tracheids*: خلايا نباتية طويلة أسطوانية الشكل يمر فيها الماء من خلية إلى أخرى عبر نهايات مثقبة.

القشرة المخية *cerebral cortex*: طبقة من المخ كثيرة الأنثناء، مسؤولة عن تنسيق النشاطات الإرادية، والذاكرة، والمقدرة على التعلم.

(ك)

الكربلة *pistil*: التركيب التكاثري الأنثوي في الزهرة؛ يتكون عادة من الميسّم والقلم والمبيض.

كيس هوائي *air sac*: في الطيور، تركيب خلفي وأمامي يستخدم في التنفس، يسبب جريانًا للهواء المؤكسج فقط خلال الرئتين.

الكيس البوغي (بشرة) *sorus*: تركيب في الخنشار يتكون من تجمع المحافظ البوغية، ويقع عادة على السطح السفلي لورقة الخنشار.

الكمبيوم الوعائي *vascular Cambium*: أسطوانة رقيقة من الأنسجة المرستيمية تنتج خلايا نقل جديدة.

الكمون (الراحة) *dormancy*: وهي فترة لا يوجد فيها نموًّا إطلاقاً، أو يوجد فيها نموٌ قليل جدًا

الكمبيوم الفليني *cork cambium*: نسيج مرستيمي يكوّن خلايا ذات جدران قاسية تشكّل طبقة واقية خارجية على السيقان والجذور.



(ل)

اللحاء phloem: نسيج نباتي وعائي يتكون من الأنابيب الغرالية والخلايا المرافقة وينقل السكريات المذابة والمركبات العضوية الأخرى من الأوراق إلى الساق والجذور ومن الجذور إلى الساقان والأوراق.

اللحمة stroma: حيز يحيط بالجرانا مملوء بسائل تحدث فيه التفاعلات التي تعتمد على الضوء.

لافقاريات حبلية invertebrate chordates: حبليات بدون عمود فقري.

لواقظ قدمية pedicellariae: تراكيب صغيرة تشبه الكلابات تساعد شوكيات الجلد على إمساك الأجسام الغريبة عن الجلد وإزاحتها.

اللافقاري الحبلي invertebrate chordate: حيوان حبلي بدون دعامة ظهرية.

(م)

المُخيخ cerebellum: جزء من الدماغ مسؤول عن توازن الجسم وتنسيق حركاته.

المشيمة placenta: في معظم الثدييات، عضو متخصص يوفر الغذاء والأكسجين للجنين النامي، ويخلصه من الفضلات

المخروط cone: تركيب يحوي التراكيب التكاثيرية الذكرية أو الأنثوية في السيكادا وغيرها من معّراء البذور.

محفظة الأبواغ sporangium: كيس يحوي أبواغاً يحفظها ويحميها من الجفاف.

معدل الأيض metabolism: جميع التفاعلات الكيميائية التي تحدث في جسم المخلوق الحي.

المعمر perennial: نبات يستطيع العيش سنوات عديدة.

الموقع النشط Active site: موقع ارتباط المادة المتفاعلة مع الأنزيم.

مصفاة madreporite: فتحة شبيهة بالمصفاة، حيث تدخل المياه إلى النظام الوعائي المائي في أعلى شوكيات الجلد.

متغير درجة الحرارة exothermic: حيوان لا يمكن أن ينظم درجة حرارة جسمه بواسطة عملياته الأيضية، ويحصل على حرارة جسمه من البيئة الخارجية.

مثانة عوم swim bladder: فراغ داخلي مملوء بغاز في الأسماك العظمية تسمح لها بتنظيم طفوها في الماء.

المحفز Catalyst: مادة تقلل طاقة التنشيط التي يتطلبها بدء التفاعل الكيميائي.

المجمع cloaca: الحجرة التي تستقبل فضلات الهضم، وفضلات البول، والبيوض أو الحيوانات المنوية قبل أن تغادر الجسم، يكون في البرمائيات.

(ن)

وفجوات صغيرة تتحول أثناء نموها إلى أنواع عديدة ومختلفة من خلايا النبات.

نوatan قطبيان polar nuclei: نواتان في مركز البوغ الأنثوي الكبير في النباتات الزهرية.

النسيج الأساسي ground tissue: نسيج نباتي يتكون من خلايا برنسيمية وكولنسيمية وإسكلرنسيمية.

النسيج المولد Meristematic tissue: تكون مناطق تنقسم خلاياها بسرعة وهي ذات أنوية كبيرة



مسرد المصطلحات

المعتدل (ليس بالطويل ولا بالقصير).

نباتات النهار المحايد Day-neutral plants: تزهر عندما تتعرض يومياً لكمية كافية من الضوء، بغض النظر عن عدد ساعات الظلام.

النفاذية الاختيارية selective permeability: خاصية للغشاء البلازمي تسمح له بتنظيم مرور المواد من الخلية إليها.

النموذج الفسيفسائي السائل fluid mosaic model: نموذج يوضح أن الغشاء البلازمي وما يحتويه من مكونات تتحرك بشكل ثابت، وينزلق بعضها فوق بعض داخل طبقة الليبيادات المزدوجة.

نيوكليوتيد nucleotide: وحدة فرعية من الحمض النووي، تتكون من سكر بسيط ومجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية.

النبات الهوائي epiphyte: نبات يعيش متعلقاً بنبات آخر أو جسم آخر. وعندما تنمو النباتات الهوائية عند قمم الأشجار تصبح بيئته أخرى مناسبة للحشرات والحيوانات الصغيرة عند قمة أشجار الغابة.

النبات السنوي annual: نبات يكمل دورة حياته في فصل نمو واحد أو أقل.

النباتات المعمرة perennial: نباتات يمكن أن تعيش سنوات عدة.

نباتات النهار القصير Short-day plants: تزهر عندما تتعرض يومياً لعدد من ساعات الظلام أكبر من الفترة الحرجة لها.

نباتات النهار الطويل Long-day plants: تزهر عندما تتعرض يومياً لعدد من ساعات الظلام أقل من الفترة الحرجة لها.

نباتات النهار المتوسط Intermediate-day plants: تزهر عندما تتعرض يومياً لعدد ساعات الظلام

(و)

الوعاء الخشبي vessel element: خلايا نباتية أنبوية طولية الشكل تكون أوعية الخشب توصل الماء والمواد المذابة.

الوحدة الأنبوية الكلوية nephron: وحدة الترشيح في الكلية.

وضع البيض (التبويض) spawn: عملية تطلق فيها إناث الأسماك وذكورها أمشاجها بعضها بالقرب من بعض في الماء.

(هـ)

الهيكل الخلوي cytoskeleton: شبكة داعمة من ألياف البروتينات، حيث توفر مساحات لعمل عضيات الخلية في السيتوبلازم.

الهدب cilium: بروزات صغيرة تشبه الشعيرات لها دور في حركة الخلية.

