



www.hldrwsy.com

موقع دل دروسي هو موقع تعليمي ي العمل على مساعدة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور في تقديم حلول الكتب المدرسية والاختبارات وشرح ال دروس والملخصات والتحاضير وتوزيع المنهج لكل المراحل الدراسية بشكل واضح ومبسط مجاناً بتصفّح وعرض مباشر أو نلاين على موقع دل دروسي

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



الرعاية الصحية

التعليم الثانوي - نظام المسارات

السنة الثالثة

المركز الوطني للمناهج

الرعاية الصحية - المرحلة الثانوية - نظام المسارات -
السنة الثالثة. / المركز الوطني للمناهج . - الرياض ، ١٤٤٦ هـ

٣١٣ ص؛ سم

رقم الإيداع: ١٤٤٦/١٨٧٤٦
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥١٤٠٢٤٩

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترناتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مقدمة

يقاس تقدم الدول وتطورها بمدى قدرتها على الاستثمار في التعليم، ومدى استجابة نظامها التعليمي لمتطلبات العصر ومتغيراته. وحرصاً من وزارة التعليم على ديمومة تطوير أنظمتها التعليمية، واستجابة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، فقد بادرت الوزارة إلى اعتماد نظام "مسارات التعليم الثانوي"، بهدف إحداث تغيير فاعل وشامل في المرحلة الثانوية.

إن نظام مسارات التعليم الثانوي يقدّم أنموذجاً تعليمياً متميّزاً وحديثاً للتعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية يسهم بكفاءة في:

- تعزيز قيم الانتماء لوطننا المملكة العربية السعودية، والولاء لقيادته الرشيدة حفظهم الله، انطلاقاً من عقيدة صافية مستندة إلى التعاليم الإسلامية السمحاء.
- تعزيز قيم المواطنة من خلال التركيز عليها في المواد الدراسية والأنشطة، اتساقاً مع مطالب التنمية المستدامة، والخطط التنموية في المملكة العربية السعودية التي تؤكد على ترسیخ ثائرة القيم والهوية، والقائمة على تعاليم الإسلام الوسطية.
- تأهيل الطلبة بما يتواافق مع التخصصات المستقبلية في الجامعات والكليات أو المهن المطلوبة؛ لضمان اتساق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
- تمكين الطلبة من متابعة التعليم في المسار المفضل لديهم في مراحل مبكرة، وفق ميولهم وقدراتهم.
- تمكين الطلبة من الالتحاق بالتخصصات العلمية والإدارية النوعية المرتبطة بسوق العمل، ووظائف المستقبل.
- دمج الطلبة في بيئه تعليمية ممتعة ومحفزة قائمة على فلسفة بنائية، وممارسات تطبيقية ضمن مناخ تعليمي نشط.
- نقل الطلبة من المرحلة الابتدائية إلى نهاية المرحلة الثانوية عبر رحلة تعليمية متكاملة، وتسهيل عملية انتقالهم إلى مرحلة ما بعد التعليم العام.



- تزويد الطلبة بالمهارات التقنية والشخصية التي تساعدهم على التعامل مع الحياة، والتجاوب مع متطلبات المرحلة.
- توسيع الفرص أمام خريجي الثانويات بتوفير خيارات متنوعة إضافة إلى الجامعة، ومنها: الحصول على شهادات مهنية، والالتحاق بالكليات التطبيقية، والحصول على دبلومات وظيفية.

ويكون نظام المسارات من ستة فصول دراسية تدرس في ثلاثة سنوات، السنة الأولى منها مشتركة يتلقى فيها الطلبة الدروس في مجالات علمية وإنسانية متنوعة، تليها سنتان تخصصيتان، يُسكن الطلبة بها في مسار عام وأربعة مسارات تخصصية تتسمق مع ميولهم وقدراتهم، وهي: المسار الشرعي، مسار إدارة الأعمال، مسار علوم الحاسوب والهندسة، مسار الصحة والحياة، وهو ما يجعل هذا النظام هو الأفضل للطلبة من حيث:

- المواد الدراسية الجديدة التي تتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخطط التنموية، ورؤية المملكة 2030، وتهدف لتنمية مهارات التفكير العليا، وحل المشكلات، والمهارات البحثية.
- برامج المجال الاختياري التي تتسمق مع احتياجات سوق العمل وميول الطلبة، حيث يُمكنهم من الالتحاق بمجال اختياري محدد وفق مصفوفة مهارات وظيفية محددة.
- مقياس الميول الذي يضمن تحقيق كفاءة الطلبة وفاعليتهم، ويساعدهم في تحديد اتجاهاتهم وميولهم، وكشف مكانن القوة لديهم، مما يعزز فرص نجاحهم في المستقبل.
- العمل التطوعي المصمم للطلبة خصيصاً بما يتسمق مع فلسفة النشاط في المدارس، ويعُد أحد متطلبات التخرج؛ مما يساعد على تعزيز القيم الإنسانية، وبناء المجتمع وتنميته وتماسكه.
- التجسير الذي يمكن الطلبة من الانتقال من مسار إلى آخر وفق آليات محددة.
- حصص الإتقان التي يتم من خلالها تطوير المهارات وتحسين المستوى التحصيلي، من خلال تقديم حصص إتقان إثرائية وعلاجية.
- خيارات التعليم المدمج، والتعلم عن بعد، الذي يُبني في نظام المسارات على أساس من المرونة، والملاعة والتفاعل والفعالية.
- مشروع التخرج الذي يساعد الطلبة على دمج الخبرات النظرية مع الممارسات التطبيقية.
- الشهادات المهنية والمهارية التي تمنح للطلبة بعد إنجازهم مهامًّا محددة، واختبارات معينة بالشراكة مع جهات تخصصية.



ويُعد مسار الصحة والحياة أحد المسارات التي يتم تطويرها في المرحلة الثانوية. حيث يُساهم ذلك في ترسيخ معنى العناية بالصحة والوقاية من الأمراض، من خلال تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات والمواصفات الإيجابية التي تعزّز السلوكيات الفردية والاجتماعية السليمة، والاستثمار في مؤهلات المواطنين للتمرس في التخصصات الطبية الحيوية، وإعدادهم لسوق العمل. ويتميز مسار الصحة والحياة بالمحظى المفصل في مجال العلوم والرياضيات، والمقررات المتخصصة في مجال الصحة والحياة، التي تُدرَس من خلال اعتماد تقنيات التدريس التي ترتكز على دور المتعلم في العملية التعليمية.

"الرعاية الصحية" هي أحد الموضوعات الرئيسية في مسار الصحة والحياة، وتهدف إلى:

- تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات المتعلقة بمجال الرعاية الصحية.
- المساهمة في الرحلة التعليمية الشاملة للطلبة وتعزيز تكامل المواد التي درست في المستويات الأكademية الدنيا.
- تعزيز فهم الطلبة للمهارات الالزمة لتقديم الرعاية الصحية وفق الإجراءات الالزمة للأدوار المختلفة الموصوفة.

وبهدف مواكبة التطور في هذا المجال على الصعيد العالمي، يأتي كتاب "الرعاية الصحية" ليزود المعلم بمجموعة متكاملة من المواد التعليمية المتنوعة التي تراعي التمايز الفردي بين الطلبة. كما يوجه الكتاب إلى استخدام برامج وموقع تعليمي توفر للطلبة الفرصة لتوظيف التقنيات الحديثة واعتماد التواصل القائم على الممارسة، ما يساعدهم في تعزيز عمليتى التعليم والتعلم اللتين يتمحور حولهما الكتاب.



يبدأ الجزء الأول من كتاب "الرعاية الصحية" بتعريف الطلبة بالتفكير والسلوك المهني، والتواصل الفعال، وتلبية احتياجات المرضى. بعدها يستكشف التغيرات الناتجة من الشيخوخة، والرعاية التي قد يحتاجها كبار السن. كما يوضح بالتفصيل المهارات والإجراءات المتضمنة في العمل كمساعد تمريض. ويُقدم الجزء الثاني من كتاب "الرعاية الصحية" المهارات وإجراءات العمل كمساعد طبي، ومهارات الأعمال والمحاسبة اللازمتان للعمل في مجال الرعاية الصحية. وينتهي هذا الجزء بفصلٍ يتناول التطوير المهني والتعلم مدى الحياة.

وأخيرًا نرجو من الله - العلي القدير - أن يشير هذا الكتاب اهتمام الطلبة، ويلبي احتياجاتهم، و يجعل تعلمهم أكثر متعة وإفادة.

والله ولي التوفيق



وزارة التعليم

Ministry of Education
مقدمة

2025 - 1447

فهرس

13	تمهيد	4	مقدمة
		10	كيفية استخدام هذا الكتاب

الجزء 1

الفصل 1 الجودة والتواصل في مجال الرعاية الصحية

57.....	5:1 فهم احتياجات المريض الفردية.....	18.....	دراسة حالة.....
59.....	بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	18.....	أهداف التعلم.....
59.....	خلاصة دراسة الحالة	18.....	المصطلحات الرئيسة.....
60.....	ملخص الفصل.....	19	المقدمة.....
60.....	حالة دراسية بسيطة	19.....	1: تحقيق انطلاقة جيدة.....
62.....	أسئلة المراجعة	26.....	2:1 تعلم التفكير كأخصائي رعاية صحية.....
65.....	التفكير الناقد	32.....	3:1 عملية التواصل
65.....	التمرينات	49.....	4:1 التغلب على حواجز الاتصال

الفصل 2 رعاية المسنين

92.....	5:2 تلبية احتياجات المسنين	66.....	دراسة حالة.....
95.....	بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	66.....	أهداف التعلم.....
95.....	خلاصة دراسة الحالة	66.....	المصطلحات الرئيسة.....
96.....	ملخص الفصل.....	67	المقدمة.....
96.....	حالة دراسية بسيطة	68.....	2: خرافات حول الشيخوخة.....
98.....	أسئلة المراجعة	70.....	2:2 التغيرات الجسدية الناتجة عن الشيخوخة.....
100.....	التفكير الناقد	80.....	3: التغيرات النفسية والاجتماعية للشيخوخة
101.....	التمرينات	86.....	4:2 التشوش والتوهان عند كبار السن.....

الفصل 3 مهارات مساعد الممرض

150.....	9:3 توفير العناية للفغرات (الفتحات الجراحية)	102.....	دراسة حالة.....
152.....	10:3 جمع عينات من البراز / البول	102.....	أهداف التعلم.....
155.....	11:3 تقديم الرعاية قبل وبعد العمليات الجراحية	102.....	المصطلحات الرئيسة.....
162.....	12:3 إعطاء الأكسجين	103.....	1:3 قبول المريض ونقله وإجراء خروجه
167.....	بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	107.....	2:3 وضع - تقليل وتحريك المريض
167.....	خلاصة دراسة الحالة	126.....	3:3 ترتيب السرير
168.....	ملخص الفصل.....	130.....	4:3 خدمة العناية بالنظافة الشخصية
168.....	حالة دراسية بسيطة	137.....	5:3 قياس وتسجيل المدخلات والمخرجات
171.....	أسئلة المراجعة	142.....	6:3 تغذية المريض
175.....	التفكير الناقد	144.....	7:3 المساعدة في وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير /المبولة
176.....	التمرينات	147.....	8:3 توفير قسطرة ووحدة تصريف البول

الجزء 2

الفصل 4 مهارات المساعد الطبي

7:4 التعامل مع الأدوية.....	178.....	دراسة حالة.....
بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	178.....	أهداف التعلم.....
229.....		المصطلحات الرئيسية.....
خلاصة دراسة الحالة.....	178.....	1:4 قياس / تسجيل الطول، الوزن، ومحيط الرأس
229.....		2:4 ضبط وضعية المريض.....
ملخص الفصل.....	179.....	3:4 الاستقصاء عن اضطرابات الرؤية.....
230.....		4:4 المساعدة في الفحص الطبي.....
حالة دراسية بسيطة.....	195.....	5:4 المساعدة في الجراحة الصغرى وإزالة الغرز.....
230.....		6:4 تسجيل وتركيب جهاز تخطيط كهربائية القلب.....
أسئلة المراجعة.....	201.....	
233.....		
التفكير الناقد.....	202.....	
236.....		
التمرينات.....	208.....	
237.....		

الفصل 5 مهارات الأعمال والمحاسبة

7:5 نظام حفظ السجلات المالية.....	238.....	دراسة حالة.....
بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	238.....	أهداف التعلم.....
270.....		المصطلحات الرئيسية.....
خلاصة دراسة الحالة.....	238.....	1:5 حفظ الملفات.....
275.....		2:5 استخدام الهاتف.....
ملخص الفصل.....	239.....	3:5 جدولة المواعيد.....
276.....		4:5 تعبئة السجلات والاستثمارات الطبية.....
حالة دراسية بسيطة.....	242.....	5:5 كتابة خطابات العمل.....
276.....		6:5 تعبئة استثمارات التأمين.....
أسئلة المراجعة.....	249.....	
279.....		
التفكير الناقد.....	254.....	
281.....		
التمرينات.....	260.....	
283.....		

الفصل 6 التطور المهني والتعلم مدى الحياة

بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	284.....	دراسة حالة.....
297.....		أهداف التعلم.....
خلاصة دراسة الحالة.....	284.....	المصطلحات الرئيسية.....
297.....		1:6 التطور المهني.....
ملخص الفصل.....	284.....	2:6 أهمية التعلم مدى الحياة.....
298.....		3:6 التعلم الطبيعي المستمر
حالة دراسية بسيطة.....	286.....	4:6 التعلم الموجه للذات
298.....		5:6 السالم الوظيفية.....
أسئلة المراجعة.....	289.....	
300.....		
التفكير الناقد.....	291.....	
302.....		
التمرينات.....	293.....	
303.....		

304..... قائمة المصطلحات



كيفية استخدام هذا الكتاب

أهداف التعلم

أهداف التعلم (مثال)

- بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل، ستكون قادرًا على:
- التفرق بين الخرافات والحقائق للجوانب المختلفة من الشيخوخة.
 - تحديد اثنين على الأقل من التغيرات الجسدية الناجمة عن الشيخوخة في كل جهاز من أجهزة الجسم.
 - عرض طرائق تقديم الرعاية لشخص مُسن يعاني من التغيرات الجسدية المصاحبة للشيخوخة.

راجع هذه الأهداف قبل البدء في قراءة كل فصل لمساعدتك على التركيز في دراستك. وبعد الانتهاء من الفصل، راجع هذه الأهدافلتعرف ما إذا كنت قد فهمت النقاط الرئيسية في كل فصل.

الرموز

تُستخدم الرموز في جميع أنحاء النص لتسلیط الضوء على معلومات محددة.

(أمثلة:)



المصطلحات الرئيسية

تركز المصطلحات الرئيسية على المفردات الهامة التي تحتاج إلى تعلمها. و**تُميّز** هذه المصطلحات باللون الأحمر ضمن النص. ستجد أيضًا معظم هذه المصطلحات مدرجة في قسم قائمة المصطلحات. استخدم هذه القائمة جزءاً من دراستك ومراجعتك للمصطلحات الهامة.

المصطلحات الرئيسية (أمثلة)


التبول الليلي Nocturia	عسر البلع Dysphagia	التهاب الشعب الهوائية Bronchitis	مرض الزهايمير Alzheimer's Disease
هشاشة العظام Osteoporosis	ضيق التنفس Dyspnea	إعتام عدسة العين (ال الساد) Cataracts	تصلب الشرايين Arteriosclerosis
التوجيه للواقع Reality Orientation	انفاس الرئة (النفّاخ) Emphysema	سكتة دماغية وعائية Cerebrovascular Accident	التهاب المفاصل Arthritis
النمش الشيخوخي Senile Lentigines	الرَّزق (المياه الزرقاء) Glaucoma	الهذيان Delirium	التصلب العصيدي Atherosclerosis
الخثرة (الجلطة) Thrombus	السلس البولي Incontinence	الخرف Dementia	الاستقلالية Autonomy

بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل

صناديق "بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل" هي عبارة عن تعليقات موجودة في كل فصول الكتاب. تساعدك هذه التعليقات على التعرف على أنواع عديدة ومختلفة من الأبحاث القائمة اليوم. وإذا نجح البحث، فقد يؤدي إلى اكتشاف علاجات محتملة وطرائق علاجية أفضل في المستقبل لمجموعة واسعة من الأمراض والاضطرابات. تسلط صناديق "بحث اليوم" الضوء أيضاً على حقيقة أن الرعاية الصحية تتغير بصفة مستمرة نتيجة الأفكار والتقنيات الحديثة.

بحث اليوم

الرعاية الصحية في المستقبل



الشكل 44-4 استُخدمت الكلاب للتعرف على سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم وسرطان البروستات بعدلات دقة تقترب من 100%.

وقد أنتج مؤخراً العديد من الأنوف الإلكترونية التي تستخدم حالياً في الدراسات التجريبية، حيث حققت الدراسات الأولية بعض النجاح. كان أحد الأنوف الإلكترونية قادرًا على التمييز بنسبة 80% بين مرضى سرطان الرئة وفئة المدخنين من غير المصابين بالسرطان والأكثر عرضة للإصابة به. واستطاع نموذج آخر التعرف على سرطان البروستات من خلال رائحة البول في 78% من الحالات. كما تعرّف أنف إلكتروني ثالث، عبر فحصه لغاز البراز، على 73-85% من مرضى سرطان القولون والمستقيم. بمجرد تحديد المركبات المرتبطة بالسرطان، قد يكون بالإمكان تطوير الأنف الإلكتروني عبر زرع مستشعر به يسمح باكتشاف أنواع السرطانات عبر التعرف على مركبات عينها. وعليه، من غير المستبعد أن يؤدي اختبار بسيط غير باضع باستخدام رواج من النفس، والبول، والبراز، وحتى الدم إلى الكشف المبكر عن السرطان. وبإمكان هذا البحث إنقاذ العديد من الأرواح.

الأنف يميّز السرطان؟

رغم التطور في علاج السرطان وإنقاذ العديد من الأرواح، إلا أنه من العسير جدًا كشف بعض أنواع السرطانات في مرحلة مبكرة عندما يكون العلاج ممكناً. ومن هذه السرطانات سرطان المعدة والعظام والكلوي والبنكرياس والمبيض.

يبحث العلماء في جميع أنحاء العالم إمكانية استخدام "اختبار شم" للسرطان باستخدام الكلاب. في البداية، درب باحثون في كاليفورنيا خمسة كلاب مختلفة على شم رائحة سرطان الثدي والرئة في أنفاس المريض. ومنذ ذلك الوقت، استخدمت الكلاب للتعرف على سرطان الثدي، وسرطان الرئة، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان البروستات بدقة تقترب من 100% (الشكل 44-4). ويعتقد الباحثون أن الكلاب قادرة على شم السرطانات عن طريق استشعار كميات قليلة من المركبات العضوية المتطايرة، والتي تمثل منتجات نهائية لعملية الاستقلاب، وتقرز في النفس والبول والبراز. ويعزل بعض الباحثين مادة البولي أمينات، وهي جزيئات مرتبطة بنمو الخلايا وتمايزها، حيث إن السرطان يرفع مستويات البولي أمين التي لها رائحة بيضاء. وتشير التقديرات أن حاسة الشم لدى الكلب قد تكون أقوى بـ 100000 إلى 100000 مرة من حاسة الشم لدى الإنسان، لذا يمكن للكلاب اكتشاف أقل الكميات من المركبات العضوية المتطايرة.

يعلم العديد من الباحثين حالياً على تحديد وعزل المركبات الكيميائية المرتبطة بأنواع مختلفة من السرطانات، ويمثل ذلك تحدياً كبيراً بسبب تشارك عدة مواد كيميائية مختلفة في تكون رائحة السرطان في معظم الأحيان، بل من المحتمل أن يكون لكل نوع من أنواع السرطان خليطاً فريداً من المركبات الكيميائية. وعلى محور آخر، يحاول الباحثون تطوير أنوف صناعية قادرة على كشف مركبات كيميائية معينة.

أسئلة مراجعة

تعزز التمرينات فهمك لمحتوى الفصل. لذلك حاول بعد الانتهاء من قراءة الفصل أن تجib على التمرينات في نهايته. فإذا وجدت نفسك غير قادر على الإجابة عن الأسئلة، عُد وراجع الفصل مرة أخرى.

أسئلة المراجعة (أمثلة)

1. ما أهميةأخذ قياسات الطول والوزن؟

2. اذكر ما لا يقل عن ست وضعيات مختلفة يمكن استخدامها في الفحوصات أو العلاجات أو كليهما، ثم اذكر سببًا واحدًا لاستخدام كلّ وضعية.

3. عرف الخسر ومد البصر، وصف الفرق بين الحالتين.

4. ما مكان الملاحظة في الفحص الطبي العام؟

5. عرف الإصغاء.

6. ما الفرق بين المُرقي وحامل الإبرة؟ ما وظيفة كلّ أداة منها؟

التفكير الناقد

تمتحنك أسئلة التفكير الناقد القدرة على البناء على المحتوى الذي تعلنته خلال الفصل. سوف تزداد معرفتك من خلال التوسيع في الموضوعات التكميلية.

التفكير الناقد (أمثلة)

1. استخدم مصادر موثوقة على الإنترنت للعثور على دواء سيليوكسيب Celecoxib، واتكتب قائمة تشمل التأثير الأساسي لهذا الدواء، والجرعة المقترنة، وطريقة الإعطاء، والتحذيرات / الآثار الجانبية، ثم أنشئ نشرة معلومات للمريض عن هذا الدواء.
2. لماذا يجب الأخذ باحتياطات السلامة عند إعطاء أي دواء؟ ما المخاطر المحتملة عند إعطاء الأدوية؟

التمرينات

تمتحنك الأنشطة فرصة للعمل مع زملائك في الفصل. حيث ستتاح لك الفرصة لتطبيق ما تعلنته بطريقة إبداعية وفي جو من التحدي عبر الانخراط في سيناريوهات طبية واقعية.

التمرينات (أمثلة)

1. أ. في مجموعة مكونة من أربعة أفراد، اكتب نصًا للسيناريو التالي: أحضرت منها طفلتها لعيادة الطبيب لإجراء فحص طبي في أسبوعها السادس. كما أحضرت طفلتها الآخرين، يوسف ومحمد، لأنهما يشكوان من صداع وحمى. تناول سارة، وهي المساعدة الطبية في العيادة، على العائلة وتسجل حضورهم. تحصل على جميع القياسات وشكاويمهم الرئيسية وتتوّنها. ينظر الطبيب في أذني الصبيان ولمن، ويأمر بتحديث سجل التطعيمات للجميع وبصرف مضادات حيوية ليوسف ومحمد.

ب. هي نفس المجموعة، العب الأدوار المذكورة في النص. عدّل السيناريو يجعل الأولاد مشاكين وغير متعاونين ولا يقرون بثبات لتلقي الحقنة.
2. بالعمل مع طالب آخر، استخدم دمية CPR (الإنعاش القلبي الرئوي) لإظهار المواقع الصحيحة للمتجهات الاثني عشر لخطيط القلب الكهربائي، أو ارسم المعلومات على قطعة من الورق.



تمهيد

التغيرات في الرعاية الصحية سريعة ومستمرة، ولذا تسند مسؤوليات إضافية للممارسين الصحيين على جميع المستويات. فالمهارة، والمرؤنة المرتبطان بالكفاءة هي متطلبات ضرورية للنجاح في مكان العمل. ولكي يصبح مقدمي الرعاية الصحية أكفاء وناجحين في هذه البيئة المتغيرة بشكل دائم، يجب أن يكونوا قادرين على التفكير بأنفسهم، والتعلم، والتكيف بقدر الضرورة للاستجابة لمتطلبات العمل الحالي والمستقبل. في الفصل الأول، يُقدم للطلبة مفهوم التفكير كأخصائي رعاية صحية (وأيضاً يسمى التفكير الناقد). شُرحت المهارات الخاصة التي تُشكل التفكير العملي باللغة المستخدمة بشكل يومي. سيتعلم الطلبة خطوة بخطوة نموذج حل المشكلات لمساعدتهم في معايشة مواقف جديدة.

الفصل الثاني يلقي الضوء على رعاية المسنين، حيث تشهد معظم دول العالم الآن "طفرةشيخوخة". لذلك تعد صحة ورعاية كبار السن الآخذ عددهم في الازدياد من أكبر التحديات التي تواجه جميع دول العالم نتيجة لشيخوخة السكان والتغير في توزيع الفئات العمرية.

تقدم متوسط العمر المتوقع بشكل ملفت منذ بدء مبادرات وزارة الصحة، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن إلى 18 % أو أعلى بحلول عام 2050. وطورت وزارة الصحة السعودية استراتيجية وطنية لصحة المسنين وتلبية احتياجاتهم الصحية بدنياً ونفسياً وعقلياً واجتماعياً. اليوم، يمكن لمعظم الأفراد أن يتوقعوا العيش حتى بلوغ سن السبعينيات، ويتمتع العديد من الأفراد بحياة صحية وسعيدة في أعمار 80 و 90 عاماً. وتستخدم هذه الفئة العمرية خدمات الرعاية الصحية بشكل متكرر، لذلك من الضروري أن يفهم مقدم الرعاية الصحية احتياجات الخاصة للكبار السن.

الفصل الثالث يستعرض مهارات مساعد الممرض، حيث يعمل مساعدو التمريض، الذين يطلق عليهم أيضًا معاونو التمريض، وفتيو الرعاية المرضى، ومساعدو رعاية المرضى، والممرضون، تحت إشراف ممرضين و ممرضات مؤهلين تأهيلاً كاملاً. ويحصل العديد من المساعدين على التدريب من خلال برامج تعليم العلوم الصحية. وفي العديد من البلدان يجب على المساعدين الذين يعملون في مراقبة الرعاية طويلة الأجل أو الرعاية الصحية المنزلية إتمام الحد الأدنى من الساعات في برنامج التدريب الإلزامي واجتياز اختبار مكتوب أو اختبار كفاءة للحصول على شهادة أو قيد. وتشمل المتطلبات التعليمية الإضافية التعليم المستمر والتقييم الدوري للأداء وإعادة التدريب إذا لم يُوظف المساعد لمدة عامين أو أكثر.

- يقدم مساعدو المسنين الرعاية للمريض في بيئات صحية مثل مراقبة الرعاية الممتدة ودور الرعاية ومرافق التقاعد أو مراكز المساعدة على المعيشة ووكالات الرعاية النهارية للبالغين.
- يقوم مساعدو الرعاية الصحية المنزلية بالعديد من واجبات مساعدي التمريض، ولكنهم يقدمون الرعاية في منزل المريض، لفترة طويلة غالباً. تشمل أمثلة المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية منزلية: المرضى الذين خرجموا حديثاً من المستشفى أو من مرافق الرعاية طويلة الأجل، والمرضى ذوي الإعاقة، والمرضى المسنين الذين يحتاجون للمساعدة، والمرضى الذين يتلقون الرعاية التلطيفية. بالإضافة إلى أداء العديد من واجبات الرعاية الشخصية لمساعد التمريض، فإن مساعدي الرعاية الصحية المنزلية يمكن أن يتسوقوا لشراء الطعام وإعداد الوجبات والحفاظ على البيئة المنزلية وتنظيفها وغسل الملابس ومراقبة المرضى في رحلات التسوق أو المواعيد الطبية.
- تختلف واجبات مساعدي التمريض حسب المنشأة التي يعملون بها. بالإضافة إلى المعارف والمهارات الموضحة في الفصل الثالث، فإنه يجب على مساعدي التمريض أيضًا تعلم وإتقان مهارات أخرى مثل الظهور بمظهر حسن وسلوك مهني لبق، والتواصل الفعال، وتعلم المصطلحات الطبية.

يعمل المساعدون الطبيون تحت إشراف الأطباء، وهم أعضاء مهمون في فريق الرعاية الصحية. تتعدد المتطلبات التعليمية عموماً، لكن يمكن أن تشمل التدريب أثناء العمل وبرامج تدريس العلوم الصحية ودرجة الدبلوم. تختلف واجبات المساعدين الطبيين حسب حجم الممارسة ونوعها، وبحسب المتطلبات القانونية للدولة التي يعملون فيها. غالباً ما تُصنف الواجبات على أنها إدارية أو سريرية. وقد تشمل الواجبات الإدارية أو واجبات مكتب الاستقبال مهاماً مثل الرد على الهواتف، واستقبال المرضى، وجدولة المواعيد، وحفظ السجلات والدفاتر المالية، والتعامل مع المراسلات. وعادة ما تُنفذ هذه الواجبات من قبل مساعدين إداريين طبيين قادرين على نيل شهادة. وقد تشمل الواجبات السريرية أو "مكتب المساندة"، تسجيل العلامات الحيوية، وتجهيز المرضى والمساعدة في الفحص والعلاجات، وإجراء الاختبارات المختبرية الأساسية. ويقوم بعض المساعدين الطبيين بأداء واجبات إدارية وسريرية معًا؛ أما الآخرون فمختصون في العمل الإداري أو السريري. وتمثل الإجراءات التي تمت مناقشتها في الفصل الرابع الواجبات السريرية. بالإضافة إلى المعرفة والمهارات في هذا الفصل، يجب على المساعدين الطبيين أيضًا تعلم وإتقان بعض المهارات مثل:



- إبداء مظهر وسلوك مهنيين.
- الحصول على المعرفة الالزمة فيما يتعلق بأنظمة تقديم الرعاية الصحية ، والهيكل التنظيمي ، والعمل الجماعي.
- تلبية جميع المسؤوليات القانونية.
- التواصل بفعالية.
- فهم التشريح البشري وعلم وظائف الأعضاء والفيزيولوجيا المرضية.
- تعلم المصطلحات الطبية.
- مراقبة جميع احتياطات السلامة.
- تطبيق جميع مبادئ السيطرة على العدوى.
- أخذ وتسجيل العلامات الحيوية.
- إجراء فحوصات مخبرية بسيطة.
- تقديم الإسعافات الأولية والإعاش القلبي الرئوي.
- الترويج للتعذية السليمة ونمط الحياة الصحي بهدف الحفاظ على الصحة.

بينما تناولت الواجبات الإدارية في الفصل الخامس من هذا الكتاب:

- استخدام مهارات الحاسوب والتكنولوجيا.
- أداء الواجبات الإدارية مثل الرد على المكالمات الهاتفية، وجدولة المواعيد، وإعداد المراسلات، وإكمال نماذج لتأمين، والحفظ على الحسابات، وتسجيل التاريخ الطبي، والحفظ على سجلات المرضى.
- طلب ومتابعة توفر الإمدادات والمواد.

أما الفصل السادس فهو موجه لكل طلبة الرعاية الصحية أيًّا كان تخصصهم. وعادة ما يُطلب من أخصائي الرعاية الصحية إجراء التطوير المهني المستمركي يحافظوا على رخصتهم المهنية. والبقاء على اطلاع على المستجدات في المجال الصحي أمر هام لكل العاملين في المجال، وذلك بسبب التطور السريع للأدوية والعلاجات ، وزيادة الاستخدام للتكنولوجيا.

سيساعد الفصل الطلبة على فهم أهمية التطوير المهني لـ:

- إثبات قدرتهم على التطور.
- تحديث مؤهلاتهم العلمية.
- مواكبة التطورات العديدة في مجالهم.
- الحفاظ على مستوى عالي من المهارة.
- الحفاظ على المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لتقديم خدمة مهنية لمرضاهם وتعزيزها.





وزارة التعليم

Ministry of Education
2025 - 1447

الجزء 1

الجودة والتواصل في مجال الرعاية الصحية

الفصل 1

رعاية المسنّين

الفصل 2

مهارات مساعد التمريض

الفصل 3



وزارة التعليم

Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل

1

رابط المدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

الجودة والتواصل في مجال الرعاية الصحية

دراسة حالة

أنت تعمل مساعداً طبياً في عيادة أخصائي أورام (أخصائي أمراض السرطان). راشمي، امرأة هندية تبلغ من العمر 56 عاماً انتقلت إلى المملكة العربية السعودية مع زوجها الذي يعمل في مجال النفط، أنت إلى العيادة برفقة ابنته البالغة من العمر 20 عاماً. تكلم راشمي القليل جداً من العربية، والقليل فقط من الإنجليزية، أمّا ابنته فتحدث اللفتين. وجاءت هذه الزيارة بسبب إصرار الابنة بعدما أخبرتها والدتها بوجود كتلة صغيرة في ثديها. راشمي قلقة جداً بشأن الزيارة. في نهاية الفصل، ستسأل عن كيفية التعامل مع هذه المريضة، بما في ذلك مراجعة احتياجاتها الفردية.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل، ستكون قادراً على:

- تعداد أسباب عدم اتباع المرضى للنصائح الطبية.
- تحديد وتوضيح الخطوات المست في عملية التواصل.
- تعداد الأهداف التي يجب مراعاتها في كل تفاعل مع المريض.
- ذكر وشرح متى نستخدم الأنواع الأربع من الأسئلة.
- شرح معنى وأهمية التواصل غير اللفظي.
- تحديد أمثلة على لغة الجسد الإيجابية.
- تعداد العوامل البيئية المؤثرة على عملية التواصل.
- تحديد ووصف الصفات الجوهرية الأساسية التي يتمتع بها أخصائيو الرعاية الصحية الفعالون.
- وضع قائمة مكونة من ستة أمثلة لكيفية تطبيق الطلاب الصفات الجوهرية أثناء وجودهم في المدرسة.
- وصف عملية حل المشكلات المكونة من خمس خطوات.
- تعداد العوامل الشخصية التي يجب مراعاتها عند اختيار مهنة الرعاية الصحية.
- تبيان أهمية التواصل الفعال في ميدان الرعاية الصحية.
- شرح كيف يستخدم أخصائيو الرعاية الصحية التواصل لمساعدة المرضى.

المصطلحات الرئيسية

العلامات Signs	عملية حل المشكلات Problem-Solving Process	التغذية الراجعة Feedback	الاستماع الفعال Active Listening
البيانات الذاتية Subjective Data	المتلقى Receiver	النزاهة Integrity	الحبسة الكلامية Aphasia
الأعراض Symptoms	مجال الممارسة Scope of Practice	ال التواصل غير اللفظي Nonverbal Communication	التقييم Assessment
ال التواصل العلاجي Therapeutic Communication	المرسل Sender	بيانات موضوعية Objective Data	لغة الجسد Body Language

تعتبر الرعاية الصحية مجالاً ممتعاً ومتناهياً. يهدف هذا النص إلى مساعدتك على اتخاذ قرار مهني مستثير واكتساب المعرفة الأساسية لمواصلة الدراسات الالازمة للمجال الذي اخترتته. يمكن أن تكون الوظائف في مجال الرعاية الصحية مصدرًا لرضا كبير، حيث يقدم أخصائيو الرعاية الصحية خدمات قيمة تمثل مساهمة كبيرة في المجتمع، وكل يوم، يحدث عملهم فرقاً في نوعية حياة الأشخاص الذين يخدمونهم. فسواءً اخترت العمل مباشرة مع المرضى أو تقديم خدمات الدعم، كن واثقاً أن ما تفعله مهمٌ ومفيدٌ للآخرين.

بالإضافة إلى منح الرضا، فإن العمل في مجال الرعاية الصحية يفرض الكثير من المطالب على عاتق من يسعون وراءه، ويجب أن يؤخذ على محمل الجد لأنه يؤثر على صحة الآخرين وسلامة تكوينهم، لذا ينبغي أداء جميع المهام بأمانة وضمير. فلا يجب اعتبار أي تفصيل أمراً مسلماً به أو تنفيذه آلياً، ولا حتى المهام الروتينية. ينبغي أن يكون أخصائيو الرعاية الصحية على استعداد لتكريس اهتمامهم الكامل لكل ما يقولونه ويفعلونه، كما يجب ملاحظة المشكلات المحتملة ومعالجتها قبل أن تصبح حرجة. فيمكن أن تكون عواقب الأخطاء وخيمة. على سبيل المثال، أن تكون وصفة الدواء غير صحيحة أو أن ينفذ الإجراء الخاطئ. فالعمل يمكن أن يكون مجهاً، وبحسب المهنة المختارة وهي الرعاية الصحية، فإن العمل سي-dom لساعات طويلة يُتعامل فيها مع حالات وفاة، وتقتضي العمل بسرعة وتحت الضغط.

1:1 تحقيق انطلاقه جيدة

Getting Off to a Good Start

صممت البرامج التعليمية في مجال الرعاية الصحية لتحضير الطلاب للنجاح في بيئة العمل. ويكرس المعلمون أنفسهم لمساعدة الطلاب الذين يبذلون الجهد اللازم للتخرج والتوظيف. لذا استفد من فرص التعلم المتاحة في مدرستك وابذل قصارى جهدك لتصبح أخصائياً مؤهلاً وكفياً في مجال الرعاية الصحية.

الصفات الجوهرية الأساسية لأخصائيي الرعاية الصحية

Essential Core Qualities of Health Care Professionals

بصفتك طالباً، لديك فرص عديدة في المدرسة لتدرب بممارسة عادات مكان العمل الجيدة. اعمل بجد الآن لتطوير المهارات التي ستجعل منك موظفاً عالي القيمة، وفي نفس الوقت، يمكنك اكتساب عادات تسهم في النجاح الأكاديمي. يمكن تطبيق الصفات الجوهرية لأخصائيي الرعاية الصحية، ليكونوا فعالين وناجحين، في الفصل الدراسي، والمخبر، وفي التدريب العملي والإكلينيكي (التدريب الخارجي / التدريب الداخلي / العمل الميداني).

ابدأ بتعلّمها الآن أثناء تواجدك في المدرسة لتطويرها وتطبيقها.

- **كن رحيمًا:** اهتم بالآخرين. طبّق معرفتك ومهاراتك لتقليل معاناة الآخرين وتحسين صحتهم وحالتهم، وكن مستعدًا لوضع احتياجات المرضى قبل احتياجاتك عند الضرورة. احترم جميع الناس وساعدهم بصرف النظر عن عرقهم، أو جنسيتهم، أو حالتهم الاقتصادية، أو دينهم، أو أعمارهم، أو خيارهم في نمط الحياة (الشكل "1-1").

- "ابدأ الآن": أظهر الاحترام والتقدير للمدرسين وزملاء الدراسة. كن لطيفاً مع الجميع، بغض النظر عن خلفيّتهم، وامتنع عن التحدث أثناء المحاضرات. حضّر دروسك حتى لا يضطر المعلم إلى اقتطاع بعض الوقت للإجابة عن أسئلة متعلقة بمواد دراسية مرتّضى ضمن واجبات الدراسة والقراءة. تدرب على الباقة والدمة في الفصل وفي جميع أنحاء المدرسة، وتطوّع لمساعدة الآخرين قدر الإمكان أو حسب الحاجة.

- **تحلّ بالنزاهة Integrity:** كن صادقاً في جميع الأوقات. احترم خصوصية الآخرين وكن مخلصاً لصاحب العمل، وتحمّل مسؤولية أفعالك.

- "ابدأ الآن": أنجز عملك بنفسك. لا تقم أبداً بنسخ الواجبات المنزلية للآخرين أو الغش في الامتحانات. قل الحقيقة دوماً، ولا تشارك أي شيء أخبرت به سرّاً وأؤتمنت عليه.

- **كن جديراً بالثقة:** تواجد في العمل في الوقت المحدد. تابع جميع المهام الموكلة إليك وأتمها، وأنجزها بدقة وعلى أكمل وجه، دون الحاجة إلى إشراف وتذكيرات مستمرة.



الشكل "1-1" يتحلى أخصائيو الرعاية الصحية الناجحون بالرحمة، ويظهرون الاحترام والتقدير لمرضائهم.

- "ابداً الآن": كن في المدرسة في الوقت المحدد واحضر جميع الفصول الدراسية. أكمل المهام في الوقت المحدد، واسعَ جاهدًا لإنجاز جميع الوظائف المكتوبة والعملية بدقة. التزم بكلّ ما كُلفت أو تطوّعت بالقيام به.

● اعمل جيداً مع الآخرين: احرص على فهم مشاعر واحتياجات الآخرين. كن مهذبًا ومراعيًا، وتدرب على مهارات التواصل الجيد. كن عضواً جيداً في الفريق عبر التعاون والمساهمة في تحقيق أهداف المجموعة. تلقّ توجيهات المشرف عن طيب خاطر.

- "ابداً الآن": كن على دراية باحتياجات المعلمين وزملاء الدراسة، والمشاركة في الصف، ونفذ الجزء المخصص بك عند العمل على مهام المجموعة.

● كن مرتناً: استعد للتكيف مع الظروف المتغيرة، وافعل المطلوب لتنفيذ المهام. اكتسب المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات في التكنولوجيا والتغييرات في أسلوب تقديم الرعاية الصحية.

- "ابداً الآن": تقبّل الاختلافات التعليمية، والتغييرات في جداول الفصل، وغيرها من الأحداث غير المتوقعة، وكن مستعداً للتعاون حسب الحاجة.

● كن مُستعداً لاكتساب العلم: حدث مهاراتك على الدوام، واطرح الأسئلة، واحضر ورش العمل، واقرأ المنشورات المهنية، واستخدم الإنترن特، واستمر في اكتساب مهارات جديدة.

- "ابداً الآن": كن على استعدادٍ للتعلم، وخذ دراستك على محمل الجد، واجعل المدرسة أولويتك. خصص وقتاً كافياً للدراسة طوال مدة الفصل الدراسي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

التعلم لدرجة الإتقان

Learning for Mastery

يجب على أخصائي الرعاية الصحية معرفة ما يفعلونه، حيث تسفر أخطاء العمل عن عواقب وخيمة. لذا من الضرورة أن ييدي الطالب التزاماً كبيراً بتعلم المواد المعطاة في الفصول الدراسية. وللتعلم معنى أشمل من مجرد حفظ المعلومات، يشمل السعي لفهمها وتذكرها بطريقة تسمح بتطبيقاتها في مواقف جديدة. يمثل هذا الفهم والإدراك أساساً يمكّنك من التفكير كأخصائي رعاية صحية، وهذا ما سيناقش لاحقاً في هذا الفصل.

يعتقد الطلاب الذين لا يبذلون سوى الحد الأدنى من الجهد اللازم لاجتياز الاختبارات أنهم يتعلمون، لكن الواقع مختلف، فمن المستبعد اكتسابهم المعرفة طويلة الأمد الالزمة لتأدية مهام العمل. أمّا الطلاب الذين يفهمون المعلومات ويطرّحون الأسئلة ويفتحون عن التفسيرات أثناء دراستهم لموضوع معين، يزيدون من فرصهم





الشكل "2-1" إحدى الطرق الفعالة للطلاب للاقتناء
المواد هي طرح الأسئلة على أنفسهم وعلى الآخرين



في أن يصبحوا أخصائيين أكفاء في مجال الرعاية الصحية، قادرين على التفكير بأنفسهم وابتكار الحلول في مواجهة التحديات الجديدة فور ظهورها.

إحدى الطرق الفعالة التي يمكن للطلاب اتباعها بفرض إتقان المواد الدراسية، هي طرح أسئلة على أنفسهم حول ما يتعلمونه أو يفعلونه. تؤدي الأسئلة في تجميع المعلومات، وتوسيع منظورك لموضوع ما، وتشيّط العقل، وتساعد في ضمان عدم استناد الإجراءات إلى افتراضات خاطئة أو معلومات غير كافية. يمكن طرح الأسئلة في عقلك (على النفس) أو على الآخرين (الشكل "1-2"). فكر: ماذا؟ متى؟ أين؟ لماذا؟ من؟ كيف؟ توضح الأمثلة التالية كيف يمكن استخدام الأسئلة لتعزيز التعلم:

- عند اكتساب معلومات جديدة، أسأل "لَمْ وَلَمَنْ" هي مهمة. "ما علاقتها؟" بالمعلومات التي تعرفها مسبقاً؟

- عند التعامل مع المرضى، أسأل "ما الذي" يعمل في حالتهم بشكل أفضل و"متى" ينبغي القيام به.

- عند مشاركة معلومات مهمة مع زميل دراسة أو عمل، أسأل نفسك "ما الأمور" التي تعرفها عنه، والتي تساعده على التواصل معه بفعالية.

- عند العمل في منشأة للرعاية الصحية، فكر "كيف" يمكن تغيير عادات عملك لتحسين الكفاءة العامة.

يعتقد بعض الطلاب أن دور معلميهم محصور في تلقين المعلومات بدلاً من السؤال عنها. لكن في الحقيقة، المدرسوون الذين يطرحون باستمرار أسئلة تتطلب من الطلاب شرح إجاباتهم وأفعالهم يشجعونهم بذلك على التعلم والتفكير مثل أخصائيي الرعاية الصحية. حتى أن بعض المدرسين يجيبون عن سؤال الطالب بسؤال آخر، وهدفهم من ذلك تعليم الطلاب التفكير بأنفسهم وبناء الثقة في قدرتهم على إيجاد الإجابة. يستخدم المدرسوون أيضاً الأسئلة لتجهيزه الطلاب إلى جمع معلومات معروفة ودمجها ببعض، وإنشاء الروابط بينها، وتطبيق ما يعرفونه على مواقف جديدة. على سبيل المثال، افترض أن طالباً في مجال المعالجة النفسية يتبع مريضاً في المستشفى. درس سابقاً المرض الذي يشكو منه المريض، ويعرف كيفية إجراء العلاجات النفسية الموصوفة. عبر طرح الأسئلة، يوجه المدرس هذا الطالب لشرح سبب وصف هذه العلاجات دون غيرها. وبذلك يُشجّعُ الطالب على النظر في طبيعة المرض وخصائص العلاجات والأدوية، والتوصل إلى استنتاجات حول العلاقات بين هذه العوامل.



تحقيق الاستفادة القصوى من دراستك

Getting the Most from Your Studies

إذا افترضى الأمر، فخصص بعض الوقت الآن للعمل على تحسين مهاراتك الدراسية وهي: تدوين الملاحظات، القراءة، والكتابة، والاستعداد للاختبارات. يمكن لهذه المهارات مساعدتك في الحصول على وظيفة النجاح فيها. على سبيل المثال، يتطلب كتابة التاريخ المرضي للمريض مهارات جيدة في تدوين الملاحظات، ويتطلب فهم التعليمات الخاصة بقطعة من المعدات القدرة على قراءة وفهم المواد التقنية، ويتطلب إعداد خطاب للاستفسار عن فرص العمل المتاحة مهارات كتابة جيدة. وإذا فكرت مليئاً في الأمر، تجد أن كل أفعالك أثناء التعامل مع مريض هي اختبار، حيث يجب عليك القيام بشيء ما بشكل صحيح "لتنجح".

قد تساعدك الاقتراحات التالية:

- **دون ملاحظات جيدة:** ركز على كتابة النقاط المهمة بدلاً من كل ما يقوله المعلم. نظم الملاحظات عبر الكتابة على شكل مخطط. اترك مساحة في الصفحات لإضافة المزيد من الملاحظات والأسئلة أثناء مراجعتك لما دونته بعد انتهاء الحصة الدراسية (الشكل "3-1").
- **اقرأ من أجل الفهم والتعلم:** عند مطالعة الكتب المدرسية أو المعلومات الموجودة على موقع الويب، ابدأ بالتصفح السريع للفصل أو القسم، ثم ركز انتباحك عبر إنشاء أسئلة القراءة بحثاً عن إجاباتها. وجه لنفسك هذه الأسئلة وحاول الإجابة عليها دون النظر إلى النص. ثبت أن هذه واحدة من أكثر طرائق التعلم فعالية.
- **اكتب بوضوح ودقة:** استخدم التنظيم المنطقي وانتبه إلى التفاصيل، بما في ذلك الإملاء، والنحو، والصيغة. تحقق من عدم وجود الأخطاء في كتابتك.
- **استعد للاختبارات:** خطط للدراسة كل يوم، ولو لفترة قصيرة. إن دراسة المواد على مدى طويل أكثر فاعلية من حشوها في اللحظة الأخيرة.

الاسم	التاريخ	صفحة
ملاحظات		
الدراسة		
والأسئلة		
للختبار الذاتي		
ملخص		

الشكل "3-1" إعداد الصفحة من أجل نظام تدوين فعال.

التطوع Volunteering

إذا كان لديك الوقت، فإن التطوع وسيلة ممتازة للانطلاق في مضمون الحياة المهنية. لا يقتصر الموضوع على اكتساب المهارات فقط، مثل العمل مع الآخرين، بل تتعلم أيضاً المزيد عن مجال الرعاية الصحية وتكتسب معلومات بإمكانها مساعدتك على اختيار المجال المناسب لك. ورغم أن العمل في بيئة الرعاية الصحية هو الخيار الأمثل، يوفر التطوع في المنظمات غير الربحية خبرة جيدة.

لدى بعض البرامج التعليمية شرط قبول وهو أن يكون لديك بعض الخبرة في المجال الذي تنوی دخوله. عند البحث عن وظيفة، يمكنك إدراج المهارات التي تعلمتها أثناء العمل التطوعي في سيرتك الذاتية. سيُظهر ذلك لأصحاب العمل المحتملين أنك تمتلك روح المبادرة ورغبة حقيقية بمساعدة الآخرين. تشمل المنصة الوطنية للعمل التطوعي (<https://nvg.gov.sa>) عدة فرص تطوع، ويمكن للطلبة استخدامها لإضافة ساعات تطوعهم إلى سجلاتهم.

المؤسسات المهنية Professional Organizations

يمكنك الانضمام إلى مؤسسة مهنية أثناء دراستك فرضاً لخلق علاقات، وامكانية لتعلم كيف تكون ناجحاً في مجالك المختار، وإتاحة الوصول إلى ورش عمل وأنشطة تعلم أخرى. وكما هو الحال مع التطوع، فإن وضع عضوية مهنية في سيرتك الذاتية يظهر امتلاكك لروح المبادرة ولرغبة الكافية.

اخبر معلوماتك

1. كيف يمكنك إثبات إجادتك للعمل مع الآخرين؟
2. كيف يجب عليك تدوين الملاحظات؟



من المشكلات الراهنة الشائعة في مجال الرعاية الصحية أن بعض الخريجين يقضون أشهرًا، أو سنوات في تكديس المعلومات، لكنهم غير قادرين على تطبيقها عندما يحتاجونها في ميدان العمل. ويعتبر ضعف مهارات التفكير الفعال سببًا رئيسًا لهذا الموقف المؤسف. وبصرف النظر عن مجال الرعاية الصحية أو المستوى المهني الذي يختاره الطلبة، فمن الضرورة أن يتعلموا التفكير كأخصائيي الرعاية الصحية. ينطوي هذا النوع من التفكير على العديد من المهارات، وفي معرض حديثنا، له المعاني التالية:

- التعلم من أجل الفهم، وليس مجرد حفظ المعلومات.
- تطبيق المواد المُتعلمة على مواقف جديدة.
- وجود نهج منظم لحل المشكلات.
- اتخاذ القرارات بناءً على حقائق، وليس على ردود فعل عاطفية أو تحيزات.
- الاستناد إلى الحقائق وخلق العلاقات بينها.
- تحديد مصادر المعلومات الموثوقة لاتخاذ القرارات.
- اتخاذ القرارات انطلاقاً من أسس ومبادئ أخلاقية.
- ممارسة مهارات التواصل الجيد عند جمع المعلومات وتوزيعها.
- الفهم الدقيق لما يسمح لك القانونُ ممارسته في مهنتك، وهذا يعرف باسم "مجال الممارسة" *Scope of Practice*.

يمكنك تطبيق مهارة التفكير البارع على الصعيد الشخصي والمهني في حياتك. يمكن وصف تفكير أخصائيي الرعاية الصحية على أنه "عملية مدروسة". هذا يعني عدم تقبل المواقف ببساطة دون المشاهدة، والنظر في معنى ما يُشاهد ووضعه بالحسبان. يمتلك المفكرون الفعالون وعيًا وإدراكًا للأفكار التي تدور في خلدهم ولماذا، وكيف يتصرفون، أو يتخذون القرارات.

لا يمكن القيام بأي شيء في مجال الرعاية الصحية بشكل روتيني ودون تفكير. تحدث الأفعال الطائشة نتيجة عدم الانتباه، أو بسبب اتخاذ قرارات مبنية على أفكار قُبّلت كما هي "لأنها كذلك". تتسرّب هذه الأفكار من أفراد الأسرة، والأصدقاء، والتجارب الشخصية، والتلفاز، والأفلام، والمجلات. لذا على أخصائيي الرعاية الصحية تعلم التفكير بالاعتماد على أنفسهم، وجمع الحقائق، واستخدام ملاحظاتهم الخاصة لاتخاذ القرارات.




عملية حلّ المشكلات

The Problem-Solving Process

من التطبيقات المهمة لمهارات التفكير حلّ المشكلات واتخاذ القرار، وهما عاملان كفاءة مهمان للغاية لأخصائي الرعاية الصحية. هناك مجموعة متنوعة من أساليب حلّ المشكلات واتخاذ القرار، وأحدّها هو **عملية حلّ المشكلات** المكونة من خمس خطوات لمساعدة الطلاب وأخصائيي الرعاية الصحية على مقاربة المشكلات وحلّها بطريقة منتظمة (الشكل "4-1"):

1. حدد المشكلة.
2. اجمع المعلومات.
3. أوجِد بدائل.
4. اختر بديلاً وبادر بالتنفيذ.
5. قيّم وراجع حسب الحاجة.



الشكل "4-1" خطوات عملية حلّ المشكلات.

الخطوة الأولى: حدّد المشكلة

Step 1: Identify the Problem

تحديد المشكلات ليس دائمًا بالبساطة التي يبدو عليها، وكثيرًا ما تكون العوامل الموصوفة على أنها المشكلة مجرد أعراض للمشكلة الفعلية. على سبيل المثال، لم تحصل هيا وهي فنية أشعة، على الدرجات العالية التي كانت تمناها في تقييم أدائها في العمل. عندما حصلت على تقييم "ضعيف" في الاعتمادية، شعرت بالضيق واعتقدت أن مشكلتها "تلقي تقييم ضعيف لأن المشرف عليها يكرهها". يتطلب تحديد الطبيعة الحقيقية للمشكلات استعدادًا للمراقبة، والانتباه، ومواجهة مسائل صعبة. فعلى القائمين على حل المشكلات تحري ما يقع وراء الأمور الملحوظة، واستخدام الأسئلة بشكل فعال لإدراك طبيعة الموقف الحقيقية. إن إنكار المشكلات أو تجاهلها لا يجعلها تخفي، بل على العكس، إذ تميل المشكلات التي لم تعالج إلى التفاقم نظرًا لعدم اتخاذ أي إجراء لحلها.

رد فعل هيا الأول كان "لا يمكنني فعل شيء. سيارتي قديمة وتعطل كثيرًا". ولأن سيارتها لا تعمل، عليها الاعتماد على عائلتها وأصدقائها لتوصيلها إلى العمل. وأوقات عملهم ليست مماثلة لأوقات هيا، لذلك، تصل متأخرة في معظم الأوقات.

وبالتفكير مليًا فيما قالته ("لا يمكنني فعل شيء")، أدركت هيا أن التواجد في العمل في الوقت المحدد هو مسؤوليتها، وأصبحت الآن قادرة على تحديد المشكلة الحقيقية: نقص وسائل النقل التي يمكنها الاعتماد عليها. لذا بإمكانها الآن البدء في البحث عن حلول فعالة. إن تحمل مسؤولية مشكلة ما يجعل البدء في حلها ممكناً.

الخطوة الثانية: اجمع المعلومات

Step 2: Gather Information

يستند الحل الجيد للمشكلات إلى وجود معلومات دقيقة وموثوقة. ويؤدي التصرف بناءً على الفرضيات (الأفكار غير المجربة)، والأراء (المعتقدات التي لا تستند إلى حقائق أو معرفة)، والعواطف إلى قرارات سيئة. في مجال الرعاية الصحية، يُعرف جمع المعلومات باسم **Assessment**. هناك طرائق عديدة لجمع المعلومات:

- راجع ما هو معروف بالفعل: ما المعرفة التي امتلكها حول المشكلة أو الموقف؟
حول الأسباب؟ حول الحلول الممكنة؟

- جمع **البيانات الموضوعية Objective Data**: ما الذي يمكن ملاحظته؟ قياسه؟
اختباره؟ ما الحقائق؟ عند التعامل مع المرضى، تسمى البيانات الموضوعية **علامات Signs**.



- **اجمع البيانات الذاتية Subjective Data:** كيف أشعر إزاء الموقف؟ ماذا أريد؟ ماذا يريد الآخرون؟ عند التعامل مع المرضى، تشير البيانات الذاتية إلى ما أبلغ عنه المريض. مثل: الألم والشعور بالغثيان، وتُعرف باسم **الأعراض Symptoms**، ولا يمكن ملاحظتها أو قياسها بشكل مباشر من قبل أخصائي الرعاية الصحية، ولكن مع ذلك، يجبأخذها بعين الاعتبار.
- **أجر البحث:** ما الحقائق؟ هل هي من مصدر موثوق (جدير بالثقة)؟ كيف أعرف؟ هل تستند إلى أساس علمي؟ (هل يمكن اختبارها؟)
- **اطلب المساعدة:** من لديه معرفة مفيدة؟ هل هناك خبراء متاحون يمكنهم إعطائي معلومات موثوقة ومساعدتي في إيجاد حل؟ عندما همت بحل المشكلة، وجدت هيا أن فكرة حل مشكلة المواصلات أمر مُربك. شراء سيارة جديدة هو الحل الوحيد الذي يبدو لها منطقياً، لكنها تعلم في قراره نفسها صعوبة شراء سيارة في الوقت الحالي. لكن عندما تضع مخاوفها جانبًا وتلتزم بجمع المعلومات، تكتشف ما يلي:
 - بتنظيم من المنشأة التي تعمل بها، تشارك السيارات متوافر.
 - أرخص سيارة جديدة معروضة للبيع في منطقتها سعرها 60,000 ريال سعودي.
 - هناك العديد من المقالات على الإنترنت حول كيفية شراء سيارة.
 - تمتلك ابنة عمها سيارة قديمة تريد بيعها.
 - تقدم إحدى الكليات المحلية ورشة عمل لتعليم الناس كيفية شراء سيارة.
 - لدى المدرسة الثانوية المحلية برنامج تدريب على ميكانيك السيارات. ومقابل رسوم رمزية، سيتحقق الطلاب من السيارات المستعملة قبل شرائها.

الخطوة الثالثة : أوجد بدائل

Step 3: Create Alternatives

الخطوة الثالثة في حل المشكلات هي إنشاء قائمة بالبدائل. تخلق أفكار الحلول، والإجراءات بناءً على المعلومات التي جمعت. فيجب النظر في جميع الخيارات قبل انتقاء واحد منها. يظهر أن بعض البدائل، عند إجراء مزيد من التحري، غير عملية أو غير قابلة للتنفيذ. لذا من الضروري دراسة كل واحد من الخيارات ووضع النتائج المحتملة في الحساب، إيجابية كانت أم سلبية. بناءً على بحثها، أنشأت هي القائمة التالية:

1. حضور ورشة العمل حول كيفية شراء سيارة، ثم شراء واحدة مستعملة. أقساط السيارة الشهرية وأسعار التأمين المرتفعة تعني الحاجة إلى وضع الميزانية بدقة لغضبة جميع النفقات. ويمكن تقليل احتمالية شراء سيارة ردئه بالاستفادة من الخدمة المقدمة في المدرسة الثانوية.

2. الاستمرار في الاعتماد على الآخرين لتوصيلها إلى العمل. (عدم الفعل بديل مطروح).

3. طلب قرض من والدها لشراء سيارة جديدة. رغم رغبتها في امتلاك سيارة جديدة، إلا أن هيا مستقلة مالياً لعدة سنوات وتفضل البقاء على هذا النحو.

لا تظهر بعض البديل المحتملة في القائمة السابقة بسبب معلومات جمعت في الخطوة الثانية:

- يجب امتلاك الراغبين في تشارك السيارات سيارة جيدة خاصة بهم. قد يكون هذا بديلاً محتملاً في مرحلة لاحقة إذا اشتريت سيارة يمكن الاعتماد عليها.

- قطعت سيارة ابنة عمها أكثر من 175,000 كيلومتر، وليس - وفقاً للتقارير التي قرأتها - من طراز يمكن الاعتماد عليه كثيراً.

الخطوة الرابعة: اخترب بديلاً وبادر بالتنفيذ

Step 4: Choose an Alternative and Take Action

الخطوة الرابعة هي الخطوة الحاسمة، فيعيد الفشل في التصرف من العقبات الشائعة في طريق حل المشكلات واتخاذ القرار. تضييع الفرص ولا تتحقق الإنجازات عندما لا يُوضع القرار حيز التنفيذ.

قررت هيا الجمع بين بديلين. ستنتمي في الاعتماد على الآخرين لتوصيلها إلى العمل، وستخطط لشراء سيارة مستعملة في السنة القادمة. وإلى ذلك الحين، ستنشئ ميزانية شخصية لضبط النفقات وتوفير المال، وستعلم المزيد حول كيفية شراء سيارة وما الطراز الأنسب لميزانيتها.

الخطوة الخامسة: قيم وراجع حسب الحاجة

Step 5: Evaluate and Revise as Needed

يعني التقييم مراجعة نتائج الإجراءات المتخذة. فأجاد الخطط المدرستة يمكن أن تكون غير فعالة أو لها عواقب سلبية غير متوقعة، وخاصة في ظل الظروف المتغيرة. ومن الضروري إجراء بعض التعديلات أو اختيار بديل آخر، قد يتطلب الأمر الرجوع إلى الخطوة 2 لجمع معلومات إضافية ومتابعة العملية مجدداً.



عند تطبيق العملية على العمل في مجال الرعاية الصحية، من المهم تذكر أن احتياجات المرضى والمنشآت تتغير، أو قد تتوافر معلومات إضافية. يمكن لذلك التأثير على العملية وفرض إجراء المراجعات قبل اكتمال العملية برمّتها. باختصار حل المشكلات عملية مستمرة.

اختيار المهنة

Making a Career Decision

هناك المئات من المسميات الوظيفية في مجال الرعاية الصحية، والعدد في ازدياد مستمر، وكلها تتطلب مجموعة واسعة من المهارات والقدرات. يجب على الطلاب الذين يفكرون في الحصول على وظيفة في مجال الرعاية الصحية معرفة متطلبات، ومسؤوليات، وشروط مجالات اهتمامهم إلى حد ما. ستساعدهم هذه المعرفة على اتخاذ خيارات مهنية جيدة تتناسب مع تفضيلاتهم وقدراتهم. على سبيل المثال، قد يجد بعض الأفراد المهتمين بالرعاية الصحية وظيفة فني الطوارئ الطبية (EMT) ممتعة ومثيرة. يتاح لفنيي الطوارئ الطبية فرصاً مهمة لتطبيق مهاراتهم لمساعدة الآخرين، وإنقاذ أرواحهم أحياناً. في نفس الوقت، يكون عملهم متطلباً جسدياً وعاطفياً، ويتم غالباً في ظروف صعبة، حيث لا تحدث حالات الطوارئ في الأوقات والأماكن المناسبة. وتتضمن جداول عمل فنيي الطوارئ الطبية الدوام الليلي، وعطلات نهاية الأسبوع، والعطل الرسمية، ويُطلبون للعمل في جميع أنواع الظروف الجوية. لذا يجبأخذ كافة جوانب المهنة بعين الاعتبار لكي تتمكن من اختيار مهنة ترضى عنها وتسر بها على المدى الطويل.

عند اختيار مهنة ما، يجب على الطلاب وضع العوامل التالية عن أنفسهم في الحسبان:

- خلفيتهم التعليمية.
- مقدار الوقت الإضافي الذي يمكن تكريسه بغرض التعلم.
- قدراتهم الطبيعية.
- سماتهم الشخصية.
- نوع الأنشطة التي يستمتعون بها أكثر من غيرها.
- تفضيلات بيئه العمل وظروفه.

اخبر معلوماتك

1. ما الذي تحتاج إلى إظهاره لتحديد الطبيعة الحقيقة للمشكلة؟
2. اذكر إحدى العقبات الشائعة في حل المشكلات واتخاذ القرار.



ال التواصل هو العملية التي تتبادل فيها الرسائل بين المُرسل والمستقبل. **المُرسل**، الذي يدعى أيضًا "المُتكلّم"، هو الشخص الذي ينشئ الرسالة ويتولّ إيصالها. **المُتلقّي Receiver**، الذي يسمى أيضًا "المُستمع"، هو الشخص الذي يوجه له المُرسل الكلام والرسالة. ويعتبر التواصل ناجحًا عندما يفهّم المُتلقّي ويفهم رسالة المُرسل على النحو المقصود. التواصل الجيد ضروري لتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة (الشكل "5-1"). تعتمد أنظمة الرعاية الصحية الحديثة على التسليم الفعال والدقيق لكميات كبيرة من المعلومات، وتستند التشخيصات والمعالجات إلى مجموعة متنوعة من البيانات الواجب مشاركتها بين العديد من مقدمي الرعاية الصحية. هناك شبكات واسعة من مقدمي الرعاية الأولية، والأخصائيين، والمعالجين، ومراكز الاختبار، والمنشآت الطبية، وشركات التأمين التي تعمل معًا لتنسيق الجهود وتوفير الرعاية الأمثل للمرضى. وتزداد احتمالية حدوث سوء تواصل كلما أصبحت الأنظمة أكبر وأكثر تعقيدًا. التواصل الجيد وجهاً لوجه ضروري. يُذكر أن السبب الجذري لما يقارب 66% من الأخطاء الطبية هو ضعف تواصل أعضاء الفريق. كما يزداد استياء أخصائيي الرعاية الصحية وانسحابهم عندما يكون التواصل بين الموظفين ضعيفاً.



الشكل "5-1" التواصل الجيد بين أعضاء فريق الرعاية الصحية ضروري لتوفير رعاية جيدة للمرضى.



التواصل مع المرضى Communication with Patients

إن القدرة على التواصل الجيد مهمة للنجاح المهني بالنسبة للفني سحب الدم، بنفس أهمية قدرته على سحب الدم بأمان. تعتمد سلامة المرضى على أمور أكبر من الكفاءة الفنية بمفردها. على سبيل المثال، إذا كانت ممرضة ترشد المريض حول كيفية تغيير الصمام على جرح ما، فإن فهم المريض للإرشادات أمر بالغ الأهمية ليكون قادرًا على تطبيق ممارسات الرعاية الذاتية في المنزل بنجاح. أظهرت الدراسات أن الحالة الصحية، ونتائج العلاج تتأثر كثيرًا بجودة التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.

وهناك عدة عوامل تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى التواصل الفعال:

- الانخفاض الكبير في الوقت الذي يقضيه المرضى في المستشفيات، وغيرها من مراقب الرعاية الصحية. فأصبح المرضى الآن مسؤولين أكثر عن متابعة ورعاية حالتهم، ويحتاجون إلى إرشادات واضحة لتنفيذ إجراءات الرعاية الذاتية اللازمة على نحو صحيح.

- تحول السبب الرئيس للوفاة من الأمراض المعدية إلى السرطان، وأمراض القلب، والداء الرئوي الساد المزمن، والstroke الدماغية: فهناك زيادة في الأمراض المزمنة لأن الناس يعيشون لفترة أطول. لذا، فإن تشخيص المريض حول العوامل التي تحسن حالته الصحية هو جانب مهم من مسؤوليات أخصائي الرعاية الصحية.

- الأدوية الجديدة: يتناول عديد من المرضى عدداً كبيراً من الأدوية، مما يزيد من صعوبة تنظيمها، وتناولها بشكل صحيح.

تؤثر مواقف وسلوكيات أخصائيي الرعاية الصحية على قدرتهم على التواصل بشكل فعال مع المرضى. لذا، فالخطوة الأولى لتطبيق مهارات تواصل ممتازة هي تتميم احترام المرضى، واستيعابهم، وفهم احتياجاتهم. التواصل الفعال يتعدى مجرد تطبيق مجموعة من التقنيات، حيث يجب أن ينبع من تعاطف صادق واهتمام حقيقي بالمرضى وسلامتهم (الشكل "6-1").

لعالم الرعاية الصحية رهبة عند المرضى، فيقلون من تلقي نتائج اختبار سلبية واكتشاف حالات طبية خطيرة لديهم، أو يخشون الشعور بالألم وعدم الراحة أثناء العلاج. ويخشى آخرون فقدان السيطرة على أجزاء من حياتهم نتيجة لحالتهم الجسدية. ويمكن لهذه المخاوف أن تؤثر، إلى جانب الإجهاد البدني الناجم عن المرض أو الإصابة، سلباً على تعافي المريض. يساعد أخصائيو الرعاية الصحية على تخفيف توتر المريض عبر إظهار التعاطف، وتقديم المعلومات المناسبة، والإجابة عن الأسئلة. وقد ثبت أن التواصل الجيد يزيد من سرعة تعافي المريض.



هناك عامل آخر يؤثر على التواصل مع المرضى، ألا وهو قدرة المريض على فهم المعلومات ومعالجتها والحصول عليها، وعلى الخدمات الصحية الأساسية اللازمة لاتخاذ القرارات الصحية الصحيحة. من المحتمل ألا يفهم المرضى ما يخبرهم به مقدمو الخدمات الصحية شفهيًّا، لكنهم يشعرون بالحرج الشديد من الاعتراف بذلك. ولا يمكن معالجة هذه المخاوف إذا كان المرضى غير مرتاحين للتعبير عنها لمقدمي الرعاية الصحية. لذا تفيد مهارات التواصل الجيدة، والتي نوقشت في هذا الفصل، **أخصائي الرعاية الصحية** في مساعدة مرضاهم بشكل أفضل على مناقشة مخاوفهم.

الشكل "6-1" مهارات التواصل الجيدة، والاهتمام الصادق بالآخرين، ضرورية للعناية الفعالة بالمرضى.



عملية التواصل

The Process of Communication

يمكن تبادل الرسائل بأربع طرائق على الأقل:

1. شفهياً.
2. غير شفهي.
3. كتابياً.
4. إلكترونياً.

يشيع الاعتقاد أنَّ التواصل الشفهي يتكون ببساطة من التحدث، والاستماع. وهذا نشاطان يمارسهما معظم الناس طوال حياتهم. حيث نجري عشرات المحادثات يومياً مع أفراد الأسرة، والأصدقاء، وزملاء الدراسة، والعمل. ويهدف التواصل الفعال في مجال الرعاية الصحية بدقة إلى تلبية احتياجات المرضى، وكثيراً ما يُدعى بال**التواصل العلاجي Therapeutic Communication**. كما يتضمن تطبيق مجموعة من المهارات الممكن اكتسابها عبر الممارسة.

في هذا النص، نُظم التواصل في عملية من ست خطوات، وتتوفر هذه العملية نهجاً منظماً لدراسة وتعلم المهارات المكونة للتواصل الفعال مثل مهارات الرعاية الصحية الأخرى. ولا يمكن التهاون في التواصل واعتباره إجراء روتينياً تقليدياً، فكلّ عملية تواصل ظروفها الخاصة، وتحتاج تركيزاً تاماً من أخصائي الرعاية الصحية.


الخطوات الست لعملية التواصل

The Six Steps of the Communication Process

1. ضع أهداف التواصل: حدد ما يجب تحقيقه. يتطلب ذلك مراعاة احتياجات المتلقى الخاصة، والظروف الحالية، والواجبات الموكلة إلى أخصائي الرعاية الصحية.
2. أنشئ الرسالة: اختر المحتوى المناسب، ونظمه بناءً على أهداف التواصل، وصفات المتلقى.
3. سلم الرسالة: اختر أفضل طريقة إيصال تضمن فهم المتلقى الفرض من الرسالة.
4. استمع إلى الرد: استخدم تقنيات الاستماع والملاحظة لتحديد ما إذا استُقبلت الرسالة كما هو مُراد.



5. استرجع المعلومات واطلب التوضيح: أعد صياغة ما تسمع، أو اطرح أسئلة، أو استخدم إعادة التدريس (اطلب من المتقين شرح ما قلته بطريقتهم الخاصة) للتحقق من فهم المتقى للرسالة.
6. قيم اللقاء (وراجع الرسالة عند اللزوم): حدد ما إذا تحقق الهدف. إذا لم يتحقق، فلماذا؟ ما الخيارات الأخرى المتاحة؟ ما الخطوة التالية؟
- هذه الخطوات موضحة في الشكل "7-1".



الشكل 7-1 الخطوات الست في عملية التواصل.

وضع أهداف التواصل Setting Communication Goals

يتسمُ كثيرٌ من اتصالاتنا اليومية بالعفوية والسطحية، ويطلبُ قليلاً من التخطيط أو لا يتطلبه بتاتاً. يتضمن ذلك التحيات اليومية المحكية تلقائياً ("مرحباً، كيف حالك؟")، ويتوقع احتواء ردها على قليل من المعلومات الحقيقة. تكون التفاعلات في بيئات الرعاية الصحية هادفة أكثر. افترض أن ممرضة تريد التعرف على الحالة الصحية الحالية للمريض، بدلاً من سؤاله، "كيف حالك؟"، السؤال الذي كثيراً ما يرد عليه بإجابة مبرمجة "بخير"، تحتاج إلى طرح أسئلة أكثر تحديداً، مستندة إلى أهداف التواصل. تتضمن الأمثلة على الأسئلة المحددة ما يلي:

- على مقياس من 1 إلى 10، ما درجة تأمرك؟

- هل لديك أي أسئلة حول رعايتك؟

- هل تشعر بالتوتر إزاء هذا الإجراء؟

فيما يلي بعض الأمثلة على أهداف الرعاية الصحية:

- اجمع معلومات حول حالة المريض.

- أرشد الأفراد بخصوص إجراءات الرعاية المنزلية بعد الجراحة، حتى يتسلّم أهل المريض فهمها ومتابعتها بشكل صحيح.



● اشرح للمريض فوائد العلاج الموصى به.

● أبلغ معلومات رعاية المريض إلى زميل العمل الذي سيتولى رعايته.

بالإضافة إلى الأهداف الخاصة بكل حالة، هناك ثلاثة أهداف أخرى يجب تضمينها في كل تفاعل مع المريض:

1. أظهر اهتماماً صادقاً بصحة المريض:

- ابتسِم بلطف.

- استخدم أسلوبًا مهذبًا.

- لا تتصرف بتسرّع.

- استمع جيداً.

2. وُطّد الثقة:

- تواصل عبر النظر بالعينين ضمن حدود اللباقة الاجتماعية.

- اشرح سبب ضرورة إجراء، أو علاج، أو اختبار ما.

- اشرح مقدماً كل ما ستفعله.

- تابع أي شيء تقول أنك ستفعله (عد خلال 5 دقائق، اتصل بالمريض للتحقق من حالته، وما إلى ذلك).

3. عزز تقدير المريض لذاته:

- أشرك المريض في اتخاذ القرار كلما أمكن ذلك.

- استوضح كلام المريض، إذا كنت غير متأكد من المعنى.

- خاطب المريض باحترام ولياقة.

- وفر الخصوصية للمريض.

- عندما يكون ذلك مناسباً، اسأل المريض عن الكيفية التي يرغب بها القيام بالأمور.

من الممكن أن تبدو محاولة تحقيق هذه الأهداف غير واقعية في الوقت القصير الذي يقضيه أخصائي الرعاية الصحية مع المرضى، فعليه إنجاز مهام أخرى، مثل: أخذ عينة دم، أو إجراء علاج تنفسي. لكن، التواصل الجيد يعتمد على الجودة أكثر من الكمية. الابتسامة الدافئة، وطمأنة المريض بمعلومات مفيدة ليست مضيعة للوقت، ويمكن تقديمها في أي لقاء. يتلقى مرضى اليوم أغلب رعايتهم من غرباء على عجلة من أمرهم، ولهذا السبب بالذات، يجب بذل جهد ليبدو التواصل مع المرضى أكثر خصوصية قدر الإمكان.



جمع المعلومات Collecting Information

لوضع أهداف ملائمة، اجمع وراجع المعلومات المؤثرة على عملية التواصل. يجب مراعاة العوامل التالية:

● مستوى فهم المريض:

- هل المريض صغير جدًا في السن؟
- هل يتكلم المريض العربية أو يفهمها؟
- هل يعاني المريض من إعاقة تعليمية مؤثرة على الفهم؟
- هل يبدو المريض مشوشًا أو مشتتاً؟
- ما قدرة المريض على استذكار المعلومات؟ هل هناك فقدان للذاكرة قصيرة الأمد؟
- ما المصطلحات المناسبة للاستخدام؟

● العوامل العاطفية:

- هل يعكس سلوك المريض الخوف أو القلق؟
- هل هناك دلائل على استخدام المريض آلية دفاعية؟
- هل المريض مستعد لقبول المعلومات التي ستقدم؟

● العوامل الفيزيائية:

- هل المريض متآلم؟
- هل يتناول المريض دواء يسبب النعاس، أو يؤثر على قدرته على التركيز؟
- هل يعاني المريض من إعاقات سمعية، أو بصرية، أو كلامية تؤثر على عملية التواصل؟

● ضرورة التواصل:

- هل يجب التواصل الآن؟
- هل الظروف المحيطة مناسبة للتواصل؟
- ما العواقب إذا لم يحدث التواصل أو لم ينجح؟

يعتبر تعلم كيفية اتخاذ هذه القرارات بسرعة مهارة مهمة في مجال الرعاية الصحية، تتطور مع مرور الوقت. إحدى التقنيات التي يمكن للأخصائي الرعاية الصحية الجدد اتباعها لمساعدتهم على الاستعداد لمواقف التواصل هي إعداد قائمة في أذهانهم.



إنشاء الرسالة Creating the Message

يتطلب إنشاء رسالة مناسبة اختيار محتوى، واستخدام لغة تستند إلى إجابات الأسئلة المذكورة سابقاً. يحدث التواصل في الرعاية الصحية على مستوى أعمق مقارنة بالمحادثات اليومية، ويجب أن يتسم بالدقة والوضوح، حيث يتضمن في بعض الأوقات مشاركة معلومات شخصية للغاية، مثل مخاوف المريض.

يجب تقديم المعلومات بطريقة يسهل على المتلقى فهمها. على سبيل المثال، رغم أن استخدام المصطلحات الطبية يضمن الدقة في التواصل مع أخصائي الرعاية الصحية الآخرين، إلا أنه يؤدي إلى إرباك المرضى وتخويفهم. حتى اللغة اليومية يتبعن تبسيطها أحياناً لبعض المرضى حسب عمرهم ومهاراتهم اللغوية. في الوقت نفسه، احرص على عدم المبالغة، والاستخفاف بفهم المرضى. نظم الرسائل الطويلة ليسهل متابعتها. فيما يلي بعض الأمثلة على الإستراتيجيات التنظيمية:

- اشرح ما تخطط لفعله، وما يجب أن يتوقع المريض سمعاه، وإحساسه، وما إلى ذلك.
- رتب المعلومات حسب الأهمية.
- ضع قائمة بسلسلة من الخطوات ليتبعها المريض.
- اذكر الحقائق، واتبع كل منها بشرح.
- قدم لمحة عامة عن الإجراء قبل تفصيل الخطوات بشكل مفرد.
- أعط تعليمات مع وصف للعواقب المحتملة إذا لم تُتبع.
- قسم المعلومات إلى أقسام إن أمكن، حتى يتسع المريض فهم كل جزء، أو مجموعة من الحقائق قبل الانتقال إلى الجزء التالي.
- استخدم إعادة التدريس: اطلب من المرضى إثبات فهمهم عبر شرح المعلومات بأسلوبهم الخاص، أو أداء المهام، أو التمارين المدرسية.

طرح الأسئلة Asking Questions

تصاغ بعض الرسائل على هيئة أسئلة، ولها عدة أنواع:

- **الأسئلة المغلقة** ويمكن الإجابة عنها بكلمة واحدة أو إجابة بـ "نعم" أو "لا". يستخدم هذا النوع من الأسئلة لجمع معلومات حقيقة واقعية. على سبيل المثال، يطرح أخصائي الرعاية الصحية أسئلة مغلقة عند الحصول على معلومات عن



الخلفية السابقة للمريض. لا ينصح بالأسئلة المغلقة عند التحقق من الفهم، حيث سيجيب عدّى من المرضى بـ "نعم" على سؤال "هل تفهم؟" حتى لو لم يفهموا، لأنّهم يخشون الظهور بمظهر الغبي، أو لا يريدون "إزعاجك" بتكرار المعلومات. تشمل الأمثلة: "هل عيد ميلادكاليوم؟" "هل تتناول أدوية؟"

● **الأسئلة المفتوحة** لا يمكن الإجابة عنها بـ "نعم" أو "لا". تتطلب جواباً كاملاً، وتستخدم لتشجيع المرضى على تقديم معلومات أو تفسيرات مفصلة. تستخدم هذه الأسئلة للتعرف على أعراض المريض، ولتشجيعه على مشاركة المشاعر والأراء، أو للتحقق من فهمه للرسالة. أمثلة على هذه الأسئلة: "كيف سقطت؟" "لماذا تعتقد أنك حزين؟"

● **الأسئلة الاستقصائية** تطلب الحصول على معلومات أو توضيحات إضافية. على سبيل المثال، يمكن استخدامها لتوجيه المرضى لمناقشة أعراضهم بالتفصيل. إذا قال المريض: "معدتي تؤلمني"، سيكون السؤال الاستقصائي عن مكان الألم بدقة ونوعه، ومتى يحدث، ومتى شعر به لأول مرة. من المهم عدم الخلط بين الاستخدام الهدف لأسئلة الاستقصاء، وطلب تفاصيل شخصية غير ضرورية، الأمر الذي يجده المريض مسيئاً. أمثلة على الأسئلة: "قلت أنك تعاني من ألم في صدرك. أين تشعر بالألم بالضبط في منطقة الصدر؟"، "متى يكون الألم أشد؟"، "هل يمكنك إخباري بالمزيد عن وقت إصابتك بهذا الصداع؟"

● **الأسئلة الإرشادية** حيث تُضمن كامل الإجابة أو جزء منها في صياغة السؤال. يجب تجنب الأسئلة الإرشادية عندما تشجع هذه الأسئلة المتلقى على إعطاء إجابة يعتقد بصحتها، أو أنها ما يريد الأخصائي سماعها. ومع ذلك، تكون الأسئلة الإرشادية مفيدة عند استخدامها مع المرضى الذين يجدون صعوبة في التحدث، أو الذين لا يفهمون اللغة بما يكفي لصياغة إجابة كاملة. في هذه الحالات، انتبه جيداً وتحقق من الفهم واحتمالية أن المريض لا يتافق معك ببساطة. الأمثلة هي: "هل تصف الألم بأنه حاد، كليل، نابض، أو مستمر؟"، "هل تشعر بمزيد من الغثيان في الصباح، أو بعد الظهر، أو في المساء، أو أثناء الليل؟".

بعد طرح سؤال، توقف وامنح المتلقى الوقت الكافي للرد. يحتاج بعض الناس إلى وقت أطول من غيرهم لصياغة الإجابات. لا تقاطع، أو تنه جمل المرضى. إذا بدا عليهم أنّهم لا يفهمون السؤال أو غير قادرين على الرد، أعد صياغته وامنحهم فرصة أخرى للرد. ضع في اعتبارك حالة كلّ مريض وقدرته على الإجابة عن الأسئلة. على سبيل المثال، "سارة" مريضة مسنة تواجه صعوبة في التذكر. دخلت المستشفى بسبب آلام الظهر الشديدة، ولا يمكنها الرد بدقة على الأسئلة حول شعورها اليوم مقارنة بالأمس. الطريقة الفعالة للحصول على المعلومات المطلوبة منها هي طلب تقييمها



لمستوى شدة ألمها على مقياس من 0 إلى 10، حيث يشير 0 إلى غياب الألم، و10 إلى أعلى مستوى ألم يمكنها تخيله.

إيصال الرسالة Delivering the Message

في البداية، من المهم تحديد من سيسلم الرسالة، الأمر ليس واضحًا دائمًا. على سبيل المثال، إذا كان المريض طفلاً أو شخصاً مسنًا، هل يجب التواصل معه أو مع أحد أفراد أسرته؟ يجب مخاطبة المرضى القادرين على فهم الرسالة أو جزء منها بشكل مباشر، كما يمكن تقديم معلومات أو تعليمات مفصلة إلى أحد أفراد الأسرة لاحظًا. مثلاً، أحد المساعدين الطبيين يُلقي التحية على فاطمة البالغة من العمر 87 عامًا بسؤال ابنتها، "كيف حال فاطمةاليوم؟". هنا فشل المساعد الطبي في إظهار الاحترام للمريض.

يُعتقد أن عديداً من المرضى الذين لا يستطيعون التحدث أو الإجابة يمكنهم السمع والشعور باللمس. في ظل هذه الظروف، يمكن لـأخصائي الرعاية الصحية إراحة المريض عبر مخاطبته، عليهم التحدث وطمأنته، والتفكير بإجراء تماس جسدي ملائم، مثل لمس يد المريض أو كتفه عند التحدث (الشكل "8-1").

التواصل غير اللفظي Nonverbal Communication



الشكل "8-1" تحدث بشكل يُطمئن المريض ولا يأس لوربت على كتفه أو يده بلطف.

يشمل **التواصل غير اللفظي Nonverbal Communication** نبرة الصوت، ولغة الجسد، والإيماءات، وتعابير الوجه، واللمس، والمظهر الجسدي. يُعبر عن 70% من معنى الرسائل بطريقة غير لفظية. يمثل التواصل غير اللفظي أدق تعبير مما يشعر ويؤمن به المُرسل؛ هذا لأنّه يأتي من الداخل وينقل بطريقة تلقائية لا شعورية كما أنه يحدث في اللاوعي. يجب أن يكون أخصائي الرعاية الصحية على دراية بالتواصل غير اللفظي الصادر عنهم، أو عن الآخرين. يجب الانتباه إلى التواصل غير اللفظي للمريض. على سبيل المثال، إذا قال مريض أنه "بخير" ولكنه بدا شديد التوتر والعصبية، فإنه لا يوجد تطابق في الرسائل اللفظية وغير اللفظية. في مثل هذه الحالات، يحتاج أخصائي الرعاية الصحية إلى الانتباه بدقة، وطرح الأسئلة، وإعطاء المجال للمريض لمشاركة ما يشعر به.

يعتبر المظهر الخارجي لأخصائي الرعاية الصحية شكلاً من أشكال التواصل غير اللفظي، ويمكنه التأثير على ثقة المريض في كفاءة الأخصائي، والتي بدورها تؤثر على كيفية استقبال الرسائل.

لغة الجسد Body Language

تنقل وضعية الجسم وحركاته الرسائل، يمكن أن يكون بعض لغة الجسد **أثرًّا سلبيًّا** على المتلقى. ومن الأمثلة على ذلك تكيف الذراعين، وهز الكتفين، والنقر بالأصابع أو القدمين، وشد القبضة، وقلب العينين. يمكن أن يعكس ذلك عدم الموافقة، وقلة الاهتمام، وعدم التصديق، ونفاد الصبر.

تنقل لغة الجسد الإيجابية الاهتمام، والعطف، والاستعداد للاستماع إلى المرسل، حتى لو كان هناك خلاف (الشكل "9-1")، كما تشجع على تبادل المعلومات والرسائل الصادقة. تشمل لغة الجسد الإيجابية ما يلي:

- النظر إلى الشخص الآخر.
- توجيه الجسد نحو الشخص الآخر.
- الميلان قليلاً نحو الشخص المُخاطب.
- اختيار وضع مريح للجسد.
- استخدام الإيماء أو الكلام التفاعلي ("آه تمام"، "نعم"، "أخبرني المزيد") أحياناً كنهاية عن الموافقة.
- تعابير وجه منفتحة ودافئة.
- الاقتراب من المريض إذا كان يقف بعيداً.
- إيقاف تنفيذ المهام لمنحه كامل الاهتمام.

تنقل وضعية الجسم الإيجابية رسائل، "جلٌ تركيزي وانتباхи عليك وعلى ما تقوله". على الأفعال أن توافق الأقوال. على سبيل المثال، إذا أراد المريض مناقشة مسألة حساسة واستمع إليه أخصائي الرعاية الصحية أثناء مواجهته للباب، تكون الرسالة الموجهة إلى المريض، "أنا مستعد للمغادرة". في مثال آخر، يريد أخصائي الرعاية الصحية طمانة المريض، لكنه متوتر وينظر بعيداً أثناء حديثه، ستبدو الرسالة خاطئة وسيشعر المريض أن المعلومات المهمة - قد تكون سلبية - لم تُقل. يتطلب بناء الثقة، وهو ركيزة أساسية في التواصل الفعال، تطابق التواصل اللفظي وغير اللفظي.

- التمثيل الإيمائي (حركات الجسم التي تقل الأفكار أو الأفعال)، يمكن استخدامه للتواصل عندما لا يكون الكلام ممكناً أو عندما لا يفهم المريض اللغة. على سبيل المثال، تمثيل الحركات الواجب على المريض القيام بها عند أداء التمارين، يوضح بالضبط ما يجب فعله.
- الإشارات تكون مفيدة عند تعذر إبداء الاهتمام اللازم على الفور للمرضى، حيث إن ملاحظة حضوره تعكس الاحترام، وتخلق جوًّا ودياً.



الشكل "9-1" يعكس لغة الجسد الإيجابية الاهتمام، والعطف، والاستعداد للاستماع.

على سبيل المثال، إذا كان موظف الاستقبال الطبي يتحدث عبر الهاتف عند وصول المريض من أجل موعده، عليه الترحيب بالمريض بابتسامة، وإيماء رأسه، وإشارة سريعة بيده أنه سيخدمه قريباً.

- تعابير الوجه شكلٌ مهم من أشكال التواصل غير اللفظي. بالنسبة للمرضى، يمكن أن تكون تعابير وجه أخصائي الرعاية الصحية مصدراً للطمأنينة أو القلق، لذا من الأهمية بمكان تعلم إدراكها والتحكم فيها. أحياناً، يكون هذا شافاً في المواقف الصعبة، أو غير السارة، أو العدوانية. على سبيل المثال، شعرت بانزعاج شديد من سلوك مريض غاضب، سيكون من الصعب تهدئته إذا ارتسمت على مُحياك علامات تفاد الصبر والانزعاج. يجب أن يعكس وجه أخصائي الرعاية الصحية الدفء، والثقة، والاهتمام بمصلحة المريض.
- في أيامنا هذه، أصبح استخدام اللمس أمراً شائكاً في مجال الرعاية الصحية. تتطلب العديد من أنشطة الرعاية الصحية دخول مساحة المريض الشخصية المخصصة فقط للأشخاص الأقرب والأكثر ثقة في حياة المريض. من المهم إخبار المرضى بما سيحدث، ولماذا. اشرح لهم ما يجب توقع رؤيته، وسماعه، وشعوره (الشكل "10-1"). على سبيل المثال، عند إعطاء حقنة، يجب على أخصائي الرعاية الصحية إعلام المريض بالغرض منها، ومكان إعطائها، وما الأحساس التي سيشعر بها.

البيئة المادية Physical Environment

يمكن أن تؤثر البيئة المادية، ووضعية أخصائي الرعاية الصحية بالنسبة للمريض على توصيل الرسالة. حيث يعطي الجلوس خلف مكتب، أو الوقوف فوق الشخص إيحاءً بالسلطة أو الهيمنة. وتشمل العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها ما يلي:



الشكل "10-1" اشرح للمريض ما قد يراه أو يسمعه أو يشعر به أثناء الفحص.



- **مُصادر الإِضاءة:** هل يستطيع المريض رؤيتك بوضوح؟ هل هناك وهج على أي شيء يتوقع أن يراه المريض؟ هل يسطع الضوء في عيون المريض؟
- **الأصوات:** هل يسمعك المريض بوضوح؟ هل توجد أصوات غير ضرورية مشتتة لانتباه؟ هل يجب إطفاء التلفاز أو الراديو؟
- **الخصوصية:** هل هناك أشخاص آخرون في المنطقة يمكنهم سماع التواصل؟ إذا كانت الخصوصية ضرورية، فكيف يمكن توفيرها؟ هل تتحدث إلى المريض مباشرةً، وبصوت عالي حسب الضرورة؟
- **النشاط:** هل تركز على تدوين الملاحظات، أو إدخال البيانات في الحاسوب أكثر من تركيزك على المريض؟
- **الراحة:** هل المريض مكشوف أو في وضع مُحرج؟ هل يمكن تأجيل التواصل؟

الاستماع إلى الإجابة Listening to the Response

الاستماع ليس عملية غير نشطة، بل عملية فاعلة تستدعي التركيز، والانتباه، والمشاهدة. سماع الكلمات وتلقيها يحدث بمعدل أسرع بعده مرات من معدل الكلام. يفيد ذلك عند تدوين الملاحظات، ولكنه يفسح مجالاً أمام العقل ليشرد. يعني **الاستماع الفعال** التركيز الكامل على ما يقوله المتحدث.

يمكن لردود فعل المُتلقى على أقوال المُرسل إعاقة الاستماع الفعال. على سبيل المثال، إذا كان المُتلقى معارضًا بشدة للرسالة، يصبح عقله مشغولاً بصياغة الحجج العقلية بدلاً من الاستماع بعناية. أحد الأمور الشائعة التي تقاطع الاستماع هي التفكير في كيفية الردّ عندما يتوقف المتحدث عن الكلام، ينخرط العقل في الحديث الذاتي، ويتوقف عن الاستماع.

يتطلب الاستماع الجيد عدم مقاطعة المُتلقين للمرسلين، أو إكمال الرسائل نيابة عنهم. امنح المرسلين وقتاً كافياً لإكمال رسائلهم. يمكنك استخدام الكلمات، والإيماءات المشجعة كمحفزات: "حسناً" أو "استمر" أو إيماءة بالرأس. يمكن للمقاطعة أن تعكس نفاد الصبر، وعدم الاحترام، أو تُشتت الرسالة المُراد إرسالها، مما يعيق إيصال المعلومات المهمة.

تطوير مهارات الاستماع الفعال أمر ممكن. ابدأ بتطوير إدراكك للتغيرات في انتباهك، وعندما تدرك أنك تفقد التركيز، أعد انتباهك مجدداً إلى المتحدث. مع الممارسة، يمكنك تقليل ضعف الانتباه والتشویش الذي ينبع من الداخل.

- أخرج المشتتات من رأسك.



- واجه المرسل.
- ركز انتباحك الكامل على المرسل.
- حافظ على التواصل البصري ضمن حدود الاباقة.
- أوقف "الحديث الذاتي".
- لا تصدر أحكاماً حول قيمة ما تسمعه.

يمكن أن تكون فترات الصمت جزءاً مهماً من عملية التواصل. لا تهدف لقاءات الرعاية الصحية إلى الحفاظ على سيلٍ مستمرٍ من المحادثات، وإنما لمساعدة المرضى على حل مشكلاتهم الصحية. يتيح الصمت الوقت للتفكير، والتدبر، كما أنه يوفر فرصة لمراقبة التواصل غير اللفظي. تثمن بعض الثقافات قيمة الصمت. ويكون السماح بحدوث فواصل الصمت أمراً محرجاً في البداية، لكن بمقدورها أن تكون أداة قيمة في تعزيز التواصل الجيد.

التغذية الراجعة

Feedback

التغذية الراجعة Feedback طريقة تستخدم للتحقق من فهم ما يقال. هل وصلت الرسالة بالشكل الذي قصده المرسل؟ كلّنا مررنا بتجارب اعتقدنا فيها أننا فهمنا الرسالة بدقة، لنكتشف لاحقاً أننا أخطأنا تفسيرها. تساعد التغذية الراجعة في تجنب سوء الفهم. فيما يلي أربع طرائق لتحقيق التغذية الراجعة:

1. إعادة الصياغة: يعيد المتلقي - بأسلوبه الخاص - صياغة الرسالة ثم يطلب من المرسل تأكيدها.

"مثال": "فهمت أنك عانيت من هذا الصداع كل يوم خلال الأسبوعين الماضيين. هل هذا صحيح؟"

2. التعبير: يشابه إعادة الصياغة ولكنه يدفع المتلقي لإكمال، أو إضافة المزيد من التفاصيل إلى الرسالة الأصلية.

"مثال": "تقول أنه يصعب عليك القيام بالتمارين التي أوصى بها المعالج بسبب..." (توقف مؤقتاً وامنح وقتاً للمتلقي للإجابة).

3. طرح الأسئلة: اطلب إيضاحات، ومعلومات إضافية. للعديد من الكلمات، مثل "صعب"، و"مؤلم"، و"كثير"، معانٌ مختلفة عند البشر. في مجال الرعاية الصحية، استخدام الأسئلة يساعد المرضى في وصف حالاتهم بشكل أوضح. تعتمد التشخيصات الدقيقة، والعلاجات المناسبة جزئياً، على وضوح وكمال المعلومات التي يقدمها المريض.



"مثال": "ما الأعراض التي تعاني منها عندما تقول أنه ينتابك شعور سيئ؟" يمكن توظيف الأسئلة للتحقق من فهم المتلقي للمعلومات المهمة، بدلاً من السؤال عن مدى فهمه، اطرح سؤالاً تكشف لك إجابته درجة الفهم.
"مثال": "هل يمكنك سرد الخطوات الثلاث التي ستقوم بها عند إعطاء ابنك الدواء؟" هذا مثال على إعادة المريض للمعلومة.

يمكن استخدام الأسئلة المفتوحة لتشجيع المرضى على التحدث عن قيمهم ومعتقداتهم. رغم أن إطلاق الأحكام عن المرضى ليس من أدوار أخصائي الرعاية الصحية، يمكن أن يساعدك ما يتعلّم على فهم سلوك ودوافع المرضى على نحو أفضل، وإيجاد أساليب لتلبية احتياجاتهم.

"مثال": "لماذا تقول أنك تستحق التعرّض للحادث؟"
يساعد هذا السؤال في فهم سبب عدم بذل المريض أي جهد لأداء التمارين المساعدة على التعافي من الإصابات.

4. طلب الأمثلة: يمكن أن تساعد الأمثلة في شرح المعنى بشكل أوضح.

"مثال": "أخبرني عن نوع المواقف التي تشعر فيها بالدوار."
يساعد إنشاء قتوات تواصل واضحة باستخدام التغذية الراجعة في الحفاظ على علاقات جيدة مع زملاء العمل والمشرفين. يتطلب اكتساب الكفاءة بمهنة أخصائي الرعاية الصحية مراقبة التطور الشخصي والتعلم من الأخطاء. يمكن أن تكون التغذية الراجعة أدلة مهمة لتعزيز النمو المهني، على سبيل المثال، أبلغ حمد من قبل مشرفة أن التقرير الذي أعده "غير مقبول". يمكن أن يطلب حمد المزيد من التغذية الراجعة المحددة عبر طرح أسئلة مثل: "ما الذي فعلته أم لم أفعله، وجعل أدائي في هذه المهمة غير مقبول؟" و "هل يمكن إخباري بالضبط ما الذي يجعل التقرير غير مقبول؟". ستتشجع هذه الأسئلة المشرف على أن يكون محدداً ويقدم تفاصيل يمكن لحمد التعلم منها.

تقييم اللقاء

Evaluating the Encounter

يهدف التقييم إلى تحديد مدى تحقق أهداف التواصل، وذلك حسب ما اتّضح عبر استجابة أو سلوك المتلقي. إذا لم يُحقق الهدف، يمكن أن تساعد الأسئلة التالية في تحديد العقبة:

- هل ذكرت رسائلي بوضوح؟
- هل قدّمتها بمستوى مناسب للمتلقي؟
- هل استمعت بشكل فعال؟
- أي جزء من الرسالة أسيء فهمه؟




في الحقيقة، تستمر عملية التقييم طوال كل لقاء يُجرى فيه تواصل. يتحقق المُحاور الجيد باستمرار من الفهم من خلال الاستماع، والمراقبة، وطلب التغذية الراجعة حسب الحاجة. بهذه الطريقة، يمكن إجراء التعديلات وفق ما يلزم.

تحتقر بعض أهداف التواصل بمرور الوقت، عندها يجب تأجيل التقييم. على سبيل المثال: إذا مُنح مريض القلب عبد الله تعليمات حول تحسين عاداته الغذائية، سيحتاج الأمر أسابيع ليتمكن أخصائي التغذية من التحقق من فهم المريض لخطبة التغذية قليلة الدسم، ومدى عزمه على اتباعها. من الأمثلة الأخرى على أهداف التواصل طويلة الأمد، بذل جهد على مدى طویل لتحسين العلاقة مع زميل في العمل.

التواصل خلال المراحل العمرية المختلفة

Communication Through the Life Span

عند التواصل مع الأطفال الصغار، من المهم مساعدتهم على فهم ما يحدث لهم وكيف تقدم لهم العون، إذ إنهم يكونون خائفين ويحتاجون المساعدة لتخفيف قلقهم. في نفس الوقت، يجب إشراك الأطفال قدر المستطاع في صنع القرار، والسماح لهم برعاية أنفسهم عندما يمكن. وكما هو الحال مع المرضى في أي عمر، من المهم الاستماع بشكل فعال إلى الأطفال، والإجابة عن أسئلتهم باستخدام لغة تناسب عمرهم (الشكل "11-1").



الشكل "11-1" غير طريقة تواصلك لتناسب مع عمر وسمات المتلقى الأخرى.



ويجب معاملة المراهقين باحترام وتقدير. أظهر اهتماماً بشخصياتهم عبر التعرف على ما يهمّهم. ففي هذه المرحلة العمرية يكافح المرء لتكوين هويته أثناء انتقاله من الطفولة إلى البلوغ. لا تتحدث معهم باستخفاف، ولكن اشرح ما تفعل ولماذا بشكل وافٍ.

تعُج مرحلة البلوغ بالعديد من المسؤوليات، مثل العمل والأسرة. يمكن أن يسبب المرض والإصابة في هذه المرحلة توترةً شديداً، لذا، من المهم أن يستمع أخصائي الرعاية الصحية إلى مخاوف المرضى. لا تفترض أن البالغين يفهمون المفردات الطبية، والتعليمات التفصيلية، والتدارير الوقائية التي يجب عليهم اتخاذها الآن لتجنب المشكلات الصحية مع التقدم بالعمر. استخدم وسائل إعادة المريض للمعلومة للتحقق من الفهم.

يختلف البالغون الأكبر سنًا اختلافاً كبيراً فيما بينهم، من الأفراد السليمين عقلياً والأذكياء في التسعينيات من عمرهم إلى أولئك المصايبين بالخرف (انظر الفصل 2). هدف أخصائي الرعاية الصحية في هذه المرحلة مساعدة المرضى على الاحتفاظ باستقلاليتهم لأطول فترة ممكنة من خلال تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها للحفاظ على صحتهم. يحتاجون إلى مصارحتهم حول أي حالات مزمنة، إلى جانب المساعدة في اتخاذ قرارات مرحلة التقدم في العمر. احرص على اتباع نهج محترم غير مفرط في الحماية.

اختبر معلوماتك

1. ما الاستماع الفعال؟

2. ما الطرائق الأربع للحصول على التغذية الراجعة؟



التحلّل من حواجز الاتصال Overcoming Communication Barriers

تؤدي العوائق أو الحواجز أحياناً إلى منع التواصل. تشمل الحواجز ما يلي:

- اختلافات اللغة.
- التأثيرات الثقافية.
- الآليات الدفاعية.
- المشتتات الجسدية.
- الإعاقات الحسية.
- تأثيرات الدواء.
- الألم.

يتطلب تحديد العوائق والتغلب عليها التعاطف، والملاحظة، والأسئلة، والتعليقات. ويمكن توظيف تقنيات محددة وإاتاحة وقت إضافي لتعزيز التواصل الفعال.

المرضى المتألمون، المعالجون، المشوشون، أو المتشتتون

Patients who Are in Pain, Medicated, Confused, or Disoriented

يمكن للمرضى المعالجين، أو الذين يعانون من الألم، أو التشوش، أو التشتت أن يواجهوا صعوبة في التواصل. ويمكن للأخصائي الرعاية الصحية مساعدتهم بتخفيص وقت إضافي لهم واتباع الإرشادات التالية:

- عرّف عن نفسك، وقل اسم المريض.
- حافظ على التواصل البصري.
- تحدث ببطء ووضوح بنبرة صوت معتدلة.
- استخدم لغة بسيطة. تجنب اللغة العامية والتعابير التي لا تنقل المعنى بدقة.
- اجعل الرسالة قصيرة وفي صلب الموضوع. على سبيل المثال، لا تعطِ سيلًا من التعليمات أو تسأل أكثر من سؤال في الوقت ذاته.
- امنح المريض الوقت الكافي للرد.
- استخدم اللمس إذا كان المريض مرتاحاً له.
- اجعل تواصلك التفاعلي مع المريض عندما يكون الألم في أدنى مستوياته.
- كرر الرسالة حسب الحاجة، دون تغيير المحتوى أو الكلمات.
- راجع المحتوى مع المريض لتقييم ما علق من الرسالة في ذهنه.
- عند الحاجة، قدم للمريض معلومات مكتوبة يمكنه الرجوع إليها لاحقاً.



المرضى المصابون بالخرف

Patients with Dementia

يسbib مرض الزهايمر ما يصل إلى 80% من حالات الخرف، وله مسببات أخرى كالخرف الوعائي الذي يتلو السكتة الدماغية. وإلى جانب فقدان الذاكرة، يحدّ الخرف من القدرة على التواصل، سواء في فهم الآخرين أو التعبير عن الذات شفهياً. من الممكن أن ينسى المرضى معنى الكلمات والعبارات، وقد يعانون للعثور على الكلمات المناسبة، ويبتكرن كلمات للتعبير عن أنفسهم، مثل تسمية ساعة اليد بساعة الذراع. ومع تراجع المهارات اللغوية، يزداد اعتمادهم على الإيماءات.

يمكن أن يُظهر المرضى سلوكاً صعباً، مثل: الصراخ، والنبر بالألقاب، والضرب، والدفع. وعلى أخصائيي الرعاية الصحية التحلّي بالعطاء، والصبر، والهدوء، وعدم أخذ هذا السلوك على محمل شخصي. ومن المهم جداً الاستمرار في التواصل مع مرضى الخرف رغم الحواجز. وتقييد الاقتراحات التالية في الحفاظ على التواصل وتحسينه:

- قلل مصادر التشتيت والضوضاء.
- اقترب من المرضى من الأمام وعرّف عن نفسك.
- اجذب انتباه المريض: تواصل بصرياً وناديه باسمه.
- لا تفترض أن المريض لا يستطيع الفهم أو لا يريد التواصل.
- أظهر تعابير ودية.
- استخدم لغة بسيطة وجمالاً قصيرة.
- كن صبوراً. امنح المرضى ما يلزم من الوقت لصياغة الإجابة.
- وافق المريض فيما يقوله أو شتت انتباهه بموضوع مختلف عندما يسهب بقول أشياء غير منطقية أو متكررة.
- استجب لمشاعر المريض لا لكلماته.
- لا تواجه المريض، أو تجادله، أو تحاول محااجنته.
- إذا كان المريض لا يفهم ما تقوله، أعد الصياغة بدلاً من التكرار.
- قدم اقتراحات لا تصحيحات. على سبيل المثال، إذا أخطأ مريضه في التعرّف على أخيها قل: "أعتقد أن هذا أخوك، عمر".
- إذا كان المريض غير قادر على التواصل شفهياً، فراقب لغة جسده لمعرفة ما يريد أو يحتاج.



المرضى المصابون بالاكتئاب

Patients Who Are Depressed

ليس غريباً إصابة المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة مثل السرطان بالاكتئاب. وعادة ما يكون ذلك حالة مؤقتة، على عكس الاكتئاب السريري (اضطراب مزاجي يسبب شعوراً مستمراً بالحزن وفقدان الاهتمام)، ولكن هذه الحالة يمكن أن تسفر عن الشعور بالضيق وعرقلة أداء المريض وقدرته على التواصل. قل لمرضى الاكتئاب: "أنا هنا من أجلك." "أنا سعيد بسماعك." في الوقت نفسه، راع أنه يمكن أن يستجيب هؤلاء المرضى بشكل سلبي لأي شيء تقوله. تتضمن اقتراحات التواصل الخاصة ما يلي:

- ادع المرضى للتحدث عن مخاوفهم وما يشعرون به، لكن لا تجبرهم على ذلك.
- استمع بعناية دون إصدار أحكام.
- امنحهم الأمل، لكن لا تتصحّهم بـ"الابتهاج" أو "الإيجابية".
- اسمح بالصمت.

المرضى القلقون

Patients Who Are Anxious

بالإضافة إلى الاكتئاب، يشيع القلق ضمن أوساط المرضى. حتى زيارة طبيب الأسنان يمكن أن تسبّب القلق للمرضى الذين يخشون الإبر، أو الألم، أو الإحراج بشأن حالة أسنانهم. يواجه المرضى القلقون صعوبة في الترکيز والاستجابة، لذا عليك التحلي بالصبر. كن متعاطفاً ومطمئناً، في الوقت نفسه، لا تبالغ بتهاون مشاعر المرضى بقولك، "من السخف أن تكون قلقاً" أو "لا يوجد ما تخاف منه". من منظور المريض، من الواضح أن الوضع يستدعي الخوف. بدلاً من ذلك، جرب الاقتراحات التالية:

- اقترب من المريض بهدوء وبابتسامة.
- اطلب من المريض التعبير عن مخاوفه.
- دع المريض يتحدث واستمع بعناية.
- اجعل رسائلك بسيطة ومبشرة.
- التزم بموضوع واحد ليسهل على المريض متابعته.
- استخدم التغذية الراجعة للتحقق من فهم المريض لرسالتك.



المرضى المصابون باضطرابات سمعية

Patients With Hearing Impairments

يؤثر فقدان السمع على عدد كبير من الأشخاص من جميع الأعمار. عند بدء المحادثة، خاصة مع كبار السن، راقب المتلقي بتمعن واستخدم التعليقات - التغذية الراجعة - المناسبة للتحقق من الفهم. من المهم عدم افتراض أن الناس يمكنهم السمع بشكل جيد لأنهم لا يرتدون سماعة أذن، أو لأنهم لا يطلبون منك التحدث بصوت عالٍ. كثير من ضعاف السمع لا يدركون إصايبهم؛ لأنها تحدث تدريجياً على مر السنين، أو يخجلون من الاعتراف بها. فيما يلي علامات تدلّ أن الشخص يواجه صعوبة في السمع:

- يعني للأمام ويدور الرأس.
- يطلب منك تكرار المعلومات.
- فشله بالسمع عندما لا يواجه المتحدث.
- عدم الرد عليك عند طرح سؤال أو إنهاء حديثك.

تمثل لغة الإشارة وسيلة تواصل جيدة مع الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد أو كامل في السمع وتتألف من أشكال وحركات اليدين، وتعبيرات الوجه، ووضعيات الجسم الموافقة لإيصال المعنى (الشكل "12-1").

يمكن للمقترحات التالية تحسين التواصل مع ضعاف السمع بشكل ملحوظ:

- كن قريباً من المتلقي وحدّثه وجهاً لوجه.
- أزل أو أسكت مصادر الضوضاء.
- اجعل مصدر الإنارة موجهاً إلى وجهك.
- تأكد أن فمك مرئي للمتلقي.
- أبق يديك بعيدتين عن وجهك.
- قل اسم الشخص قبل بدء المحادثة.
- حدد ما إذا كان الشخص يسمع في أذن أفضل من الأخرى.
- عرّف الموضوع العام للمحادثة.
- تحدث بوضوح ولا تتمتم.
- تحدث ببطء ولكن بشكل طبيعي.
- لا تصرخ أو تبالغ في نطق الكلمات؛ قد يجعل ذلك الأمر أكثر صعوبة على الشخص في الفهم.
- حافظ على نبرة صوت منخفضة إلى معتدلة.
- استخدم جملًا قصيرة.



- انتبه إلى علامات الاستيعاب.
- لا تغير الموضوع دون سابق إنذار.

المرضى المصابون باضطرابات بصرية

Patients With Visual Impairments

يحتاج المرضى الذين يعانون من محدودية قدراتهم البصرية إلى عناية خاصة أيضاً، حيث إنهم لا يمتلكون مؤشرات بصرية للتوجيه أنفسهم جسدياً. وحيث أن معظم محتوى التواصل ينقل بطريقة غير لفظية، فمن المفهوم أن مريضاً عنده ضعف بصري سيواجه تحديات في التواصل. فيما يلي بعض الأساليب لتحسين التواصل مع ضعاف البصر:

- استهل بالإعلان عن وجودك وتعريف نفسك.



الشكل "12-1" تمثل لغة الإشارة وسيلة تواصل للأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد أو كامل في السمع.

- قبل البدء في إجراء ما، صُف أي معدات ستستخدم وموقعها بالنسبة للمريض.
- ومع تقدمك في الإجراء، اشرح ما ستقوم به وأين ستلمس المريض.
- فسر مصدر الضوضاء التي سيسمعها المريض.
- أعط توجيهات واضحة وكاملة. على سبيل المثال، قل "ارفع ذراعك الأيسر أمامك مباشرة بزاوية 45 درجة"، وليس "ارفع ذراعك هكذا" أو "ارفع ذراعك".
- دع المريض يعرف متى تقادر المنطقة.
- إذا كان المريض سيغادر دون مرافق، فقم بإعطائه إرشادات محددة حول المداخل والمعالم والعقبات الأخرى التي سيواجهها، مثل الأسطح غير المستوية.



- أُعطي معلومات إضافية شفوياً لوصف أي شيء يمكن التعبير عنه عادة من خلال تعابير الوجه، والإشارات، وإيماءات الرأس، والحركات الأخرى.

المرضى المصابون باضطرابات كلامية

Patients With Speech Impairments

من المحتمل ألا يقدر المرضى على الكلام بسبب إصابة، أو سكتة دماغية، أو حالة عصبية أخرى. يمكن أن تكون الحالة مؤقتة، كما هو الحال عند استخدام منفحة أو مجرب هواء اصطناعي. يصاب المرضى غير القادرين على التعبير عن أنفسهم بالقلق، والإحباط، وحتى الذعر. تقييد الأمور التالية في إجراء التواصل: استخدام التمثيل الإيمائي، والصور، والرسومات، والكتابة، ولوحات التواصل المصممة خصيصاً لهذا الغرض والتي تحتوي على أكثر طلبات المرضى شيوعاً التي يمكنهم الإشارة إليها ببساطة.

فقدان القدرة على الكلام أو **الحبسة الكلامية Aphasia** هي حالة يجد فيها الفرد صعوبة في فهم وإنفاس اللغة. تراوح المشكلة من الصعوبات الخفيفة مثل صعوبة إيجاد الكلمة الصحيحة إلى صعوبات شديدة في فهم وإنفاس اللغة، ويمكن أن تكون نتيجة لفقدان وظائف المخ، كما في حالة مرض الزهايمر. فيما يلي بعض الأساليب لتحسين التواصل عند الأشخاص المصابين بالحبسة الكلامية:

- أزل الضوضاء والمشتتات.
- استخدم لغة الكبار. لا تعامل المرضى وكأنهم أطفال.
- اطرح أسئلة "نعم" و"لا".
- أعط خيارات واضحة للإجابات الممكنة.
- استخدم الإشارات المرئية، مثل: بطاقات الصور.
- شجع المريض على التواصل معك عبر الإيماءات والرسومات والحديث.
- تحقق من الفهم.



المرضى الغاضبون

Patients Who Are Angry

يمثل الغضب الاستجابة العاطفية للاستياء أو الانزعاج الشديد بسبب خطأ متصور. يمكن أن يسبب المرض أو الإصابة، والقلق بشأن نفقات الرعاية الصحية، والإزعاج من الاضطرار لانتظار الخدمة، إلى غضب المريض وخسارته للسيطرة على ذاته. يمكن أن يحدث الغضب أيضًا بسبب مشكلات لا علاقة لها بالرعاية الصحية، مثل: الصعوبات العائلية أو فقدان الوظيفة.

عند التعامل مع مريض غاضب، حاول تحديد سبب غضبه. في معظم الحالات، لا يكون الغضب بسبب أخصائي الرعاية الصحية. قد يكون الغضب شكلًا من أشكال التنبيس حين لا يكون المريض قادرًا على توجيه غضبه إلى السبب الحقيقي. ومع ذلك، إذا اكتشفت أنك فعلت شيئاً أزعج المريض، اعتذر منه بصدق وحاول التواصل معه جيدًا قاصدًا تلبية احتياجاته. عند التعامل مع المرضى الغاضبين، تكون الإرشادات التالية مفيدة:

- لا تجب بغضب ولا تجادل المريض.
- ابق هادئاً ومهذباً.
- استمع باهتمام إلى مخاوف المريض.
- قدّم اعتذاراً صادقاً إذا لزم الأمر.
- لا ترفع صوتك.
- انتبه إلى لغة جسديك، وراقب المريض.
- أظهر الحرص والاهتمام، وليس الانزعاج.
- أجب عن أسئلة المريض.
- إذا لم تتمكن من حل المشكلة، فناقشها مع مشرفك أو أي شخص آخر مناسب.
- إذا كان المريض يسب أو يسيء لفظياً، فوضح بأدب أنك على استعداد لسماعه ولكنك لن تسامح مع لغة الشتائم أو التهديد.
- اطلب مساعدة زميل في العمل أو الأمان إذا لزم الأمر.



المرضى الذين لا يتكلمون اللغة العربية

Patients Who Do Not Speak Arabic

تخيل نفسك سائحاً في بلد لا تتحدث لغته، حيث تختلف ممارسات الرعاية الصحية عن تلك الموجودة في بلدك ثم تعرضت لحادث وأسعفت إلى مستشفى حيث لا تتحدث أحد فيه لفتك، ولا يمكنك شرح احتياجاتك، أو مكان الألم، أو طرح أسئلة حول حالتك، وتختلف العلاجات فيه عن أي شيء جربته من قبل، ستكون مضطرباً، وهذا بالضبط شعور المريض الذي لا يتكلم العربية. يمكن لأخصائي الرعاية الصحية إظهار التعاطف والاهتمام بهؤلاء المرضى من خلال تعلم بعض العبارات الشائعة على الأقل من اللغات الرئيسية المستخدمة في مجتمعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تكون الأفكار التالية مفيدة عند التعامل مع المرضى غير الناطقين باللغة العربية:

- ابتسِم، الابتسامة إشارة عالمية على حسن النية.
- حدد ما إذا كان المريض يتحدث أو يفهم أي كلام باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.
- اكتشف ما إذا كان أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء، الناطقين بالعربية أو الإنجليزية، متاحاً للمساعدة. (تأكد من أن المريض يوافق على إشراكه حتى لا تنتهك الخصوصية.)
- تحدث ببطء ووضوح.
- لا ترفع صوتك، لن يساعد ذلك الشخص الآخر على الفهم.
- استخدم كلمات وجملًا بسيطة.
- لا تستخدم لغة عامية أو تعبيرات يتحمل إساءة فهمها.
- حاول تكرار رسالتك بكلمات مختلفة.
- استخدم الإيماءات والتمثيل الإيمائي لتوضيح ما تريد أن يفعله المريض.
- اكتب الرسالة.
- استخدم الصور إذا كانت متوفرة.
- اطلب خدمات مترجم فوري إذا لزم الأمر.

اخبر معلوماتك

1. كيف يجب أن تجيب الممرضة على المريض القلق؟
2. ما أفضل طريقة للتعامل مع المريض الغاضب؟



فهم احتياجات المريض الفردية

Understanding the Patient as an Individual

تعتبر معاملة كلّ مريض كفرد مستقلّ بذاته مكوناً أساسياً للرعاية الجيدة. يجب صون كرامة المرضى والسعى جاهداً لتقدير تجاربهم واحتياجاتهم خلال الفترة العصيبة من المرض أو الإصابة. وتعتمد جدوى تفاعلات أخصائي الرعاية الصحية مع المرضى وتواصله معهم إلى حد كبير على فهم واحترام الفروق الفردية بينهم. يمكن أخصائيي الرعاية الصحية من تلبية احتياجات المرضى بشكل أفضل عن طريق استيعاب عقلياتهم المتنوعة. وهناك العديد من الأساليب للتعرف على المريض كفرد مستقلّ الكيان:

- راقب سلوك المريض وطراائق تفاعله مع الآخرين من حيث:

- التواصل البصري.
- درجة الرسمية في المحادثة وحركات الجسم.
- المؤشرات العاطفية الخارجية كالعصبية، أو الخوف، أو الشك.
- حضور أفراد الأسرة.
- التفاعلات مع أفراد الأسرة.
- رد فعل على اللمس والتلامس الشخصي القريب.

- حدد ما إذا كانت حواجز اللغة موجودة أم لا:

- أسأل المريض عن اللغة التي يرتاح لاستخدامها.
- أسأل عن اللغة التي يفضلها للمعلومات المكتوبة.
- أسأل عن حاجة المريض إلى مترجم فوري عند مناقشة معلومات الرعاية الصحية والعلاجات.

- اطرح أسئلة لتحديد التفضيلات الفردية:

- ماذا تفعل للبقاء بصحة جيدة؟
- ماذا تفعل عادةً عندما تكون مريضاً أو لا تشعر بشكل جيد؟
- إلى من تلجأ أولاً لطلب المساعدة في المشكلات الصحية؟
- من سيساعدك في المنزل إذا احتجت إلى المساعدة؟
- في التعامل مع هذا المرض / الإصابة، ماذا تتوقع من فريق الرعاية الصحية ومن نفسك؟
- برأيك، ما العامل الأكثر أهمية في شفائك؟
- هل تود إخباري بأي شيء ممكن أن يساعدنا في فهم احتياجاتك؟
- استمع بعناية لردود المريض.



- بناءً على ما تعلمته، اشرح ما تفعله ولماذا، عند تنفيذ الإجراءات أو عند طرح الأسئلة التي قد تكون صعبة على المرء.

إلى جانب إدراك الاختلافات الفردية، سيساعدك فهم الدوافع البشرية وال الحاجة لصون تقدير الذات على التواصل بشكل فعال، وتقديم الرعاية المناسبة، ومراقبة لغة الجسد، وإنشاء رسائل واضحة. وفيما يلي دليل موجز للتعامل مع المرضى كأفراد مستقلين:

- تعلم فهم المريض كفرد مستقل، بما في ذلك كيفية تأثير حاليه أو مرضه عليه، وكيف تؤثر ظروف الشخص على علاجه وصحته على المدى الطويل.

● تأكد من معالجة العوامل، مثل: الإعاقات الجسدية أو صعوبات التعلم، ومشكلات البصر، والكلام، والسمع، القراءة، والفهم، أو التحدث باللغة العربية، بحيث يكون المريض قادرًا على المشاركة على أكمل وجه ممكن في الاستشارات والرعاية.

● اسأل المريض عن أي عوامل، مثل: الوضع المنزلي، والاجتماعي، والعمل، وتجاربه السابقة في مجال الرعاية الصحية، والتي من المحتمل أن تؤثر على حالته الصحية وقدرته أو استعداده للانخراط في خدمات الرعاية الصحية، وتمسّ قدرته على تدبر أمور رعايته، واتخاذ قرارات بشأن الإدارة الذاتية وخيارات نمط الحياة.

● استمع إلى أي معتقدات، ومخاوف، وتفضيلات صحية لدى المرضى وناقشها، وأبقي في الحسبان أن هذه العوامل تؤثر على تفاعلهم مع العلاج وتقبلهم له من عدمه. احترم آرائهم وقدم الدعم لمساعدتهم على الانخراط بفعالية في خدمات الرعاية الصحية والمشاركة في الإدارة الذاتية كلّما سنت الفرصة.

● تجنب وضع افتراضات حول المريض بناءً على مظهره أو سماته الشخصية الأخرى.

● إذا كان ذلك الأمر ملائماً، فناقش مع المريض حاجته للدعم النفسي، أو الاجتماعي، أو المالي. وفر له الدعم والمعلومات وأرشده إلى المصادر التي تقدمها. راجع ظروفه وحاجته للدعم بانتظام.

اخبر معلوماتك

1. ما الأمور التي تؤثر على تفاعل و التواصل أخصائي الرعاية الصحية مع المرضى بشكل فعال؟
2. ما الإجراءات التي ستساعدك على التواصل بشكل فعال وتقديم الرعاية المناسبة؟



بحث اليوم الرعاية الصحية في المستقبل

والاكتشاف الآخير كان عندما زرع الحُصين الاصطناعي مع أقطابه الكهربائية في الحيوانات ذات الوظائف الطبيعية، عزز الجهاز الذاكرة قيد التشكيل. ويعمل فريق البحث الآن مع فريق من الأطباء لزراعة الحُصين الاصطناعي في المرضى كجزء من الإجراءات التشخيصية الطبية لداء الصرع. أثناء وجود الأقطاب الكهربائية في مكانها، أجريت اختبارات الذاكرة، وتمكن الفريق إظهار ما يصل إلى 37% من التحسن في وظائف الذاكرة. يُجرى الآن المزيد من الأبحاث لتخصيص النسيج الحي المزروع، واختبار رموز الذاكرة لتجري إمكانية الاحتفاظ بالذكريات لفترة من الزمن.

إذا نجح هذا البحث، تصبح إمكانية صنع عضو صناعي قابل للزراعة بشكل دائم في البشر متاحة. يمكن لهذا مساعدة ضحايا مرض الزهايمر، أو السكتة الدماغية، أو أذية الدماغ على استعادة الذاكرة المفقودة وتحسين الوظائف العقلية. فضلاً عن ذلك، إذا كان استخدام العضو الاصطناعي لقمع الذكريات ممكناً، يتحمل أن يكون للجهاز دورٌ في علاج الأفراد المصابين باضطراب ما بعد الصدمة أو حالات نفسية أخرى، مثل المخاوف الناجمة عن ذكرة سابقة. ورغم أن هذا البحث سيطلب عدة سنوات أخرى من الدراسة بسبب الطبيعة المعقدة للذاكرة البشرية، إلا أنه إذا نجح، سيشكل نقلة نوعية في حياة الكثير من الأفراد.

استعادة الذكريات بضغط زر؟

هل تمنى أن تتذكر أسماء الأشخاص الذين قابلتهم من قبل في أي وقت؟ أليس مثيراً أن تكون قادرًا على تشغيل الذكريات وإيقافها بضغط زر؟ يمكنك التخلص من كل ذكرياتك السيئة وتعزيز ذكرياتك الجيدة، ولا يستبعد حدوث ذلك يوماً ما.

اكتشف فريق من مهندسي الطب الحيوي كيفية التعامل مع خلايا الدماغ في الفئران بحيث يمكن تنشيطها أو قمعها. تناولت الدراسة منطقة في الدماغ تسمى الحُصين، وهي منطقة مهمة لتشكيل الذكريات. أدخل الفريق مجسات كهربائية في الحُصين، ثم علموا الفئران اكتشاف أي واحدة من عدة رافعات، يمنح ضغطها مكافأة. وأثناء عملية التعلم، سجل الباحثون تغيرات في نشاط دماغ الفئران بين قسمين داخليين رئيسيين في الحُصين، مناطق فرعية معروفة باسم CA3 وCA1، ووجدوا أن هذه المناطق الفرعية تتفاعل لتحويل الذاكرة القصيرة إلى طولية الأمد.

استخدم العلماء المجسات الكهربائية لتحفيز الأعصاب، ولمسوا تحسناً في أداء الفئران، واستطاعت الفئران أن تتذكر الرافعه الصحيحة لمدة زمنية أطول. للتحقق من إمكانية قمع الذاكرة، أعطى الباحثون الفئران دواء يعيق نشاط الخلايا العصبية، و يجعلهم ينسون المهمة. بعدها، أنشأ فريقاً نظاماً اصطناعياً استنسخ نمط التفاعل في الحُصين. عندما أدخل هذا النظام في الحيوانات وحفّزت خلايا الدماغ بالنمط الصحيح، عادت الذاكرة طولية الأمد.

خلاصة دراسة الحالة

راسمي متواترة للغاية بشأن ما قد تعنيه طبيعة الكتلة الموجودة بصدرها، وتخشى أنها مصابة بسرطان الثدي. هل كنت قادرًا على وضع إستراتيجية لمساعدة راسمي؟ كيف يمكنكطمأنتها بشأن العملية؟ هل راعيت احتياجات ابنتها أيضًا؟



ملخص الفصل 1

- التواصـل الجـيد ضروري لتقديـم رعاـية صـحـية آمنـة وفعـالة، يتطلـب تحـديد العـوـائق والتـغلـب عـلـيـها استـخدـام التـعـاطـف، والـمـلاـحظـة، والأـسـئـلة، والتـغـذـية الـراـجـعة.
- تـعـتـبر معـاـمـلـة كلـ مـريـض كـفـرـد مـسـتـقـلـ مـكـونـاً أـسـاسـيـاً للـرـعاـية الجـيدة.
- يـقـدم أـخـصـائـيـو الرـعاـية الصـحـية خـدـمـات قـيمـة تمـثـل إـسـهـاماً كـبـيرـاً فـي المـجـتمـع. حـرـيـ بهـم أـخـذ عـمـلـهـم عـلـى مـحـمـلـ الجـدـ؛ لأنـه يـؤـثـر عـلـى سـلـامـة وـصـحة الآـخـرـين.
- يـمـكـن تـطـبـيقـ الصـفـاتـ الـأسـاسـيـةـ لـأـخـصـائـيـ الرـعاـيةـ الصـحـيةـ النـاجـيـنـ فـيـ الفـصـولـ الـدـرـاسـيـةـ،ـ وـالـمـختـبـرـ،ـ وـالـمـوقـعـ السـرـيرـيـ.
- مـهـارـاتـ التـفـكـيرـ الـفـعـالـ وـالـقـدرـةـ عـلـىـ حلـ الـمـشـكـلاتـ سـمـاتـ أـسـاسـيـةـ فـيـ أـخـصـائـيـ الرـعاـيةـ الصـحـيةـ الـمـتـمـكـنـ.

حـالـة درـاسـيـة بـسيـطـةـ 1:1 المـمـرـضـ اللـطـيفـ

سـالمـ مـمـرـضـ حـدـيـثـ التـخـرـجـ، عـيـنـ فـيـ عـيـادـةـ الأـوـرـامـ فـيـ مـسـقـطـ رـأـسـهـ،ـ وـيـتـعـاملـ مـعـ مـرـضـيـ مـصـابـيـنـ بـأـمـراضـ خـطـيرـةـ.ـ يـتـسـمـ ذـلـكـ بـالـصـعـوبـةـ لـأـنـهـ يـعـرـفـ كـثـيرـيـنـ مـنـهـمـ وـعـائـلـاتـهـمـ مـنـذـ سـنـوـاتـ عـدـيـدةـ.ـ يـجـدـ نـفـسـهـ يـتـسـاءـلـ كـيـفـ بـإـمـكـانـهـ التـواـصـلـ مـعـهـمـ بـشـكـلـ أـفـضـلـ.ـ يـرـيدـ مـنـهـمـ أـنـ يـعـرـفـواـ أـنـ يـهـتـمـ وـيـرـغـبـ مـسـاعـدـتـهـمـ،ـ لـكـنـهـ غـيرـ وـاثـقـ بـكـيـفـيـةـ التـصـرـفـ مـعـ مـاـ يـعـقـدـ أـنـهـ مـوـاقـفـ عـاطـفـيـةـ،ـ وـيـجـدـ نـفـسـهـ قـلـيلـ الـكـلامـ.

الـتـحـلـيلـ

1. كـيـفـ يـعـاـمـلـ سـالمـ مـرـضـيـاـ يـعـرـفـهـ شـخـصـيـاـ أـوـ يـعـرـفـ أـسـرـتـهـ؟

2. كـيـفـ يـمـكـنـ أـنـ يـسـتـخـدـمـ سـالمـ خـطـوـاتـ عـمـلـيـةـ التـواـصـلـ لـمـسـاعـدـتـهـ عـلـىـ الشـعـورـ بـثـقـةـ أـكـبـرـ فـيـ التـواـصـلـ مـعـ الـمـرـضـيـ؟

3. ماـ التـقـنيـاتـ الـتـيـ سـتـسـاعـدـهـ عـلـىـ الشـعـورـ بـثـقـةـ أـكـبـرـ فـيـ أـنـ مـرـضـاهـ فـهـمـواـ مـاـ يـقـولـهـ لـهـمـ؟



حالة دراسية بسيطة 2:1 مريض مشوش

نور ممرضة مساعدة تعمل مع طبيب عيادة محلية. أخبرها الطبيب أن يونس، أحد مرضى، يواجه صعوبة في تذكر تناول دواء ضغط الدم بانتظام. يعيش يونس مع أبنائه وأحفاده، وجميعهم مشغولون جدًا. يود الطبيب أن تساعد نور يونس على استخدام إستراتيجيات لتذكر أدويته.

التحليل

1. ما المشكلة المحتملة هنا؟ وكيف يجب على نور التعامل معها؟

2. هل يجب على نور إشراك أسرة يونس في حل المشكلة؟ كيف يمكنهم المساعدة؟

3. ما الذي يجب على نور إبلاغ الطبيب به؟

حالة دراسية بسيطة 3:1 مريض ضعيف السمع

صفا مساعدة طبية في عيادة محلية. المريضة التالية، مها، تعاني من ضعف متوسط الشدة في السمع، وتقابل الطبيب لإجراء فحص طبي روتيني. تحتاج صفا إلى سؤال مها عن تاريخها المرضي الحديث وقياس ضغط دمها حسب توصيات الطبيب.

التحليل

1. كيف يمكن لصفا التواصل مع مها؟

2. ما المعلومات التي تحتاج صفا إلى جمعها عن مها؟

3. ما العوامل المهمة التي يجب على صفا مراعاتها في تحضير رسالتها؟



أسئلة المراجعة

1. ما الصفات الست الأساسية التي يجب على كلّ أخصائي رعاية صحية إظهارها؟

2. صف أربع طرائق يمكن للطلاب من خلالها تحسين تقنيات الدراسة.

3. ما الخطوات الخمس في عملية حلّ المشكلات؟

4. ما الفرق بين البيانات الذاتية والبيانات الموضوعية؟ ماذا ندعوها عند التعامل مع المرضى؟



5. ما العوامل الشخصية الستة الواجب مراعاتها عند اختيار مهنة الرعاية الصحية؟

6. ما العوامل الثلاثة التي عزّزت الحاجة إلى التواصل الفعال في مجال الرعاية الصحية؟

7. ما الطرائق الأربع لتبادل الرسائل؟

8. ما العوامل الأربعة التي يجب مراعاتها حول المرضى عند وضع أهداف التواصل؟ أعط مثلاً لكل واحد.



٩. ما العوامل البيئية الخمسة التي تؤثر على الاتصال؟

١٠. ما الإجراءات الخمسة التي يمكن للأخصائي الرعاية الصحية اتخاذها للتعرف على مرضاهم كأفراد مستقلين؟



التفكير الناقد

1. ماذا يعني "التفكير كأخصائي رعاية صحية"؟ ما أهمية هذا السلوك؟

2. لماذا يعتبر التواصل الفعال مهمًا في تقديم الرعاية الصحية؟

3. فكر في كيفية تواصلك مع زملائك، ومعلميك، وعائلتك. ما تقنيات التواصل التي تستخدمها؟ هل هي فعالة؟
كيف يمكنك تحسين فعاليتك؟

التمرينات

1. ضع خطة شخصية لتطوير الصفات الجوهرية الأساسية التي يجب أن يتحلى بها أخصائيو الرعاية الصحية.
2. اصنع ملصقاً يوضح الخطوات الست في عملية التواصل.

الفصل

2

رابط المدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

دراسة حالة

تعيش ريم مع جدتها مريم البالغة من العمر 87 عاماً وتعتني بها بينما كانت تدرس في كلية التمريض. فقدت جدتها حاسة السمع، وضعف بصرها، وفقدت أيضاً وزنها، وقوتها، وقدرتها على التحمل. تحب مريم الاختلاط بالناس، ولكن زوجها والعديد من أصدقائها قد توقفوا. أصبحت تنسى ولم تعد تخرج من المنزل؛ وتشتاق للقاء أصدقائها. في نهاية الفصل، سُيُطلب منك سرد طرائق التي تمر بها مريم من التغيرات الجسدية والعاطفية للشيخوخة.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل، ستكون قادراً على:

- التقرير بين الخرافات والحقائق للجوانب المختلفة من الشيخوخة.
- تحديد اثنين على الأقل من التغيرات الجسدية الناجمة عن الشيخوخة في كل جهاز من أجهزة الجسم.
- عرض طرائق تقديم الرعاية لشخص مسن يعاني من التغيرات الجسدية المصاحبة للشيخوخة.
- ذكر خمسة عوامل تسبب التغيرات النفسية الاجتماعية المصاحبة للشيخوخة.
- وصف ست طرائق على الأقل لمساعدة الشخص المسن في التكيف مع التغيرات النفسية والاجتماعية.
- وصف أسباب وتأثيرات التشوش والتوهان لدى كبار السن.
- وضع برنامج التوجيه للواقع.


المصطلحات الرئيسية

التبول الليلي Nocturia	عسر البلع Dysphagia	التهاب الشعب الهوائية Bronchitis	مرض الزهايمر Alzheimer's Disease
هشاشة العظام Osteoporosis	ضيق التنفس Dyspnea	إعتام عدسة العين (ال الساد) Cataracts	تصلب الشرايين Arteriosclerosis
التجيئ للواقع Reality Orientation	انفاس الرئة (النفّاخ) Emphysema	سكتة دماغية وعائية Cerebrovascular Accident	التهاب المفاصل Arthritis
النمش الشيخوخي Senile Lentigines	الزَّرق (المياه الزرقاء) Glaucoma	الهذيان Delirium	التصلب العصيدي Atherosclerosis
الخثرة (الجلطة) Thrombus	السلس البولي Incontinence	الخرف Dementia	الاستقلالية Autonomy


نوبة نقص التروية العابرة
Transient Ischemic Attacks (TIAs)

المقدمة

خلص مسح أجرته الهيئة العامة السعودية للإحصاء في عام 2017 (مسح كبار السن السعودي) إلى أن هناك 1,050,885 شخصاً يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر يعيشون في المملكة العربية السعودية، ويشكلون 3.23% من إجمالي السكان. ويُتوقع اليوم أن يعيش معظم الأشخاص حتى السبعينيات من عمرهم، ويتمتع العديد من الأفراد بحياة صحية وسعيدة في الثمانينيات والتسعينيات من العمر (الشكل "1-2 أ"). وتعيش النساء عموماً لفترة أطول قليلاً من نظرائهم الذكور في كل فئة عمرية مقابلة (الشكل "1-2 ب"). وتستخدم هذه الفئات العمرية خدمات الرعاية الصحية بشكل متكرر، لذلك من الضروري أن يفهمن مقدم الرعاية الصحية الاحتياجات الخاصة لكبار السن.



الشكل 1-2 أ النسبة المئوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً في المملكة العربية السعودية والمحددين في المسح السعودي لكبار السن لعام 2017.



الشكل 1-2 ب الفرق في النسب المئوية للرجال والنساء الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر والمحددة في المسح السعودي لكبار السن لعام 2017.

الشيخوخة هي عملية طبيعية تؤدي إلى تغيرات طبيعية في بنية الجسم ووظيفته. وعلى الرغم من أن قلة من الناس يرثبون في التقدم في العمر، إلا أن الشيخوخة حدث طبيعي في حياة الجميع. ويعرف "علم الشيخوخة" بأنه الدراسة العلمية للشيخوخة والمشكلات التي تصيب كبار السن. بينما تعرف "رعاية المسنين" بأنها الرعاية المقدمة لكبار السن. وقد أثبتت دراسة الشيخوخة والتقدم في السن الكثير من الحقائق المتعلقة بهذه المرحلة العمرية، لذلك من الضروري أن يكون مقدم الرعاية الصحية قادرًا على التمييز بين الحقيقة والخرافة عند تقديم الرعاية للمسنين.

- الخرافة:** أي شخص فوق عمر معين، مثل عمر الـ 65، هو "مسنّ".

- الحقيقة:** يعتمد تحديد عمر الفرد بدرجة قليلة على عدد السنوات التي عاشها ويتحدد بدرجة أكبر حسب طريقة تفكيره، وشعوره، وسلوكه. على سبيل المثال، بالنسبة لطفل يبلغ من العمر 10 أعوام، فإن من يبلغ من العمر 35 عاماً هو كبير بالسن. من المهم تذكر أن معظم الأشخاص يتمتعون بالنشاط، والإنتاجية، والاكتفاء الذاتي وهم في الثمانينيات وحتى التسعينيات من العمر. وفي كثير من الأحيان، يصبح المصطلح "كبير السن" مرادفاً لمصطلح "لا قيمة له" أو "منهك". لذلك من الأفضل استخدام مصطلح "ذى خبرة أو ناضج".

- الخرافة:** كبار السن غير مؤهلين وغير قادرين على اتخاذ القرارات أو التعامل مع شؤونهم الخاصة.

- الحقيقة:** قد يتخد الأفراد المسنون قرارات وأحكاماً أفضل من غيرهم؛ لأنهم كثيراً ما يبنون قراراتهم على سنوات عديدة من الخبرة والمعرفة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أثبتت الدراسات أن كبار السن قادرون على التركيز، وتعلم مهارات جديدة، وتقييم المعلومات الجديدة.

- الخرافة:** يفقد جميع المسنين ذاكرتهم.

- الحقيقة:** ليس من المحتمل أن تفقد وظيفة الذاكرة مع تقدمك في العمر. في المسح السعودي للمسنين عام 2017، كان 1.2% فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً يعانون من مرض الزهايمر. هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتدريب عقلك والحفاظ على ذاكرتك، مثل حل الكلمات المتقاطعة أو الألغاز المعقدة. وعلى الرغم من أن بعض كبار السن يعانون من التشوش والارتباك، إلا أن غالبيتهم يظلون مؤهلين عقلياً إلى حين وفاتهم.

- الخرافة:** أن تصبح مسناً، يعني أن تكون مريضاً أو معاقة.



- **الحقيقة:** إن معظم الأفراد المسنين يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام؛ وذلك بفضل اتباع أنماط الحياة الصحية، ونظم التغذية الجيدة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والرعاية الصحية الوقائية، والأدوية الجديدة، والتقدم التكنولوجي. إن الوصول بسهولة إلى الرعاية الصحية، والحد من التوتر، والحفاظ على وزن مناسب للجسم تعتبر عوامل إضافية يمكن أن تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة. كما أدى التقدم في تشخيص وعلاج أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والحالات المزمنة المماثلة إلى تحسين الصحة العامة للمسنين. وكثيرٌ من الأشخاص الذين بلغوا سن الثمانينيات والتسعينيات لا يعانون من أي إعاقات أو أمراض كبيرة، ويتمتعون بنوعية حياة جيدة.
- **الخrafة:** لا يرغب كبار السن في العمل - أي أن هدف كبار السن هو التقاعد، وقبل التقاعد فإنهم يفقدون شففهم بالعمل.
- **الحقيقة:** يظل العديد من الأفراد متجين في سن السبعينيات وحتى الثمانينيات من العمر (الشكل "2-2"). وفي المملكة العربية السعودية، يواصل 22% من الرجال المسنين العمل بعد عمر 65 عاماً. وقد أظهرت الدراسات أن الموظف، الأكبر سناً لديه التزام جيد بالحضور، و يؤدي المهام بكفاءة، ويتعلم مهارات جديدة بسهولة. أرباب العمل الذين ينشدون الأخلاقيات الجيدة والخبرة في موظفيهم

الشكل "2-2" يظل العديد من الأفراد متجين في سن السبعينيات وحتى الثمانينيات من عمرهم.



يوظفون الأشخاص الأكبر سنًا في كثير من الأحيان. قد لا يرغب العديد من الأفراد المتقاعدين العمل بوظيفة بدوام كامل، وإنما يعودون إلى وظائف بدوام جزئي أو يعملون مستشارين أو متطوعين.

● **الخرافة:** الأشخاص المتقاعدون ليس لديهم ما يفعلونه بحياتهم.

● **الحقيقة:** يتمتع العديد من الأشخاص المتقاعدين بحياة كاملة ونشطة. ويشاركون في السفر، والهوايات، والرياضة، والنشاطات الإجتماعية، والمناسبات العائلية، وأنشطة المجتمع. وفي المسح السعودي للمسنين، وُجد أن العديد من كبار السن يقومون بالعمل التطوعي في المجالات الدينية، والاجتماعية، الثقافية، وغيرها من مجالات الحياة.

اختبار معلوماتك

1. ما تعرّف علم الشيخوخة؟
2. لماذا تتمتع نسبة كبيرة من كبار السن بصحة جيدة بشكل عام؟

2:2 التغييرات الجسدية الناتجة عن الشيخوخة

Physical Changes in Aging

مع حدوث الشيخوخة، تحدث بعض التغييرات الجسدية في جميع الأفراد ويعتبر ذلك جزءاً طبيعياً من عملية الشيخوخة. من المهم ملاحظة أن معظم التغييرات تحدث بصورة تدريجية وعلى مدى فترة زمنية طويلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل ودرجة التغير تختلف من شخص إلى آخر. وتتأثر البنية الجسدية ووظائف الجسم بالأمراض ويمكن أن تزيد من سرعة ودرجة حدوث تغييرات الشيخوخة. ويمكن أن يكون لنمط الحياة، والتغذية، والبيئة الاجتماعية، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الطبية تأثيرات أيضاً.

تؤدي معظم التغييرات الجسدية في الشيخوخة إلى ضعف وظائف أجهزة الجسم؛ حيث تباطأ عمليات الجسم ويحدث انخفاض مماثل في مستوى الطاقة. وبالتالي، إذا استطاع الفرد تمييز هذه التغييرات باعتبارها جزءاً طبيعياً من الشيخوخة، يمكنه أن يتعلم التكيف مع هذه التغييرات والتعامل معها.



الجلد وملحقاته Integumentary System

تظهر بعض الآثار الأكثر وضوحاً للشيخوخة على الجلد وملحقاته (الطبقة الخارجية للجسم - الجلد، والشعر، والأظافر، والغدد) (الشكل "3-2"):

- ينخفض إنتاج خلايا الجلد الجديدة مع التقدم في العمر.
- تصبح الغدد الدهنية (الزيتية) والغدد العرقية (المفرزة للعرق) أقل نشاطاً.



الشكل "3-2" تظهر بعض الآثار الأكثر وضوحاً للشيخوخة على الجلد

- ينخفض الإمداد الدموي إلى الجلد ويسبب برودة البشرة وجفافها، وضعف التئام الأنسجة المتأذية.
- يفقد الشعر لونه ويحدث تساقط الشعر.
- يؤدي الانخفاض في وظائف الجسم إلى تغيرات جسدية أو هيكلية:
 - يصبح الجلد جافاً، وهشاً، وأقل مرنة، مما يجعله عرضة للتشققات والإصابات.
 - تصبح الحكة شائعة.
- تظهر بقع لونها أصفر داكن أو بني، تسمى **النمث الشيخوخي** Senile Lentigines.
- تظهر الخطوط والتجاعيد عندما يتناقص هيكل طبقة الأنسجة الدهنية للجلد.
- تصبح الأظافر سميكة، وقاسية، وهشة.



- يؤدي تراجع الأنسجة الدهنية وضعف الدورة الدموية إلى شعور بالبرودة بصورة متكررة لدى كبار السن، ويتمثل انخفاض حرارة الجسم عن المستوى الطبيعي مشكلة خطيرة في كبار السن.

لذلك، فإن العناية الجيدة بالجلد، والأظافر، والشعر ضرورية:

- يجب استخدام الصابون الخفيف لأن العديد من أنواع الصابون قد تسبب الجفاف، ويوصى بزيوت الاستحمام أو مستحضرات الترطيب لمكافحة الجفاف والحكمة.
- يمكن للاستحمام بصفة يومية أن يلعب دوراً في جفاف البشرة والحكمة، فيوصى بالاستحمام أو الغسل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع مع الاستحمام الجزئي في أيام أخرى.
- يساعد تمشيط الشعر على تحفيز الدورة الدموية وإفراز الزيوت.
- يجب العناية بأي قرحة أو إصابة جلدية على الفور، ومن المهم الحفاظ على المنطقة المصابة نظيفة وخالية من العدو.
- يجب على كبار السن طلب المساعدة الطبية عند ملاحظة أي قرح أو إصابات غير ملائمة.
- يحتاج كبار السن إلى رفع درجة حرارة الغرفة عن درجة الحرارة العادبة وأن تكون محمية من تيارات الهواء.

إن اتباع نظام غذائي مناسب، وممارسة التمارين الرياضية، وعادات النظافة الجيدة، وتقليل التعرض لأشعة الشمس، واستخدام كريمات واقيّة من أشعة الشمس في الهواء الطلق، والعناية بالبشرة يمكن أن يساعد في إبطاء أو حتى تقليل التغييرات الفيزيائية الطبيعية في الجلد وملحقاته.



الشكل 4-2 يجب تشجيع الأشخاص المسنين على ممارسة الرياضة بالقدر الذي تسمح به حالتهم الجسدية.

الجهاز العضلي الهيكلي Musculoskeletal System

ت فقد العضلات النغمة العضلية، والحجم، والقوه مع التقدم في العمر. ومن أمثلة أمراض التنسكس الشيغوخى:

- **هشاشة العظام Osteoporosis**، هي فقدان الكالسيوم والمعادن الأخرى من العظام، مما يجعل العظام هشة وأكثر عرضة للكسر أو الشرخ.
- **التهاب المفاصل Arthritis**، يجعل المفاصل متيبسة، ومؤلمة، وأقل مرونة. ويصبح القفص الصدري أكثر صلابة، وتقترب عظام العمود الفقري من بعضها (تضغط). تؤدي هذه التغيرات الجسدية والهيكلية في كبار السن إلى نقصان الطول تدريجياً، ونقص وظيفة العضلات وقدرتها على الحركة وضعفها. فتصبح الحركة أبطأ والشعور بالارتفاع أضعف، والتعرض للسقوط سهلاً، مما يؤدي أحياناً إلى الإصابة بكسر في الوركين، أو الذراعين، أو الساقين، كما تصبح الحركات الدقيقة للأصابع، مثل غلق أزرار الملابس أو ربط الحذاء، صعبة على الشخص المسن.
- ينبغي تشجيع كبار السن على ممارسة التمارين الرياضية بالقدر الذي تسمح به حاليهم الجسدية (الشكل "4-2")؛ فهذا يساعد على الاحتفاظ بنشاط العضلات ومراعاة المفاصل بقدر الإمكان، فحتى المشي البطيء يومياً يساعد في الحفاظ على تناغم العضلات، ويمكن أن تحافظ تمارين نطاق الحركة أيضاً على قوة العضلات.
- يمكن لاتباع نظام غذائي غني بالبروتين، والكالسيوم، والفيتامينات أن يبطئ فقدان المعادن من العظام ويحافظ على بنية العضلات.
- تناول الأدوية، جنباً إلى جنب مع المدخلات اليومية من الكالسيوم وفيتامين د، يمكن أن يبطئ من تقدم هشاشة العظام.
- يجب توجيه اهتمام إضافي للبيئة حتى تصبح أكثر أماناً للشخص المسن. مثلاً قضبان التمسك في الحمام، والدرابزين في القاعات وعلى الدرج، وغيرها من الأجهزة المماثلة التي تساعد أثناء المشي.
- عندما يكون الشعور بالتوازن ضعيفاً، فإن الشخص المسن ربما يحتاج إلى الاستناد أثناء الحركة، وكثيراً ما يوصى باستخدام المشاية والعصي الرباعية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأحذية ذات النعال غير القابلة للانزلاق والكعب المسطح أن تقي من خطر السقوط، ويمكن أن تحل الشرائط والأربطة ذاتية الالتصاق محل الأزرار وأربطة الأحذية لجعل ارتداء الملابس أكثر سهولة.
- يمكن لاستشارة الطبيب، أو اختصاصي العلاج الطبيعي، أو المعالج الوظيفي تزويد كبار السن بمعلومات عن أحدث الأجهزة التكميلية وأكثرها فعالية لحفظ على الاستقلالية.



الجهاز الدوري Circulatory System

في تغيرات الجهاز الدوري، تصبح عضلة القلب أقل كفاءة في ضخ الدم إلى الشرايين، وينخفض النتاج القلبي مع التقدم في العمر. ومن الناحية البنوية، فإن الأوعية الدموية تضيق وتتصبح أقل مرونة. وربما ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى. وقد يرتفع ضغط الدم أو ينخفض.

لا يلاحظ العديد من كبار السن أي تغيرات أثناء الراحة، بينما يصبحون أكثر وعيًا بالتغييرات الوظيفية أثناء ممارسة التمارين الرياضية، أو الإجهاد، أو الإثارة والانفعال، أو أثناء المرض وغيرها من الأحداث المشابهة التي تتطلب زيادة احتياجات الجسم من الأكسجين والمواد الغذائية، وفي هذه الأثناء يشعرون بالضعف والدوار، والتنميل في اليدين والقدمين، وزيادة معدل ضربات القلب.

يجب على الأشخاص المسنين الذين يعانون من تغيرات بنوية ووظيفية في الدورة الدموية تجنب التمارين الشاقة أو الإجهاد المفرط؛ فهم بحاجة إلى فترات من الراحة خلال النهار، وإن ممارسة التمارين بدرجة معتدلة حسب قدرة الشخص على التحمل يحفز الدورة الدموية ويساعد على منع تكون **خثرة Thrombus**، أو جلطة دموية. إن ارتداء الجوارب الضاغطة، أو بنطال ضيق مضاد للانسداد، مع عدم استخدام الأربطة أو العصابات الضيقة حول الساقين، يساعد في منع تكون التخثرات الدموية. وإذا كان الفرد طريح الفراش أو مقعداً على كرسي متحرك، فإن ممارسة تمارين نطاق الحركة تساعده في تشيط الدورة الدموية. وفي حالة ارتفاع ضغط الدم، يوصى باتباع نظام غذائي قليل الملح أو الصوديوم، وفي بعض الحالات حمية قليلة الدهون، ويجب على الأفراد الذين يعانون من أمراض الجهاز الدوري اتباع خطط الحمية الغذائية والتمارين الموصى بها من قبل الطبيب.


الجهاز التنفسي Respiratory System

تصبح عضلات التنفس أضعف مع تقدم العمر، ويصبح القفص الصدري أكثر صلابة. وتصبح الحويصلات الهوائية في الرئتين أكثر رقة وأقل مرونة، مما يقلل من تبادل الغازات بين الرئتين وتيار الدم. كما تفقد القصيبات (أنابيب الهواء في الرئتين) المرونة. وتؤدي التغيرات البنوية في الحنجرة إلى زيادة حدة الصوت وضعفه. والحالات المرضية المزمنة مثل **انتفاخ الرئة Emphysema**، حيث تفقد الحويصلات الهوائية مرونتها، أو يحدث **التهاب الشعب الهوائية Bronchitis**، حيث تصبح القصيبات ملتهبة، مما يقلل من كفاءة وظيفة الجهاز التنفسي بشكل أكثر حدة.



تسبب هذه التغيرات الهيكلية معاناة الشخص المسن من **ضيق التنفس**، أو صعوبة التنفس. فيصبح التنفس أسرع، مع صعوبة في السعال وطرد الإفرازات من الرئتين، وهذا يجعلهم أكثر عرضة للإصابة ببعض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والالتهاب الرئوي. كي تكون تلك الأعراض الشيخوخية أقل شدة يوصى بالتالي:

- تعلم المبادلة بين أوقات النشاط وأوقات الراحة أمر مهم لتجنب الإصابة بضيق التنفس.



الشكل "5-2" الأفراد الذين يظلون نشطين عقليًا تتراجع قدراتهم العقلية بدرجة أقل.



الشكل "6-2" يمكن أن تساعد الأرقام الكبيرة على الهاتف الخلوي في تحسين الرؤية.

- محاذاة الجسم الجيدة وتصحيح وضعية الجسم يمكن أن يخففان من صعوبات التنفس.
- يفضل أن ينام الشخص المسن الذي يعاني من مشكلات تنفسية على وسادتين أو ثلاث وسائد لرفع الجزء العلوي من الجسم لتسهيل التنفس.
- من الضروري تجنب الهواء الملوث، مثل الموجود في الغرف المليئة بالدخان.
- يساعد التنفس بعمق، والسعال على فترات متكررة في تسليمي مجرى التنفس وزيادة سعة الرئة.
- يوصى باستخدام مضخة الأكسجين لكبار السن الذين يعانون من مشكلات وظيفية مزمنة في الجهاز التنفسي، إذ تتيح لهم تلك المضخات المتنقلة العيش بنشاط.

الجهاز العصبي Nervous System

تؤثر التغيرات الجسدية في بنية الجهاز العصبي على العديد من وظائف الجسم؛ حيث يقل تدفق الدم إلى الدماغ، ويصاحبه فقدان متزايد لخلايا الدماغ، وتتدخل هذه الخسارة في الوظيفة البنوية مع عمليات التفكير، والتفاعل، والتفسير والتذكر. وتضعف حواس التذوق، والشم، والإبصار، والسمع. وتصبح النهايات العصبية أقل حساسية، مع انخفاض القدرة على الاستجابة للألم والمحفزات الأخرى.

- في سياق حدوث هذه التغيرات البنوية والوظيفية، فقد يعاني الشخص المسن من فقدان الذاكرة. وتتأثر الذاكرة قصيرة المدى، فعلى سبيل المثال، قد لا يتذكر الفرد ما تناوله على الإفطار ولكنه يتذكر قائمة حفل تقادمه بأكملها. ولا تتأثر الذاكرة طويلة المدى والذكاء في جميع الحالات، ولكن ربما يستغرق كبار السن وقتاً أطول للرد، ولكن إذا أعطيتهم وقتاً كافياً، يمكنهم التفكير والرد بصورة مناسبة، والأشخاص الذين يظلون

نشطين عقلياً ويشاركون في الأحداث الجارية تصيبهم التغيرات العقلية بدرجة أقل (الشكل "5-2"). وقد أظهرت الدراسات أن معظم كبار السن يظلون مؤهلين عقلياً طوال حياتهم.

● **تغيرات الإبصار** تسبب مشكلات في قراءة الطباعة الصغيرة أو رؤية الأشياء عن بعد، ويحدث انخفاض في الرؤية الطرفية (الجانبية) والرؤية الليلية، كما تستغرق العينان وقتاً أطول للتكيف مع الانتقال من الضوء إلى الظلام، وتوجد حساسية متزايدة للوهج. كبار السن هم أكثر عرضة أيضاً للإصابة بـ **اعتام عدسة العين Glaucoma**، حيث تصبح العدسة الشفافة للعين خائمة أو معتمة. **Cataracts** (المياه الزرقاء) حالة تحدث فيها زيادة الضغط الداخلي للعين بدرجة تتدخل مع الرؤية وهي أكثر شيوعاً في كبار السن. وهناك إجراءات معينة كالعناية المناسبة بالعينين، وارتداء النظارات الطبية/العدسات، والعلاج الطبي لإعتام عدسة العين أو المياه الزرقاء، واستخدام أرقام كبيرة الحجم على الهاتف الجوال، واستخدام الإضاءة المناسبة، جميعها يمكن أن تساعد في تحسين الرؤية (الشكل "6-2").

● **فقدان السمع** يحدث تدريجياً في كبار السن، وقد يتحدث الشخص بصوت عالٍ أكثر من المعتاد، ويطلب تكرار الكلمات، ولا يسمع الأصوات عالية التردد مثل رنين الهاتف، وربما تكون مشكلات السمع أكثر وضوحاً عند وجود ضوضاء صاحبة في الخلفية. على سبيل المثال، قد لا يسمع الشخص المسن جيداً في مطعم مزدحم مع تشغيل الموسيقى وتحدّث الكثير من الأشخاص الآخرين، ويمكن أن تساعد سماعات الأذن في حل بعض مشكلات السمع. ولكن في حالات التلف الشديد لبنية العصب، فإن سماعة الأذن لن تعالج المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأشخاص يرفضون استخدام سماعة الأذن، وفي حالة ارتداء سماعة الأذن يجب الحفاظ عليها بحالة جيدة عن طريق تغيير البطاريات، والحفاظ على السماعة نظيفة، والتأكد من أن الشخص يرتديها بصورة صحيحة. وعند التحدث مع شخص مصاب بضعف السمع، يجب التحدث ببطء ووضوح، وتجنب التحدث بصوت عالٍ بشكل مفرط. ومواجهة الأشخاص أثناء التحدث معهم يساعد في مواقف كثيرة، وإلغاء ضوضاء الخلفية مثل أصوات الراديو أو التلفاز، يزيد أيضاً من القدرة على السمع.

● **يؤثر ضعف حاستي التذوق والشم** في كثيرٍ من الأحيان على الشهية للطعام، وغالباً ما يشكو كبار السن من أن الطعام لا طعم له ويضيفون السكر، أو الملح، أو الفلفل. ويمكن تحفيز الشهية بقائمة من الأطعمة الجذابة ذات قوام ومذاق متعدد. وقد يؤدي ضعف حاستة الشم أيضاً إلى جعل الشخص المسن أقل حساسية لروائح الغازات، والمواد الكيميائية، والدخان، والروائح الخطيرة الأخرى. ويمكن أن يساعد كاشف الدخان، وكاشفات المواد الكيميائية، والمراقبة الدقيقة للبيئة في القضاء على هذا الخطر.



● يمكن أن يؤدي انخفاض الإحساس بالألم والمحفزات الأخرى إلى الإصابات. وكبار السن أكثر عرضة للحروق، وعضة الصقيع، والجروح، والكسور، وإجهاد العضلات، والعديد من الإصابات الأخرى. في بعض الأحيان، لا يشعر كبار السن بالإصابة أو المرض لأنهم لا يشعرون بالألم. من المهم أن يتعامل كبار السن مع المواد الساخنة أو الباردة بعناية فائقة، وأن يكونوا على دراية بمخاطر البيئة المحيطة بهم.

تحدث تغيرات في بنية ووظيفة الجهاز العصبي تدريجياً على مدى فترة زمنية طويلة. ويتبع هذا وقتاً للشخص للتكيف مع التغيرات وتعلم مواكبتها. مع ذلك، فمن الضروري في بعض الأحيان أن ينضم شخص آخر للمساعدة عندما تصبح التغيرات شديدة. على سبيل المثال، لا يزال العديد من كبار السن يقودون السيارات، ولأن رادات الفعل لديهم بطيئة، فإنهم يصبحون أكثر عرضة لحوادث السيارات. عندما يبدأ على شخص مسن ضعف القدرة على القيادة، يصبح من الضروري منعه من قيادة أفراد الأسرة أو بقية القانون من القيادة.

الجهاز الهضمي Digestive System

تحتاج التغيرات الجسدية في الجهاز الهضمي عندما يقل إنتاج العصارات والإنزيمات الهاضمة، وتتصبح وظيفة العضلات أبطأ وتقل الحركة الدودية للأمعاء، وتُفقد الأسنان، وتختفي وظائف الكبد.

● **عسر البلع Dysphagia**، أو صعوبة البلع، هو شكوى متكررة عند كبار السن. وتعزى هذه المشكلة إلى نقصان كمية اللعاب وبطء منعكس الغثيان الباعومي. بالإضافة لذلك، فإن فقدان الأسنان أو استخدام أطقم الأسنان غير المناسبة يجعل مضغ الطعام بشكل صحيح أكثر صعوبة.

● من الشكاوى الأخرى الشائعة عسر الهضم، والذي ينتج عن بطء هضم الأطعمة الناجم عن نقص العصارات الهاضمة.

● شكاوى انتفاخ البطن (الغازات) والإمساك شائعة بسبب نقص الحركة الدودية للأمعاء وسوء التغذية. كما يساهم أيضاً ضعف حاسة التذوق في ضعف الشهية والحمية الغذائية.

ويمكن أن تساعد العناية الجيدة بنظافة الفم، وإصلاح أو استبدال الأسنان التالفة، وتناول الطعام في جو مريح على تحسين مضغ الطعام وهضمها. ويجد معظم كبار السن أن من الأفضل تجنب الأطعمة الجافة، والمقلية، والدهنية؛ لأن هذه الأطعمة يصعب مضغها وهضمها. يوصى بالأطعمة الغنية بالألياف والبروتين ذات الأذواق والقوام المختلف. وتحسن الشهية أيضاً مع الاستخدام المتناسب للتوازن والأعشاب



لتحسين المذاق، ومن المهم تجنب الإفراط في التوابل؛ لأنها قد تسبب عسر الهضم. ونظرًا لأن عملية الأيض تصبح أبطأ، هناك حاجة إلى عدد أقل من السعرات الحرارية للحفاظ على وزن الجسم. فالمراقبة الدقيقة للوزن مهمة للوقاية من السمنة، وزيادة تناول السوائل يجعل البلع أسهل، ويساعد في منع الإمساك، ويدعم وظائف الكلى.

الجهاز البولي Urinary System

مع التقدم في السن، تصبح الكلى أصغر حجمًا وأقل كفاءة في إنتاج البول. ويؤدي التدفق الدموي الضعيف إلى الكلى وانخفاض عدد الوحدات الكلوية (النيفرونات) إلى فقدان وظيفي للقدرة على تركيز البول، مما يسبب فقدان الكهارل والسوائل. وتقل قدرة المثانة على الاحتفاظ بالبول، وفي بعض الأحيان لا تفرغ المثانة بشكل كامل ويُحتجظ بالبول في المثانة، وهو سبب رئيس للإصابة بعدوى المثانة. قد يجد الشخص المسن أنه مضطر للتبول بشكل متكرر.

● التبول الليلي Nocturia، هو أمر شائع ويعرق نمط النوم.

● احتباس البول في المثانة يسبب عدوى والتهابات المثانة. غالباً ما يعاني الرجال من تضخم غدة البروستاتا، مما يجعل التبول صعباً ويسبب احتباس البول.

● فقدان المقوية العضلية للمثانة يؤدي إلى **السلس البولي Incontinence**، أو عدم القدرة على التحكم في التبول. قد ينتج سلس البول أيضاً عن علاج تضخم غدة البروستاتا، أو عن علاج سرطان البروستات.

يقلل العديد من كبار السن من تناول السوائل لتنقلي الحاجة المتكررة إلى التبول، وهذا يمكن أن يسبب الجفاف، والإمساك، وأمراض الكلى، والعدوى. لذا يجب تشجيع المسنين على زيادة تناول السوائل لتحسين وظائف الكلى. ولتنقلي حالات التبول الليلي، يجب تناول معظم السوائل قبل المساء. يمكن أن يساعد الذهاب المنتظم إلى دورة المياه، وارتداء ملابس سهلة الخلع، واستخدام حفاضات ماصة حسب حاجة الأشخاص الذين يعانون من سلس البول بدرجة بسيطة. ويمكن أن تساعد برامج تدريب المثانة في زيادة سعة المثانة وتؤدي إلى مزيد من التحكم في التبول المتكرر لدى الأشخاص الذين يعانون من سلس البول، وقد تكون هناك حاجة إلى وضع قسطرة مستقرة عند فقدان التحكم في التبول تماماً.

عندما تسبب التغيرات البنوية في الجهاز البولي في ضعف وظائف الكلى، يمكن أن تراكم مواد النفايات في مجرى الدم وتسبب أمراضًا خطيرة. لذلك من المهم الحفاظ على عمل الكلى بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.



جهاز الغدد الصماء Endocrine System

تؤدي تغيرات جهاز الغدد الصماء إلى زيادة إنتاج بعض الهرمونات، مثل هرمون الغدة الدرقية (الباراثورمون) والهرمون المحفز للغدة الدرقية، ونقص إنتاج هرمونات أخرى، مثل هرمون الغدة الدرقية (التيروكسين)، والإستروجين، والبروجسترون، والأنسولين. ولأن الهرمونات تؤثر على العديد من وظائف الجسم، فقد تحدث العديد من التغيرات الجسدية؛ حيث يعمل الجهاز المناعي للجسم بشكل أقل فعالية، الأمر الذي يعرض كبار السن للإصابة بالأمراض أكثر من قبل. وينخفض معدل الأيض الأساسي، مما يؤدي إلى شكاوى مثل الشعور بالبرد، والتعب، ونقص الانتباه واليقظة (الشكل "7-2"). ويمكن أن يظهر عدم تحمل الجلوكوز، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الدم.

وكما هي الحال مع أجهزة الجسم الأخرى، فإن تغيرات جهاز الغدد الصماء تحدث ببطء على مدى فترة زمنية طويلة. والعديد من كبار السن ليسوا على دراية بالتغيرات التي تحدث في هذا الجهاز. إن ممارسة التمارين بصورة مناسبة، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، والرعاية الطبية للمريض، واتباع نظام غذائي متوازن، ونمط حياة صحي تقيي جميعاً في تقليل الآثار الناجمة عن التغيرات في النشاط الهرموني.



الشكل "7-2" التدثر ببطانية قد يقي المريض الذي يشكو من الشعور بالبرد.



الجهاز التناسلي Reproductive System

يسbib انخفاض مستوى الهرمونات الأنثوية "الإستروجين، والبروجستيرون" حدوث تغيرات جسدية في جسم المرأة. وفي بعض الحالات، يؤدي ضعف الأنسجة الداعمة إلى ترهل الرحم إلى أسفل، وهو حالة تعرف باسم "التدلي". ويؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون عند الذكور أيضاً إلى تغيرات في الجسم الذكري.

الملخص Summary

تسبب الشيخوخة العديد من التغيرات الجسدية، والهيكلية، والوظيفية في جميع أجهزة الجسم. ويختلف معدل ودرجة حدوث هذه التغيرات من شخص إلى آخر، ولكن جميع الأشخاص المسنين يعانون من هذه التغيرات بدرجة ما. ويسمح توفير سُبل التكيف مع هذه التغيرات والتعامل معها لبار السن التمتع بالحياة حتى في ظل الضعف الجسدي. ومن المهم لجميع مقدمي الرعاية الصحية أن يتعلموا كيفية تمييز هذه التغيرات وتوفير طرائق للتعامل معها. إن التحمل، والتحلي بالصبر، والتعاطف أمور ضرورية في هذه الحالات.

اخبر معلوماتك

- أعط مثالين محددين لكيفية تأثر وظائف الجهاز العصبي نتيجة للتغيرات البنوية التي تؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ.
- لماذا قد يكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض؟

3:2 التغيرات النفسية والاجتماعية للشيخوخة Psychosocial Changes in Aging

بالإضافة إلى التغيرات الجسدية، يعاني كبار السن أيضاً من تغيرات نفسية واجتماعية. ويتكيف بعض الأفراد مع هذه التغيرات بفعالية، ولكن يعاني بعضهم الآخر من إحباط شديد واضطراب نفسي، ومن المهم أن يكون مقدم الرعاية الصحية على دراية بالتغيرات النفسية والاجتماعية والضغوط التي يعاني منها كبار السن.



العمل والتقاعد Work and Retirement

يقضى معظم البالغين جزءاً كبيراً من يومهم في العمل. ويربط الكثيرون شعورهم بالقيمة الذاتية مع الوظائف التي يؤدونها. ويشعرون بالفخر أن يذكروا أنهم ممرضون، أو كهربائيون، أو معلمون، أو محامون، أو مساعدون إداريون. بالإضافة إلى ذلك، فإن التواصل الاجتماعي أثناء العمل هو شكل رئيس من أشكال التفاعل مع الآخرين.

غالباً ما يُنظر إلى التقاعد على أنه نهاية سنوات العمل. ويبيّن العديد من الأشخاص قادرین على الاستمتاع بالتقاعد وإيجاد أنشطة أخرى لتحمل محل الأدوار الوظيفية؛ حيث يجد بعض الأشخاص وظائف بدوام جزئي أو وظائف استشارية بعد التقاعد من وظائفهم الأساسية. ويصبح آخرون نشطين في العمل التطوعي أو يشاركون في أنشطة المجتمع أو النادي. ويجد هؤلاء الأشخاص بدائل مرضية لمشاعر تقدير الذات التي كانت توفرها لهم الوظيفة.

ومع ذلك، يشعر بعض كبار السن بشعور كبير بالخسارة عند التقاعد، وبالتالي قد يعانون من الضغط النفسي، ويمكن أن يصابوا بالاكتئاب.

العلاقات الاجتماعية Social Relationships

تتغير العلاقات الاجتماعية على مدار الحياة. بين كبار السن ، قد تحدث هذه التغيرات بشكل متكرر؛ فأحياناً يتزوج الأبناء ويرحلون عنهم، وإذا توفي أحد الزوجين، يصبح الآخر «أرملًا» أو «أرملة». ومع تقدم الشخص في العمر، يتوفى المزيد من الأصدقاء والأقارب، وتقل الصلات الاجتماعية.

يستطيع بعض الأفراد المسنين التكيف مع هذه التغيرات من خلال تكوين صداقات جديدة وإقامة اتصالات اجتماعية جديدة. توفر المساجد والتواصل الجماعي العديد من الأنشطة الاجتماعية لكبار السن، ومن خلال المشاركة في هذه الأنشطة، يمكن للأفراد الذين كانوا صداقات بسهولة طوال حياتهم الاستمرار في بناء علاقات جديدة مع تقدمهم في السن.

يجد بعض المسنين صعوبة في التكيف مع الفقد المستمر للأصدقاء والأقارب. غالباً ما تكون وفاة الزوج أو الزوجة مدمرة للشخص المسن، خاصة عندما تربط بينهما علاقة وثيقة لسنوات عديدة. وفي هذه الحالات من الضروري تقديم المساعدة النفسية.

البيئات المعيشية Living Environments

تخلق التغيرات في البيئات المعيشية تغيرات نفسية واجتماعية. ويفضل معظم كبار السن البقاء في منازلهم حيث يشعرون بالأمان محاطين ببيئات مألوفة لهم. ويمكن أن يمثل فقدان الاستقلالية (الحكم الذاتي أو القدرة على تقرير الذات من خلال اتخاذ الخيارات والسعى في مسار الفعل) أمراً محبطاً ومزعجاً. وإذا كان الشخص المسن يشعر بالأمان، يصبح التأقلم أسهل بكثير (الشكل "8-2").

الاستقلالية Independence

يرغب معظم الناس في أن يكونوا مستقلين ومكتفين ذاتياً. حتى الأطفال الذين يبلغون من العمر عامين يبدأون في تعلم الاستقلالية لتأكيد حقهم في الاختيار والسعى إلى الاستقلالية. وكما يتعلم الأطفال وجود حدود للاستقلالية، يتعلم كبار السن أن الاستقلالية يمكن أن تتعرض للتهديد مع تقدم العمر؛ فيمكن أن تؤدي الإعاقة الجسدية، والمرض، وانخفاض القدرة العقلية، وغيرها من العوامل إلى فقدان الاستقلالية لدى كبار السن.

قد يجد الأفراد الذين كانوا في السابق مستقلين ذاتياً واعتنوا بأنفسهم أنهم مضطرون إلى طلب المساعدة من الآخرين. بعد القيادة طوال عمرهم سابقاً، يجد

الشكل "8-2" إذا شعر الشخص المسن بالأمان، يتآقلم بسهولة.



كبار السن أنهم لم يعودوا قادرين على القيادة بأمان. فربما توافقوا عن القيادة أو لم يعد لديهم وسائل نقل شخصية. ويجب عليهم الاعتماد على الآخرين لأخذهم إلى حيث يرغبون. بالإضافة إلى ذلك، تمنعهم القيود الجسدية من طهي وجبات الطعام، والغسيل، والتنظيف، وفي بعض الحالات، يصعب عليهم حتى الاعتناء بأنفسهم. وبالتالي قد يصابون بالإحباط، والغضب، والاكتئاب.

وينبغي أن تتيح أي رعاية تُقدم للمسنين أكبر قدر ممكن من الاستقلالية والقرار الذاتي. يجب تقديم المساعدة عند الحاجة لحفظ سلامة الفرد، ولكن يجب تشجيع الفرد على القيام بأكبر قدر ممكن من الأنشطة. على سبيل المثال، يجب على عضو فريق الرعاية الصحية تشجيع كبار السن على اختيار ملابسهم وارتداء ملابسهم بأنفسهم، حتى لو استغرق ذلك وقتاً أطول. ويمكن أن تحل الشرائط ذاتية الالتصاق محل الأزرار لجعل مهمة ارتداء الملابس أسهل ولتوفير المزيد من الاستقلالية. وهذا يساعد الشخص المسن على الاحتفاظ بشعور من الاستقلالية، والتكيف مع الوضع، والحفاظ على الشعور بقيمة الذات. في جميع الأوقات، يجب السماح للأفراد المسنين بأكبر قدر ممكن من الخيارات لمساعدتهم على الاحتفاظ بشخصيتهم المستقلة.

المرض والعجز

Disease and Disability

كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض والعجز. يُعرف المرض على أنه أي حالة تتدخل مع الوظيفة الطبيعية للجسم. تشمل الأمثلة الشائعة للأمراض لدى كبار السن مرض السكري، وأمراض القلب، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والتهاب المفاصل، وهشاشة العظام.

تُعرف الإعاقة بأنها عيب جسدي أو عقلي أو عجز يتداخل مع الوظائف الطبيعية. ومن الأمثلة على ذلك ضعف السمع، أو خلل الإبصار، أو عدم القدرة على المشي بسبب كسر في مفصل الورك. وتسبب الأمراض في بعض الأحيان إعاقات دائمة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي **سكتة دماغية وعائية Cerebrovascular Accident** إلى شلل دائم في جانب واحد من الجسم، أو شلل نصفي.

عندما يؤثر المرض أو الإعاقة على عمل الجسم، قد يعاني الفرد من مشكلات نفسية. وعندما يحدث هذا في شخص مسن يعاني بالفعل من ضغوط تغيرات أو ظروف أخرى، فقد يكون ذلك صادماً له. فمثلاً يمكن أن يؤدي كسر الورك إلى احتياج الشخص المسن الذي كان يعيش بشكل مستقل إلى الاعتماد أكثر مما يريد على عائلته. وغالباً ما يحدث المرض أو الإعاقة فجأة ولا يسمح بالتكييف التدريجي، مما يجعل التأقلم أكثر صعوبة.



غالباً ما يكون لدى المرضى خوف من الموت، ومن الأمراض المزمنة، أو فقدان الوظيفة، أو الشعور بالألم. هذه مخاوف طبيعية، وهؤلاء الأفراد يحتاجون إلى وقت للتكييف مع أوضاعهم. لذا استمع إليهم وهم يعبرون عن هذه المخاوف، وكن صبوراً ومتقهماً. وإذا لم يتمكنوا من مناقشة مشاعرهم، فقبل هذا التحفظ وقدم لهم الرعاية الداعمة (الشكل "9-2").

الملخص Summary

يمكن أن تكون التغييرات النفسية والاجتماعية مصادر رئيسية للتوتر لدى كبار السن. وعند حدوث تغييرات، يجب أن يتعلم الفرد استيعابها والتكييف مع الأوضاع الجديدة. ومن المهم أن نتذكر أن كبار السن قد نجوا من العديد من الأزمات على مدار حياتهم وتعلموا العديد من أساليب التأقلم المختلفة سابقاً. لذا، يجب تشجيع هؤلاء الأفراد على استخدام نقاط قوتهم ومهارات التأقلم الموجودة لديهم. فمن خلال الدعم، والتفاهم والصبر، يمكن لمقدم الرعاية الصحية مساعدة الأشخاص المسنين أثناء تعلمهم التكييف.

اختر معلوماتك

1. كيف يمكن للكبار السن التكيف مع التغييرات في العلاقات الاجتماعية؟
2. كيف يمكن للكبار السن الاحفاظ باستقلاليتهم؟



الشكل "9-2" وفر الرعاية الدائمة واستمع إلى المرضى أثناء تعبيرهم عن مخاوفهم.



التشوش والتَّوْهان عند كبار السن

Confusion and Disorientation in the Elderly

على الرغم من أن معظم الأشخاص المسنين يظلون في حالة تيقظ عقلي حتى الوفاة، إلا أن البعض يعانون من فترات من التشوش والتَّوْهان. وتتضمن علامات التشوش والتَّوْهان: التحدث بكلام غير مترابط، وعدم معرفة أسمائهم، وعدم التعرف على الآخرين، والتجول بلا هدف، والافتقار إلى الوعي بالزمان أو المكان، وإظهار سلوك عدائٍ أو قتالي (الشكل "10-2")، والهلاوس، والسلوك التراجعي، ونقص الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم القدرة على الاستجابة للأوامر البسيطة.

أسباب التشوش والتَّوْهان

Causes of Confusion and Disorientation

الهُذِيَان Delirium هو المصطلح المستخدم عندما يكون التشوش أو التَّوْهان حالة مؤقتة ناجمة عن حالة قابلة للعلاج. من مسببات الهُذِيَان:

- الضغط النفسي أو الاكتئاب نتيجة لغيرات جسدية أو نفسية واجتماعية هو أحد الأسباب الممكنة التي تسبب التشوش والتَّوْهان.
- أمراض الكلى، التي تتدخل مع توازن الكهارل؛ وأمراض الجهاز التنفسى، التي تقلل مستوى الأكسجين؛ وأمراض الكبد، التي تتدخل مع عملية الأيض.
- كذلك فإن الأشخاص المسنين هم أكثر حساسية تجاه الأدوية، ويمكن أن تترافق الأدوية في الجسم وتسبب التشوش والتَّوْهان.
- سوء التغذية أو نقص تناول السوائل يمكن أن يتداخل مع القدرة العقلية.

الشكل "10-2" غالباً ما يشير السلوك العدائى أو القتالى إلى مشاعر الإحباط أو التشوش.



تحديد وعلاج أي من هذه الحالات يقلل أو حتى يزيل التشوش والتوهان في كثير من الأحيان، على سبيل المثال، قد يؤدي تغيير الدواء أو إعطاؤه بجرعات أصغر إلى استعادة الوظيفة الطبيعية.

يمكن أن يؤدي المرض أو تلف الدماغ أحياناً إلى تشوش وتوهان مزمن. ومن مسببات ذلك:

- السكتات الدماغية الوعائية، التي تؤدي إلى تلف خلايا الدماغ.

- يمكن أن تعيق خثرة دموية تدفق الدم إلى الدماغ، أو يمكن أن يتمزق الوعاء الدموي ويسبب نزيفاً في الدماغ.

- **تصلب الشرايين Arteriosclerosis**، حالة تصبح فيها جدران الأوعية الدموية سميكة وت فقد مرونتها، وهي حالة شائعة في المسنين، وإذا أصبحت الأوعية ضيقة بسبب ترسب الدهون والمعادن مثل الكالسيوم، تسمى الحالة **التصلب العصيدي Atherosclerosis**، ويمكن أن تسبب هذه الحالات **نوبات نقص تروية عابرة (إقفارية) Transient Ischemic Attacks (TIAs)**، أو سكتات دماغية صغيرة، والتي تؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ لفترات مؤقتة، وفي كل مرة تحدث فيها نوبة، يؤدي ذلك إلى تلف مزيد من خلايا الدماغ.

- **الخرف Dementia**، هو فقدان للقدرة العقلية يتسم بانخفاض القدرة الفكرية، وفقدان الذاكرة، وضعف الحكم، وتغير الشخصية، والتوهان. عندما تكون الأعراض ناتجة عن حمى مرتفعة، أو عدوى الكلى، أو الجفاف، أو نقص الأكسجين، أو سمية دوائية، أو غيرها من الحالات التي يمكن علاجها، تسمى الحالة "هذيان"، أو في بعض الحالات "خرف حاد". عندما تحدث الأعراض بسبب تلف دائم في خلايا الدماغ لا يمكن شفاؤه فإن هذه الحالة تسمى "خرف مزمن". يمكن أن تسهم السكتات الوعائية الدماغية و**تصلب الشرايين**، ونوبات نقص التروية العابرة (الإقفارية) في حدوث الخرف المزمن. وتشير إحدى النظريات إلى أن الخرف المزمن ناتج عن نقص كامل لأحد الأنزيمات أو وجود كمية غير كافية منه. وأيّاً كان السبب، يعتبر الخرف المزمن مرضًا تنكسياً لا يمكن شفاؤه.

- **مرض الزهايمر Alzheimer's Disease**، هو شكل من أشكال الخرف الذي يسبب تغيرات متزايدة في خلايا الدماغ. الأفراد الذين يعانون من مرض الزهاي默 لديهم نقص في ناقل عصبي، أو كيميائي يسمح بنقل الرسائل بين الخلايا العصبية في الدماغ، وهذا يؤدي إلى موت الخلايا العصبية وتكون الحبائث. ويمكن أن يصيب مرض الزهاي默 الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاماً، ولكنه يحدث بشكل متكرر في الأشخاص في الستينيات والسبعينيات من العمر. والسبب غير معروف، ولكن هناك العديد من النظريات التي يجري البحث فيها حالياً. ومن العلوم





الشكل "11-2" قد ينسى المريض المصاب بمرض الزهايمر كيفية استخدام الأشياء الشائعة، ويواجهه مشكلات في العديد من أنشطة الحياة اليومية.

الأسباب المحتملة التي تمت الإشارة إليها: وجود عيب وراثي، أو إنزيم مفقود، أو التأثيرات السامة للألومنيوم، أو فيروس، أو الأيض الخاطئ للجلوكوز. وأيًّا كان السبب، فإن مرض الزهايمر ينظر إليه على أنه مرض دماغي عصبي غير قابل للشفاء يستمر عادةً من ثلاثة إلى عشرة أعوام.

- في المراحل المبكرة، يُظهر الفرد تمركزاً حول الذات، ونقص الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية، وفقدان الذاكرة، وتغييرات في المزاج والشخصية، والقلق، والهياج، والاكتئاب، وسوء التقدير، والتشوش فيما يتعلق بالزمان والمكان، وعدم القدرة على تحطيط ومتابعة العديد من أنشطة الحياة اليومية (الشكل "11-2").

- مع تقدم المرض، يحدث الأرق الليلي، وتتصبح تقلبات المزاج متكررة، ويبداً المريض بتجاهل النظافة الشخصية، ويشتد التشوش والنسيان، وتنظر السلوكيات المتكررة وغير المبررة، وتقل القدرة على فهم الآخرين والتحدث

بكلام مترابط، ويقلب الوزن، ويزداد الارتياب والهلوسة، ويصبح ضروريًا الإشراف عليهم طوال الوقت.

- في المراحل النهاية، يعني الفرد من التوهان التام فيما يتعلق بمعرفة الأشخاص، والزمان، والمكان؛ ويتحدث بكلمات غير مترابطة ولا يستطيع التواصل بالكلمات، ويفقد السيطرة على وظائف المثانة والأمعاء، ويصاب بتشنجات صرعية، ويفقد الوزن على الرغم من تناوله حمية غذائية متوازنة، ويصبح معتمدًا تمامًا على الآخرين، وفي النهاية يدخل في غيبوبة ويموت، وكثيرًا ما يحدث الموت بسبب الالتهاب الرئوي، والالتهاب والعدوى، ومضاعفات السقوط، والفشل الكلوي. ويختلف التقدم عبر المراحل المختلفة لهذا المرض من شخص إلى آخر.

تشخيص مرض الزهايمر أمر صعب ولا يمكن تأكيده إلا عند العثور على اللويحات النشوانية (بروتين أميلويد) أثناء تشريح الجثة بعد الوفاة. وتعتمد اختبارات الكشف عن مرض الزهايمر على مواقف فردية.

- يُجرى تصوير مسح الدماغ (التصوير المقطعي أو التصوير بأشعة الرنين المغناطيسي) لاستبعاد الحالات الأخرى التي تحاكي الأعراض، مثل الأورام الخبيثة، أو الورم الدموي أو المرض الوعائي الدماغي.

- يمكن أيضًا إجراء اختبارات الدم لتحديد ما إذا كان هناك خلل كيميائي أو هرمוני أو نقص للفيتامينات يسبب هذا السلوك.

- يوفر التقييم السريري باستخدام الاختبارات العقلية التشخيصية وكيفية الإجابة عن الأسئلة وتنفيذ المهام تشخيصًا دقيقًا في كثير من الحالات.

على الرغم من عدم وجود علاج نهائي لمرض الزهايمر، إلا أن العديد من الأدوية المختلفة أظهرت نتائج واعدة في تحسين الذاكرة ومهارات التفكير في المراحل المبكرة من المرض. ويجري حالياً اختبار أدوية أخرى تعمل على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ وإزالة اللويحات النشوانية. وكذلك، يمكن وصف الأدوية التي تعالج الأعراض الشائعة لمرض الزهايمر، مثل أدوية الاكتئاب أو القلق. كذلك، التشخيص والتدخل المبكر أمر ضروري لهذا المرض.

رعاية الأفراد المصابين بالتشوش أو التوهان


Caring for Confused or Disoriented Individuals



يجب اتباع مسارات محددة للرعاية مهما كان السبب، ويتمثل الاهتمام بالسلامة الأساسية في توفير بيئة آمنة وموثقة.

يجب إبقاء الأشياء الخطرة، مثل الأدوية، والسموم، والمقصات، والسكاكين، وأجهزة العلاقة، والأدوات، الكهربائية والمنظفات، وأعواد الكبريت والولاعات بعيداً عن متناول اليد وفي منطقة مغلقة.





الشكل "12-2" قد تُربط أجهزة استشعار خاصة بساقة أو معصم الشخص المصاب بالتوهان.



الشكل "14-2" يمكن للساعة الكبيرة أن تساعد الشخص المسن على تتبع الوقت والأنشطة اليومية.



الشكل "13-2" يجب أن تظل أنشطة الفرد المصاب بالتشوش أو التوهان بسيطة ولفترات زمنية قصيرة.

إذا كان الشخص يميل إلى التجول، يجب تأمين الأبواب والنوافذ، وفي الحالات الشديدة، يمكن ربط أجهزة استشعار خاصة بساقة أو معصم الشخص المصاب بالتوهان (الشكل "12-2"). حيث تتبه أجهزة الاستشعار الآخرين إلى أن الشخص بدأ في مغادرة منطقة معينة. والعديد من أجهزة الاستشعار لديه أيضاً قدرات تتبع باستخدام أنظمة تحديد الموضع.

من المهم أيضاً اتباع الروتين نفسه. فيجب أن تكون الوجبات، والاستحمام، وارتداء الملابس، والمشي، ووقت النوم في نفس الوقت تقريباً كل يوم، فـأي تغيير في الروتين يمكن أن يسبب التوتر والتشوش. على الرغم من وجوب تشجيع الشخص على أن يكون نشطاً بقدر الإمكان، إلا أن إبقاء الأنشطة بسيطة ولفترات زمنية قصيرة أمر واجب أيضاً (الشكل "13-2"). ومن المهم أيضاً توفير بيئه ساكنة وهادئة. إذ يمكن أن تسبب الضوضاء الصاخبة، والغرف المزدحمة، والفووضى العارمة في أن يصبح الشخص هائجاً وأكثر تشويشاً.

ويمكن أيضاً استخدام أنشطة التوجيه مع مرضى التشوش والتوهان كـتساعدهم



على تعزيز الوعي بالزمان والمكان والأشخاص.

يتكون **التوجيه للواقع Reality Orientation** من أنشطة تساعد على تعزيز الوعي بالزمان، والمكان، والأشخاص، ويمكن أن يقوم أي شخص يرعى الشخص المشوش بمتابعة الأنشطة، سواء كانت هذه الرعاية في المنزل أو في منشأة للرعاية طولية الأمد، وفيما يلي بعض جوانب أنشطة التوجيه للواقع:

- كن هادئاً ولطيفاً عند الاقتراب من الشخص.
- خاطب الشخص بالاسم الذي يفضله.
- اذكري اسمك وصحيح للشخص إذا أطلق عليك اسمًا خاطئاً. على سبيل المثال، إذا اعتقاد المريض أنك ابنته، قولي: "أنا لست ابنتك فاطمة. أنا سارة، ممرضتك لهذا اليوم."
- اصنع إشارات ثابتة لليوم، والزمان، والمكان: "الساعة الثامنة صباح الثلاثاء وهو موعد الإفطار".
- استخدم الساعات، والتقويمات، ولوحات المعلومات للإشارة إلى الوقت، واليوم، والأنشطة (الشكل "14-2").
- حافظ على روتين ثابت ومحدود.
- حافظ على إدراك الشخص لدورات النهار والليل. خلال النهار، شجع الشخص على ارتداء الملابس العادية، وافتح الستائر وأشر إلى أشعة الشمس. وفي الليل، أغلق الستائر، واستخدم الأضواء الليلية إذا لزم الأمر، وزد من الهدوء والراحة.
- تحدث ببطء ووضوح، واطرح أسئلة بسيطة.
- لا تتعجل أو تستعجل الشخص.
- كرر التعليمات بصرير. امنح الشخص وقتاً للرد.
- شجّع المحادثات حول الأشياء المألوفة.
- اسمح للفرد أن يحكى ذكرياته أو يتذكر تجاربه السابقة.
- شجعه على استخدام التلفزيون أو الراديو، ولكن تجنب المبالغة في تحفيذه.
- تأكد من استخدام الفرد للمعينات الحسية، مثل النظارات وسماعات الأذن (إذا لزم الأمر)، وتأكد أن الأجهزة تعمل بحالة جيدة.
- احتفظ بالأشياء والصور المألوفة في موضع نظره، وتجنب نقل أثاث الشخص أو متعلقاته.
- لا تجادل بعبارات غير صحيحة. قدم المعلومات الصحيحة برفق إذا كان الشخص قادرًا على قبول المعلومات دون إثارته. مثلاً: عندما يقول الشخص أن الوقت حان لارتداء ملابس العمل، قل له: "ليس عليك الذهاب إلى العمل اليوم. لقد تقاعدت قبل سبعة أعوام".



● استخدم اللمسة اللطيفة للتواصل مع الشخص، ما لم يسبب ذلك إثارته وتهيجه (الشكل "15-2").

● تجنب المجادلات أو تبادل الاتهامات. وعندما تجد شخصاً مسناً موجوداً في المنطقة الخاطئة، لا تقل: "أنت تعرف أنه ليس من المفترض أن تكون هنا". بدلاً من ذلك، قل، "دعني أريك كيفية الوصول إلى غرفتك".

● تشجيع الاستقلالية والمساعدة الذاتية.

● تعامل دائمًا مع الشخص باحترام وبأسلوب حفظ الكرامة. تكون أنشطة التوجيه ل الواقع فعالة خلال المراحل المبكرة من التشوش والتوهان. في مراحل لاحقة عندما يكون الفرد غير قادر على الاستجابة، يمكنها أن تسبب زيادة القلق والتهيج. عندما يُظهر تقييم المريض أنه يعاني من ذلك القلق والتهيج، فعلينا تجنب مواجهته بالواقع. على سبيل المثال، لا تخبر المريضة التي تريد أن ترى زوجها أن زوجها توفى قبل عشرة أعوام. بدلاً من ذلك، اطلب منها أن تخبرك عن زوجها واسمح لها بأن تحكي ذكرياتها. قدم الرعاية الداعمة للسماح للمريض بالتعبير عن المشاعر مع حفظ الكرامة.

قد تكون رعاية الشخص المصابة بالتشوش أو التوهان أمراً محبطاً في بعض الأحيان. يلزم إجراء تقييم مستمر لقدرات الشخص ومشكلاته لتصميم برنامج رعاية صحية يسمح للفرد بالعمل ضمن مستوى قدراته. وفي جميع الأحوال فالصبر، والاتساق، والرعاية المخلصة هي أجزاء ضرورية من جهة مقدم الرعاية الصحية.



الشكل "15-2" المس المصاب بالتهان بطف وتحاشي إثارته.

اخبر معلوماتك

1. ما مرض الزهايمر؟

2. اذكر خمس طرائق لتطبيق التوجيه ل الواقع تُستخدم عند تقديم الرعاية للمسنين المصابين بالتشوش.

تلبية احتياجات المسنين

5:2

Meeting the Needs of the Elderly

يمكن أن يمثل تقديم الرعاية للمسنين تحدياً صعباً ولكنه تجربة نافعة. من المهم أن نتذكر أن احتياجات كبار السن لا تختلف بدرجة كبيرة عن احتياجات أي شخص آخر؛ فلديهم نفس الاحتياجات الجسدية والنفسية



مثل أي شخص في أي عمر. ومع ذلك، فإن هذه الاحتياجات تزداد أحياناً بسبب التغيرات الجسدية أو النفسية والاجتماعية التي تعرقل نمط الحياة الطبيعي. وعندما يحدث هذا، يحتاج الشخص المسن إلى التفهم، والتقبيل، ومعرفة أن هناك من يهتم، وتدعوه القيم الإسلامية (الشريعة) والعادات، والتقاليد الخاصة بالمجتمع السعودي، إلى تقدير� واحترام كبار السن. إن دعم المسنين والتوعية بحقوقهم أمر مهم في رعايتهم.

تحدد الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادئ المتعلقة بالمسنين التي اعتمدت عام 1991 بما يلي:

- **الاستقلالية:** يجب أن يكون لدى كبار السن دائمًا القدرة الكافية من الطعام والماء، والمأوى والملابس، والرعاية الصحية، وإمكانية الحصول على عمل مربح، والتعليم والتدريب.
- **المشاركة:** ينبغي أن يساهم الجيل الأكبر سنًا في وضع السياسات التي تؤثر مباشرة على رفاهية حياتهم.
- **الرعاية:** ينبغي إتاحة الفرص المناسبة للأسرة وإتاحة الرعاية الصحية للمسنين، في منازلهم أو في منشآت الرعاية أو العلاج.
- **تحقيق الذات:** يجب أن تتاح لكبار السن فرص التطور عبر الوصول إلى الموارد التعليمية، الثقافية، والروحية، والترفيهية للمجتمع بشكل عام (الشكل "2-16").

الشكل "2-16" يجب أن تتاح لكبار السن فرص التطور من خلال الوصول إلى الموارد التعليمية، الثقافية، والروحية، والترفيهية للمجتمع بشكل عام.



● الكرامة: ينبغي تمكين كبار السن من العيش في ظروف تسم بالكرامة والأمن، دون التعرض لأي استغلال أو إساءة، جسدية أو عقلية، ومعاملتهم معاملة عادلة بغض النظر عن سنهم، أو جنسهم، أو خلفيتهم العرقية، أو الإثنية، أو ما إذا كانوا معاقدين، وبغض النظر عن وضعهم المالي.

وقد وافق مجلس الوزراء السعودي عام 2022 على سن قانون لحماية حقوق كبار السن ورعايتهم. يهدف هذا القانون إلى تعزيز وضع رفاهية كبار السن، وكذلك الحفاظ على أنفسهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم، وضمان الرعاية المناسبة لهم في الأسرة والمجتمع. وهناك أحكام في القانون لحماية الحقوق الجسدية والنفسية لكتاب السن. كما يهدف القانون إلى تشجيع الأنشطة التطوعية في رعاية المسنين وتقديم تسهيلات خاصة لهم في الأماكن العامة والتجارية، والمناطق السكنية، والمساجد.

وتنص المادة 27 من القانون الأساسي السعودي على ما يلي: «تケفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على المساهمة في الأعمال الخيرية». ووضعت مبادرات تهدف إلى تحسين نوعية الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسنين في المجتمع بشكل عام وفي دور الرعاية.

وتقوم المبادرات في إطار برنامج التحول الوطني حاليًا بوضع نماذج لتلبية احتياجات المسنين، بما في ذلك الخدمات الصحية، والعلاج الطبيعي، والمرافق الترفيهية. وتوجد في القطاع الخاص جمعيات أهلية متخصصة للمسنين تغطي خدماتها جميع مناطق المملكة، مثل جمعية (وقار) وهي جمعية خيرية غير ربحية تأسست لدعم كبار السن في المملكة العربية السعودية، وتهدف الجمعية إلى:

- استكمال القطاعات التي تخدم كبار السن.
- إنشاء برامج ومبادرات تناسب كبار السن، وتساهم في تحسين أنواع الخدمات المقدمة لهم.
- رفع الوعي باحتياجات المسنين ورعايتهم.
- تعزيز مكانة المسنين في المجتمع، وإبراز دورهم، ورفع الوعي بقضاياهم.

التحرر من سوء المعاملة هو جانب مهم آخر من جوانب الرعاية. يمكن أن تكون إساءة معاملة كبار السن جسدية، أو لفظية، أو نفسية. إن التعامل مع الفرد بقسوة، أو حرمانه من الطعام، أو الماء، أو الدواء، أو الصوت العالي أو الصراخ في وجه الشخص، أو التسبب في الخوف، كلها أشكال للإساءة. ومن الصعب أحياناً إثبات سوء المعاملة. حيث يشيع أن يكون المعتمدي أحد أفراد الأسرة أو القائم بالرعاية، وقد يرغب المسنون في حماية المعتمدي أو يشعرون بأنهم يستحقون الإساءة. لذلك من المهم لأي عضو في فريق الرعاية الصحية يرى أو يشتبه في إساءة معاملة كبار السن أن يبلغ الجهة المناسبة عن ذلك.

أختبر معلوماتك

1. ما جمعية وقار؟

2. ما الذي يجب على عضو فريق الرعاية الصحية فعله إذا رأى أو اشتبه في إساءة معاملة شخص مسن؟

تعمل "كينيون" وباحثون آخرون الآن على الديدان الأسطوانية، وهي كائنات صغيرة جدًا تقدم في العمر وتتجدد في غضون عشرة أيام فقط، ونادرًا ما تعيش لفترة أطول من أسبوعين. بتغيير جين daf في الحمض النووي للدودة، استطاع الباحثون زيادة فترة حياتها إلى فترة تتراوح بين 10 إلى 12 أسبوعاً، وقد أظهرت دراسات أخرى حول العالم أن الأرجح أن الأشخاص الذين يعيشون أكثر من 100 عام لديهم نفس الطفرة الجينية، وإذا تمكنت المزيد من الأبحاث من تطبيق هذه العوامل على البشر، فيمكن عندها تأجيل حدوث الشيخوخة، كما يمكن الوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر؛ وذلك لأن العمر هو أهم عامل خطورة للإصابة بالعديد من الأمراض، فمن المرجح أن يعاني المرء من تطور ورم سرطاني في سن السبعين أكثر بكثير منه في سن الثلاثين. يستخدم باحثون آخرون هذه المعلومة لإطالة فترة حياة الفئران بما يزيد عن 30% وهم مستمرون في إجراء التجارب على ثدييات أخرى لديها جينات مماثلة للبشر. هدفهم في ذلك هو تطوير أدوية لها نفس تأثير الجينات الموجودة في الحيوانات التي طال عمرها، وإذا نجحوا في ذلك، يمكن الوقاية من كثير من الأمراض المتعلقة بالتقدم في العمر، وقد يبقى الأشخاص في حالة شباب وإنجابية طوال فترة حياتهم.

هل يعيش الناس حتى عمر 200 عام؟

لطالما اعتُبر التقدم في العمر تدهوراً طبيعياً لجسم الإنسان، ولكن هذا المفهوم تغير عندما اكتشفت "سينثيا كينيون" - عالمة الوراثة في جامعة كاليفورنيا - مع فريقها البحثي مجموعة من الجينات في الديدان التي بدا أنها تنظم الشيخوخة؛ ومن خلال تبييض عمل أحد الجينات، استطاعت "كينيون" زيادة فترة حياة الدودة بمقدار ست مرات وإبقاءها في مرحلة الشباب.

بدأ البحث بدودة خيطية صغيرة متحورة، كان طولها 1 ملليمتر، وببدأ أنها استطاعت العيش بمقدار 50% أطول من الديدان الخيطية الأخرى، ومن خلال البحث عن جينات متحولة، اكتشفت "كينيون" جين daf-2، وهو الجين الذي يتحكم في عملية الشيخوخة، وأظهرت المزيد من الأبحاث أن هذا الجين يسمح لأنسجة الجسم بالاستجابة للهرمونات، وعمل جين daf-2 المتحول على تقليل هذا النشاط، مما جعل الأنسجة أقل استجابة للهرمونات وسمح بتأخير عملية الشيخوخة.

جرى التعرف على جين آخر هو daf-16، والذي اعتُبر أنه جين "ينبوع الشباب"؛ لكونه يعزز تجديد الشباب، حيث سمحت هذه الجينات للديدان المتحورة ليس فقط بتأخير عملية الشيخوخة بل بالبقاء شابة أيضاً، مثل شخص في الخامسة والستين من العمر لكنه يتمتع بنشاط وحيوية شخص في الخامسة والأربعين. وأظهرت الأبحاث أن الشيخوخة تخضع للتنظيم بالعوامل الوراثية.

خلاصة دراسة حالة

هل تمكنت من تسمية التغيرات العديدة الجسدية والعاطفية التي تعاني منها مريم نتيجة للشيخوخة؟ ما بعض الطرق التي يمكن لريم من خلالها المساعدة في دعم جهود مريم للبقاء مستقلة ومنخرطة في المجتمع؟



ملخص الفصل 2

- تسبب التغيرات النفسية والاجتماعية احتياجات خاصة لـكبار السن؛ فالتقاعد، ووفاة الزوج/الزوجة، والمرض والعجز يمكن أن تُسبب ضغطاً نفسياً.
- على الرغم من أن معظم الأشخاص المسنين يبقون في حالة انتباه عقلي حتى الوفاة، إلا أن البعض يعانون من فترات من التشوش والتَّوهان. إن توفير بيئة آمنة وموثوقة أمر بالغ الأهمية.
- من المهم لمقدمي الرعاية الصحية احترام كبار السن وحمايتهم من سوء المعاملة.
- رعاية المسنين هي الرعاية المقدمة لـكبار السن.
- تتزايد أعداد هذه الفئة العمرية وتستفيد من خدمات الرعاية الصحية بشكل متكرر.
- تشيع بعض الخرافات، أو المعتقدات الخاطئة حول الأشخاص المسنين.
- تحدث الشيخوخة تغيرات جسدية ويتعرض لها كل البشر.
- يجب أن يكون مقدم الرعاية الصحية على دراية بهذه التغيرات وأن يوفر للأفراد سُللاً للبقاء مستقلين بقدر الإمكان.

حالة دراسية بسيطة 1:2 صديق مُخطئ

أنت في زيارة إلى صديقتك وتحذينها عن عملك مساعدة تمريض تعمل مع كبار السن. أخبرتك صديقتك باعتقادها أنها غير قادرة على أداء وظيفتك؛ لأنها تقضي العمل معأشخاص يمكنها إجراء محادثة ناضجة معهم. وتعلق قائلة أنها لا ترغب أن تكبر في السن وتمرض وتفقد ذاكرتها.

التحليل

1. كيف يمكنك مساعدة صديقتك على فهم أن معتقداتها عن كبار السن ليست صحيحة؟

2. كيف يمكنك أن تبرهنني لصديقتك أن كبار السن قادرون مثل أي شخص على إجراء محادثة ناضجة؟

3. ماذا يمكنك أن تفعل لمساعدتك في دحض الخرافات حول كبار السن في منطقتك المحلية؟



حالة دراسية بسيطة 2: المريض الضعيف

أصبحت جدتك هيا، البالغة من العمر 86 عاماً، والتي تعيش معك ومع أسرتك، ضعيفة وواهنة في الآونة الأخيرة، وتختلط عليها الأمور بسهولة. تحب التجول في أرجاء المنزل لكنها تضل السبيل إلى غرفتها. تعرف على صورها، وتعرف الجميع من حولها، لكنها تخطأ في أسمائهم. تقلق بشأن الوقت لكنها لم تعد قادرة على قراءة ساعتها.

التحليل

1. كيف يمكنك مساعدة هيا في العثور على غرفتها بسهولة؟

2. ماذا يمكنك أن تفعله لمساعدة هيا وتجنب تعرضها للضغط النفسي؟

3. هل يجب إشراك طبيبها في خطة رعايتها؟

حالة دراسية بسيطة 3: المريض المسن

يشكو مريضك، ويدعى فهد، من حكة وجفاف في الجلد، كما أنه يشعر بالضيق والتعب أثناء النهار لأنه يستيقظ ليلاً ثلاث أو أربع مرات بفرض التبول. تجد ابنته صعوبة في التعامل معه لأنه يستخدم الملح، والفلفل، والسكر بشكل مفرط في جميع أنواع الأطعمة التي يتناولها، ويشكو أن المأكولات ليس لها أي طعم. يتحدث باستمرار بصوت عالٍ للغاية، ويطلب من الجميع التحدث بصوت أعلى أو أن يكرروا ما قالوه مجدداً.

التحليل

1. ماذا يحدث لفهد؟ هل هناك ما يمكنك اقتراحه لمساعدته؟

2. هل يمكنك اقتراح طرائق يمكن من خلالها لابنة فهد جعل أوقات الوجبات أقل إحداثاً للتوتر للجميع؟

3. هل ينبغي تحرّي تبوله الليلي؟ لماذا؟



أسئلة المراجعة

1. ما التدابير التي يمكن اتخاذها لمساعدة الفرد على التكيف أو التعامل مع ضعف الأداء بسبب هذه التغيرات الجسدية/البنوية الناجمة عن الشيخوخة؟
- أ. الجفاف وحكة الجلد.
 - ب. ضعف البنية العضلية.
 - ج. فقدان السمع وعدم القدرة على سماع الأصوات عالية التردد.
 - د. نقص حاسة التذوق.
 - ه. عسر الهضم والإمساك.
-
-
-
-

2. فرق بين المرض والعجز.

3. اذكر أربعة عوامل تسبب تغيرات نفسية اجتماعية في الشيخوخة. لكل عامل من العوامل، أعط مثاليين على الأقل للطرائق التي يمكن من خلالها مساعدة الشخص على التكيف أو التعامل مع التغيرات الحاصلة.
-
-

4. فرق بين الخرف الحاد (الهذيان) والخرف المزمن. حدد أربعة أسباب ممكنة لكل نوع من أنواع الخرف.

5. حدد العوامل التي يمكن أن تقلل من سرعة ودرجة التغيرات الجسدية الناجمة عن الشيخوخة، واذكر العوامل التي يمكن أن تُسبب زياقتها.

6. كيف يمكن مساعدة شخص ما على التكيف مع التقاعد؟

7. لماذا قد يشعر المسن بفقدان استقلاليته؟ وكيف يمكن مساعدته؟

8. كيف يمكن مساعدة كبار السن الذين يصابون بالتهاب المفاصل في الحفاظ على صحتهم واستقلاليتهم؟

9. إذا كان الشخص المسن يعاني من ضيق التنفس، فما الذي يحدث؟ وكيف يمكن تخفيف الحالة أو تجنبها؟

١٠. كيف يمكن للشيخوخة أن تؤثر على الدورة الدموية للمسنين؟ وما الذي يمكن القيام به للمساعدة في الحفاظ على الصحة؟

التفكير الناقد

١. السيدة ليلى أم لثمانية أطفال تبلغ من العمر 83 عاماً وحدها ٢١ فرداً. أفراد عائلتها قريبون جدًا منها يحبون زيارتها في منزلها كل أسبوع، حيث يتناولون الطعام، ويتحدثون، ويلعبون. سقطت السيدة ليلى وأصيبت بكسر في مفصل الورك. خضعت لعملية جراحية وهي الآن في وحدة إعادة التأهيل في المستشفى المحلي. بدأت تفقد وزنها لأنها لا تحب الطعام في المستشفى. نورة أخصائية العلاج الطبيعي لها ودرست تقديم الرعاية للمسنين. ما التغييرات التي يمكن أن تجريها نورة على روتين إعادة التأهيل؟ وما الذي تقتربه على قسم التغذية والموظفين الآخرين لتعزيز شفاء السيدة ليلى؟

٢. عندما يصاب شخص عزيز بالتشوش والتوهان، فإن ذلك يؤثر على حياته اليومية وعلى كل فرد من عائلته، ويمكن أن يكون العباء المالي، والنفسي، والعاطفي، ثقيلاً. حل هذا التأثير وأوجد ثلاث طرائق يمكن للعائلات من خلالها مواكبة هذا الواقع الجديد بطريقة إيجابية. في إجابتك ، ضع في اعتبارك جهود المملكة العربية السعودية لتحسين جودة الرعاية المقدمة لكتار السن.



التمرينات

1. جهز عرضاً بمشاركة زميل لك يبين الجوانب الإيجابية للتقدم في السن. استخدم ثلاثة صور أو رسوم بيانية لتوضيح هذه الحقائق المتعلقة بالشيخوخة.

2. ضمن مجموعات من أربعة زملاء، افعل ما يلي:

أ. ارتدي زوجاً من النظارات التي تغير الرؤية، وضع كرة قطنية واحدة في كل أذن، واستخدم ربطه عنق لربط ذراع واحدة إلى الصدر لمحاكاة ضعف الحركة، وارتدي قفازات عمل سميكه. أكمل المهام التالية على طاولتك:

- أرسل لصديقك رسالة نصية.

- اقرأ مقالة صحافية.

- خذ اثنين من قطع الحلوي الصفراء (لمحاكاة حبوب الدواء) من علبة واقية مانعة للأطفال.

ب. بعد الانتهاء من هذه الأنشطة، اكتب مقالة من صفحة واحدة تجيب عن الأسئلة التالية: ما أهم ثلاثة أشياء جعلت إنجاز المهام اليومية أكثر صعوبة؟ ما التدخلات التي يمكن لمقدم الرعاية الصحية المسئول عنك تنفيذها لمعالجة هذه المخاوف مع دعم استقلاليتك؟

ج. ضمن مجموعتك، ضع في اعتبارك هذا السؤال: "إذا كنت مسؤولاً عن منشأة المساعدة على المعيشة، فما أفضل خمس طرائق لتوفير الرعاية للأشخاص المقيمين فيها والتي سأصر على أن ينفذها الموظفون؟" كن مستعداً لعرض أفكارك على الفصل.

3. ضمن مجموعة صغيرة، استخدم علبة أحذية لإنشاء المنشأة المثلية للعناية بالذاكرة. أدرج على الأقل ثلاثة اعتبارات للتوجيه للواقع إلى المبني المادي. اكتب مقالة قصيرة تشرح فيها تفاصيل برنامجك للتوجيه للواقع وكيف يدعم هذا المبني تلك الأهداف.



الفصل

3

رابط المدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

مهارات مساعد التمريض

دراسة حالة

قام مشفى خاص بتوظيف خالد وبسمة مساعدتي تمريض جراحي. يعملا بوتيرة متسارعة لمواكبة الجدول الزمني للعمليات والإجراءات الجراحية والعناية بالمرضى في السرير. في نهاية هذا الفصل، ستسأل عن المهارات التي سيحتاجها خالد وبسمة للعمل في هذه الوحدة الطبية/الجراحية.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل، ستكون قادرًا على:

- قياس وتسجيل كمية السوائل الواردة إلى المريض والصادرة عنه.
- مساعدة المريض في الأكل وإطعامه.
- مساعدة المريض على استخدام المبولة أو وعاء للتبول في الفراش، والعناية بالقسطرة.
- العناية بحالة الفغر والتقطيم.
- جمع عينات من البول، أو البراز.
- الالتزام بجميع احتياطات الأمان والسلامة عند التعامل مع البول، أو البراز.
- تقديم الرعاية قبل الجراحة حسب التوجيهات.
- تجهيز وحدة ما بعد الجراحة مع التأكد أن جميع المعدات في مكانها الصحيح.
- توفير الأكسجين للمريض بطريقة آمنة عبر قناع، أو قنادة أنفية، أو خيمة (حجرة) الأكسجين.
- قبول المريض، أو نقله، أو إتمام إجراء خروجه، وإظهار الحرص الكافي على ممتلكات المريض.
- وضع المريض بطريقة سلية ومحاذاة صحيحة دون ظهور أي بروزات عظمية.
- تحريك وتقليل المريض في السرير مع مراعات الوضعيات والحركات السليمة صحياً للجسد.
- تطبيق تقنيات النقل التالية: التعليق، الكرسي، الكرسي المتحرك، النقالة والحامل الطبي الميكانيكي، مع مراعاة جميع معايير الأمان.
- معرفة كيفية جعل الأسرة مغلقة ومفتوحة ومشغولة باستخدام حركات الجسم الصحيحة.
- تقديم المساعدة في العناية الشخصية للمريض بما في ذلك نظافة الفم والعناية بالشعر والأظافر وتدليك الظهر.
- مساعدة المريض الملائم للفراش على الاستحمام والاغتسال في الحوض أو الدش، مع مراعاة جميع معايير الأمان.

المصطلحات الرئيسية

قرحة الضفت	الففر	عينات	المحاذاة
Pressure Ulcer	Ostomy	Specimens	Alignment
وحدة تصريف البول	إخراج	الجفاف	التخدير
Urinary Drainage Unit	Output	Dehydration	Anesthesia
التبول	النظافة الشخصية	الوذمة	القسطرة
Urinate	Personal Hygiene	Edema	Catheter
	قبل الجراحة	إدخال	التدلي
	Postoperative	Intake	Dangling
	بعد الجراحة	جراحي/أثناء الجراحة	تغوط (تبرّز)
	Preoperative	Operative/Intraoperative	Defecate

قبول المريض ونقله واتمام إجراء خروجه

Admitting, Transferring, and Discharging Patients

بصفتك عضو فريق رعاية صحية في مستشفى، أو وحدة رعاية طويلة الأمد، قد يكون قبول المرضى، ونقل واجراء خروج المقيمين منهم واحدة من مسؤولياتك. ورغم أن هذه الإجراءات تتغير قليلاً باختلاف المنشآت، فإن المبادئ الأساسية نفسها تطبق في جميع هذه المنشآت.

قبول المريض

Admitting the Patient

يمكن أن يسبب القبول في وحدة رعاية طبية الخوف والتوتر لكثير من المرضى  وعائلاتهم. فحتى الانتقال من غرفة أو وحدة في المستشفى إلى غرفة أو وحدة أخرى يمكن أن يخلق حالة من التوتر لديهم لأنه سيتوجب عليهم التأقلم مع بيئة أخرى جديدة. لذا، فمن الضروري أن يترك عضو فريق الرعاية الصحية انطباعاً أولياً طيباً. ويمكن لمقدم الرعاية الصحية أن يفعل أشياء كثيرة تخفف القلق والتوتر كونه مهذباً ولطيفاً وداعماً؛ كذلك، يساعدُ إعطاء تعليمات واضحة للمريض أو المريض المقيم عن كيفية استخدام وتشغيل المعدات ونمط الروتين المتوقع حدوثه، مثل، أوقات الوجبات، على تعرّفه على البيئة والتأقلم معها. ومن الضروري أيضاً عدم الاستعجال أثناء قبول المريض أو نقله أو تخريجه، والسماح له بطرح الأسئلة والتعبير عن مخاوفه وتساؤلاته. وفي حال عدم معرفتك إجابات بعض هذه الأسئلة، فوجهاها إلى مشرفك على الفور.

- ألق التحية على المريض وتأكد من هويته، واسأله ما إذا كان يحب أن ينادي  المجتمع باسم معين. عرف بنفسك بذكر اسمك ولقبك للمريض ولأي فرد متواجد من العائلة. في حال وجود مريض آخر في الغرفة، فعرف وقدم المريض الجديد، ثم اشرح الإجراء واحصل على الموافقة على البدء فيه.

- أغلق الباب والستارة لتوفير الخصوصية. اطلب من المريض ارتداء الملابس الطبية. ساعد المريض حسب الضرورة. ضع المريض بوضع مريح على السرير أو الكرسي. تمتلك معظم المنشآت استثمارات محددة تُستخدم أثناء قبول المرضى أو نقلهم أو تخريجهم. وقد أرفقنا عينة استماراة قبول في (الشكل 1-3). في معظم المنشآت، تكون الاستثمارات رقمية، ويستخدم حاسب محمول، أو لوحي لإدخال معلومات المريض. تخزن سجلات المرضى إلكترونياً وتسمى السجلات الصحية الإلكترونية. ومع ذلك، فإن جميع الاستثمارات تدرج الإجراءات الواجب القيام بها والتي تختلف قليلاً من منشأة إلى أخرى. ومن المهم أن يعتاد عضو فريق الرعاية الصحية على المعلومات المطلوبة في هذه الاستثمارات.

<input type="checkbox"/> طرقة النقل: <input type="checkbox"/> مشياً <input type="checkbox"/> كرسي متحرك <input type="checkbox"/> نقافة <input type="checkbox"/> طرائق أخرى <input type="checkbox"/> التدخين <input type="checkbox"/> نم لا		يفضل المريض أن ينادي بـ : <input type="checkbox"/> غرفة الطوارئ <input type="checkbox"/> منشأة العناية المركزة <input type="checkbox"/> المنزل <input type="checkbox"/> عيادة الطبيب <input type="checkbox"/> قدرته على التواصل باللغة العربية <input type="checkbox"/> قليلة <input type="checkbox"/> جيدة <input type="checkbox"/> ممدودة <input type="checkbox"/> رقم هاتف المنزل () <input type="checkbox"/> لا يوجد <input type="checkbox"/> المترجم الفوري (اسم الشخص) <input type="checkbox"/> رقم هاتف العمل ()	
الممتلكات الشخصية <input type="checkbox"/> الملابس <input type="checkbox"/> المجوهرات <input type="checkbox"/> القفاز <input type="checkbox"/> الماشية <input type="checkbox"/> الكرسي المتحرك <input type="checkbox"/> المكاز <input type="checkbox"/> ممتلكات أخرى		الفاعل البيئي <input type="checkbox"/> ضوء الاستدعاء <input type="checkbox"/> فحص الشارة <input type="checkbox"/> التحكم السريري <input type="checkbox"/> الماء <input type="checkbox"/> سياسة الحواجز الجانبية للسرير <input type="checkbox"/> سياسة الزيارة <input type="checkbox"/> سياسة التدخين <input type="checkbox"/> سياسة الملكية الشخصية <input type="checkbox"/> الحمام	
عيادات السمع <input type="checkbox"/> نم <input type="checkbox"/> لا النظارات: <input type="checkbox"/> نم <input type="checkbox"/> لا العacamات الصناعية: <input type="checkbox"/> نم <input type="checkbox"/> لا (صف المريض)		أطقم الأسنان <input type="checkbox"/> العدسات اللاصقة <input type="checkbox"/> صلبة <input type="checkbox"/> يسار <input type="checkbox"/> صلبة <input type="checkbox"/> ناعمة <input type="checkbox"/> يمين <input type="checkbox"/> ناعمة <input type="checkbox"/> الملعوبة <input type="checkbox"/> لا يوجد <input type="checkbox"/> الملعوبة <input type="checkbox"/> السفلية <input type="checkbox"/> لا يوجد <input type="checkbox"/> السفلية	
في حالات الطوارئ تقوم بإخطار الاسم: علاقة بالمريض: رقم هاتف المنزل () رقم هاتف العمل ()		الصرف بالمتطلبات المئوية <input type="checkbox"/> أعطيت إلى <input type="checkbox"/> المريض <input type="checkbox"/> علاقته بالمريض <input type="checkbox"/> ووضعت في خزنة الأمانات (رقم طلب الاسترداد)	
الحساسية <input type="checkbox"/> غير معروف <input type="checkbox"/> الأدوية <input type="checkbox"/> غير معروف <input type="checkbox"/> أصابة <input type="checkbox"/> بسليلون <input type="checkbox"/> أخرى (اذكرها) <input type="checkbox"/> كبريات (حار، بiesen، حليب، غيرها) <input type="checkbox"/> بود <input type="checkbox"/> أسريرين <input type="checkbox"/> مورفين <input type="checkbox"/> وضع السرير <input type="checkbox"/> ديميرول <input type="checkbox"/> وضع الوقوف		العلامات الحيوية <input type="checkbox"/> درجة الحرارة <input type="checkbox"/> فموية <input type="checkbox"/> شرجية <input type="checkbox"/> إبطية <input type="checkbox"/> النبض <input type="checkbox"/> كمبري <input type="checkbox"/> ققي <input type="checkbox"/> معدل التنفس <input type="checkbox"/> يسار <input type="checkbox"/> وضيعة <input type="checkbox"/> ضغط الدم <input type="checkbox"/> يمين <input type="checkbox"/> وضيعة <input type="checkbox"/> الجلوس <input type="checkbox"/> الاستلقاء <input type="checkbox"/> الطول <input type="checkbox"/> الوزن <input type="checkbox"/> وضع الوقوف	
التشريف بالأدوية <input type="checkbox"/> لم يحضر إلى المستشفى <input type="checkbox"/> أرسلت للمنزل مع <input type="checkbox"/> إلى الصيدلية (اذكرها)		الأدوية (وصفة طيبة - غير وصفة طيبة) آخر جرعة (اليوم / الوقت) الجرعة / التكرار 1 2 3 4 5 6	
التشخيص الأولي الموجب للقبول: _____ توقيع المرضات: _____ المرضة المسجلة / المرض المهني المؤهل _____ التاريخ _____ الوقت _____			

الشكل "1-3" نموذج قبول المريض.

- تستخدم كثيراً من المعلومات الواردة في نموذج القبول أساساً لخطة الرعاية التمريضية، لذا يجب أن تكون المعلومات كاملة ودقيقة. في حال عدم قدرة المريض على إجابة الأسئلة، فإن قريبه أو المسؤول عنه سيوفر المعلومات. في بعض المنشآت، تكون الأسئلة بخصوص الأدوية والحساسية من مسؤوليات التمريض.
- عند قبول المريض في المنشأة، تُفذ إجراءات معينة مثل قياس وتسجيل العلامات الحيوية والطول والوزن وجمع عينة بول بصورة دورية. فاتّبع الأساليب الصحيحة أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.





الشكل "2-3" استخدم الكرسي المتحرك
لنقل المريض إلى الغرفة أو الوحدة الجديدة
إذا كانت حالته تسمح بذلك.

- أعد قائمة جرد شخصية شاملة لملابس المريض والأشياء الشخصية والثمينة لحماية ممتلكاته. بعد ذلك، توضع الأشياء الثمينة في الخزنة أو ترسل إلى الأمن، ويُسلم إيصال للمريض أو يوضع على لوحة المريض، وإذا نقل المريض أو خرج من المشفى يأخذ الممتلكات الثمينة من الخزنة، وتتحقق من قبل كل من مقدم الرعاية الصحية والمريض.
- وجه المرضى وأفراد الأسرة في المنشأة الصحية، إذ يجب تقديم الإرشادات حول كيفية تشغيل إشارة الاستدعاء والتحكم في السرير والتحكم عن بعد بالتلفاز - إن وجد - والهاتف وغيرها من التجهيزات المماثلة. ويجب شرح وتوضيح ساعات الزيارة وموقع الصالات والخدمات المتوافرة، مثل الأنشطة والخدمات الدينية وأوقات الوجبات وغيرها من القواعد والإجراءات الروتينية المطبقة في المنشأة. تقدم عديد من المنشآت كتيبات أو أوراق للمرضى وأسرهم تشرح فيها هذه المعلومات. لكن رغم ذلك، يبقى شرح المعلومات الرئيسية أمراً واجباً ومهماً.

نقل المريض إلى منشأة أخرى

Transferring the Patient to Another Facility

يحدث النقل لأسباب كثيرة، ويكون أحياناً مرتبطاً بتغير حالة المريض، على سبيل المثال، نقل شخص من أو إلى وحدة العناية المركزة.

● يجب شرح سبب النقل للمريض وأسرته، ويكون هذا من مسؤولية الطبيب أو الممرضة، إذ يساعد النقل المنظم والفعال على تحاشي إثارة خوف المجتمع وقلق المريض.

● يجب أن تكون الغرفة أو الوحدة الجديدة جاهزة لاستقبال المريض وتُنقل الملابس والأدوات الشخصية وبعض المعدات والأدوية مع المريض.

● يجب على مقدم الرعاية الصحية معرفة كيفية نقل المريض والكراسي المتحركة (الشكل "2-3") والنقلات أو حتى سريره الذي يمكن أن يستخدم في النقل في بعض الحالات.

● يجب أن تتبع الإجراءات الصحيحة لتجنب إصابة مقدم الرعاية الصحية والمريض. يوجد كثيراً من النماذج المختلفة من الكراسي المتحركة والنقلات. ومن المهم قراءة تعليمات الشركة المصنعة فيما يتعلق بتشغيل أي قطعة من المعدات. إذا لم تكن هناك تعليمات، فاطلب من مشرفك المباشر شرح كيفية التشغيل الصحيح لكرسي متحرك، أو نقالة معينة. ولا تستخدم أي معدات حتى تعلم بكيفية استخدامها.



- كثيراً ما تستخدم حاملات الرفع الميكانيكية لنقل المرضى الضعفاء، أو المشلولين. ومن المهم قراءة تعليمات التشغيل الخاصة بها، ويجب فحص الأشرطة والمشابك والحملة بعناية بحثاً عن أي عيوب. يجب استخدام حركات سلسة ومتساوية أثناء تشغيل الرافع الميكانيكي الطبي لأنه غالباً ما يخالف المرضى منه، لذا يجب طمأنتهم أنه آمن.
- في حالات الرعاية المنزلية، يجب إبعاد الأثاث غير المهم عن الطريق أثناء النقل.
- إذا لم يتمتع السرير بميزة الرفع والخفض الآلي، فمن الضروري على مقدم الرعاية الصحية مراقبة وضعية الجسم الصحيحة وحنيه عند الوركين والركبتين بدلاً من الخصر. من الممكن استئجار أسرة مستشفيات وكراسي متحركة ورافع ميكانيكية طبية وغيرها من الأشياء المماثلة لتقديم الرعاية المنزلية.
- قبل أن يُنقل المريض، يجب على مقدم الرعاية الصحية الحصول على الموافقة، أو الأمر القانوني من المشرف المباشر عليه، لذا لا تقل مريضاً دون الحصول على التصريح الرسمي.
- من المهم مراقبة المريض عن كثب أثناء أي تحريك، أو نقل، انتبه إلى التغييرات في معدل النبض وضغط الدم والتنفس واللون. لاحظ علامات الضعف والدوار وزيادة التعرق، أو الانزعاج. في حال ملاحظة أيّ تغير غير طبيعي، فأعد المريض لوضع آمن ومرير وافحصه مع مشرفك المباشر، حينها سيقرر المشرف ما إذا كانت عملية النقل ستستمر أم لا.

تخرج المريض Discharging a Patient

يجب توافر أمر مكتوب خطياً من الطبيب قبل تخرج المريض، أو المريض المقيم من المستشفى. إذا كان أحد المرضى يخطط للمغادرة دون إذن، أبلغ مشرفك بذلك على الفور. فللمنشآت سياسات خاصة يجب اتباعها عندما يغادر الشخص متجاهلاً المشورة الطبية.

- عند استلام أمر تخرج، يجب على مقدم الرعاية الصحية التتحقق من ممتلكات المريض وحزمه. ويجب التتحقق من قائمة الجرد الشخصية الكاملة في وقت قبوله في المنشأة؛ للتأكد من أن جميع ممتلكات المريض حُرمت. يضمن الفحص الدقيق للوحدة، بما في ذلك أي أدراج وخزائن ومناطق تخزين، تساعده على العثور على جميع العناصر.
- تأكد من تلقي المريض التعليمات النهائية من الممرضة، أو الطبيب، قد تشمل هذه تعليمات المغادرة والوصفات الطبية. ركب أي معدات يفترض أن تُعطى للمريض.



- تطلب معظم المنشآت الطبية أن يرافق المريض موظفٌ من الكادر إلى السيارة. ويسمح بعضها للمريض بالمشي، لكن يفضل كثير منها نقل المرضى على كرسي متحرك. إذا كان المريض سينقل بسيارة إسعاف، فسيقوم موظفو الإسعاف بإحضار نقالة إلى الغرفة. في هذه الحالة، من المهم لمقدم الرعاية الصحية أن يحضر ممتلكات المريض لتكون جاهزة للنقل.
- لدى معظم الهيئات استمرارات، أو قوائم مرجعية تستخدم أثناء التخريج؛ للتأكد من اتباع جميع الإجراءات.

اخبر معلوماتك

1. اذكر ثلاثة أشياء يجب على مقدم الرعاية الطبية قياسها، وتسجيلها عند قبول المريض في المستشفى.
2. لماذا تستخدم حوامل الرفع الميكانيكية الطبية؟

2:3 وضع - تقليل وتحريك المريض

Positioning, Turning, and Moving Patients

بصفتك مقدم رعاية صحية فقد تكون من مسؤولياتك وضع المرضى وتحريكهم ونقلهم. إذا تمت هذه الإجراءات بشكل صحيح، فستوفر للمريض الراحة والرعاية المُثلى وستفادى إصابة نفسك والمريض أيضاً.

تذكر أن تحريك، أو تدوير، أو نقل المريض بصورة غير صحيحة، قد يتسبب في إصابات خطيرة للمريض، أو لمقدم الرعاية الصحية، وأحياناً، لا يمكن نقل بعض المرضى بأمان دون اللجوء إلى طرائق خاصة أو بأجهزة ميكانيكية.

أما المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية في الظهر، أو الرقبة، أو الورك، فلهم أن يُقلوا بأساليب خاصة فقط.

إذا كان هناك قيود على تحريك ونقل المريض، فلا بد من وضع تنبيه يعلق على باب غرفة المريض من الخارج. إذا لم تكن متأكداً ما إذا كان من الممكن تحريك المريض، أو نقله بأمان عام، فاسأل مشرفك دائمًا قبل اتخاذ أي إجراء. تذكر أنك مسؤول قانونياً عن أمان وسلامة المريض.

وضعية الجسم الصحيحة مهمة ومطلوبة في جميع الإجراءات المناقشة هنا.

احصل على المساعدة إذا لم تكن قادرًا على تحريك المريض بنفسك.



السلامة



المحاذاة (تقويم وضعية المريض) Alignment

يجب توجيه مقدمي الرعاية للمرضى للمحافظة على **محاذاة Alignment** طبيعية لجسم المريض. تُعرف المحذاة أنها اختيار وضعية صحيحة لأجزاء الجسم بالنسبة لبعضها البعض؛ بهدف إبقاء الجسم بوضعية سليمة. للمحاذاة الصحيحة الفوائد التالية:



الشكل "4-3" تدلي "سقوط" القدم وهو تقلص شائع يمكن منعه جزئياً بإبقاء القدم في الزاوية الصحية بالنسبة للساقي.



الشكل "3-3" التقلص هو شد، أو تقصير في العضلات يحدث بسبب قلة الحركة أو فرط إجهاد العضلة.



الشكل "6-3" تساعد وسادة القدم الوقائية في منع قرح الفراش التي تصيب القدم.



الشكل "5-3" المحذاة الصحية لمريض يرقد على ظهره في وضعية الاستلقاء.

- تجنب التعب:

- تساعد المحذاة الصحيحة المريض على الشعور بالراحة أكثر وتجنب التعب.
- الوقاية من التقلصات والشد العضلي:
 - يمثل (شكل "3-3") حدوث شدّ وقصر في عضلة، يحدث بسبب قلة الحركة أو قلة استخدام العضلة.
 - يعتبر هبوط القدم تقلصاً شائعاً، يمكن تقاديه إلى حدّ ما بإبقاء القدم في الزاوية الصحيحة نسبةً للساقي (شكل "4-3").





الشكل "7-3" المحاذاة الصحيحة لمريض يرقد على جانبه.



الشكل "8-3" يمكن استخدام وسادة كبيرة لدعم القدمين عندما يكون المريض في وضعية الاستلقاء البطني.

- يمكن استخدام مساند ودعامات القدم وأحذية التنس العالية لإبقاء القدم في الزاوية الصحيحة.
- تساعد مجموعة التمارين الشاملة في تجنب هذه التقلصات أيضاً.

● الوقاية من قرحة الضفت.

لمحاذاة المريض الذي يرقد على ظهره في وضعية الاستلقاء بشكل صحيح (شكل "5-3"):

- ضع رأس المريض في خط مستقيم مع عموده الفقري.
- ضع وسادة تحت الرأس والرقبة لتوفير الدعم.
- يمكنك وضع وسادة، أو بطانية ملفوفة أسفل الساقين من الركبتين إلى فوق الكعب، بمسافة 5 سم لتوفير الدعم وإبقاء الكعبين مرتفعين عن السرير.
- يمكن وضع وسادات وقائية على الكعبين، أو المرفقين (الشكل "6-3").
- يجب أن تشير كل أصابع القدم للأعلى. يمكنك وضع بطانية ملفوفة، أو وسادة، أو لوح للقدم على الوجه الأخمصي لها. لتحقيق ذلك، يمكن استخدام أحذية التنس عالية الساق للمحافظة على القدم بهذه الزاوية.

تحقق من راحة المريض واحتياطات السلامة والدعم قبل المغادرة، وتأكد من عدم وجود بروز عظمي مكشوف وأن جميع أجزاء الجسم مدرومة.



لوضع المريض المستلقى على جانبه بمحاذاة صحيحة، (الشكل "7-3"):

- ضع وسادة صغيرة تحت الرأس والرقبة لتوفير الدعم.
- اثنان الذراع السفلي عند مستوى المرفق. يمكن وضعها بمحاذاة الوجه.
- وفر الدعم للعضد، مع ثبيته عند مستوى المرفق بوسادة أو بطانية ملفوفة.
- اثنان الركبتين قليلاً. ضع وسادة قاسية أو بطانية ملفوفة بين الساقين. يجب أن تمتد الوسادة من أعلى الساق حتى الكاحل.
- استخدم لوح قدم، أو وسادة، أو بطانية ملفوفة، أو أحذية تنس عالية الساق؛ لإبقاء القدمين بزاوية قائمة (90 درجة) على الساقين.



- يمكن وضع مناشف ملفوقة أو كرات مطاطية رغوية في اليدين المصابتين بالشلل لمنع التقلصات.

- استخدم الوسائل لدعم الظهر والبطن.

- يمكن وضع الضمادات الواقية على الكاحلين والكعبين والمرفقين.

- تأكد من أن جسم المريض غير ملتوٍ، وأن أي جزء من الجسم لا يضغط  **الاحتياطات** مباشرة على أي جزء آخر.

لمحاذاة المريض الذي يرقد على بطنه (في وضعية الاستلقاء البطني) :

- ضع الرأس بمحاذاة العمود الفقري وبشكل مستقيم.


- اقلب الرأس إلى أحد الجانبين. يمكن دعمه بوسادة صغيرة. ويؤدي وضع الوسادة بزاوية إلى إبعادها عن وجه المريض.

- يمكن وضع وسادة صغيرة تحت الخصر لتدعيمه.


- ضع وسادة قاسية أسفل الساقين. سيؤدي ذلك إلى ثني الركبتين قليلاً.

- يمكن تمديد القدمين فوق نهاية الفراش حتى تظلا بزاوية مناسبة نسبة للقدمين. ويمكن دعمهما في هذا الوضع بواسطة الوسائل، أو البطانيات الملفوفة (الشكل "8-3").

- ضع الذراعين على جانبي رأس المريض باستقامة. استخدم ضمادات لحماية المرفقين، ثم اثنى المرفقين قليلاً لتوفير الراحة.




الشكل "9-3 ب" المرحلة الثانية من قرحة الضغط.



الشكل "9-3 أ" المرحلة الأولى من قرحة الضغط.



الشكل "9-3 د" المرحلة الرابعة من قرحة الضغط.



الشكل "9-3 ج" المرحلة الثالثة من قرحة الضغط.

قرحات الضغط

Pressure Ulcers



الشكل "10-3" مرتبة ضغط الهواء بالتناوب، لتغير باستمرار نقاط الضغط على جلد المريض.

قرحة الضغط **Pressure ulcer** (تسمى أيضًا قرحة الاستلقاء، الناقبة، أو قرحة الفراش) هي قرحة ناتجة عن ضغط مطول على منطقة من الجسم مما يعيق الجريان الدموي فيها. قرحات الضغط شائعة في المناطق التي تكون فيها العظام قريبة من الجلد، مثل عظم الذنب (منطقة العصعص) والوركين والركبتين والكاحلين والكعبين والمرفقين. يحدث تلف الأنسجة الناجم عن قرحة الضغط على أربع مراحل:

- المرحلة الأولى: يتلوّن الجلد السليم بالأحمر أو الأزرق الرمادي (الشكل "3-9أ"). ولا يختفي التلوّن بعد تخفيف الضغط.
- المرحلة الثانية: تتطوّر السحجات أو الكدمات أو القرحات المفتوحة نتيجة تلف الأنسجة في الطبقات العليا من الجلد (البشرة والأدمة) (الشكل "3-9ب").
- المرحلة الثالثة: وفيها تتلف جميع طبقات الجلد، فتشكل حفرة عميقه ومفتوحة فيه، وتصبح الأنسجة الدهنية والعضلية مكسوّفة ظاهرة للعيان (الشكل "3-9ج").
- المرحلة الرابعة: يمتد الضرر ليشمل أنسجة العضلات والأوتار والعظام (الشكل "3-9د").

إن الوقاية من حدوث قرحات الضغط أسهل من علاجها. إذا كُشفت هذه القرحات في المراحل المبكرة، يمكن أن يساعد العلاج الفوري في تجنب حدوث المزيد من الضرر. من الطرق الفعالة للوقاية من قرحات الضغط:

- العناية الجيدة بالبشرة.
- استخدام المستحضرات المرطبة للبشرة الجافة.
- المُساعدة في تنظيف الجلد من البول والبراز.
- التدليك بحركات دائرة حول المنطقة المُحمرة.
- تقليل المريض على جوانبه بشكل متواتر (كل ساعتين على الأقل).
- اختيار وضعية جسد مناسبة للمريض، نتجنب فيها الضغط على المناطق الملتهبة.
- الحفاظ على بياضات وأغطية الفراش نظيفة وجافة وممدودة بشكل جيد دون ثياب.
- وضع واقيات من جلد الغنم، أو صوف الحَمل، أو الرغوة على النواة العظمية، مثل الكعبين والمرفقين.

يعتبر تخفيف الضغط أهم عامل في الوقاية من قرحات الفراش. يتوافر أكثر من 100 نوع مختلف من سطوح الدعم، أو منتجات تقليل الضغط لمنع التقرّح. وتعتبر المفارش ذات ضغط الهواء المتغير (الشكل "10-3") وأسرّة الدوران الجانبي المستمرة (التي تقلب المريض باستمرار من جانب إلى آخر) من بين أكثر الأسطح الخاضدة للضغط تقدماً. كما تعتبر المراقبة الدقيقة لجلد المريض أثناء الاستحمام، أو التقليل أمراً

ضروريًا. فإذا لوحظ وجود منطقة شاحبة، أو حمراء أو زرقاء رمادية، يجب الإبلاغ عن ذلك وتوثيقه على الفور.

علاج قرحة الضغط:

- يُعالج قرح الضغط في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية برغوة خاصة، أو بضمادات غراونية مائية إلى جانب تقليل المريض باستمرار؛ لإبعاد الضغط عن القرحة.

● يمكن معالجة قرحة المرحلة الثالثة والرابعة بهذه الضمادات أيضًا، أو يمكن معالجتها بعلاج الجروح بالضغط السلبي باستخدام تقنية إغلاق الجرح بمساعدة التفريغ (الأشكال 11-3أ و 11-3ب). تقطع إسفنجية رغوية لتتناسب حجم الجرح المفتوح. ويوضع لاصق شفاف فوق الإسفنج، ويدخل أنبوب الشفط عبر الضمادة. يوصل الأنبوب بجهاز الشفط وعلبة جمع يمكن التخلص منها. يقوم هذا الجهاز بإغلاق الجرح وتطبيق ضغط سلبي لتحفيز التئام الجرح والوقاية من الالتهابات. يعمل عن طريق سحب حواف الجرح معًا وإزالة الإفرازات والحطام الخلوي الناجم عن الالتهاب. كما أنه يقلل من الوذمة (التورم) ويعزز التروية عن طريق إجبار السوائل على التدفق في المنطقة.

تقليل المريض Turning a Patient

يجب تقليل المريض في الفراش بشكل متكرر، وتغيير وضعيته كل ساعتين على الأقل إذا سمح الطبيب بذلك. تنشر بعض المنشآت جدول مواعيد التقليل بجوار سرير المريض؛ على سبيل المثال، الساعة 6 صباحًا: الجانب الأيمن؛ 8 صباحًا: الظهر؛ 10 صباحًا: الجانب الأيسر؛ و12 ظهرًا: البطن.

يمرن التقليل المتكرر العضلات. كما أنه ينشط الدورة الدموية ويقلل من الاحتقان الرئوي ويساعد على الوقاية من قرحة الضغط والتقلصات، ويوفر الراحة للمريض. يجب اتباع إجراءات التقليل الصحيحة لمنع إصابة كل من المريض ومقدم الرعاية الصحية.

- قبل تدوير أو تحريك المريض:


- اطرق على الباب وتوقف قليلاً قبل الدخول. قدم نفسك.

 المجتمع **وعرّف على المريض، واشرح الإجراء واحصل على الموافقة منه.**

- وفر الخصوصية. أغلق الباب واسحب الستارة.
- اغسل يديك وارتدِ القفازات.



الشكل 11-3 بعد تنظيف قرحة الفراش أو الجرح بشاش أو ضمادة رغوية (أ)، يربط جهاز التفريغ المساعد لإغلاق الجرح (ب) لتطبيق ضغط سلبي على المنطقة لتحفيز الشفاء.



الشكل "12-3 أ" ضع ملأة الرفع تحت المريض عبر قلب المريض إلى أحد الجانبين.



الشكل "12-3 ب" يجب أن يقوم كلّ من أعضاء فريق الرعاية الصحية بلف حفاف غطاء الرفع إلى الداخل، بالقرب من كلاً جانبيًّا جسم المريض.



الشكل "12-3 ج" عند إشارة معينة، يرفع مقدمًا الرعاية الصحية الملاءة والمريض، وينقلان المريض إلى مقدمة السرير.

- اقفل عجلات السرير لمنع حركته، وارفع السرير إلى ارتفاع مريح.
- استخدم حركات الجسم المناسبة طوال العملية، واعتمد على **السلامة** وزن جسمك لتحريك المريض؛ ذلك لكي تتجنب إجهاد الظهر.

● **بعد إتمام الإجراء:**

- اترك جسم المريض في وضع ومحاذاة جيدة، وتأكد من أن المريض مستريح.
- ارفع الحواجز الجانبية للسرير (إذا زم الأمر) قبل أن تترك المريض.
- تأكد أن جهاز استدعاء الممرض وغيره من المستلزمات المطلوبة في متداول المريض.
- اخفض السرير إلى أدنى مستوى له.
- بلّغ عما أجري وسجل جميع المعلومات المطلوبة على لوحة المريض، أو أدخلها في السجل الصحي الإلكتروني.
- أعد جميع المعدات إلى مكانها السابق، وتأكد أن المنطقة نظيفة.
- انزع القفازات واغسل يديك.

نقل المريض في السرير Moving a Patient Up in Bed

- يجب أن يكون هناك شخص واحد على كلّ جانب من السرير.
- اخفض مقدمة السرير، وأزل جميع الوسائل؛ يمكن إبقاء وسادة واحدة على اللوح الأمامي للسرير لمنع إصابة رأس المريض أثناء تحريكه مع سريره.
- راقب المريض لملاحظة ضيق التنفس. إذا لوحظ أي صعوبة في التنفس، ارفع مقدمة السرير على الفور، وتحقق مع مشرفك من **سلامة** المريض قبل المتابعة.

- ضع ملأة الرفع تحت المريض عبر قلب المريض إلى أحد جانبيه (الشكل "12-3 أ"). يمكن طي غطاء الرفع في منتصف السرير. تأكد أنّ الغطاء يمتد تحت رأس المريض وكتفيه ووركيه وفخذيه. اقلب المريض إلى الجانب الآخر وافرد غطاء الرفع بحيث يغطي السرير بالكامل، ثم اقلب المريض على ظهره.

- يجب على شخصين استخدام غطاء الرفع لتحريك المريض. يقف أحدهما على أحد جانبي السرير والثاني على الجانب الآخر. ويضع كلّ شخص إحدى يديه على غطاء الرفع عند كتفي المريض واليد الأخرى عند وركه.



- يواجه الشخصان مقدمة السرير ويرتكز كلّ منهما على قاعدة واسعة بوضع إحدى القدمين أمام الأخرى. ويجب أن يكون كلّ شخص منها قريباً من المريض والسرير.
- إذا كانت حالة المريض تسمح، فاطلب منه ثني ركبتيه وثبت كلتا القدمين بقوة على السرير.
- يقوم مقدما الرعاية الصحية الاثنان بلف حواف غطاء الرفع إلى الداخل، بالقرب من كلا جانبي جسم المريض (الشكل "12-3 ب").
- وعند إشارة معينة، يرفعان الملاءة والمريض، وينقلانه إلى مقدمة السرير (الشكل "12-3 ج"). انقل وزنك من رجلك الخلفية إلى الأمامية في نفس الوقت الذي تنقل فيه المريض.
- بعد وضع المريض بشكل صحيح، يقوم كلّ عضو من أعضاء الفريق بإعادة ثني غطاء الرفع إلى جانب السرير.


قلب المريض بعيداً للتغيير وضعيته Turning a Patient Away to Change Position

- إذا كانت الحاجز الجانبي للسرير موجودة ومرتفعة، فاخفض الحاجز الجانبي الأقرب إليك، وتأكد من رفع الحاجز الجانبي في الجهة المقابلة وأنه مقفول بإحكام.
- يجب أن يكون المريض مستلقياً على جانب السرير القريب منك. إذا كان الأمر كذلك، فتابع إلى الخطوة التالية. أمّا إذا كان المريض في المنتصف، أو قريباً من الجانب الآخر من السرير، فحرك المريض على النحو التالي:
 - ضع إحدى يديك تحت رأس وعنق المريض، وضع يدك الأخرى تحت الجزء العلوي من ظهر المريض، ثم حرك الجزء العلوي من جسم المريض نحوك.
 - ضع كلتا يديك تحت ورك المريض، حرك الوركين نحوك.
 - ضع كلتا يديك تحت ساقي المريض العلوية والسفلى، وحرك الساقين نحوك.
 - إذا لم تستطع نقل المريض، فاطلب المساعدة.



السلامة





الشكل "13-3" ضع إحدى يديك تحت كتف المريض والأخرى تحت ورك المريض. استخدم حركة سلسة ومتوازنة لقلبه بعيداً.

- اطلب من المريض وضع ذراعيه على الصدر وتحريك الساق القريبة (تلك الأقرب إليك) فوق الساق الأخرى. هذا سيسهل أمر تقليل المريض ويقي من الإصابة.
- لا تصالب ساق المريض إذا كان قد خضع لجراحة استبدال مفصل الورك. !
- اقترب من المريض عن طريق ثني ركبتيك والمحافظة على استقامة ظهرك. ضع قدميك بطريقة توفر قاعدة عريضة من الدعم والارتكاز، ثم مرر إحدى يديك تحت كتف المريض والأخرى تحت ورك المريض. استخدم حركة سلسة ومتوازنة لقلب المريض بعيداً عنك ووضعه على جانبه (الشكل "13-3").
- ضع يديك تحت رأس المريض وكفيه، واسحب الرأس والكتفين إلى الخلف باتجاه منتصف السرير.
- ضع يديك تحت وركي المريض واسحبهما برفق إلى الخلف باتجاه منتصف السرير، ثم ضع يديك تحت أرجل المريض واسحبهما إلى الخلف باتجاه منتصف السرير.



- وضع وسادة خلف ظهر المريض، وبين الساقين لمحاذاة الوركين، وتحت الجزء العلوي من الذراع، ثم تأكد من أن المريض مرتاح وهي محاذاة جيدة.

قلب المريض إلى الداخل لتغيير وضعيته Turning the Patient Inward to Change Position

- اخفض حاجز السرير الجانبي الأقرب إليك، إذا كان موجوداً ومرتفعاً.
- إذا كان المريض قريباً جداً من الجهة الأقرب إليك من السرير، فانقله إلى الجانب المقابل كما يلي:
 - وضع إحدى يديك تحت رأس وكتفي المريض والأخرى تحت ظهره. حرك الجزء العلوي من الجسم باتجاه الجانب المقابل من السرير.
 - وضع كلتا يديك تحت ورك المريض، وحرك الوركين نحو الجانب المقابل من السرير.
 - وضع كلتا يديك تحت أرجل المريض، وحرك الساقين نحو الجانب المقابل من السرير.
- اطلب من المريض أن يشبك ذراعيه على صدره. ضع ساق المريض الأبعد عنك فوق الساق الأقرب إليك. هذا يمنع إصابة ذراعي وساقي المريض.
- لا تصالب الساقين إذا كان المريض قد خضع لجراحة استبدال مفصل السلمة  الورك.
- اقترب من المريض عن طريق ثني ركبتيك والمحافظة على استقامة ظهرك. ضع قدميك بطريقة توفر قاعدة عريضة من الدعم والارتكاز، ثم مرر يدك الأقرب إلى رأس السرير على كتف المريض البعيد، وضع الأخرى خلف ورك المريض (الشكل "14-3أ"). استخدم ركبتك لثبيت جسمك على جانب السرير. استخدم حركة سلسة ولطيفة لقلب المريض ودحرجته تجاهك (الشكل "14-3ب").
- يمكن أيضاً استخدام ملاءة الرفع بواسطة واحد أو اثنين من مقدمي الرعاية الصحية لتقليل المريض. يمسك أعضاء الفريق بحواف ملاءة الرفع ويقلبون الحواف إلى الداخل قرب جسم المريض (الشكل "14-3ج"). وعند إشارة معينة، يستخدم أعضاء الفريق حركة سلسة ومتوازنة لقلب المريض إلى الداخل (الشكل "14-3د").



- ارفع الحاجز الجانبي وثبته، إذا لزم الأمر. واذهب إلى الجانب المقابل من السرير وانزل الحاجز الجانبي الآخر، في حال كان موجوداً ومرتفعاً.
- ضع يديك تحت رأس وكتف المريض، واسحبهما معيناً إياهما إلى منتصف السرير.
- ضع يديك تحت وركي المريض، واسحبهما نحو منتصف السرير.
- ضع يديك تحت ساقى المريض، واسحبهما نحو منتصف السرير.
- ضع وسائد خلف ظهر المريض، وبين الساقين، وتحت العضد؛ لجعل المريض بوضعية جسد ومحاذاة جيدة، تأكد أنّ المريض مرتاح.



الشكل "14-3 ب" استخدم حركة لطيفة وسلسة لقلب المريض نحوك.



الشكل "14-3 أ" ضع يديك على كتف المريض بعيدة ووركه.



الشكل "14-3 د" عند إشارة معطاة، يستخدم أعضاء الفريق حركة سلسة ومتوازنة لقلب المريض إلى الداخل.



الشكل "14-3 ج" يمكن استخدام غطاء الرفع بواسطة واحد أو اثنين من مقدمي الرعاية الصحية لقلب المريض.



التعليق أو التدلي Dangling

إذا كان المريض حبيس الفراش لفترة من الوقت، غالباً ما يجلس في وضع متسلق Dangling قبل نقله من السرير. التعليق يعني الجلوس مع تدلي الأرجل على جانب السرير. يُمنح ذلك المريض بعض الوقت للتكيف مع وضع الجلوس.



الشكل "15-3 أ" وضع إحدى ذراعيك حول كتفي المريض، ومرر ذراعك الأخرى تحت ركبتيه.

- اخفض السرير إلى أدنى مستوى له. وإذا كانت الحاجز الجانبي موجودة ومرتفعة، فاخفض الحاجز الجانبي على الجهة التي ستتدلى منها أرجل المريض.
- افحص نبض الشريان الكعبري؛ سيكون هذا بمثابة معيار يقيس مدى تحمل المريض للإجراءات (المعدل الضابط أو في حالة الراحة).

• افحص ضغط الدم لتحديد مدى تحمل المريض للإجراء. يُقاس ضغط الدم أثناء الاستلقاء والجلوس والوقوف؛ قد يعاني المريض من هبوط ضغط الدم مع تغيرات الوضعية، وهذا ما يسمى هبوط الضغط الانصابي.



الشكل "15-3 ب" أدر المريض ببطء نحو جانب السرير.

- راقب أيضاً معدل التنفس والتوازن (قد يشكو المريض من الدوار، أو الدوخة) وكمية العرق واللون وغيرها من الخصائص المماثلة.
- ارفع مقدمة السرير ببطء لتعديلها إلى وضعية الجلوس. امنح المريض وقتاً للتكيف مع الوضعية.

• اقترب من المريض من خلال ثني ركبتيك وحافظ على ظهرك مستقimًا. ثبت قدميك لتوفير قاعدة عريضة من الارتكاز والدعم. ضع ذراعك الأقرب إلى مقدمة السرير حول كتفي المريض، ومرر ذراعك الأخرى تحت ركبتيه (الشكل "15-3أ"). أدر المريض ببطء نحو جانب السرير (الشكل "15-3ب"). ضع قدم المريض على مسند القدم لإراحتها إذا لزم الأمر.

قف أمام المريض لمنع سقوطه.

السلامة

- افحص نبض المريض الكعبري. انتبه إلى أي علامات تدل على الضيق والتعب، مثل شحوب اللون، وزيادة التعرق، وصعوبة التنفس، والضعف، والدوخة، أو الغثيان.





- إذا أظهر معدل النبض زيادة غير طبيعية، فإن ضغط الدم ينخفض بشكل ملحوظ، ويتبعة تنفس جهدي، ويصبح اللون شاحباً، نلاحظ زيادة التعرق، أو إصابة المريض بدوار، أو ضعف شديد، فيجب إعادةه على الفور إلى وضع الاستلقاء والراحة.
- وجّه المريض أن يثني ويمدد ساقيه وقدمييه؛ يزيد ذلك من نشاط الدورة الدموية في المنطقة ويعفز العضلات.
- دع رجلي المريض في وضع التدلي لوقت محدد أو حسبما تسمح به حالته.
- وعند انتهاء الوقت المحدد، ضع إحدى الذراعين حول كتفي المريض وذراعك الأخرى تحت ركبتيه. وبرفق وببطء، أعد المريض إلى السرير.
- اخفض رأس السرير بيطراء، وضع المريض في محاذة جيدة.
- تحقق من نبض المريض الكعبي مرّة أخرى وانتبه إلى أي تغييرات مهمة. أبلغ عن أي تغيير على الفور.

نقل المريض إلى كرسي أو كرسي متحرك

Transferring a Patient to a Chair or a Wheelchair


- يمكن وضع الكرسي أو الكرسي المتحرك بطريقتين: عند مقدمة السرير مواجهًا لنهاية السرير أو عند النهاية مواجهًا للرأس. غالباً ما يعتمد مكان الوضع على التجهيزات الأخرى في الغرفة. وفي حال كان الأمر متاحاً: يجب وضع الكرسي بطريقة يستند فيها إلى حائط، أو أثاث صلب حتى لا ينزلق إلى الخلف.
- اقل عجلات الكرسي المتحرك، وارفع مساند القدمين بحيث لا تعيق الحركة (شكل "3-16أ"). ثم تحقق مجدداً من القفل.
- اقل السرير لمنع الحركة، واحضنه إلى أدنى مستوى وارفع مقدمته بيطراء.
- إذا كانت الحاجز الجانبية للسرير موجودة ومرتفعة، فاخفض الحاجز على الجانب الذي سينزل منه المريض عن السرير. اطوي أغطية السرير وضعها على نهايته.
- ساعده المريض في الجلوس على جانب السرير مع وضع أقدامه على الأرض. انتبه إلى أي علامات تعب وإرهاق. راقب اللون ومعدل النبض والتنفس وعلامات أخرى مماثلة. ساعده على ارتداء الجوارب والأحذية، أو النعال ذات الأسطح غير القابلة للانزلاق، ولف حزام النقل على المريض.
- حافظ على استقامة ظهرك. وامدد كلتا يديك إلى جانبي الحزام وامسكه بإحكام. واجه المريض وقف بالقرب منه، وثبت قدميك لتوفير قاعدة عريضة من الدعم والارتكان. إذا كان لدى المريض ضعف في الساق، فدع ساقه بوضع ركبتك على ركبة المريض، أو باعتراض قدمه بقدمك.

- في حال وجود مانع طبي لاستخدام الحزام الناقل، فضع يديك تحت ذراعي المريض وحول الكتفين من الخلف لتقديم الدعم اللازم.
- اتفق مع المريض على إشارة؛ مثل العد إلى ثلاثة. اطلب من المريض الضغط على السرير بكلتا يديه للنهوض إلى وضعية الوقوف.


- بعد إعطاء الإشارة، ساعد المريض على الوقوف. ارفع المريض من الحزام بينما ينهض بنفسه من السرير (الشكل "3-16ب"). ضع ركبتيك وقدميك بثبات بشكل مقابل لركبتي وقدمي المريض لتوفير الدعم اللازم.
- امنح المريض الوقت الكافي للتكييف مع وضعية الوقوف، محاافظاً على نفس وضعية يديك، ساعد المريض على الاستدارة بعدة خطوات حتى يلامس ظهر رجليه مقعد الكرسي (الشكل "3-16ج").
- اطلب من المريض وضع يديه على المساند المخصصة، وحني ركبتيه بينما تُخفضه تدريجياً وبيطئاً ليستقر في وضعية الجلوس على الكرسي (الشكل "3-16د").
- ضع المريض بوضعية جلوس مريحة، وأزل حزام النقل. استخدم بطانية لغطية حجر المريض ورجليه. أنزل مساند القدمين على الكرسي المتحرك، وضع قدمي المريض عليها، مع الحرص على عدم صدم القدمين (الشكل "3-16ه").
- راقب المريض بحثاً عن أي علامات تعب، أو إجهاد. ابق معه إلى حين التأكد من عدم وجود مشكلات. إذا تركت المريض جالساً على كرسي المتحرك، أو عادي، فتأكد من أن جهاز استدعاء الممرض وغيره من المستلزمات موجودة في متناول يد المريض. اطمئن على المريض من حين إلى آخر.
- إذا كنت تنقل المريض على كرسي المتحرك، فتمهل عند مداخل الأبواب وتفحص ما إذا كان هناك أحد يمر. وعند دخول المصعد، أدر الكرسي نصف دورة وارجع إلى الخلف إلى داخل المصعد. الأمر مماثل عند النزول من ممر منحدر بشدة، أدر الكرسي نصف دورة وارجع إلى الخلف لتنزل على المنحدر. استخدم وزن جسمك لدفع الكرسي، وقف بالقرب منها. راقب المريض عن كثب بحثاً عن علامات ضيق، أو تعب أثناء النقل.
- لإعادة المريض إلى الفراش، نفذ الإجراء بشكل معكوس، بدءاً من وضع حزام نقل على المريض ورفع مساند القدمين.
- تأكد من قفل العجلات قبل مساعدة المريض على النهوض من الكرسي المتحرك. اغلق السرير لمنع تحركه.

- ضع جسم المريض في محاذاة جيدة بعد إعادةه إلى الفراش.





الشكل "3-16 أ" - د اقفل العجلات، وارفع مساند **الشكل "3-16 ج"** ارفع الحزام إلى أعلى **الشكل "3-16 ج"** ساعد المريض على الاستدارة حتى يلامس ظهر قدميه مقدمه من السرير. بينما ينهم المريض بنفسه من السرير.




الشكل "3-16 ه" - د اخفض مساند المريض تدريجياً وبيطئ ليستقر في وضعية **الشكل "3-16 ه"** وضع قدمي المريض عليهما.



نقل المريض إلى حمّالة (نقالة) Transferring a Patient to a Stretcher


- ضع غطاء فوق المريض. اطو ملاءة السرير إلى نهايته، وتجنب كشف المريض.
- ضع الحمّالة بجانب السرير. يجب أن يكون السرير والحمّالة متوازيين.
- اقفل عجلات الحمّالة. وبالإضافة إلى الأقفال، استخدم وزن جسمك لثبيت الحمّالة على السرير أثناء هذا الإجراء.
- إذا كان المريض واعياً وقدراً على الحركة بدون مساعدة، فمدد يديك فوق الحمّالة وارفع الغطاء واحمله. اطلب من المريض أن يزحف من السرير إلى النقالة. ثبت النقالة على السرير (شكل "17-3").
إذا كان المريض يحتاج المساعدة، فامدد يد العون بتحريك رأس المريض وأكتافه أولاً، ثم وركيه، وأخيراً ساقيه وقدميه.
- إذا كان المريض ضعيفاً جداً، أو مشلولاً، أو فقداً للوعي، أو شبه فقد للوعي، فاستعن بثلاثة أو أربعة آخرين من أعضاء الفريق:
 - ضع ملاءة رفع، أو بطانية تحت المريض تمتد من رأس وعنق المريض إلى القدمين.
 - يجب أن يقف شخصان، أو ثلاثة بجانب النقالة واثنان، أو ثلاثة أشخاص على الجانب المفتوح.
 - لفّ أطراف ملاءة الرفع، أو البطانية قرب جسم المريض.
 - باستخدام قبضة اليد بوضعية الكب، يمسك أحد المساعدين بالملاءة من ناحية رأس المريض وخرقه. ويمسك الثاني الملاءة من ناحية الورك والساقي. يمسك المساعدون من على الجانب المفتوح من السرير بالملاءة في نفس المناطق. إذا تواجد مساعد ثالث على أحد الجانبين، أو كليهما، ينبغي أن يتذدوا وضعاً مناسباً بحيث يتوزع وزن المريض على ثلاثتهم بالتساوي.
 - عند إعطاء الإشارة، يجب على جميع المساعدين رفع الملاءة قليلاً لينسلّ المريض برفق من السرير إلى الحمّالة. بعض المنشآت تستخدم الواحاً مزلقة بدلاً من ملاءة الرفع، أو البطانية.
- ضع المريض برفق على الحمّالة. أحكم ربطة حزام (أو أحزمة) الأمان. ارفع كلا الحاجزين الجانبيين للنقالة.



الشكل "17-3" ارفع البطانية واستخدم وزن جسمك لثبيت النقالة مقابل السرير أثناء نقل المريض إلى الحمّالة.



الشكل "18-3 أ" يجب على أعضاء الفريق على جانبي النقالة لف ملاءة الرفع بالقرب من جسم المريض والتموضع بحيث يدعمنون جميع أجزاء جسم المريض.



الشكل "18-3 ب" عند إعطاء إشارة معينة، يجب على جميع المساعدين رفع الملاءة قليلاً لتحريك المريض برفق من النقالة إلى السرير.

- لنقل المريض، يوجّه شخصان الحمّالة (أحدهما عند مقدمها والآخر عند نهايتها). افتح عجلات الحمّالة، وتحرك ببطء. عندما ينقل المريض على الحمّالة، يجب دائمًا أن تمرّ قدماه أولاً. عند النزول على منحدر، ينبغي للشخص الموجود عند نهاية الحمّالة أن يرجع إلى الخلف ويستخدم وزن جسمه للتحكم فيها. عند دخول مصعد ما، اضغط على الزر المناسب لإبقاء باب المصعد مفتوحاً. ادخل الحمّالة إلى المصعد رجوعاً إلى الوراء بحيث يدخل رأس المريض أولاً. لمغادرة المصعد، اضغط على الزر لإبقاء الباب مفتوحاً، وادفع الحمّالة إلى الخارج بحيث تخرج القدمين، أولاً.
- لإعادة المريض إلى السرير، اعكس الإجراءات بدءاً من قفل عجلات الحمّالة والسرير وفتح حزام (أو أحزمة) الأمان، ثم تابع كما هو موضح في الشكلين "18-3أ" و "18-3ب".

استخدام رافعة طبية ميكانيكية لنقل المريض Using a Mechanical Lift to Transfer a Patient

- ستوّضح الشركة المصنعة الوزن المسموح به للرافعة الميكانيكية. لا تستخدم الرافعة الميكانيكية إذا كان وزن المريض يتجاوز الوزن المحدد.  السلامة
- تتطلب معظم المنشآت أن يقوم اثنان من مقدمي الرعاية الصحية بتنفيذ هذه الإجراءات. أحدهما يقوم بتشغيل الرافعة بينما يوجه الآخر حركات المريض.  السلامة
- تتحقق من الأشرطة والحبال والمشابك للتأكد من عدم وجود عيوب. افحص الوحدة الهيدروليكيّة وابحث عن أي أثر لتسريب الزيت. لا تستخدم الرافعة إذا كانت الأحزمة، أو الحمّالة ممزقة، أو فيها خلل. قد ينجم عن المشابك غير الآمنة، أو تسريب الزيت من الوحدة الهيدروليكيّة، حدوث إصابات خطيرة. ضع ملصقاً على الرافعة المعيبة يحذر من استخدامها، وأعلم مشرفك فوراً.
- يخشى المرضى من نقلهم بالرافعة في كثير من الأوقات. من المهم أن يبقى المريض مسترخيًا قدر الإمكان أثناء النقل، ومن الضروريطمأنته وتشجيعه باستمرار.  المجتمع
- ضع الكرسي العادي أو المتحرك بجوار نهاية السرير، بحيث يكون وجه المقعد مقابلأً لرأس السرير. اقفل عجلات الكرسي المتحرك. ارفع مساند القدم إلى الوضع العمودي.
- اقفل عجلات السرير. وإذا كانت الحواجز الجانبية موجودة ومرفوعة، اخفضها في الجانب الذي سيُنقل منه المريض.




- أدر المريض أو حركه لوضع الحمالة الطبية تحته. يجب وضع الحمالة تحت الكتفين والأرداف والفخذين. تأكّد من أنّ الحمالة ناعمة وأنّ المركز بالقرب من مركز ظهر المريض (الشكل "3-19أ").
- ضع الرافعة الطبية الميكانيكية فوق السرير (الشكل "3-19ب"). وافتح قاعدة الرافعة لأوسع نطاق ممكّن لها لتوفير قاعدة دعم عريضة.
- اربط أحزمة التعليق بالحملة، وأدخل الخطافات من داخل الحملة إلى الخارج لإبقاء الطرف المفتوح للخطافات بعيداً عن جسم المريض. تأكّد من أنّ الأربطة ليست متشابكة أو ملتوية. وإذا كانت المشابك موجودة على الخطافات، فتأكّد من أنها آمنة.
- اربط أحزمة التعليق بإطار الرافعة (الشكل "3-19ج"). تأكّد من أنّ الأحزمة مثبتة بإحكام، وأنّها ليست متشابكة أو ملتوية. ضع ذراعي المريض داخل الأحزمة. شجّعه على إبقاء ذراعيه مطوية على صدره لإبقاء الذراعين داخل الأحزمة.
- أدر ذراع الرافعة أو استخدم التحكم الهيدروليكي لرفع المريض ببطء فوق السرير. افحص الأربطة والحملة وموضع المريض للتأكد من تعليق المريض بواسطة الرافعة بشكل محكم.
- استمر في رفع المريض حسب الحاجة حتى تتمكن من تدوير الرافعة ببطء لتحريرك المريض بعيداً عن السرير ووضعه على الكرسي العادي أو المتحرك. حافظ على سلاسة وتساوي الحركات قدر الإمكان (الشكل "3-19د"). تحرك ببطء لتفادي الاهتزاز أو الارتجاج الذي قد يخيف المريض.
- اخفض الرافعة ببطء لوضع المريض على الكرسي العادي أو المتحرك. وجّه ساقى المريض إلى مكانهما الملائم على الكرسي (الشكل "3-19ه").
- فكّ أحزمة التعليق من الحملة (الشكل "3-19و")، وأزلّها من تحت المريض (الشكل "3-19ز"). وفي بعض الأحيان، تُترك الحملة في موضعها تحت المريض. حرّك الرافعة بعيداً عن المريض بحذر.
- احرص على عدم أذية المريض بالأحزمة أو الرافعة، وذلك أثناء تحريرها بعيداً عن الكرسي  السلامة.
- لإعادة المريض إلى الفراش، اعكس الإجراء. ابدأ بالتأكد من قفل عجلات الكرسي والسرير. اربط أحزمة التعليق بالحملة بطريقة مُحكمة.

اخبر معلوماتك

1. في أي مرحلة من مراحل تخرّب النسيج تكون قرحة ضغط مع سحجات، كدمات، أو قروح مفتوحة ضمنها؟

2. كم مرة يجب تغيير وضع، أو تقليل الملازم للفراش؟





الشكل "19-3" (أ) ضع الحمالة تحت كتفي المريض وأرداfe وفخذيه. (ب) ضع الراافعة الميكانيكية فوق السرير. (ج) اربط أحزمة التعليق بإطار الراافعة، وتأكد أنها مقلبة بالإطار أو مثبتة بإحكام. (د) ارفع المريض من السرير بحركة سلسة. (ه) اخفض الراافعة بيطة لنقل المريض إلى الكرسي المتحرك. (و) فك أحزمة التعليق من الحمالة. (ز) أزل الحمالة من تحت المريض.




3:3 ترتيب السرير Bedmaking

يعدّ ترتيب الأسرّة بشكل صحيح من المهام الواجب على عديد من مقدمي الرعاية الصحية القيام بها، حيث إنّ الترتيب الصحيح للسرير يوفر الراحة والحماية للمريض الملائم للفراش لفترات طويلة، ولذلك يجب العناية بترتيب الأسرة. يجب أن تكون ملاءة السرير خالية من الطيات، لأنّ وجودها يسبب عدم الراحة للمريض ويجهلهم في تشكّل قرحة الضغط.

تستخدم الزوايا المشطوبة (التاجية) لثبيت الملاءة في مكانها بإحكام. الزوايا المشطوبة تقنيةٌ طيّ خاصة تثبت الملاءة تحت الفراش (شكل "20-3"). وتستخدم الزوايا المشطوبة أيضاً في ملاءات الحمّالة وأسرّة الفحص. بعض المنشآت والمنازل تستخدم ملاءات مشدودة جاهزة كملاءات سفلية. فيما يلي بعض أنواع ترتيبات الأسرّة:

- سرير مغلق: وهو السرير الذي رُتب بعد تخريح مريض ما ونُظّف تماماً، والهدف منه المحافظة على السرير نظيفاً إلى حين قبول مريض آخر.



الشكل "20-3" خطوات صنع زاوية مشطوبة.



- سرير مفتوح: يُحول السرير المغلق إلى مفتوح عن طريق طي الأغطية العلوية (الطي مثل أذرع المروحة الورقية). ويكون ذلك بمثابة "الترحيب" للمرضى الجدد وللمرضى القادرين على المشي أو النهوض من السرير لفترات قصيرة.
- السرير المشغول: هو السرير الذي يُرتب أثناء وجود المريض عليه. (الشكل "3-21أ" إلى الشكل "3-21د").



الشكل "3-21أ-د" ترتيب سرير مشغول.





الشكل 22-3 يدعم العامل الواقي الملاءة العلوية وينع تلامسها مع رجلي المريض وأقدامه.

● **العامل الواقي (مهد السرير):** يوضع تحت الملاءة العلوية لمنع تلامسها مع جسم المريض (الشكل 22-3)، حيث يستخدم في حالات الحروق، آفات الجلد وتقرّحه، الخثرات الدموية، أمراض الأوعية الدموية، الكسور، جراحة الرجلين والقدمين وغيرها من الحالات المشابهة.

ملاءات السحب: وتسمى أيضًا ملاءات وأغطية الرفع، أو النقل، هي أنصاف ملاءات، كثيراً ما تستخدم على السرير. تمتد من كتفي المريض إلى ركبتيه، وتستخدم لحماية الفراش. في حالة اتساخها يمكن تغييرها بسهولة دون الحاجة إلى تغيير الملاءة السفلية للسرير.

وفي بعض الأحيان توضع تحت المريض واقيات للسرير، صالحة للاستخدام لمرة واحدة، وتدعى بالشرائف الصحية، وذلك لحماية الملاءات بدلاً من استخدام ملاءات السحب. يذكر أنه يمكن استخدام ملاءات السحب كملاءات رافعة.

لتجنب إصابة نفسك، يجب مراعاة وضعيات الجسم الصحيحة أثناء ترتيب الأسرّة. ومن المهم الحفاظ على الوقت والجهد، لذا يُعد حفظ الملاءات مرتبة حسب الاستخدام طريقة فعالة للحفاظ على الوقت والجهد. بالإضافة إلى ذلك، تُرتب معظم الأسرّة بالكامل، أولاً على جانب واحد ثم على الجانب الآخر. هذا يحدُّ من الحركة غير الضرورية من أحد جانبي السرير إلى الجانب المقابل.

من الضروري الحد من انتشار الجسيمات الدقيقة المعدية أثناء ترتيب الأسرّة كما ينبغي:





الالتزام بالتدابير القياسية ومنها غسل يديك بشكل متكرر، وارتداء القفازات أثناء التعامل مع الملائات.

- لف الملائات المتتسخة أو الملطخة أثناء إزالتها من السرير. ربما تتتسخ الملائات بالدم، أو سوائل الجسم، أو الإفرازات، أو الفضلات، أو البول، أو البراز.
- أبعد الملائات المتتسخة عن جسمك وملابسك، وضعها في سلة أو عربة أو شنطة الملائات على الفور. لا تضع الملائات المتتسخة على الأرض أبداً.
- لا تسمح بعض المنشآت بتواجد عربات أو سلال الملائات في غرفة المريض. تُترك السلة أو العربة في الممر. توضع البياضات المتتسخة في أكياس مخدّات أو كيس بلاستيك، ثم تُنقل إلى الممر، وحينها توضع في السلة أو العربة.
- انزع القفازات، واغسل يديك بعد التعامل مع الملائات المتتسخة، وقبل التعامل مع الملائات النظيفة.
- قبل التعامل مع البياضات النظيفة، يجب إزالة القفازات الملوثة، ويجب غسل اليدين.
- يجب تخزين الملائات النظيفة في خزانة مغلقة، أو عربة ملائات مغلقة. لا تسمح أبداً بتماس الملائات النظيفة مع ملابسك. لا تحضر معك أبداً ملائات نظيفة إضافية إلى غرفة المريض لأنها ستعتبر ملوثة عند ذلك ولا يمكن استخدامها لمريض آخر.
- لا تتفصّل الملائات النظيفة. افردها بلطف. ضع النهاية المفتوحة لأكياس المخدّات بعيداً عن الباب. يbedo ذلك أكثر أناقة كما يساعد في منع دخول الجسيمات الدقيقة المعدية من الممر.
- في حال وجود أي احتمال لحدوث تلوث في الغرفة، يجب ارتداء القفازات النظيفة قبل التعامل مع الملائات النظيفة.
تمتلك عديد من المنشآت أكياس غسيل بلاستيكية خاصة تذوب ذاتياً أثناء عملية الغسيل. توضع الملائات الملوثة في هذا الكيس ويُغلق، ثم يوضع الكيس بعد ذلك في كيس بلاستيك آخر ويوضع ملصق عليه قبل إرساله إلى قسم الغسيل؛ الكيس الثاني ضروري لأن الملائات المبللة قد تذيب الكيس القابل للذوبان في الماء قبل وصوله إلى قسم الغسيل. يجب أن ينتبه مقدم الرعاية الصحية طوال الوقت إلى منع انتشار العدوى بالملائات الملوثة.

اخبر معلوماتك

1. من هم المرضى الذين يتوجب معهم استخدام الحامل الواقي (مهد السرير)؟
2. ما الاسم الآخر لملاعة السحب؟



قد يكون الاهتمام بالعناية والنظافة الشخصية من مسؤولياتك كمقدم لخدمات الرعاية الصحية، حيث يعتمد المرضى المدتفون بشدة على مقدمي الرعاية الصحية في جميع جوانب العناية الشخصية. يجب أن يشعر مقدم الخدمة الصحية بحاجات المريض ويحترم حقه في الخصوصية أثناء العناية به.

غالباً ما تشمل النظافة الشخصية **Personal hygiene** الاستحمام، العناية بالظهر ومنطقة العجان والفم والشعر والأظافر، والحلقة عند الحاجة. يعزز هذا الاهتمام العادات السليمة للنظافة الشخصية، وتوفير الراحة، وتشطط الدورة الدموية. كما أن تقديم هذه الرعاية أيضاً يعطي فرصة جيدة لمقدمي الرعاية الصحية لتوطيد علاقة جيدة وطيبة مع المريض.

أنواع الحمامات

Types of Baths

تُقدم للمريض أنواع مختلفة من الحمامات. تعتمد أنواع الحمامات على حالة المريض وقدرته على المساعدة.

- الحمام السريري الكامل:** يقوم مقدم الرعاية الصحية بتنظيف جميع أجزاء جسم المريض، العناية بالنظافة الشخصية للفم، العناية بالظهر والشعر والأظافر والعجان. يُقدم الحمام الكامل غالباً للمريض الملائم للفراش والضعيف جداً، أو غير قادر على الاستحمام بنفسه.

- الحمام السريري الجزئي:** يقوم مقدم الرعاية الصحية بغسل بعض أجزاء جسم المريض. يشمل مصطلح "تنظيف جزئي" معنيين، كلاهما مرتبط بقدرة المريض على المساعدة. إذا كان المريض ضعيفاً جداً، فالاستحمام الجزئي يعني فقط أن ينطف مقدم الرعاية الصحية الوجه والذراعين واليدين والظهر ومنطقة العجان. أما إذا كان المريض قادراً على تنظيف معظم أجزاء جسمه، فالاستحمام الجزئي يعني أن يُكمل مقدم الرعاية الصحية الحمام، غالباً ما ينطف ساقى المريض وظهره. في كلتا الحالتين يجهز مقدم الرعاية الصحية الأدوات اللازمة للتنظيف.

- الاستحمام بالحوض أو الدش:** يُسمح لبعض المرضى الاستحمام في الحوض أو تحت الدش. يساعد مقدم الرعاية الصحية قدر الإمكان على توفير المناشف والأدوات اللازمة للتنظيف، وتجهيز منطقة الاستحمام ومساعدة المريض كما تقتضي الحاجة. تمتلك عديد من وحدات الرعاية الصحية كراسى استحمام يستخدمها






الشكل "23-3" يستخدم كرسي الاستحمام للمرضى الذين لا يستطيعون الوقوف أو الوصول إلى الحوض. يجب تنظيفه وتعقيمه قبل وبعد كل استخدام.



الشكل "24-3" امسك طقم الأسنان بإحكام أثناء غسل الأسنان.



الشكل "25-3" استخدام ماسحة مجهرة لتنظيف كل أجزاء فم المريض أثناء تقديم عناية فموية خاصة.

المرضى الذين لا يستطيعون الوقوف تحت الدش أو الوصول إلى الحوض (الشكل "23-3"). يجب تنظيف كرسي الاستحمام وتعقيمه قبل وبعد كل استخدام.

- **الاستحمام بدون مياه:** تستخدم بعض المنشآت الصحية أقمشة مُنظفة مُعبأة مسبقاً صالحة للاستخدام لمرة واحدة، بدلاً من استخدام المياه في الاستحمام. تحتوي هذه الأقمشة المُنظفة على مطهر خالٍ من الغسول ومرطب، ويمكن تدفتها في المايكرويف (اتبع التعليمات الموجودة على العبوة) أو في جهاز خاص للتدفئة. الاستحمام بدون مياه أقل إجهاداً للمريض ويساعد على الاحتفاظ ببرطوبة الجلد، يمنع الجفاف، وأكثر لطفاً على جلد المريض من معظم أنواع الصابون. معظم العبوات تحتوي على 10-8 أقمشة. تستخدم قطعة لتنظيف الوجه والرقبة والأذنين وقطعة لكل ذراع وقطعة لكل ساق وقطعة للصدر والبطن وقطعة للعجان وقطعة للظهر والأفخاذ. يجف محلول على الجلد سريعاً، لكن تُستخدم منشفة لإزالة الرطوبة الزائدة برفق. لابد من توخي الحذر والانتباه إلى تجنب زيادة تسخين الأقمشة. اقرأ واتبع تعليمات المصنع.

النظافة الشخصية للفم Oral Hygiene

يعني ذلك العناية بالفم والأسنان. ويتم ذلك ثلاثة مرات يومياً على الأقل. إذا كانت حالة المريض تستلزم عناية متواترة للفم، يجب تكرار التنظيف أكثر من ذلك؛ كل ساعتين على الأقل. تمنع العناية الجيدة بالفم أمراض وتسوس الأسنان وتحفز الشهية وتتوفر الراحة. بالإضافة إلى أنها تمنع البخر (رائحة الفم الكريهة).

- نظافة الفم الروتينية تشير إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط بانتظام يومياً. بعض الأوقات، يكون المرضى قادرين على العناية بأنفسهم. في هذه الحالات، يوفر مقدم الرعاية الصحية المعدات والأدوات اللازمة. وفي حالات أخرى يساعد مقدم الرعاية الصحية المريض في تنظيف الفم والأسنان.

- العناية بتطقم الأسنان ضروري عندما يمتلك المريض طقمًا، أو أسناناً صناعية. في بعض الحالات، يجب أن يساعد مقدم الرعاية الصحية في تنظيف طقم الأسنان. قد يكون لدى المرضى حساسية وإحراج



من طقم الأسنان، لذلك من الضروري أن يوفر مقدم الرعاية الصحية الخصوصية والطمأنينة للمريض. لا بدّ من العناية الشديدة وتوخي الحذر لتجنب تلف طقم الأسنان (شكل "24-3").

- العناية الفموية الخاصة تُقدم غالباً للمرضى فاقدى الوعي أو شبه فاقدى الوعي. لأن عدداً منهم يتৎفسون من خلال الفم، فلا بد من العناية الشديدة بتنظيف كلّ أجزاء الفم. تُستخدم أدوات خاصة لهذا الغرض (شكل "25-3").

العناية بالشعر Hair Care

يتشابك ويتعدّد شعر المرضى الملازمين للفراش. تزال هذه التشابكات والعقد بتصفيف جزء صغير من الشعر في كلّ مرة، وتمشيط الشعر من أطرافه باتجاه الفروة (من أسفل إلى أعلى). تساعد المرطبات في منع التشابكات. وينشط التمشيط الدورة الدموية للفروة أيضاً، كما يزيل الأوساخ والأوبار، ويحافظ على الشعر لامعاً ومرتباً.

من الضروري مراقبة حالة الشعر وفروة الرأس. ويجب الإبلاغ عن علامات المرض، الاحمرار، القشرة، تهيج فروة الرأس، أو أي حالات أخرى.

موافقة الطبيب ضرورية لاستخدام الشامبو. وهناك أنواع مختلفة من غسول الشعر (الشامبو) الجاف والسائل متاحة للمرضى الملازمين للفراش. اقرأ كلّ التوجيهات بعناية قبل استخدام أي نوع من هذه المنتجات.

توفر أيضاً أدوات خاصة للاستخدام عند غسل شعر المريض الملازم للفراش بالغسول (شكل "26-3").



الشكل "26-3" تتوفر أدوات خاصة للاستخدام عند غسل شعر المريض الملازم للفراش بالغسول.



الشكل "27-3" بعد نقع الأظافر لترطيبها، نظف أظافر المريض باستخدام الحافة المثلومة المائمة للقطعة الخشبية البرتقالية المخصصة لتنظيف الأوساخ تحت الأظافر.

العناية بالأظافر Nail Care

العناية بالأظافر جانب آخر مهمٌ في العناية الشخصية للمريض. تحمل الأظافر الأوساخ التي تؤدي إلى العدوى والأمراض. بالإضافة إلى أن الأظافر الخشنة أو الحادة تسبب الإصابة والخدوش. من المهم أن تكون العناية بالأظافر من ضمن العناية الشخصية اليومية المقدمة للمريض. ورغم ذلك، لا يجب قص الأظافر إلا بأمر محدد من الطبيب المعالج أو المشرف المباشر.



نطف الأظافر ببنقها لمدة 5-10 دقائق في محلول من منظف خفيف وماء في درجة حرارة 40.6 - 43.6 °C، حيث يذيب ذلك الأوساخ تحت الأظافر. استخدم الحافة المائلة أو الكليلة من عود تنظيف الأظافر لإزالة الأوساخ من تحتها (شكل "3-27"). كما تُستخدم الفرشاة - أيضاً - لتنظيف الأظافر. افحص الأظافر والجلد المحيط بها بعناية أثناء التنظيف.

استخدم المبرد لتهذيب الأظافر وقصيرتها. استخدم المبرد بحركات ناعمة قصيرة. ابدأ من جانب الظفر وانتقل إلى قمته، ثم كرر ذلك في الجانب الآخر. لا تحرك المبرد ذهاباً وإياباً؛ من الممكن لهذه الحركة أن تقسم الظفر.

قد يتسبب قص الأظافر في حدوث إصابة. في بعض المرافق، يُسمح فقط للأشخاص المؤهلين أو الذين لديهم شهادة خبرة بقص الأظافر. في حالة السماح بقص الأظافر، استخدم القصافة، وليس المقص. قُص الأظافر بشكل مستقيم. لا تقص أبداً أسفل أطراف الأصابع. قص ببطء وحذر لتجنب إتلاف الجلد المحيط بالظفر. قلم الأظافر بشكل مستقيم للتخلص من الحواف الخشنة. لا تقص أظافر القدم أبداً لأن إصابة القدم عرضة للعدوى وبطء الالتئام. قلم أظافر القدم بشكل مستقيم.

تدليك الظهر Back Rub

عندما لا تمنع حالة المريض، يُجرى تدليك للظهر كجزء من الحمام اليومي، يمكن - أيضاً - إجراؤه في أوقات أخرى خلال اليوم، ويجب إجراؤه مرة واحدة على الأقل كل ثمانية ساعات للمريض الملازم للفراش. يستغرق التدليك الجيد للظهر ما لا يقل عن 7-4 دقائق وينشط الدورة الدموية ويعين تقويات الفراش ويؤدي إلى الاسترخاء والراحة. لتدليك ظهر المريض:

- افرك كمية صغيرة من مستحضر التدليك (الفسول) في يديك. ابدأ من قاعدة العمود الفقري.
- دلّك منتصف الظهر حتى الرقبة وحول الكتفين وأسفل جانبي الظهر، ثم دلّك الأرداف وحولها وارجع إلى نقطة البداية في دائرة. كرر هذه الخطوة أربع مرات.
- لتكن تمسيداتك طويلة ومهدئة، اضغط بشكل قوي صعوداً، وبشكل لطيف نزولاً. (الشكل "3-28أ").
- كرر التمسيدات الطويلة صعوداً، ومسد بشكل دائري نزولاً(الشكل "3-28ب"). وأول اهتماماً أكثر إلى البروزات العظمية. كرر هذه الحركة أربع مرات.
- كرر التمسيدات الطويلة صعوداً، واعكسها نزولاً. استخدم حركات دائيرية صغيرة (الشكل "3-28ج"). واستخدم راحة يدك للضغط بقوة. أعط اهتماماً أكثر للبروزات العظمية. كرر هذه الحركة مرّة واحدة.




- كرر التمسيفات الطويلة المهدئة المستخدمة في البداية (الشكل "3-28د"). قم بها لمدة 3-5 دقائق.

- أنه تدليك الظهر بتمسيفات صاعدة وهابطة على الظهر بالكامل (الشكل "3-28ه"). افع ذلك لمدة 1-2 دقيقة. يوفر هذا الاسترخاء بعد التنبيه والتحريك.

من المهم أن يحافظ مقدم الرعاية الصحية على أظافره قصيرة لتجنب إحداث أذية.



السلامة



الشكل "3-28 أ إلى ه" حركات تدليك الظهر.

تغيير ثوب أو ملابس المريض الخاصة بالمستشفى Changing Gown or Clothing

يعتبر تغيير ثوب المريض الطبيّ مهمًا. ملابس المستشفى مفتوحة أسفل الظهر ويسهل وضعها وإزالتها. لكن إذا كانت ذراع المريض ضعيفة، أو مصابة، أو إذا حقن محلول وريدي في ذراع واحدة، فيجب وضع الثوب بعناية. حيث يُزَالُ كُمُّ الملابس المتتسخة من الذراع غير المصابة أولاً (الشكل "3-29"). إذ يُتيح ذلك مزيداً من حرية الحركة أثناء إزالة الكُمُّ من الذراع المصابة. وبالتالي، يوضع كُمُّ الثوب النظيف على الذراع المصابة أولاً ثم على الذراع السليمة. من الضروري أحياناً ترك ذراع واحدة خارج الثوب ووضع الكُمُّ على الذراع السليمة فقط. بعض المنشآت لديها أثواب مع فتحات عند الكتفين. يمكن وضع مثل هذا الثوب فوق الذراع المصابة ثم تأمين المنطقة المفتوحة بمشابك، أو أربطة أو شرائط الفيلкро اللاصقة التي توضع على الثوب من ناحية الكتفين.

أمّا في ميدان الرعاية المنزلية، فيمكن فتح الأثواب عند خط الذراع لسهولة الاستخدام. يمكن بعد ذلك، وضع شرائط أو أربطة الفيلкро اللاصقة بحيث يمكن تأمين الثوب بعد وضعه على المريض. في وحدات الرعاية طويلة الأمد، يرتدي معظم المرضى الملازمون للفراش ملابس عاديّة أثناء النهار. ومن المهم مساعدة المريض حسب الحاجة في اختيار وارتداء الملابس المناسبة. إذا واجه أحد المرضى الملازمين للفراش صعوبة في تحريك جانب واحد أو أصيب بالشلل، فضع الملابس دائمًا على الجانب المصابة أولاً وقم بإزالتها من الجانب المصابة أخيراً.





الشكل "3-29" أبقي حاوية المحلول الوريدي في مستوى أعلى من مستوى مضخة حقن المحلول، ومررها عبر كم رداء المريض.

مشاهدات Observations

عند التعامل مع النظافة الشخصية، فمن المهم أن يظل مقدم الرعاية الصحية منتباً إلى أي علامات قد تكون غير عادية. عند القيام بأي إجراء من إجراءات النظافة الشخصية، لاحظ وأبلغ عن أي مشاهدات غير عادية أيضاً، بما في ذلك:

- **التقرحات والجروح والإصابات:** يجب الإبلاغ عن أي إصابات تلاحظ على الجلد أو الفم، أو فروة الرأس.
- **الطفح الجلدي:** يجب الإبلاغ عن أي نوع من أنواع الطفح الجلدي. وفي كثير من الأوقات، يكون الطفح الجلدي هو أول علامة لرد فعل تحسسي تجاه دواء ما.
- **اللون:** يجب ملاحظة أي لون غير عادي، وغالباً ما يكون أحمرار الجلد (**الحُمامي**) هو العلامة الأولى لقرحة الفراش. اللون الأزرق (**الزُرقة**) هو علامة على ضعف الدورة الدموية. اللون الأصفر (**اليرقان**) هو علامة تشير إلى وجود مرض كبدي أو انسداد القناة الصفراوية أو تخريب كريات الدم الحمراء.



● **التورم (الانتفاخ):** يمكن أن يُشير هذا إلى ضعف الدورة الدموية أو مرض ما، ويجب الإبلاغ عنه على الفور. انتبه بشكل خاص إلى اليدين والقدمين والكاحلين وأصابع القدم.

● **علامات التعب الأخرى:** صعوبة التنفس (ضيق التنفس)، والدوخة (الدوار)، والضعف غير المعتاد، والعرق المفرط (العرق)، والشحوب الشديد، أو النعاس غير الطبيعي (الخمول) ويجب الإبلاغ عنها فوراً.

عند التعامل مع النظافة الشخصية، يجب مراعاة الاحتياطات القياسية في الاحتياطات جميع الأوقات. فيجب غسل اليدين بشكل متكرر وارتداء القفازات، لأنه من الممكن ملامسة الدم، أو سوائل الجسم، أو الإفرازات أو الفضلات. يجب أيضاً ارتداء الثوب الطبي إذا كان من المحمّل تلوث الزي أو الملابس. يجب ارتداء كماماً ونظارات واقية، أو واقٍ للوجه في حال وجود قطرات من الدم، أو سوائل الجسم، كما الحال عندما يسعى المريض بشكل مفرط. أمّا بالنسبة لأعضاء الفريق الطبي الذين يعانون من الجروح أو التقرّحات أو التهاب الجلد في أيديهم، فيتوجب عليهم ارتداء القفازات عند التعامل مع جميع المرضى، حيث إنّ منع انتشار العدوى هي مسؤولية أساسية تقع على عاتق مقدمي الرعاية الصحية.

راعِ دائمًا مشاعر المريض واحترم حقوقه. اطرق على الباب وتوقف لوهلة قبل دخول غرفته. وفر الخصوصية أثناء الفحوصات بإغلاق الباب وسحب الستارة. وتجنب كشف المريض أثناء القيام بالنظافة الشخصية. اشرح جميع الإجراءات وطمئن المريض كما مطلوب. فمراعاة المسؤوليات القانونية والأخلاق المهنية واجبة في جميع الأوقات.

اخبر معلوماتك

1. كم عدد المرات المطلوبة للعناية الفموية يومياً؟
2. كيف تزيل التشابك أو العقد من الشعر؟





الشكل "30-3" يُدخل أنبوب أنفي معدني من خلال الأنف إلى أسفل المريء ثم **الشكل "31-3"** يُدخل أنبوب معدني من خلال الفم إلى أسفل المريء ثم إلى المعدة.

قياس وتسجيل المدخلات والمخرجات

Measuring and Recording Intake and Output



تسجيل ومراقبة كمية السوائل التي يتناولها ويخلص منها المريض يساعد الطبيب في توفير الرعاية اللازمة له. جزء كبير من جسم الإنسان عبارة عن سوائل، لذا يجب أن يكون هناك توازن بين كمية السوائل التي تدخل إلى الجسم والكمية التي تُفقد منه. عند الفرد السليم، يُنظم توازن السوائل من خلال أعضاء الجسم للحفاظ على توازن السوائل، أو التوازن الطبيعي. وعلى الرغم أنه إذا كان الفرد يعاني من أمراض القلب، أو الكلوي، أو فقد كميات كبيرة من السوائل بسبب القيء، أو الإسهال، أو التعرق المفرط، أو النزيف، وتوازن السوائل أصبح غير طبيعي، فإن الاحتفاظ بكميات كبيرة من السوائل داخل الجسم قد تحدث **الوذمة (التورم)**. وفي حالة فقدان السوائل بكمية كبيرة من الجسم، يحدث **الجفاف Dehydratation**. ويمكن أن تؤدي أي من الحالتين إلى الوفاة إذا لم تعالج. في مثل هذه الحالات، يتطلب الأطباء متابعة سجل السوائل التي تُدخل وتُخرج من الجسم. يُسمى هذا السجل بسجل المدخلات والمخرجات. تسجيل المدخلات والمخرجات هو وسيلة لتسجيل جميع السوائل التي يتناولها الشخص ويخلص منها خلال فترة معينة. كل منشأة لديها سجل المدخلات والمخرجات الخاص بها بالشكل الورقي أو الرقمي، غير أن معظمها يحتوي على معلومات متشابهة.

الإدخال Intake

تعني **المدخلات Intake** جميع السوائل التي يتناولها المريض، لذا يجب مراقبة طرائق الإدخال ونوعية السوائل المدخلة، كما يلي:

- **الإدخال الفموي:** يكون عن طريق الفم. والسوائل التي تتناول عن طريق الفم تشمل الماء، والقهوة، والشاي، واللبن، والعصائر، وغيرها من المشروبات، بالإضافة

إلى ذلك، فإن الحساء، والجيلاتين، والأيس كريم، والأطعمة المماثلة الأخرى التي تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة أيضاً تعادل شرب السوائل. غالباً ما يقيس مساعد التمريض هذه الكميات ويسجلها، أو يعطى تقريراً عنها.

- **التغذية المعوية:** (عن طريق أنبوبة المعدة) تستخدم للمرضى الذين يعانون من عدم القدرة على البلع، أو للفاقدين للوعي، أو مرضى الغيبوبة، أو الذين يعانون من بعض أمراض الجهاز الهضمي. يُعطي السائل من خلال أنبوب أنفي ممعدي أو ممعدي فموي أو أنبوب ممعدي أمعائي.

- الأنبوب الأنفي الممعدي عبارة عن أنبوب يُدخل عبر الأنف وصولاً إلى المريء ثم إلى المعدة (شكل "30-3").

- يأخذ الأنبوب الفموي الممعدي نفس الطريق، ولكنه يدخل من خلال الفم (شكل "31-3") يمكن استخدام حقنة معينة لإدخال الطعام، أو الدواء في الأنابيب السابقة.

- يُدخل أنبوب المعدة الموصل للأمعاء جراحياً عبر فتحة بجلد البطن إلى المعدة مباشرة (شكل "32-3").

تستخدم مضخة التغذية لإعطاء محلول (شكل "33-3"). يحتوي محلول المعطى على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. وستقوم ممرضة أو أي عضو آخر من أعضاء الفريق ذوي الرخصة بإعطاء الرعاية بإعطاء هذه التغذية المعوية.

يجب أيضاً على مساعد التمريض:

- المحافظة على ارتفاع رأس المريض 30-45 درجة أثناء الإطعام ولمدة 30-60 دقيقة تقريباً بعد الانتهاء من تناول وجبة الطعام.

- التأكد من عدم وجود أماكن خلل، أو انشاء في الأنبوب.

- توخي الحذر الشديد عند تدوير أو تحريك المريض لتجنب خلع الأنبوب.

- تنظيف الفم باستمرار.

- قم بإخطار الممرضة على الفور عند سماع الإنذار على مضخة التغذية، أو إذا كان محلول لا يتدفق عبر الأنبوب، أو إذا كانت حاوية محلول بطئ التدفق أو فارغة.

- **التغذية الوريدية:** تشير إلى محلول الذي يعطى في الوريد. مثل وحدات الدم، الأدوية الوريدية، ومحاليل وريدية أخرى. وهذه القياسات هي مسؤولية الممرضة أو أي من أعضاء الفريق الآخرين الموكلين بهذا نظاماً.



الشكل 32-3 يُدخل أنبوب المعدة جراحياً عبر جلد البطن إلى المعدة.



الشكل 33-3 تستخدم مضخة التغذية لعمل التغذية المعوية.

الإخراج Output

المخرجات **Output** هي جميع السوائل التي يتخلص منها المريض.

لذا يجب مراقبة طرائق الإخراج ونوعية المخرجات كما يلي:

- **حركة الأمعاء:** يُقاس ويُسجل عدد مرات البراز السائل. يُسجل البراز السائل، أو المتماسك، ويُبلغ به. ويمكن لمساعد التمريض أن يقيس ويُسجل هذا الإخراج، ويُبلغ به.

- **القيء:** يُقاس ويُسجل أي شيء يُقيء. يُدون اللون والنوع والمعلومات الأخرى عن القيء. غالباً ما تقوم مساعدة التمريض بقياس التقيؤ وتسجيله والبلاغ عنه.

- **البول:** يُقاس ويُسجل كل البول الذي يُفرغ أو يُصرف عبر القسطرة. قد يكون هذا القياس من مسؤولية مساعد التمريض. يجب الإبلاغ عن إخراج البول إذا كان أقل من 30 مليلترًا في الساعة.

- **الأنبيب والمصارف:** يُقاس أي تصريف أو شفط للسوائل، بما في ذلك التصريف من الأنابيب الأنفية المعلوية، وجهاز شفط الدم من الجروح، وأنابيب الصدر، وأنابيب التصريف الأخرى (شكل "34-3"). يُشار إلى النوع والكمية واللون والحقائق الأخرى حول تصريف السوائل من الجسم. إذا حُقن محلول في أنبوب وعاد المزيد من محلول في الأنبوب، فإن الكمية الزائدة تعتبر من الإخراج. هذا القياس هو مسؤولية الممرضة، أو عضو آخر من الفريق المعتمد رسمياً.

تسجيل المدخلات والمخرجات Recording Intake and Output

يجب أن تكون سجلات المدخلات والمخرجات دقيقة. ويجب أن تقايس جميع الكميات في وعاء مدرج. الوعاء المدرج يشبه كوب القياس وهو عبارة عن حاوية مصنوعة من البلاستيك أو المعدن مقاوم للصدأ.

يقيس هذا الوعاء المدخلات والمخرجات بالملليتر أو السنتمتر المكعب وتكون الوحدات المستخدمة في القياس مرسومة على جدار الوعاء الخارجي. يجب أن يكون الوعاء على مستوى العين أثناء القياس، أو يوضع على سطح مستوي ويُنظر إليه على مستوى العين لتسجيل الكميات بدقة (شكل "35-3"). بالإضافة إلى ذلك، يجب توخي الحذر عند إضافة أو تجميع الأعمدة في السجل. تحتوي معظم السجلات على تجمعات لمدة



الشكل "34-3" التصريف بواسطة الشفط عن طريق جهاز سحب السوائل والدم الفائز من الجروح كأحد أنواع تصريف السوائل من الجروح، والذي يسجله ضمن السوائل الخارجة من الجسم في سجل الإدخال، والإخراج.



الشكل "35-3" ضع الوعاء على سطح مستوى للحصول على القراءة، أو ضعه بمستوى العين للحصول على قياس دقيق.



8 ساعات و 24 ساعة (شكل "36-3")، وتستخدم بعض المؤسسات الصحية فترات أخرى مدتها 12 ساعة لجمعية وحساب الإدخال والإخراج.

 بالنسبة لسجلات المدخلات والمخرجات، تُقاس السوائل بوحدات مترية تسمى الميليلتر (مل). وقد تستخدم بعض أجهزة القياس السنتيمتر المكعب (سم مكعب). بما أن 1 مل = 1 سم مكعب هما نفس الكمية، فإن 30 مل يساوي 30 سم مكعب. والمنشآت الصحية المختلفة لديها سياسات مختلفة لتسجيل المدخلات والمخرجات. في بعض المنشآت الصحية، يُحتفظ بالسجل بجانب سرير المريض. ويسجل أعضاء الفريق كمية السوائل الداخلة، والخارجية الخاصة بالمريض ويقومون

سجل السوائل الداخلة والخارجية										
رقم المستشفى: 54-3201		الطبيب المعالج: د. ناصر الحامد حصة رقم: 238			الاسم الأول: سعد الاسم العائلي: الخالد					
ملاحظات	آخر	السوائل الخارجية			السوائل الداخلة				التاريخ 9/30	
		براز	قيء	درنقة	بول	الدم وم مشقاته	عن طريف الوريد	سوائل عن طريق القلم	الوقت	
									100	ص 8 - 7
قيء أحضر اللون			200						320	ص 9 - 8
					420					ص 10 - 9
									100	ص 11 - 10
غسيل معدة بواسطة الأنبوية المعدية بمحلول الملح المتعادل						10				ظهرًا 12 - 11
									240	م 1 - 12
افرازات بنية أو عسلية من أنبوية المعدة			200				850			م 2 - 1
									60	م 3 - 2
			200	200	730	10	850	820	المجموع الكلى 8 ساعات	عصراً 4 - 3
افرازات بنية		120					150	320		م 5 - 4
					280					م 6 - 5
									180	م 7 - 6
										م 8 - 7
									100	م 9 - 8
افرازات بنية من أنبوية المعدة			240				500			م 10 - 9
									310	م 11 - 10
		120		240	590		650	600	المجموع الكلى 8 ساعات	م 12 - 11
غسيل معدة بواسطة الأنبوية المعدة بال محلول الملح						10				ص 1 - 12
									420	ص 2 - 1
قيء أحضر اللون										ص 3 - 2
										ص 4 - 3
										فجراً 5 - 4

الشكل "36-3" نموذج سجل المدخلات والمخرجات.

بكتابتها. ويعُلم المريض قياس وكتابة الكميات بنفسه. وفي منشآت أخرى، يُحتفظ بالسجل على مخطط خاص للمريض. وتدون القياسات على الورق والإبلاغ عنها،



ابداء من الممرضة، أو السكريتير الطبي، أو منسق الوحدة الصحية أو عضو الفريق المعتمد ثم تسجل المعلومات على شكل الرسم البياني للمدخلات والمخرجات. باستخدام الرسوم البيانية المحوسبة، تُدخل المجاميع مباشرة في الحاسب بواسطة الممرضة أو مساعد الممرضة. ستضيف معظم البرامج المحوسبة جميع أعمدة الإدخال والإخراج تلقائياً.

 يجب إعطاء المرضى تعليمات دقيقة عند الاحتفاظ بسجل المدخلات والمخرجات. فعلى المريض إبلاغ مقدمي الرعاية الصحية عندما يشرب سوائل لا يسجلها فريق الرعاية الصحية. في بعض الأحيان، يسجل المريض عدد أكواب الماء أو السوائل الأخرى التي تتناول. في أحيان أخرى، يملأ مقدم الرعاية الصحية إبريق ماء ثم يفحص الكمية المتبقية قبل إعادة ملء الإبريق. ويقوم مقدم الرعاية الصحية بعد ذلك بطرح هذه الكمية من الكمية الإجمالية الأصلية في الإبريق، ويسجل الفرق على أنه كمية الماء التي شربت. لتجنب فقدان أي كميات من المدخل عن طريق الفم، يجب أن يأخذ مقدم الرعاية الصحية بعين الاعتبار كمية السوائل المدخلة في كل مرة يزال فيها إبريق أو كأس ماء من الوحدة، كي لا ينسى حساب كل الكميات المدخلة فموياً. وإذا أحضر الزائرون البن المخفوق أو سوائل أخرى، فيجب - أيضاً - تسجيل كمياتها.

 يجب اتباع الاحتياطات القياسية في جميع الأوقات التي تُقاس فيها سوائل الجسم، مثل البول، والقيء، وحركة الأمعاء السائلة (الإسهال)، وتصريف السوائل من الجروح. يجب ارتداء القفازات أثناء قياس السوائل والتخلص منها. ويجب غسل اليدين بشكل متكرر، وأيضاً غسلها دائمًا فور نزع القفازات. إذا كان من الممكن تناثر سوائل الجسم، أو تطايرها، فيجب ارتداء واق للعين، وكماماً، أو واق للوجه، وعباءة خاصة للحماية من السوائل. يجب استخدام أدوات الإخراج أو القياس لمعرفة كمية الإخراج لهذا المريض فقط. ويجب التخلص منها أو تعقيمها عندما لا يُقاس الإخراج. ويجب مسح أي مناطق ملوثة بسوائل الجسم عند إجراء الفحوصات بمطهر. ويجب على مقدم الرعاية الصحية اتخاذ إجراءات مستمرة لمنع انتشار العدو.

اخبر معلوماتك

1. ما الطريقتان المعتمدتان لتناول السوائل؟

2. ما وحدات قياس السوائل؟



التغذية الجيدة جزء مهم من علاج المريض. قد يكون ضمن مسؤولياتك جعل أوقات الوجبات ممتعة قدر الإمكان للمريض. غالباً ما يُنظر إلى وجبات الطعام على أنها وقت للتفاعل الاجتماعي. يفضل معظم الناس تناول الطعام مع الآخرين، وغالباً ما يعاني الأشخاص الذين يأكلون بمفردهم من ضعف الشهية وسوء التغذية. في وحدات الرعاية طويلة الأمد، يُشجع المرضى على تناول الطعام في غرفة الطعام. فهذا يوفر فرصة للتفاعل الاجتماعي مع الآخرين. وإذا كان المريض ملازماً للفراش، فمن المهم التحدث مع المريض أثناء تقديم الطعام له، أو عند إطعامه.

يعد التخطيط المناسب لوقت الوجبة أمراً مهماً، فإذا كان المريض مستعداً لتناول الطعام عند وصول صينية الطعام، فمن المرجح أن يكون وقت تناول الطعام أكثر متعة. يشمل التحضير قبل تقديم صينية الطعام ما يأتي:

- عرض المبولة للمريض إذا كان بحاجة إليها، أو مساعدة المريض على دخول الحمام، وتنظيف الغرفة من الروائح الكريهة باستخدام مزيل الرائحة أو فتح نافذة.
- مساعدة المريض على غسل يده ووجهه.
- المساعدة في نظافة الفم إذا طُلبت، كثير من الناس يريدون تنظيف أسنانهم قبل وجبات الطعام، وخاصة قبل الإفطار.
- وضع المريض بشكل مريح وفي وضعية جلوس.
- تنظيف طاولة الطعام التي توضع على السرير، وتجهيزها لصينية الطعام.
- إزالة أشياء مثل حوض التقىء، أو وعاء السرير من أمام نظر المريض، ضع هذه الأشياء في حامل السرير، إذا لم تكن هناك حاجة إليها.
- إذا ما تأخرت الوجبة بسبب الأشعة السينية أو العلاجات الأخرى، فتأكد من شرح ذلك للمريض.

احفص صينية الطعام بعناية وتأكد أن عليها اسم المريض، ورقم الغرفة، ونوع النظام الغذائي المطلوب. إذا بدا أي شيء في غير محله (على سبيل المثال، علبة ملح موجودة على صينية الطعام، بنظام غذائي خال من الملح، أو سكر مع نظام غذائي لمرضى السكري)، فاستشر مشرفك المباشر أو أخصائي التغذية. لا تقم أبداً بإضافة أي طعام إلى الصينية دون التحقق من نوعية النظام الغذائي أولاً.



اسمح للمرضى أن يأكلوا بأنفسهم كلما أمكن ذلك. وإذا لزم الأمر، فاجعلهم يساعدون في تقطيع اللحوم، وفتح علب المشروبات، ووضع الزبدة على الخبز. إذا كان المريض أعمى أو ضعيف البصر، فأخبر المريض عن الطعام الموجود على لوحه الطعام من خلال مقارنة اللوحة بالساعة. على سبيل المثال، لنفترض، "اللحم عند عقرب الساعة 12، والبازلاء والجزر عند عقرب الساعة 4، والبطاطا المهرولة عند عقرب الساعة 9 صباحاً". تأكد من وضع جميع الأطعمة والأواني في مكان ملائم.

قبل إطعام أي مريض، اختبر درجة حرارة جميع الأطعمة الساخنة. يمكن وضع كمية صغيرة على راحة يدك للتحقق من درجة الحرارة ولا تنفس أبداً في الطعام الساخن لتبريده.

تشمل النقاط التي يجب مراعاتها عند إطعام المريض ما يلي:

- نوع الأطعمة عن طريق إعطاء رشقات من السوائل بين الأطعمة الصلبة.
- استخدم المصاصات للسوائل ما لم يكن المريض يعاني من عسر البلع (صعوبة في البلع)، لأنه يمكن أن تدفع المصاصة السوائل إلى الحلق بشكل أسرع وتسبب الاختناق، لذا يمكن إضافة المادة التي تزيد سُمك الطعام إلى السوائل لجعلها متمسكة قليلاً، وتسهيل ابتلاعها. يجب أن يوافق الطبيب أو أخصائي التغذية على استخدام ذلك المنتج.
- قدم قطعاً صغيرة فقط من الطعام في وقت واحد، واملاً الملعقة أو الشوكة بمقدار الثلث إلى النصف.
- امسك الملعقة أو الشوكة بحيث تكون بزوايا تسهل إطعام المريض بشكل صحيح بنهائيات أدوات الطعام.
- شجع المريض على تناول أكبر قدر ممكن من الطعام.
- وفر جواً مريحاً وهادئاً.
- امنح المريض الوقت الكافي لمضغ الطعام.

لاحظ مقدار ما يأكله المريض بحيث يمكن تسجيل مقدار الغذاء الذي تناوله. إذا كان المريض لا يحب بعض الأطعمة على الصينية، فاسأله مشرفك المباشر أو أخصائي التغذية إذا كان يمكن توفير بديل. سجل معدل تناول الطعام في سجل المدخلات والمخرجات.

 انتبه لعلامات الاختناق على المريض، وابذل كل جهد ممكن لمنع الاختناق السالم عن طريق إطعام كميات صغيرة، مما يتيح للمريض وقتاً كافياً للمضغ والبلع، واجعل المريض يتناول السوائل للحفاظ على رطوبة الفم وتسهيل عملية المضغ والبلع. إذا كان المريض يسعى بشكل مستمر ويغص أثناء تناول الطعام فيلزم إيقاف عملية الإطعام مباشرة لتجنب دخول الطعام للمجرى الهوائي. قم بإخطار مشرفك على



الفور. إذا أصيب المريض بسكتة دماغية، فقد يتأثر جانب واحد من الفم. لذا أثناء إطعام المريض، وجه الطعام إلى الجانب غير المصابة. راقب حلق المريض للتحقق من البلع، وراقب الطعام الذي قد يكون متراكماً في الجانب المصابة من الفم. إذا اختنق المريض بالطعام، فلن مستعداً للتوجيه دفعات قوية متلاحقة للبطن.

اختبار معلوماتك

1. كيف يختلف طبق طعام مريض أعمى عن طبق مريض ضعيف البصر؟
2. إلى أي حد تملأ الملعقة أو الشوكة التي يقدم فيها الطعام للمريض؟

7:3 المساعدة في وعاء قضاء الحاجة / التغوط في السرير / المبولة Assisting with Bedpan/Urinal

يساهم التخلص المنتظم من فضلات الجسم في التمتع بصحة جيدة، ويجب على المرضى ملزامي الفراش الاعتماد على مساعدة مقدم الرعاية الصحية في تلبية هذه الحاجة الهامة. التخلص من فضلات الجسم أمر ضروري، لأن عدم التخلص من الفضلات يؤدي للموت. لذا نستخدم المصطلحات التالية للإشارة إلى ما يتعلق بالتخلص من الفضلات:

- **يشير التبول Urinate** (يُسمى أيضاً الإفراغ) إلى إفراغ المثانة البولية، التي تخزن الفضلات السائلة، أو البول، الذي تتجه الكلى. يستخدم المرضى الذكور المبولة عندما يحتاجون إلى التبول (شكل "37-3")، يستخدم وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير من قبل المرضى الإناث. هناك نوعان رئيسيان منه هما وعاء لأصحاب العظام المكسورة وأيضاً وعاء السرير القياسي.



الشكل "37-3" يجب أن يكون للمبولة غطاء أو قفل.

● يشير التغوط أو التبرز **Defecate** إلى حركة الأمعاء - تصريف الفضلات عبر المستقيم. أما المادة فتسمى البراز.

يشعر العديد من المرضى بالحساسية تجاه استخدام وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير، أو المبولات. لذلك وفر الخصوصية بإغلاق الباب وستارة الخصوصية وستارة النافذة. أجعل المريض مرتاحاً قدر الإمكان أثناء هذا الإجراء.

من المهم أيضًا توفير وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير أو المبولة فوراً عندما يطلبها المريض. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير أو المبولة بشكل متكرر لأي مريض ملازم الفراش.

الللاحظة الدقيقة لمرات تكرار، وكمية ومظهر البول، والبراز مهمة. قد يشير وجود شيء غير طبيعي في أي من هذه العوامل إلى مرض أو مضاعفات. يجب الإبلاغ عن أي خلل على الفور، ويجب حفظ عينة للفحص.

قبل إفراغ وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير أو المبولة، تقع على عاتق مقدم الرعاية الصحية مسؤولية التتحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى عينات أم لا. بالإضافة إلى ذلك، يجب قياس الكميات وتسجيلها إذا كان هناك سجل إدخال وإخراج للمريض. تتحقق مع مشرفك المباشر أو لاحظ أوامر الطبيب للحصول على هذه المعلومات.

يجب مراعاة الاحتياطات القياسية عند التعامل مع البول، أو البراز، فينبعي غسل اليدين بشكل متكرر وارتداء القفازات، وينبغي ارتداء واق للعين وقناع، أو واق للوجه، إذا كان من المُحتمل التعرض للرش أثناء إفراغ وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير.

تبني بعض وحدات الرعاية الصحية تكنيك أو تقنية القفاز الواحد (رمي القفاز بعد أول استخدام) لحماية البيئة أثناء التعامل مع وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير أو المبولات (الشكل "38-3").



الشكل "38-3" يمكن استخدام تقنية القفاز الواحد لحمل غطاء سرير ملوث، وترك اليد الأخرى حرّة لأداء مهام أخرى دون تلوث البيئة.



ويرتدي قفازان لإزالة المبولة أو وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير. يُغطى وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير أو المبولة ويوضعان فوق غطاء آخر، تم وضعه على كرسي خاص. ويمنع تماماً وضع وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير، أو المبولة على الطاولة أو فوق السرير. ثم يُنزع قفاز واحد ويُمسك في اليد التي ترتدي القفاز، وتُستخدم اليد التي خلعت القفاز، لرفع الحواف الجانبية (إن وُجدت) وفتح الأبواب وتشغيل الصنابير. يمكن أيضاً استخدام منشفة ورقية مع قفاز اليد لمنع ملامسة العناصر الموجودة في البيئة. من المهم حماية الأسطح البيئية من التلوث بالمواد الموجودة على قفازات اليد من البول، أو البراز.

بعض المنشآت لديها وحدات رش خاصة في الحمامات للشطف وتنظيف وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير أو المبولة (الشكل "39-3"). بعد الشطف، يجب تطهير وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير أو المبولة، ويجب استخدامهما لمريض واحد فقط، وبعد خروج المريض من المستشفى، يجب تعقيميهما قبل أن يستخدمهما مريض آخر. يمكن التخلص من وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير في حاوية النفايات المعدية عند خروج المريض، ويجب مسح أي مناطق ملوثة بالبول، أو البراز بمطهر. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تُتاح للمرضى الفرصة لغسل أيديهم وتلقي الرعاية بعد استخدام المبولة أو وعاء قضاء الحاجة/التغوط في السرير. ويمكن أن يساعد اتخاذ الاحتياطات المناسبة في منع انتشار العدوى.



الشكل "39-3" بعض الوكالات لديها وحدات رش خاصة في الحمامات للشطف والتنظيف.

اخبر معلوماتك

1. ما وظيفة المثانة؟

2. ماذا يجب أن يفعل مقدم الرعاية الصحية قبل إفراغ المبولة؟



توفير قسطرة ووحدة تصريف البول


Providing Catheter and Urinary Drainage Unit Care



الشكل "40-3 أ" تدخل قسطرة مستقيمة في المثانة لتصريف البول، ولكن لا تُترك في المثانة.



الشكل "40-3 ب" تحتوي قسطرة فولي على بالون صغير في نهايتها يُدخل في المثانة. يُفتح البالون بالماء المعقم لثبيت القسطرة في مكانها.



الشكل "40-3 ج" إذا كان المريض رجلاً ويحتاج إلى إفراغ البول، يمكن استخدام قسطرة خارجية.

بعض المرضى غير قادرين على التبول. وفي هذه الحالات، يمكن إدخال **قسطرة Catheter** في المثانة لتصريف البول.

تُوصل القسطرة بوحدة تصريف لتجميع البول. القسطرة هي أنبوب مجوف، وتكون مصنوعة من المطاط اللين، أو البلاستيك. ولها أنواع مختلفة:

- قسطرة مستقيمة، تدخل في المثانة لتصريف البول، ولكن لا تُترك في المثانة (الشكل "40-3 أ"). يستخدم هذا النوع لجمع عينة البول المعقمة.
- قسطرة فولي (وتسمى أيضًا القسطرة الساكنة)، وتستخدم لتصريف ما في المثانة وغالبًا ما تترك لفترة أطول. تحتوي على بالون صغير في النهاية يُدخل في المثانة (الشكل "40-3 ب"). بمجرد إدخال أي قسطرة، يتم نفخ البالون بالماء المعقم لإبقاء القسطرة في مكانها.
- إذا كان المريض رجلاً ويحتاج إلى إفراغ البول، يمكن استخدام قسطرة خارجية (الشكل "40-3 ج"). هذه القسطرة تلغي الحاجة إلى قسطرة داخلية وتقلل من فرصة الإصابة بالتهاب المسالك البولية. توضع القسطرة الخارجية على القضيب وتوصل بأنابيب صرف البول وبكيس تجميع البول. ينبغي أن تتم إزالة القسطرة كل 24 ساعة على الأقل وينظف الجلد جيداً ويُفحص لأي علامات تهيج. إدخال أي قسطرة هو تقنية تخضع للتعقيم تؤديها ممرضة، أو طبيب أو غيرهم من الأشخاص المصرح لهم بذلك. يجب أن تظل القسطرة معقمة طوال الوقت.






الشكل "41-3 أ" و "41-3 ب" يمكن استخدام كيس الساق للمرضى القادرين على الحركة لجمع البول الذي يُصرف من خلال القسطرة. وثبتت إلى رجل المريض بواسطة الأحزمة اللاصقة. ويسمح بمرور البول من القسطرة إلى الكيس وليس العكس.

توصيل وحدة أو كيس تصريف البول Urinary Drainage Unit، مع القسطرة لسحب البول المصفى (الشكل "41-3أ"). تكون هذه الوحدة مغلقة لمنع الكائنات الحية الدقيقة من دخول القسطرة ومن ثم منع العدوى. تتكون الوحدة من أنابيب بلاستيكية أو مطاطية متصلة بالقسطرة وتمتد إلى كيس يُجمع فيه البول. المرضى القادرون على الحركة يمكنهم استخدام كيس الساق لجمع البول المصفى من خلال القسطرة (الشكل "41-3ب"). كيس الساق أصغر من حقيبة التصريف البولي ويجب إفراغه بشكل متكرر، ولكنه يتيح للمريض الحركة بحرية. تثبت معظم أكياس الساق في مكانها باستخدام أشرطة الفيلكرو اللاصقة. يجب وضع كيس التصريف بحيث يكون منسدلاً مباشرةً من القسطرة. عندما يعود المريض إلى الفراش، يُزال كيس الساق والقسطرة المتصلة بكيس تصريف البول. ويُخلص من معظم أكياس الساق في كيس نفايات معدّ للاستخدام مرة واحدة. لمنع العدوى يجب استخدام تقنية تعقيم دقيقة أثناء توصيل وفصل القسطرة من كيس التصريف البولي أو كيس الساق. يلزم مراقبة القسطرة ووحدة التصريف بشكل دقيق ومراعاة التالي بشكل مستمر:

- الاتصال بين القسطرة وكيس الصرف آمن ومكتمل.
- خلو الأنابيب من الالتواءات أو الانحناءات التي توقف تدفق البول.






الشكل "42-3 أ" يمكن استخدام جهاز تثبيت القسطرة لتأمين القسطرة بالساقي.



الشكل "42-3 ب" يمكن استخدام حزام لثبت القسطرة بالساقي.



الشكل "42-3 ج" يمكن استخدام شرائط طبية قليلة التحسس (لا تسبب الحساسية) في تثبيت القسطرة بالساقي.

- يوضع كيس التصريف دائمًا تحت مستوى المثانة، وإذا تم رفعه فوق مستوى المثانة، يمكن أن يحدث ارتجاع للبول في المثانة، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى العدوى.

- تدفق البول بحرية في كيس التصريف، ذلك النظام يعتمد على الجاذبية من أجل سحب وتصريف البول، لذلك يجب إبقاء كيس التصريف منخفضاً بما يكفي للاستفادة من قوة الجاذبية.

- ثبيت القسطرة على ساق المريض باستخدام جهاز تثبيت القسطرة (الشكل "42-3")، أو حزام (الشكل "42-3ب")، أو شريط (الشكل "42-3ج")، وينع ذلك شد القسطرة، مما قد يؤدي إلى إزاحتها، أو يسبب تهيج الجلد.

- تcriغ كيس التصريف بشكل متكرر، حيث يشجع البول الراكد نمو الكائنات الحية الدقيقة. تُفرغ الأكياس كل ثمان ساعات، ولكن تُفرغ بشكل متكرر أكثر، إذا لزم الأمر.

- يجب ألا يكون كيس التصريف أو أنابيب حقيبة البول ملقاة على الأرض. بل يجب توصيلهما بحوامل خاصة بالسرير.

- يجب ألا توجد حلقات زائدة من أنبوب التصريف معلقة أسفل الكيس، لأن هذه الحلقات تتدخل مع تدفق البول بالجاذبية إلى الكيس.

- يكون أنبوب الصرف المؤدي إلى كيس التصريف دائمًا فوق مستوى البول في الكيس، هذا يمنع العدوى والكائنات الحية الدقيقة في البول من الارتداد للخلف عبر الأنبوب إلى داخل مثانة المريض.

- إذا اشتكي المريض من حرقان، أو ألم، أو تهيج، أو ألم في منطقة مجرى البول، يجب إبلاغ الشكوى على الفور إلى المشرف.

 يجب مراعاة الاحتياطات القياسية في جميع الأوقات عند التعامل بالاحتياطات مع البول. ينبغي ارتداء القفازات عند العناية بالقسطرة، والحصول على عينات البول من منفذ تجميع البول، وإفراغ وحدة تصريف البول. يجب غسل اليدين على نحو متكرر فور نزع القفازات. كما ينبغي ارتداء واقٍ للعين، وقناع للوجه، وثياب واقية، ما دام من الممكن انتشار سوائل الجسم. يجب مسح أي مناطق ملوثة بالبول بمطهر. إذ يساعد اتخاذ الاحتياطات المناسبة على منع انتشار العدوى.

اخبر معلوماتك

1. ما القسطرة؟

2. كيف تثبت قسطرة فولي أو القسطرة الساكنة في مكانها؟

يُعدّ الفغر Ostomy إجراءً جراحيًا حيث تُنشأ فيه فتحة في جدار البطن تسمى فغرة، مما يسمح بطرد الفضلات مثل: البول، أو البراز من خلالها. يُجرى الفغر في معظم الحالات بسبب وجود أورام، أو سرطان في المثانة أو الأمعاء.

يمكن أيضًا إجراء الفغر في علاج العيوب الخلقية، أو التهاب القولون التقرحي، أو انسداد الأمعاء، أو بعض الإصابات.

تكون الفغرة دائمة أحياناً، وتكون مؤقتة في أوقات أخرى، وتُلغى عندما تلتئم الإصابة، أو تتحسن الحالة التي تطلب الفغر.

توجد أنواع مختلفة من الفغرات:

- **فغر الحالب:** فغر الحالب هو فتحة جراحية في أحد الحالبين اللذين ينقلان

البول من الكُلية إلى المثانة. يُحضر الحالب إلى سطح البطن، ويصرف الفغر -

أو الفتحة الجراحية- البول.

- **فغر اللفائي:** تسمى هذه العملية بـفغر اللفائي، وهو فتحة جراحية في اللفائي

الذي يُعدّ جزءاً من الأمعاء الدقيقة. يُجلب فيها طرف من اللفائي إلى سطح

الجلد، وتُجرى في الحالات التي لا تستطيع فيها الأمعاء الغليظة إخراج الفضلات.

ونظراً للتجاوز للأمعاء الغليظة، فإن البراز المطرود خارجاً يكون متواصلاً وسائلاً


ويحتوي على إنزيمات الجهاز الهضمي التي تهيج الجلد.

- **فغر القولون:** فغر القولون هو فتحة جراحية في الأمعاء الغليظة أو القولون.

تختلف أنواع فتحات القولون اعتماداً على المنطقة المصابة من الأمعاء الغليظة

(الشكل "43-3"). البراز الخارج من فغر القولون الصاعد يكون سائلاً بينما ما

يخرج من فغر القولون المستعرض أو النازل يميل إلى الصلابة والتشكل نوعاً ما.



الشكل "43-3" يختلف نوع فغر القولون اعتماداً على أي جزء من الأمعاء يُزال. تظهر مناطق الأمعاء المتبقية بعد كلّ نوع من فغر القولون باللون الأزرق.



الشكل "44-3" يرتدي معظم المرضى الذين يعانون من الفغر حقيقة أو كيس فوق الفغرة لجمع تصريف المياه.

أما البراز المطرود من خلال فغر القولون السيني يكون أشبه بالبراز الطبيعي على نحو كبير لأن فضلات الجهاز الهضمي تكون انتقلت عبر معظم الأمعاء، وأعيد امتصاص الماء ومواد أخرى.

يرتدي المرضى المفغورون دائمًا كيساً فوق الفغرة وذلك لتصريف المفرغات (الشكل "44-3"). يثبت هذا الكيس في مكانه بواسطة حزام، أو لاصق. قد يسبب الفغر مشكلات منها: التسرب، والرائحة الكريهة، وتهيج الجلد المحيط بالفغرة، لذلك لا بد من إفراغ الكيس على نحو متكرر. تحوي العديد من الأكياس أجزاء يمكن فتحها لتسمح بتصريف البول، أو البراز. توضع نهاية كيس التصريف في وعاء التبول. إذا كان المريض قادرًا على المشي، يمكنه الجلوس على المرحاض ووضع نهاية تصريف الكيس فوق المرحاض. يُفتح المشبك الذي يغلق نهاية الكيس للسماح بتصريف البول، أو البراز، وتُنطَّلَفْ نهاية الكيس بعد ذلك لمنع انتشار الرائحة الكريهة ثم يُغلق المشبك ثانيةً بإحكام. تُسْعَمِل بعض الأكياس مرة واحدة لذلك نتخالص منها في النفايات.

إن الفغرة الصحية والعناية بها أمران ضروريان كي لا تحدث تهييجات أثناء تصريف البول، أو البراز. يُفضل أن تُوضع الواقيات الجلدية، والكريمات، والمرطبات، والبودرة حول الفغرة لمنع تهيج الجلد عند إزالة الكيس، وينبغي وضع طبقة رقيقة من هذه المستحضرات كي لا تعيق إغلاق الكيس وتهيج الجلد.

تقوم ممرضة عامة أو ممرضة فغر برعاية المرضى الذين يتعرضون للفغر للمرة الأولى، أما بالنسبة للمرضى الذين سبق وأجري لهم فغرات فتوكل رعايتهم لمقدمي الرعاية الصحية المدربين والمؤهلين إذ يمكنهم التعامل مع الأمر بسهولة. لا بد أن تتحقق من سياسة منشأتك وأن تعرف مسؤولياتك القانونية قبل تقديم الرعاية لمرضى الفغر. أما بالنسبة للمرضى الذين يستطيعون العناية بأنفسهم، فيمكن تعليمهم طريقة العناية بالفغرات في جسدهم.



إن المراقبة الدقيقة ضرورية عند تقديم رعاية لمريض يعاني من الفغر. فتحة الفغر Stoma هي عبارة عن غشاء. تكون الفتحة غشاء مخاطياً دون نهايات عصبية، يتدرج لونها من الأحمر الفاتح إلى الداكن وتبدو رطبة بسبب الغشاء المخاطي المكشوف (الشكل "45-3").

يجب مراعاة الاحتياطات القياسية في جميع الأوقات عند التعامل مع البول، أو البراز. ينبغي ارتداء القفازات عند إفراغ كيس التصريف أو العناية بالفغر. لا بد من غسل اليدين على نحو متكرر، وفور نزع القفازات أيضاً. يلزم ارتداء واقٍ للعين، وقطع اللوجه، وثوب واقٍ مادام بالإمكان انتشار سوائل الجسم. يجب التخلص من كيس التصريف في كيس النفايات المعدية. وإذا استخدم غطاء سرير يجب تنظيفه وتطهيره. ينبغي مسح أي مناطق ملوثة بالبول، أو البراز بمطهر. يمكن أن يساعد اتخاذ الاحتياطات المناسبة على منع انتشار العدو.



الشكل "45-3" تدرج الثغرة من اللون الأحمر الفاتح إلى الأحمر الغامق وتبدو رطبة بسبب الغشاء المخاطي المكشوف.

اخبر معلوماتك

1. اذكر سببين لإجراء فغر؟
2. ما السمات المميزة للفغر السليم؟

10:3 جمع عينات من البراز / البول Collecting Specimens of Feces/Urine

بصفتك مقدم رعاية صحية، قد تكون مسؤولاً عن جمع عينات Specimens البول والبراز. تُجرى الاختبارات والفحوصات المعملية على العينات لمساعدة في تشخيص المرض. ولكي تكون الاختبارات دقيقة، تجمع العينات بشكل صحيح. تشمل أنواع العينات التالي:

عينة بول روتينية، أو عينة بول نظيفة تؤخذ في منتصف التبول، أو عينة بول عقيمة تؤخذ بالقسطرة البولية، أو عينة بولية مجتمعة خلال 24 ساعة، أو عينة برازية.



عينة البول الروتينية : Routine Urine Specimen



الشكل "46-3" يجب أن يكون لحاويات عينات البول غطاء محكم لمنع الانسكاب.

تعد عينة البول الروتينية واحدة من أكثر العينات شيوعاً. تُستخدم لمجموعة متنوعة من الاختبارات المعملية مثل تحليل البول (فحص البول للتحقق من التهابات المسالك البولية وأمراض أخرى). توجد مجموعة متنوعة من حاويات العينات متاحة لجمع البول. معظم الحاويات شفافة، ومعايير بالمليلترات (مل)، ويمكن التخلص منها. يجب أن تكون الحاويات لها غطاء محكم لمنع التسريب والانسكاب (الشكل "46-3").

يمكن جمع معظم عينات البول الروتينية في حاوية غير معقمة. ويلزم استخدام حاويات معقمة إذا كانت زراعة البول تجري في وسط مناسب وإذا كان يتم اختباره بحثاً عن وجود كائنات حية مثل البكتيريا.

- يكفي 120 مل من البول لهذا الاختبار. إذا كان المريض غير قادر على إفراغ هذه الكمية، فاحصل على المتاح وأرسل هذه الكمية إلى المختبر.

- يجب إرسال العينة إلى المختبر على الفور. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فاحفظ العينة في الثلاجة حتى وقت إرسالها إلى المختبر.

- في حال عدم توفر حاوية عينات، يمكن استخدام أي حاوية نظيفة. اغسل الحاوية جيداً بالماء والصابون، ثم اشطفها وجففها. ويجب تحذير المرضى من استخدام حاويات كانت تحتوي على أدوية سابقاً، لأن استخدام مثل هذه الحاويات يمكن أن يغير نتائج الاختبار.

عينة بول في منتصف التبول، أو عينة بول بطريقة الجمع النظيف


Clean-catch, or Midstream, Specimen

عينة بول في منتصف التبول، أو عينة بول بطريقة الجمع النظيف هي عينة بول غير ملوثة بالكائنات الحية الدقيقة الموجودة في منطقة الأعضاء التناسلية وعلى حاويات العينات، تُستخدم احتياطات خاصة للحصول على عينة سليمة منها:

- تنظيف المنطقة التناسلية جيداً. يمكن استخدام مناديل جاهزة أو إسفنج قطني نظيف أو مربعات شاش.



● بعد تنظيف المنطقة، يُطلب من المريض التبول. يُسمح لبعض قطرات من البول بالتدفق في نونية السرير، أو المرحاض، ثم تُستخدم الحاوية المعقمة لالتقاط البول التالي. ويجب التخلص من قطرات البول القليلة الأخيرة بهذه الطريقة، يُخلص من الجزء الأول والأخير من العينة، ويُجمع البول فقط في منتصفه ويجب وضع الغطاء المعقم على الحاوية على الفور لمنع التلوث (شكل "47-3").



الشكل "47-3" وضع الغطاء المعقم على الحاوية مباشرة بعد جمع عينة البول.

قسطرة لعينة بول معقمة Catheterization for Sterile Urine Specimen

من الضروري أحياناً الحصول على عينة بول معقمة من المريض. للقيام بذلك، تُركب قسطرة للمريض. يُدخل أنبوب ضيق ومجوف ومعقم مباشرة إلى المثانة، ثم يفرغ البول من الأنابيب في وعاء معقم لعينة البول.

عينة بول على مدار يوم كامل (24 ساعة) 24-Hours Urine Specimen

تتطلب بعض الفحوصات الخاصة عينة بول على مدار 24 ساعة. وهذا يعني حفظ البول كله الذي ينتجه المريض خلال فترة 24 ساعة. يستخدم هذا البول لفحص وظائف الكلى (الشكل "48-3").



الشكل "48-3" جامع عينات بول على مدار 24 ساعة.

عينة البراز Feces Specimen

يفحص المختبر عينة من البراز للتحقق من الطفيليات وبيوضها (الديدان وبيوضها). ويمكن أيضاً فحص البراز للكشف عن وجود الدهون والكتائبات الدقيقة والدم الخفي وغيرها من المواد غير الطبيعية. يكشف اختبار البراز الجديد الجين، أو طفرة الحمض النووي التي تكون معيّنة في المراحل الأولى من سرطان القولون. ويمكن أن يساعد هذا الاختبار الأطباء في اكتشاف سرطان القولون في مراحله الأولى، عندما يكون علاجه أكثر فعالية.



الشكل "49-3" يجب وضع جميع عينات البول، أو البراز في أكياس واقية قبل نقلها إلى المختبر.

وضع الملصقات

Labeling

يجب وضع الملصقات على جميع العينات على نحو صحيح، بحيث تشير لنوع العينة (بول، أو براز)، والفحص المطلوب، واسم المريض، ورقم الغرفة أو رقم التعريف، والتاريخ والوقت، واسم الطبيب. ومن الأفضل وضع الملصق على حاوية العينة بدلاً من الغطاء لأن الأخطاء قد تحدث إذا كان الغطاء في غير مكانه. يجب أيضاً طباعة جميع المعلومات المطلوبة على نموذج طلب المختبر الصحيح. يجب إرسال طلب المختبر مع العينة المعرفة. وتستخدم منشآت الرعاية الصحية التي لديها سجلات صحية إلكترونية ملصقات أنشئت بواسطة الحاسوب لحاوية العينات ونموذج طلب المختبر.

 يجب مراعاة الاحتياطات القياسية عند الحصول على عينات البول، أو البراز الاحتياطات والتعامل معها. إذ يجب ارتداء القفازات، وغسل اليدين على نحو متكرر وغسلهما دائمًا فور نزع القفازات. ويجب ارتداء واق للعين وقناع للوجه وثوب واق إذا كان من الممكن انتشار سوائل الجسم. يجب أيضًا مسح أي مناطق ملوثة بالبول، أو البراز بمطهر. ولتجنب التلوث الناجم عن الانسكابات أو الانتشار، توضع جميع عينات البول، أو البراز في أكياس بيولوجية خاصة قبل نقلها إلى المختبر للفحص (الشكل "3-49"). حيث يساعد اتخاذ الاحتياطات المناسبة في منع انتشار العدوى.

اخبر معلوماتك

1. ما الذي يمكن استخدامه في حال عدم توفر حاوية جمع البول الروتينية؟
2. إذا لم تُرسل عينة البول إلى المعمل على الفور، فكيف تخزن؟

11:3 تقديم الرعاية قبل وبعد العمليات الجراحية

Administering Preoperative and Postoperative Care

تقديم الرعاية للمرضى المجدولين لإجراء الجراحة قد تكون إحدى مسؤولياتك كونك عضو في فريق الرعاية الصحية، تقسم الرعاية الجراحية إلى ثلاثة مراحل:

• **الرعاية قبل الجراحة Preoperative:** الرعاية المقدمة قبل الجراحة.

• **الرعاية خلال الجراحة Operative:** توفير الرعاية أثناء الجراحة.

• **رعاية ما بعد الجراحة Postoperative:** الرعاية المقدمة بعد الجراحة.

ما لم تكن تعمل في غرفة العمليات، فمن المحتمل أن تشمل المسؤوليات الرئيسية لمساعد التمريض مرحلتي ما قبل الجراحة وما بعد الجراحة.





تشكل مخاوف لدى أي مريض سيخضع لعملية جراحية مهما صغرت. مثل المخاوف بشأن التشوّه والألم وفقدان السيطرة والمجهول وطول فترة التعافي والتكاليف والمشكلات المالية والتشخيص السيئ بعد الجراحة، وتشغل تلك المخاوف تفكير كثير من المرضى. لذا من المهم أن يقدم لهم الدعم العاطفي بالإضافة إلى الرعاية الجسدية. فعليك أن تجيب عن جميع الأسئلة بقدر ما تستطيع. ومع ذلك، الأسئلة المحددة حول الجراحة أو النتيجة أو التخدير يجب إحالتها إلى الطبيب أو المشرف.

الرعاية قبل الجراحة

Preoperative Care

الرعاية ما قبل الجراحة لها عدة متطلبات تعتمد على توجيهات الطبيب ونوع العملية. من أمثلة ذلك:

- تصريح الجراحة: هذا نموذج موقع من قبل المريض لإعطاء الإذن (الموافقة) للتخدير والجراحة، إذا كان المريض غير قادر على التوقيع بسبب مرض شديد أو ارتباك، يمكن لأقرب الأقارب أو أي فرد لديه توكيلاً رسمي التوقيع نيابةً عنه. ويجب أن يشهد على التوقيع فرد مُخول قانوناً بهذا. (الشكل "50-3")
- الاختبارات المعملية: قد تشمل فحوصات الدم، واختبارات البول، وتصوير الصدر أو الأشعة السينية الأخرى، وتحطيط كهربية القلب، والاختبارات الأخرى التي قد يطلبها الطبيب.
- الاستحمام: يمكن الاستحمام في الليلة السابقة للجراحة وصباح الجراحة، والغرض من ذلك هو إزالة أكبر عدد ممكן من الكائنات الدقيقة في محاولة لمنع العدوى. بعض الجراحات تتطلب حماماً باستخدام منظف البشرة المطهر في الليلة السابقة وصباح الجراحة. منظف البشرة المطهر يزيل البكتيريا من



الشكل "51-3" يجبأخذ العلامات الحيوية وتسجيلها كجزء من الرعاية قبل الجراحة.



الشكل "50-3" أشرح الإجراءات وتتأكد من توقيع المريض للموافقة على الجراحة. تذكر أن الأشخاص المُصرح لهم فقط هم من يمكن أن يكونوا شهوداً على التوقيع.

الجلد لمنعها من دخول الشق الجراحي، كما يمنح الاستحمام المريض فرصة للتحدث وتخفيف بعض القلق.

● **العلامات الحيوية:** تؤخذ العلامات الحيوية وتسجل (شكل "3-51"). وتُستخدم معياراً للتحقق من العلامات الحيوية أثناء وبعد الجراحة.

● لا شيء عن طريق الفم: لا يُسمح للمريض بتناول أي شيء عن طريق الفم لمدة 8-12 ساعة قبل الجراحة. يبدأ تنفيذ الطلب في الساعة 12:00 في منتصف الليل. وتوضع علامة على سرير المريض، ويُزال الماء من المنطقة في الوقت المحدد.

● **الأشياء الثمينة:** جميع الأشياء الثمينة للمريض بما في ذلك المال والمجوهرات، يجب وضعها في خزنة المستشفى أو مع الأمن لمنع فقدانها. يُسمح للمريض أحياناً بارتداء خاتم الزواج ومع ذلك، يجب أن يُلصق أو يُربط بالإصبع كي لا يفقد.

● **إزالة الأطراف الصناعية:** تُزال جميع الأطراف الصناعية وهذا يشمل أطراف الأسنان، والعدسات اللاصقة، أو النظارات، والأذرع، أو الأرجل الاصطناعية، والمعينات السمعية.

● **إزالة مستحضرات التجميل:** يُزال طلاء الأظافر ومستحضرات التجميل ودبابيس الشعر والشعر المستعار قبل الجراحة، لأن وجود مستحضرات التجميل يمكن أن يخفي الجلد أو يُغير لون الظفر.

● **الملابس:** يجب على المريض إزالة جميع الملابس بما في ذلك الملابس الداخلية. حيث يلبس المريض ثوب المستشفى. وتضع معظم المنشآت أيضاً غطاء جراحيًا على المريض لتنقية الشعر.

● **البطاقة:** قبل الجراحة يجب فحص بطاقة اسم المريض أو شريط التعريف للحصول على معلومات دقيقة، لأن المريض غالباً ما يكون فاقداً للوعي أثناء الجراحة، فالبطاقة هي الطريقة الوحيدة لتحديد هوية المريض.

● **الإفراغ:** للتأكد من أن المثانة فارغة أثناء الجراحة، يجب على المريض إفراغها فوراً قبل إحضاره إلى غرفة العمليات. في بعض العمليات الجراحية، تُدخل قسطرة إلى المثانة لاستخراج البول كلّه باستمرار. ويجب أن يُدخل القسطرة شخص مؤهل فقط.

● **قائمة الفحص الجراحية:** تستخدم معظم المستشفيات قوائم تدقيق لتتبع معظم عناصر التحضير المذكورة سابقاً، والتحقق من اكتمالها. وهذا يوفر



طريقة لتحديد إن كان المريض قد أُعد على نحو صحيح للجراحة أم لا. تُرفق قائمة المراجعة بالملف الخاص بالمريض أو تُدخل في سجله الطبي الإلكتروني. في كثير من الأحيان لا يدخل المرضى إلى المستشفى إلا في صباح يوم الجراحة، وفي هذه الحالة يُجرى العديد من الاختبارات، مثل فحوصات الدم، والأشعة، وتخطيط القلب في العيادة الخارجية قبل يوم الجراحة.

التخدير

Anesthesia

التخدير Anesthesia هو منع الألم عن طريق فقدان الإحساس. يُعطى الدواء من قبل طبيب التخدير أو ممرضة التخدير أو الطبيب. يعتمد نوع التخدير المستخدم وطريقة إعطائه على نوع المخدر، نوع الجراحة، وطول الوقت المطلوب، والحالة الجسدية. الأنواع الأساسية الثلاثة للتخلص هي:

- **التخدير الكلي:** يُعطي الدواء عن طريق الوريد أو الاستنشاق من خلال قناع. يتسبب هذا في فقدان الوعي، والذي يستمر طوال فترة الجراحة. ولكنه قد يسبب الغثيان والقيء بعد الإفادة منه.
- **التخدير الموضعي:** يُحقن الدواء في المنطقة المحيطة مكان العملية لوقف الإحساس بالألم. عند ما يكون المريض مستيقظاً يُستخدم التخدير الموضعي.
- **التخدير النخاعي:** يُحقن الدواء في القناة الشوكية ويسبب فقدان الإحساس (الشعور) في جميع المناطق الواقعة أسفل الحقن. هذا غالباً ما يُستخدم في جراحة البطن لأنّه يُرخي العضلات جيداً. يجب إخبار المرضى أنه لن يكون لديهم أي شعور في الساقين، أو حركة لفترة من الوقت. وقد يعني المرضى أحياناً من الصداع بعد هذا النوع من التخدير.

العناية بعد العملية

Postoperative Care

أثناء خضوع المريض للجراحة، يجب تجهيز غرفة ما بعد الجراحة أو وحدة السرير بطريقة توفر جميع المعدات الضرورية عند عودة المريض من الجراحة. يُجهز سرير الاستشفاء، وقطب أو حامل للوريد، وتوضع معدات لأخذ العلامات الحيوية، كما يوضع حوض التقيء والأنسجة بجانب السرير. وتوضع أيضاً المعدات الخاصة اللازمة، مثل آلة الشفط لأنابيب النزح أو معدات ضخ الأكسجين، في الوحدة. وتُزال جميع المعدات غير الضرورية من المنطقة، على سبيل المثال، يُزال إبريق الماء والكوب إلى أن تأتي أوامر ما بعد العملية التي تقييد أنه يمكن للمريض الحصول على سوائل.



رعاية ما بعد الجراحة هي جانب مهم من الرعاية الجراحية، بعض العوامل التي يجب مراعاتها في رعاية ما بعد الجراحة مباشرة هي:

- **العلامات الحيوية:** يجب فحصها على نحو متكرر ووفقاً للطلب. تؤخذ أحياناً كل 15 دقيقة حتى يستقر وضع المريض. إذ إن الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم، أو التغير في معدل النبض أو طبيعته، غالباً ما يكونان العلامات الأولى للنزيف أو للصدمة، لذلك يجب الإبلاغ عن أي تغيرات أو قراءات غير طبيعية على الفور.
- **الضمادات:** يجب فحصها على نحو متكرر (شكل "3-52"). يجب ملاحظة لون وكمية ونوع النزح. أي ملاحظات غير عادية يُبلغ عنها على الفور.
- **الحقن بالوريد:** يجب فحص معدل التدفق وموقع الحقن فقط بواسطة فرد مؤهل لذلك.
- **مستوى الألم:** يجب إجراء تقييم لمقدار الألم الذي يعاني منه المريض. كثيراً ما يطلب من المرضى وصف الألم على مقياس من 1 إلى 10، حيث يشير 1 إلى أخف الألم و10 إلى أشد الألم. غالباً ما تستخدم المسكنات التي يتحكم فيها المريض للسيطرة على الألم. وقد توصل مضخة مسكنة بخط وريدي، ويتعلم المريض الضغط على الزر عند الشعور بالألم. حيث توفر المضخة جرعة محددة من مسكنات الألم مباشرة في مجاري الدم لتوفير الراحة الفورية.
ولا يستطيع المريض تناول جرعة زائدة من الدواء لأن المضخة تغلق إطلاق الدواء لفترة محددة. إن تغيير وضع المريض يمكن أن يساعد في تخفيف الألم. إذا لم يخف الألم المريض، يجب الإبلاغ عن ذلك في الحال.
- **الملاحظات:** إذا ظل المريض متلماً أو تغير لون جلده أو حرارته وشعر بالغثيان وتقيأ، فيجب الإبلاغ عن ذلك.



الشكل "3-53" يجب فحص الضمادات على نحو متكرر بعد الجراحة.



الشكل "3-52" توفر وسادة على البطن الدعم عندما يسعل المريض ويتنفس بعمق.

● **الوضع:** يجب تغيير وضعية المريض عندما يكون ذلك ممكناً. تأكد أنك تعلم قيود الحركة جميعها، إذ تحدّ بعض العمليات من حركة المريض ووضعه. لذا لا تقلب المرضى أو تحركهم إلا بعد الحصول على تفويض بذلك.

● **السعال والنفس العميق:** يحتاج معظم المرضى إلى التشجيع على السعال والتنفس بعمق بعد التخدير العام (الشكل "3-53"). يساعد هذا التمرين على إزالة المخاط من الرئتين والجهاز التنفسي ويمنع الالتهاب الرئوي والاضطرابات الأخرى للرئة.

● **الأنبيب:** قد تثبت أنابيب تصريف على المرضى بعد الجراحة. وتُوصل الأنابيب بزجاجات للصرف أو مجتمعات الصرف الخاصة. ينبغي الإبلاغ على الفور إذا لم تُصرف الأنابيب، أو إذا كانت الأنابيب مسدودة، أو تغير محلول الصرف أو بدا غير عادي، أو إذا لم يُوصل الأنبوب بمصدر تصريف، أو إذا لوحظت أي ملاحظات غير عادية. يجب أيضاً توخي الحذر عند قلب المريض أو تحريكه للتأكد أن الأنابيب غير مفصولة، أو غير ملتوية، أو غير منزوعة.

● **الأحزمة:** هي أجهزة خاصة تُصنع من قطن ثقيل، أو قماش الفلانيل ولها جوانب ذات دعامتين مرنّة. وتستخدم لمختلف أجزاء الجسم، وخاصة البطن والظهر والثدي. وتشمل وظائف الحزام التالي:

- تقديم الدعم والتخفيف من الآلام بعد الجراحة.
- تثبيت الضمادات في مكانها.
- تقييد الحركة.
- الضغط على أجزاء معينة من الجسم.

يجب وضع الحزام بسلامة لمنعه من تشكيل ضغط، يمكن بدوره أن يؤدي إلى تكوين قرح الفراش. يجب أن يتاسب الحزام على نحو مريح مع الجزء المرجو تدعيمه وألا يكون ضيقاً لدرجة يسبب الانزعاج. يجب أن يخلو الحزام من الالتواءات والثنيات. النوع الأكثر استخداماً هو الحزام المستقيم. يمكن وضع الحزام على البطن، أو الظهر، أو القفص الصدري، ويُثبت الحزام المستقيم باستخدام لاصقات الفليکرو. وتوضع الأحزمة من أسفل إلى أعلى للحصول على الدعم الأمثل. يمكن تدعيم الأعضاء على نحو صحيح بهذه الطريقة. إذ يجب دائماً التحقق من الدورة الدموية والتنفس. حيث يمكن أن يتسبب الحزام الضيق للغاية في حدوث مضاعفات خطيرة. كما يجب إزالة الحزام كذلك على فترات وعناية بالبشرة أسفله.

● **الخرطوم الجراحي (المرن):** يُسمى كذلك بالخرطوم الضاغط أو الداعم، ويمكن استخدامه لدعم أوردة الساق وزيادة الدورة الدموية. يساعد هذا الخرطوم على منع تكون جلطات الدم في الساقين. ويجب وضع الخرطوم على نحو صحيح، لأنه لو ثبت بشدة، يمكن أن يعيق الدورة الدموية.





الشكل "54-3" تنتفع الجوارب الضاغطة باستمرار وتنكمش لتنشيط الدورة الدموية في الساقين.



الشكل "55-3" أشرطة مونتغمري هي شرائط لاصقة خاصة توضع عند الحاجة إلى تغيير الضمادات على نحو متكرر في موقع الجراحة.

● **جوارب طبية ضاغطة:** توصل الجوارب الضاغطة، التي تُسمى أيضاً بأجهزة الضغط المتسلسلة، بمضخة تستمر في نفخ الخرطوم وإفراغه. تُستخدم في كثير من الأحيان لتنشيط الدورة الدموية في الساقين عن طريق محاكاة عمل عضلات الساق على الأوعية الدموية (الشكل "54-3"). فتزيد من تدفق الدم الوريدي وتمنع تكوين جلطات دموية أو انسداد خثاري وريدي (VTE).

● **أشرطة مونتغمري:** هي شرائط لاصقة خاصة توضع عندما يجب تغيير الضمادات على نحو متكرر في موقع الجراحة (الشكل "55-3"). يُنظف الجلد المحيط بموقع الجراحة جيداً، ويوضع حاجز على الجلد مثل: سائل، أو معجون؛ لحمايته من التأثير بالشريط. ثم توضع شرائط مونتغمري عندئذ على جانبي موقع الجراحة. يكون منتصف هذه الأشرطة غير لاصق ومربوطاً معًا. ولتغيير الضمادات. تُفك الأشرطة، وتُغيّر الضمادات، ثم تُربط الأشرطة فوق الضمادات. ويلغي هذا الحاجة إلى إزالة وضع الشريط اللاصق وإعادته أثناء كل تغيير للضمادة.

 ينبغي لمساعد التمريض أن يتبع الاحتياطات، والإجراءات القياسية جميعها عند ملامسة الدم، أو سوائل الجسم بقدر الإمكان. فهذا يساعد على منع انتشار العدوى بما في ذلك إصابة المريض الجراحي بالعدوى بعد الجراحة.

يجب على مساعد التمريض معرفة جميع جوانب الرعاية المطلوب العناية بها؛ من أجل المريض الجراحي وفهمها على نحو صحيح. إذ يمكن أن تساعد الرعاية الجراحية الجيدة المريض على تسريع شفائه والتقليل من المضاعفات.

اخبر معلوماتك

1. ما مراحل الرعاية الجراحية الثلاث؟

2. كم مرة تُؤخذ العلامات الحيوية بعد الجراحة؟

إعطاء الأكسجين

Administering Oxygen

لا بد أن يحتوي الدم على أكسجين. يحصل الدم على إمداده من الأكسجين من الهواء الذي يشكل منه الأكسجين نسبة 23%. لكن يمكن أن يكون الجسم غير قادر علىأخذ ما يكفيه من الأكسجين، أو استخدامه على نحو فعال؛ نتيجة للحوادث أو الإصابة أو أمراض الجهاز التنفسي. في مثل هذه الحالات، يمكن إعطاء الأكسجين للمرضى بطرق مختلفة.

من علامات نقص الأكسجين: التنفس السريع والسطحى، والنبض السريع، والاضطراب، والقلق، والزُرقة. يُسمى نقص الأكسجين بنقص الأكسجة، ويمكن أن يتسبب نقص الأكسجين في تلف الدماغ في غضون 4-6 دقائق.

يتطلب إعطاء الأكسجين أمراً من الطبيب يتضمن طريقة الإعطاء والتركيز الذي سيُعطى. في الحالات الإسعافية القصوى، يمكن المباشرة بإعطاء الأكسجين بتركيزات قياسية ولا بد من إخبار الطبيب بشكل عاجل. ويمكن أن تتبع معظم فرق الإنقاذ، وموظفي الإسعاف، وغيرهم من المشاركون في أعمال الطوارئ أوامر محددة تتعلق بإعطاء الأكسجين.

طائق إعطاء الأكسجين

Methods of Oxygen Administration

يُعطى الأكسجين بإحدى الطرق التالية:

- **قناع الأكسجين (الشكل "3-56 أ"):** يجب أن يغطي القناع الأنف والفم. ويجب أن يكون مناسباً ومريحاً للمريض لتجنب فقدان الأكسجين وألا يكون ضيقاً جدًا فيسبب



الشكل "3-56 ب" عندما تُستخدم التقنية الأنفية لإعطاء الأكسجين، يجب على المريض التنفس عبر الأنف.



الشكل "3-56 أ" يغطي قناع الأكسجين الأنف والفم ويوفر تركيزاً عالياً من الأكسجين.

له إزعاجاً. إن الأكسجين عن طريق القناع هو الطريقة الأكثر استخداماً من قبل فرق الإنقاذ، إذ إنه أعلى تركيز للأكسجين.

- يخاف بعض المرضى من القناع؛ لذلك شرح أهميته والتطمين المستمر ضروريان.



- يكون معدل تدفق الأكسجين بالقناع بين 6-10 لترات لكل دقيقة (ل/د)، يجب ألا يستخدم أبداً بمعدلات تدفق أقل من 5 لترات للدقيقة، لأن ذلك سيجعل المريض يعيق تنفس ثاني أكسيد الكربون مما سيشعره بالاختناق.

● **القنية الأنفية (الشكل "3-56ب")**: تكون من أنبوبتين صغيرتين منحنيتين مصنوعتين من البلاستيك توضع كلّ منها بفتحة أنف. يوصل الطرف الآخر من القناة بوحدة أو خزان أكسجين. يجب أن يوجه المريض للتنفس من خلال الأنف، فإذا فتح فمه للتنفس سيقل تركيز الأكسجين. ويكون معدل تدفق الأكسجين عبر القنية بين 2-6 لتر للدقيقة.

● **الخيème**: يحاط المريض بخيème مزودة بتركيز عالٍ من الأكسجين، وتستخدم هذه الطريقة للرضع والأطفال الصغار حيث توفر الأكسجين والرطوبة المناسبين لهم. ففي الكروبيت المستخدم مع الرضع والأطفال الصغار. يكون معدل التدفق بين 10-12 لترًا للدقيقة.

أنظمة إيصال الأكسجين Oxygen Delivery Systems

هناك أنظمة مختلفة لتوفير الأكسجين:

● تُدخل بعض المستشفيات الأكسجين عبر الجدار، وقد تقوم بذلك بعض منشآت الرعاية الصحية مثل وحدات الرعاية طويلة الأمد، والوحدات الطبية، وعيادات طب الأسنان. يُجرى توصيل الأكسجين عن طريق تشغيل مقياس تدفق الأكسجين المُوصل بمحول في الحائط (الشكل "3-57أ"). ويرمز إلى الأكسجين باللون الأخضر، ويحتوي المحول بالحائط على علامة خضراء تحتوي على الكلمة أكسجين، أو الرمز " O_2 ".

● تستخدم أسطوانات الأكسجين المحمولة أثناء نقل المرضى في الطوارئ، وفي بعض منشآت الرعاية طويلة الأمد، والحالات المنزلية (الشكل "3-57ب").

● تستخدم منشآت الرعاية الطبية طويلة الأمد، والوحدات الطبية، ومكاتب طب الأسنان أسطوانات الأكسجين، أو مولدات الأكسجين. حيث يزيل مولد الأكسجين الشوائب والغازات الأخرى من هواء الغرفة للحصول على أكسجين مركز (الشكل "3-57ج"). لا يمكن استخدام مولدات الأكسجين مع أقنية الأكسجين لأنها توفر معدلات تدفق منخفضة بين 2-4 لترات للدقيقة. ويجب تنظيف منقى مولد الأكسجين باستمرار بغسله بالماء الدافئ والصابون ثم شطفه وعصره حتى يصبح جافاً قبل إعادة توصيله إلى الوحدة.



● يستطيع المرضى أيضاً ملء الحاويات محمولة الصغيرة خفيفة الوزن بالأكسجين السائل مما يمكنهم من حملها في حقيبة كتف، ويستطيع المريض التنقل لعشر ساعات أو أكثر بمساعدة الإمداد خفيف الوزن والمركز من الأكسجين الذي لا يعتمد على أي مصادر كهربائية أو بطاريات. (الشكل "57-3").



الشكل "57-3 ب" تُستخدم أسطوانات الأكسجين المحمولة أثناء نقل المرضى في الطوارئ، وفي بعض منشآت الرعاية طويلة الأمد، والحالات المنزليّة.



الشكل "57-3 أ" عندما يُضخ الأكسجين عبر الحائط، يوصل مقياس التدفق بمحلول الحائط. يستخدم المرطب لترطيب الأكسجين.



الشكل "57-3 د" الأكسجين السائل متوفّر في حاويات أصغر ويوصى تركيزاً عالياً من الأكسجين.



الشكل "57-3 ج" يزيل مولّد الأكسجين الشوائب، والغازات الأخرى من هواء الغرفة ليركّز الأكسجين بالوحدة.



إن الأكسجين النقي جافًّا وقد يدمر الأغشية المخاطية ويهيجها. تشير التوصيات الحالية إلى أن أي معدل لتدفق الأكسجين أعلى من 4 لترات للدقيقة يجب ترطيبه عن طريق إمراهه خلال الماء قبل إعطائه للمرضى. ويستخدم جهاز الترطيب لترطيب الأكسجين انظر (الشكل "3-57").

احتياطات السلامة Safety Precautions



يجب مراقبة احتياطات السلامة عندما يكون الأكسجين قيد الاستخدام. إن الأكسجين لا ينفجر، لكن يكون الاحتراق أسرع وأشد في وجود الأكسجين. وتحترق المواد القابلة للاشتعال بسرعة أكبر في وجوده. لذا يجب اتخاذ الاحتياطات التالية عندما يكون الأكسجين قيد الاستخدام:

- يحظر حرق الشموع واستخدام اللهب عند استخدام الأكسجين، وتمنع معظم مرافق الرعاية الصحية التدخين. على نحو عام في المنزل أو في أي منطقة يمكن أن يتواجد فيها مدخنون، لا بد من وضع لافتة تحذيرية مكتوب عليها: "ممنوع التدخين - أكسجين" على الباب أو في غرفة المريض أو على السرير أو على الحائط المجاور. وتوضع ملصقات التحذير أحياناً على الخزانات المستخدمة بواسطة أفراد الطوارئ والإنقاذ.
- تُعد اللافتة غير كافية؛ لذا يجب تحذير المريض من التدخين، كذلك يجب إخبار الشهود في مكان وقوع حادث أو حالة طوارئ بضرورة تجنب التدخين.
- يجب تجنب استخدام المعدات الكهربائية التي يمكن أن تسبب شرارة.
- لا ينبغي استخدام السوائل القابلة للاشتعال، مثل: مزيل طلاء الأظافر أو مزيل الشريط اللاصق عند استخدام الأكسجين، كما لا يمكن استخدام مستحضرات ما بعد الحلاقة الكحولية، أو مثبتات الشعر، أو العطور، أو مرطبات الشفاه للاعتناء بالمريض.
- يجب استخدام الأغطية القطنية بدلاً من تلك المصنوعة من الصوف أو النايلون. كما ينبغي أن تكون الأسرّة والأغطية والملابس جميعها من القطن بدلاً من المواد الاصطناعية. يقلل استخدام القطن من خطر الكهرباء الساكنة لأنه لا يسببها.
- يجب إجراء فحوصات مستمرة عندما يكون الأكسجين قيد الاستخدام، وينبغي أن تُزال مصادر الشرر والكهرباء الساكنة.



جهاز قياس الأكسجين في الدم Pulse Oximeters

يمكن استخدام مقياس التأكسج النبضي لمراقبة المريض الذي يتلقى الأكسجين (شكل "58-3"). يستخدم مقياس التأكسج النبضي؛ لقياس مستوى الأكسجين بالدم الشرياني، حيث يوصل الكاشف الضوئي بإصبع يد المريض، أو إصبع قدمه أو شحمة أذنه، تظهر نسبة الأكسجين الشرياني على شاشة الجهاز. النسبة الطبيعية لتشبع الدم بالأكسجين تتراوح بين 95%-100%， المستويات الأقل من 90% تعد نقص تأكسج أي قلة وصول الأكسجين إلى الأنسجة، إذا انخفض مستوى الأكسجين عن الحد الأدنى للنسبة المئوية المبرمجة بالجهاز، فسيصدر صوت إنذار.

الموظفون المؤهلون فقط مسؤولون عن برمجة ومراقبة مقياس التأكسج. يجب أن يتتأكد مساعد الرعاية الصحية من عدم تعطل المقياس، ويجب إخطار المشرف إذا انطلق الإنذار.



الشكل "58-3" يُستخدم مقياس التأكسج النبضي لقياس مستوى الأكسجين في الدم الشرياني.

الاحتياطات Precautions



يجب فحص المريض الذي يتلقى الأكسجين على نحو متكرر.

- يجب ملاحظة جودة التنفس.
- يجب العناية بالأنف والفم في حالة استخدام قناع، أو قناء أنفية.
- يجب فحص معدل تدفق الأكسجين.
- راقب المريض والزوار للتأكد من أنهم لم يحرکوا الصمام ليغيروا معدل التدفق.
- في حال استخدام جهاز ترطيب، يجب فحص مستوى الماء، واستبدال جهاز الترطيب كما هو محدد. يجب فحص احتياطات السلامة مراراً.
- تقع مسؤولية إعطاء الأكسجين في العديد من منشآت الرعاية الصحية على عاتق قسم العلاج التنفسي. رغم ذلك، يجب على مقدم الرعاية الصحية المتواجد مع المريض على نحو متكرر أن يكون على دراية باحتياطات السلامة ويفحص المرضى بعناية. ويجب الإبلاغ عن أي ملاحظات غير طبيعية على الفور.

اختر معلوماتك

1. اذكر طريقتين تستخدمان لإعطاء الأكسجين.
2. ما الذي يستخدم لترطيب الأكسجين؟



بحث اليوم الرعاية الصحية في المستقبل

وجد علماء آخرون جيناً يسمى STAT3 يبدو أنه يحمي خلايا سرطان الكبد من تأثيرات العلاج الكيماوي (العلاج بأدوية السرطان). وقد طور البحث لإيجاد مادة تمنع عمل هذا الجين بحيث يكون العلاج الكيماوي أكثر فعالية، عدة مثبطات محتملة لـ STAT3. وأحد أكثر المثبطات الوعادة هو نابابوكاسيين لأنه يبدو فعالاً في منع عمل STAT3 والسماح للعلاج الكيميائي أن يكون أكثر فعالية. إذا استطاع العلماء إيجاد طرائق لاستبدال الجينات المفقودة أو منع الإجراءات التي تتسبب في أن تصبح الخلايا خبيثة، فسيكونون قادرين على إيقاف أو تقليل نمو السرطان لذلك ستكون العلاجات الأخرى أكثر فعالية.

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في العلاج الجيني في طريقة إدخال الجين في خلية الشخص. إذ لا يستطيع العلماء ببساطة حقن الجينات في الخلايا بل يجب نقلها إلى الخلية باستخدام حامل يسمى ناقل. النوافل الأكثر شيوعاً المستخدمة هي الفيروسات القهقرية. يمنع العلماء الفيروسات القهقرية من التسبب في المرض ثم يستخدمونها لنقل الجين إلى الخلايا. لكن المشكلات التي تحدث بهذه الطريقة هي أن الجينات قد تتغير أو تغير الخلايا الطبيعية الأخرى، أو أن الجين الجديد قد يدخل في المكان الخطأ، مما يلحق المزيد من الضرر للجسم. لهذه الأسباب، يجب على العلماء تحديد طرائق أسهل وأفضل لتوصيل الجينات إلى خلايا الجسم. ويحاول العلماء في جميع أنحاء العالم حلّ هذه المشكلات. فإذا نجحوا، فسيعالج الكثير من مصابي السرطان.

العلاج الجيني الذي يشفي السرطان

يقتل سرطان الخلايا الكبدية (سرطان الكبد) الكثير من الناس كل عام، يجرب الباحثون العديد من العلاجات المختلفة لسرطان الكبد إحداها يتضمن استخدام العلاج الجيني، فلدى كل إنسان ما بين 50,000 إلى 100,000 جين مختلف، وتحدد هذه الجينات ما يرثه الإنسان مثل لون الشعر والعيون، تحمل الجينات أيضاً تعليمات للخلايا لتدلي وظائف معينة مثل متى تتكاثر وتتمو. في البداية، حدد العلماء الذين يبحثون في انتشار سرطان الكبد إلى القولون والمستقيم جيناً يسمى p53. يرمز هذا الجين إلى بروتين موجود في الخلايا الطبيعية وينظم نمو الخلايا. لكن في العديد من أنواع السرطان، يكون الجين مفقوداً، أو متغيراً (متغيراً)، مما يسمح بالنمو غير المنضبط للخلايا السرطانية. كما درست مجموعة أخرى من الباحثين في اليابان ناقلات التهاب الكبدي C واكتشفت أن وجود جين معين يضاعف تقريباً من فرص إصابة حامل التهاب الكبد C بسرطان الكبد. وحدد العلماء أيضاً جينات تسمى FGFR4-19 وFGFR4، والتي تنشط في سرطان الكبد والثدي والبنكرياس، مما يتسبب في أن تصبح الخلايا السليمة سرطانية. ومع ذلك، وجد هؤلاء العلماء أيضاً أنه عند تطبيق مثبط تجريبي للأجسام المضادة، يتوقف نشاط الجين، مما يمنع نمو الخلايا السرطانية. وبالتالي، هناك العديد من مثبطات FGFR4 في دراسات تجريبية أولية.

خلاصة دراسة حالة

ما المهارات التي تعتقد أن خالد وبسمة سيحتاجانها لتقديم رعاية فائقة لمرضاهما؟ ما المهارات التي تتطلب طلب المساعدة من بعضنا بعضاً؟ ما مهارات التواصل التي سيحتاج خالد وبسمة لاستخدامها؟



ملخص الفصل 3

- وبعض مهارات مساعد التمريض مطلوبة لأجل إجراءات خاصة مثل حساب كمية السوائل التي تدخل جوف المريض والكميات الخارجة منه وجمع عينات البراز والبول، ومساعدة المريض الجراحي وإدارة الأكسجين، وتوفير رعاية القسطرة، وتركيب خرطوم الجراحة.
- من المهم أيضًا تسجيل ملاحظات دقيقة عن المريض أثناء تقديم الرعاية، وتسجيل تلك الملاحظات أو الإبلاغ عنها على نحو صحيح سيعبر عن مدى فهمك والتزامك بمهارات مساعد التمريض؛ لتصبح عما قريب عضواً مهماً في فريق الرعاية الصحية.
- توفر العديد من مهارات مساعد التمريض رعاية شخصية عالية الجودة للمريض. ومن الأمثلة على ذلك، الاستحمام، والعناية بالشعر والأظافر، وارتداء الثوب الطبي للمريض، وتدليك الظهر، وتوفير نظافة الفم، والحلاقة، والتغذية ومساعدته في استخدام أغطية الأسرّة أو المبولات، وترتيب السرير. ومن الضروري أن يتعلم مساعد التمريض الإجراءات الصحيحة ويتبعها لتوفير السلامة والراحة والخصوصية للمريض.
- ومن مهارات مساعد التمريض المهمة أيضًا، تعلم كيفية وضع المرضى، وتحويتهم، وتحريكهم أثناء أي حركة أو نقل، ويد استخدام الأوضاع الصحيحة للجسم، والمحافظة على المحاذاة من الأمور الضرورية أثناء أي حركة أو نقل.

حالة دراسية بسيطة 1:3 مريض مصاب بقرحة ضغط

أفتان مساعدة تمريض في مستشفى محلّي، تعرفت على هيا وهي امرأة مسنة قُبِلت للتو بسبب إصابة في ساقها. أخبرت هيا أفتان أنها لم ترغب بالقدوم إلى المستشفى لأن عائلتها تعنى بها جيداً في المنزل. ورغم ذلك، عند فحص أفتان لهايا، اكتشفت أفتان قرحة الفراش (أو قرحة ضغط) من الدرجة الثانية على وركها. وتعترف هيا أنها عانت من بعض الألم في وركها في الآونة الأخيرة.

التحليل

1. ما الذي يجب على أفتان فعله أولاً؟

2. كيف يمكن علاج قرحة الفراش التي تعاني منها هيا؟

3. عندما تخرج هيا إلى المنزل، ما النصيحة التي يمكن أن تعطيها أفتان لأسرة هيا حول كيفية تجنب حدوث المزيد من قرحتين؟

حالة دراسية بسيطة 2:3 "ممرضة نبيهة"

تعمل عائشة في جناح طبي في مستشفى محلي. أحد المرضى الذين كلفت بعانتهم يدعى محمد؛ رجلٌ يبلغ من العمر 72 عاماً مصاب بمرض السكري حديثاً (وهو حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من الأنسولين لضبط مستويات السكر في الدم). جزء من تحضيرات عائشة لرعاية مريضها هو مراجعة لواتهم لتلقي تعليمات الطبيب الجديدة. ولاحظت أن الطبيب حضر في الليلة السابقة وأمر بفحص جلوكوز دم المريض في الساعة 8 صباحاً. ووفقاً للنتائج، وجَب إعطاء الأنسولين. (كما ارتفع مستوى الجلوكوز في الدم، زادت كمية الأنسولين المعطاة).

عائشة، "ممرضة نبيهة"، وتشكّ فيما إذا كان هذا الأمر صائباً؛ تعلم أن صوانى الإفطار تصل في الساعة 7:30 صباحاً في طابقها، وأنّ محمد سيكون تناول الطعام عندما تتحقق من مستوى الأنسولين في الساعة 8 صباحاً. وتدرك أنه بعد تناول الطعام، يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم لدى المصاب بشكل طبيعي لبعض ساعات. هذا هو السبب في إجراء اختبارات الجلوكوز في الدم عادة بعد صيام المريض لعدة ساعات. تقول عائشة إنها إذا حسنت كمية الأنسولين بناءً على مستوى الجلوكوز المرتفعة مؤقتاً في الدم، فسيتلقى محمد الكثير من الأنسولين، ويحتمل أن يكون لذلك رد فعل سلبي. لذا استدعت عائشة الطبيب لتوضيح الأمر؛ قال الطبيب إنه يعتقد أن صوانى الإفطار لا تصل حتى الساعة 8:30 صباحاً، وشكر عائشة على اكتشاف الخطأ وقام بتغيير أوامره.

التحليل

1. ماذا سيحدث لو أجرت عائشة اختبار جلوكوز الدم ببساطة كما هو مطلوب بالضبط؟

2. وفي حال اتبعت الأوامر كما هي، هل تعتقد أنه يجب اعتبار عائشة مسؤولة عن الخطأ؟

3. راجع أسئلة "ماذا؟ متى؟ أين؟ لماذا؟ من؟ وكيف؟" المتعلقة بهذا الموقف. أعط أمثلة على الأسئلة التي ربما طرحتها عائشة على نفسها.



حالة دراسية بسيطة 3: الممرضة المشغولة

قبلت مريم لإجراء جراحة استئصائية في مفصل ركبة مؤلم. أنتِ الممرضة التي تعتنين بها قبل وبعد العملية. مريم قلقة بشأن ما سيحدث ومدى الألم الذي ستشعر به بعد ذلك. أنتِ منشغلة للغاية، فلديك العديد من المرضى بحاجة إلى تحضير للجراحة في ذلك الصباح، لكن مريم ترفض السماح لك بالرحيل.

التحليل

1. كيف يمكنك مساعدة مريم لتقليل خوفها؟

2. كيف تضمن الممرضة رعاية جميع مرضاهما؟

3. ماذا يجب على الممرضة أن تخبر مريم عن الجراحة؟ إذا كانت لديها أسئلة محددة حول الجراحة، فماذا تفعل الممرضة؟



أسئلة المراجعة

1. اذكر ثلاثة إجراءات يجب اتخاذها أثناء إدخال المريض إلى المستشفى، أو مرفق رعاية لمدة طويلة.

2. اذكر ست طرائق لتجنب قرح الضغط.

3. ماذا يمكن أن يحدث للمريض عند تغير وضعه من الاستلقاء إلى الجلوس، أو الوقوف؟ وماذا يجب أن تفعل إذا حدث هذا؟



٤. ما نوع القسطرة؟ ولماذا يُستخدمان؟

5. فرق بين عينة البول الروتينية والنظيفة (في المنتصف) والمعقمة وعينة البول على مدار 24 ساعة.

٦. لماذا يُفحص البراز؟



7. عرف التالي (فغر القولون - قرحة الضغط - الوذمة - الأنبوب الأنفي المعدي - عسر البلع).

8. حدد خمسة جوانب للرعاية في التالي:

أ. المرضى قبل العمليات الجراحية.

ب. المرضى بعد العمليات الجراحية.



مهارات مساعد الممرض 173

وزارة التعليم

Ministry of Education

2025 - 1447

9. اذكر ثلاثة أنظمة لإعطاء الأكسجين.

10. اشرح خمسة احتياطات يجب مراعاتها أثناء التعامل مع البول، أو البراز.

التفكير الناقد

1. أ. حدد سبعة ملاحظات يمكن أن تشير إلى مشكلة طبية.

ب. لماذا من المهم مراقبة المريض باستمرار أثناء تقديم الرعاية الشخصية؟

2. أ. اذكر أربع طرائق لمنع حدوث تقرحات الفراش أو التقفعات.



مهارات مساعد المُمرض 175

وزارة التعليم

Ministry of Education

2025 - 1447

ب. لماذا يكون منع قرحة الفراش أو التقفعات أسهل من علاجها؟

3. لماذا يكون ضروريًا التعاون والتواصل كفريق عند نقل المريض إلى نقاة أو استخدام الحامل الطبي الميكانيكي؟

التمرينات

1. اكتب مع زميلك، نشرة للمرضى توضح لهم الرعاية بعد العمليات الجراحية.
2. ارسم، مع زميل لك، غرفة المستشفى المثالية الجاهزة لاستقبال مريض جديد، وأنشئا نصاً لمساعدة تمريض تساعد المريض الجديد على الشعور بالراحة.



الجزء 2

-
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| مهارات المساعد الطبي | الفصل 4 |
| مهارات الأعمال والمحاسبة | الفصل 5 |
| التطور المهني والتعلم مدى الحياة | الفصل 6 |



الفصل

4

رابط المدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

مهارات المساعد الطبي

دراسة حالة

عبد الله ونورة مساعدان طبيان في عيادة طبية. يُجري الفريق الطبي العديد من الفحوصات، والتطعيمات، والإجراءات، وإعادة صرف الأدوية. ويحب كل من نورة وعبد الله أن يكونا مشغولين وأن يساعدوا في تلبية احتياجات المرضى المختلفة. تعمل نورة في العيادة منذ 15 عاماً، أما عبد الله، فقد تخرج حديثاً مساعداً طبياً العام الماضي. ويُسرّ نورة أن تعمل بفريق واحد مع عبد الله لتقديم رعاية ممتازة لمرضى العيادة. في نهاية هذا الفصل، ستسأل عن المهارات التي سيحتاج عبد الله ونورة معرفتها حتى يتمكنوا من مساعدة الأطباء في تقديم الدعم والرعاية الكافية لمرضى العيادة.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل، ستكون قادراً على:

- التعرف على الأدوات / المعدات المستخدمة في الجراحة الصغرى ووصفها.
- التعرف على الأدوات / المعدات المستخدمة في إزالة الغرز ووصفها.
- تسجيل وتركيب تحظيط القلب الكهربائي (electrocardiogram ECG).
- استخدام مصادر موثوقة للعثور على المعلومات الأساسية حول الأدوية المختلفة.
- التعرف على طرائق إعطاء الأدوية وقواعد السلامة التي يجب مراعاتها.
- قياس وتسجيل الطول والوزن.
- وضع المريض وإسدال الستار الطبي على نحو صحيح في كل وضعيات الاضطجاع التي يكون عليها المريض: الافق، والانكباب، والاضطجاع على الجانب الأيسر (سيمز)، والاعتماد على الصدر والركبتين، والاضطجاع جالساً (فاولر)، ووضعية استئصال الحصاة أو الولادة، والاضطجاع الظهري، ووضعية النكوس (ترندينبورغ)، ووضعية "الموسى الكبasa" أو الإنثناء والتللي (جاكتايف).
- استخدام مخطط قياس حدة البصر لتحري مشكلات الرؤية.
- التحضير والمساعدة في إجراء الفحص الطبي العام.

المصطلحات الرئيسية


الإصغاء Auscultation	مد البصر Hyperopia	المراقبة Observation	المنظار Speculum	سيمز (على الجانب الأيسر) Sims' (Left Lateral)
الاضطجاع الظهري Dorsal Recumbent	الإنثناء والتللي (في طب المستقيم والشرج) Jackknife (Proctologic)	الجس Palpation		المنظار Speculum
الستائر Drapes	الركبة - الصدر Knee-Chest	القرع Percussion		سماعة طبية Stethoscope
الملاقط Forceps	وضعية استئصال الحصاة Lithotomy	الانكباب على البطن (الانبطاح) Prone		الغرز Sutures
الاضطجاع جالساً (فاولر) Fowler's	الحسر Myopia	المبعّد Retractor		وضعية النكوس (ترندينبورغ) Trendelenburg
المُرقئ Hemostat	عقدة Node	المشرط Scalpel		الحدّة البصرية Visual Acuity
الاضطجاع الأفقي (الاستلقاء) Horizontal Recumbent (Supine)				

قياس / تسجيل الطول، والوزن، ومحيط الرأس

Measuring/Recording Height, Weight, and Head Circumference

قياسات الطول والوزن جزء من الفحص الطبي العام في عيادة الطبيب. وتُجرى أيضاً روتينياً عند دخول المريض إلى أي مستشفى، أو منشأة رعاية طويلة الأمد، أو مؤسسة رعاية صحية أخرى. توفر هذه القياسات أيضاً معلومات ضرورية لإجراء وتقدير بعض الفحوصات المخبرية ولحساب جرعات بعض الأدوية.

- تؤخذ قياسات الطول والوزن في العديد من مجالات الرعاية الصحية، وتستخدم لتحديد ما إذا كان المريض يعاني من زيادة أو نقص في الوزن. إذ يمكن لكلتا هاتين الحالتين أن تشير إلى وجود مرض ما.
- يمكن استخدام مخططات الطول والوزن لتحديد ما إذا كان الطفل ينمو جيداً، أو يعاني من نقص أو زيادة في الوزن.
- يجب أن تكون قياسات الطول والوزن دقيقة، لذا فعليك التحقق من صحة قراءاتك باستمرار.
- يُراقب كل من الطول والوزن ومحيط الرأس، وأحياناً، قياسات محيط الصدر للرضع والأطفال الصغار بشكل متكرر لأن نموهم سريع. يُفحص الرضيع بانتظام للكشف أي تغيرات قد تشير إلى مشكلات في النمو والتطور (الشكل "1-4"). وتُسجل القياسات على رسوم بيانية للوزن نسبة للعمر (الأشكال "4-2أ" و"4-2ب")، وللطول نسبة للعمر (الأشكال "4-2ج" و"4-2د")، وللمحيط الرأس نسبة للعمر (الأشكال "4-2ه" و"4-2و")، والوزن نسبة للطول (الأشكال "4-2ز" و"4-2ح") للأطفال الذكور والإإناث. وهناك حاجة إلى رسوم بيانية مختلفة للأطفال الذكور والإإناث لأنهم ينمون بأنماط ومعدلات مختلفة. حيث تسمح المعلومات المستقاة من الرسوم البيانية للطبيب بالتحقق من نمو الطفل ومقارنته بمتوسط النسب المئوية للأطفال الآخرين في نفس العمر. وقد تشير أنماط النمو غير الطبيعية إلى نقص التغذية أو الأمراض الوراثية.




الشكل "1-4" يُفحص الرضيع بانتظام للكشف أي تغيرات يمكن أن تشير إلى مشكلات في النمو والتطور.



مخططات النمو للأطفال والمرأهقين السعوديين

مصادق عليها من قبل مجلس الخدمات الصحية في "المملكة العربية السعودية" رقم 29 (24/6/2007)




المصدر: محمد إ. الموزان، عبدالله السلوم، عبدالله ص. الحريش، بيتر ج. فوستر، منصور م. القرشي، أحمد ع. العمر. مخططات النمو لعام 2005 للأطفال والمرأهقين السعوديين (رقم AR-20-63). مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 2009، الرياض، المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: يعتمد العمر على التقويم الغريغوري.

الشكل ٤-١٢ النسبة المئوية للوزن نسبة للعمر: أطفال ذكور، من الولادة حتى الشهر 60.



مخططات النمو للأطفال والمرأهقين السعوديين

مصادق عليها من قبل مجلس الخدمات الصحية في "المملكة العربية السعودية" رقم 29 (24/6/2007)




المصدر: محمد إ. الموزان، عبدالله السلوم، عبدالله ص. الحريش، بيتر ج. فوستر ، منصور م. القرشي، أحمد ع. العمر. مخططات النمو لعام 2005 للأطفال والمرأهقين السعوديين (رقم AR-63-20). مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا 2009، الرياض، المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: يعتمد العمر على التقويم الغريغوري.

الشكل "4-2 ب" النسبة المئوية للوزن نسبة للعمر: أطفال إناث، من الولادة حتى الشهر 60.



مخططات النمو للأطفال والمرأهقين السعوديين

مصادق عليها من قبل مجلس الخدمات الصحية في "المملكة العربية السعودية" رقم 29 (24/6/2007)




المصدر: محمد إ. الموزان، عبدالله السلوم، عبدالله ص. الحريش، بيتر ج. فوستر، منصور م. القرشي، أحمد ع. العمر. مخططات النمو لعام 2005 للأطفال والمرأهقين السعوديين (رقم AR-20-63). مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 2009، الرياض، المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: يعتمد العمر على التقويم الغريغوري.

الشكل "ج" النسبة المئوية للطول نسبة للعمر: أطفال ذكور، من الولادة حتى الشهر 60.

مخططات النمو للأطفال والمراهقين السعوديين

مصادق عليها من قبل مجلس الخدمات الصحية في "المملكة العربية السعودية" رقم 29 (24/6/2007)




المصدر: محمد إ. الموزان، عبدالله السلوم، عبدالله ص. الحريش، بيتر ج. فوستر، منصور م. القرشي، أحمد ع. العمر. مخططات النمو لعام 2005 للأطفال والمراهقين السعوديين (رقم AR-63-20). مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا 2009، الرياض، المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: يعتمد العمر على التقويم الغريغوري.

الشكل "4-2 د" النسبة المئوية للطول نسبة للعمر: أطفال إناث، من الولادة حتى الشهر 60.



مخططات النمو للأطفال والمرأهقين السعوديين

مصادق عليها من قبل مجلس الخدمات الصحية في "المملكة العربية السعودية" رقم 29 (24/6/2007)




المصدر: محمد إ. الموزان، عبدالله السلوم، عبدالله صن. الحريش، بيتر ج. فوستر، منصور م. القرشي، أحمد ع. العمر. مخططات النمو لعام 2005 للأطفال والمرأهقين السعوديين (رقم AR-20-63). مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 2009، الرياض، المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: يعتمد العمر على التقويم الغريغوري.

الشكل "4-2هـ" النسب المئوية لمحيط الرأس نسبة للعمر: أطفال ذكور، من الولادة حتى الشهر 60.



مخططات النمو للأطفال والمراهقين السعوديين

مصادق عليها من قبل مجلس الخدمات الصحية في "المملكة العربية السعودية" رقم 29 (24/6/2007)




المصدر: محمد إ. الموزان، عبدالله السلوم، عبدالله ص. الحريش، بيتر ج. فوستر، منصور م. القرشي، أحمد ع. العمر. مخططات النمو لعام 2005 للأطفال والمراهقين السعوديين (رقم AR-20-63). مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا 2009، الرياض، المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: يعتمد العمر على التقويم الغريغوري.

الشكل "4-2و" النسبة المئوية لمحيط الرأس نسبة للعمر: أطفال إناث، من الولادة حتى الشهر 60.



مخططات النمو للأطفال والمرأهقين السعوديين

مصادق عليها من قبل مجلس الخدمات الصحية في "المملكة العربية السعودية" رقم 29 (24/6/2007)



المصدر: محمد إ. الموزان، عبدالله السلوم، عبدالله ص. الحريش، بيتارج. فوستر، منصور م. القرشي، أحمد ع. العمر. مخططات النمو لعام 2005 للأطفال والمرأهقين السعوديين (رقم AR-20-63). مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 2009، الرياض، المملكة العربية السعودية.


ملاحظة: يعتمد العمر على التقويم الغريغوري.

الشكل 4-2ز النسبة المئوية للوزن نسبة للطول: أطفال ذكور، من الولادة حتى الشهر 60.



مخططات النمو للأطفال والمراهقين السعوديين

مُصادق عليها من قبل مجلس الخدمات الصحية في "المملكة العربية السعودية" رقم 29 (24/6/2007)



المصدر: محمد إ. الموزان، عبد الله السلم، عبد الله بن الحريش، بيتر ج. فوستر، منصور م. القرشي، أحمد ع. العمر. مخطوطات النمو لعام 2005 للأطفال والمهاتفين السعوديين (رقم AR-20-63). مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 2009، الرياض، المملكة العربية السعودية.

الشكل "4-2ح" النسب المئوية للوزن نسبة للطول: أطفال إناث، من الولادة حتى الشهر 60.

محيط الرأس والصدر

Head and Chest Circumference

يمكن أن تكون بعض نتائج فحصات محيط رأس الرضع مؤشرًا باكراً على التطور غير الطبيعي للدماغ. وعادة ما يشير أي محيط رأس أعلى من الرتبة المئوية 95 إلى وجود استسقاء الرأس Hydrocephalus، أو موه الرأس والذى يعني تراكم السوائل حول الدماغ، وهذا يؤدي إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة وتلف الدماغ.

ومن أسباب استسقاء الرأس التطور غير الطبيعي لبطينات الدماغ، أو التهاب السحايا الجرثومي، أو الأورام.

ويمكن أن تكون القيمة الأقل من الطبيعية لمحيط الرأس مؤشراً على صفر الدماغ Microencephaly. وهذا أيضاً قد يؤدي إلى تحديد النمو العقلي.

- ومن أسباب صغر الدماغ العيوب الخلقية، أو التهابات الحمل، أو الإغلاق الباكر لليوافيخ الدماغية، أو أي عيوب وراثية.

يُقاس محيط الصدر أيضًا عند الرضع، خاصةً إذا كان هناك اشتباه في التطور المفرط أو القاصر للقلب أو الرئتين، أو تكبس الغضروف الصدغي.

- منذ الولادة وحتى عمر سنة، يكون محيط الرأس عادة أكبر من محيط الصدر.
- في عمر سنة إلى سنتين تقريبًا، يكون محيط الرأس والصدر متساوين.
- بعد ذلك، يكون محيط الصدر أكبر من محيط الرأس.
- يمكن أيضًا قياس محيط الصدر عند البالغين المصابين بأمراض الانسداد الرئوي المزمن مثل النفاخ الرئوي Emphysema لتحديد تقدم المرض.

الوزن

Weight

يُقاس الوزن بشكل متكرر عند البالغين لمراقبة فقدان الوزن المفرط أو زيارته بسبب الاضطرابات الهرمونية مثل مرض السكري، وأمراض الغدة الدرقية، واضطرابات الجهاز الهضمي، وارتفاع التوتر الشرياني (ارتفاع ضغط الدم) مع احتباس السوائل. ويُقاس وزن مرضى السرطان أو المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي بشكل متكرر لمراقبة فقدان الوزن. وغالبًا ما يُطلب قياس الوزن يوميًا للمرضى الذين يعانون من وذمة (تورم) بسبب أمراض القلب، أو الكلى، أو غيرها من الأمراض.

لاحظ النقاط التالية عند أخذ قياسات وزن يومية:

- استخدم نفس الميزان كل يوم.
- تأكد من معايرة الميزان قبل وزن المريض.
- زِنَّ المريض في نفس الوقت كل يوم.
- إذا كان بالإمكان، زِنَّ المريض في الصباح الباكر، قبل تناوله أي طعام أو سوائل.
- تأكد أن المريض يرتدي نفس الملابس كل يوم.
- اطلب من المريض إفراغ المثانة.





معظم المرضى حساسون بشدة للتغيرات الوزن. وقد ينتاب الآباء قلق بشأن وزن أطفالهم. لذلك، من الأهمية ألا ينطق مقدم الرعاية الصحية إلا بالكلام الطيب أثناء قياس وزن المريض. كما يجب توفير الخصوصية أثناء قياس وزن المريض، وتথبي الحذر حتى لا يتمكن آخرون من رؤية وزن المريض على الميزان.



الشكل "4-3أ" ميزان بعرضة موازنة.



الشكل "4-3ب" ميزان الكرسي المتحرك.



الشكل "4-3ج" سرير مع ميزان مدمج.

الطول Height

تُؤخذ قياسات الطول بشكل متكرر لدى كبار السن للتحري عن هشاشة العظام Osteoporosis، وهو تَكَس في العمود الفقري ناجم عن تدهور الغضروف والعظم. فمع انهدام الأقراص الفقرية الموجودة بين الفقرات، سيصبح الفرد أقصر.



يجب مراعاة سلامة المريض أثناء قياس الوزن والطول. راقب السيدة المريض عن كثب في جميع الأوقات كي تتحاشى السقوط عن الميزان والإصابة المحتملة بسبب الذراع البارزة لجهاز قياس الطول.

الموازين Scales

- تُستخدم مجموعة متنوعة من الموازين للحصول على قياسات الطول والوزن.
- تحتوي بعض الموازين السريرية على عارضة مُوازنة لقياس الوزن وقضيب قياس لتحديد الطول (الشكل "4-3أ"). وتتوفر موازين الرضع مساحة لوضع الرضيع في وضعية الاستلقاء، أو الوضعيّة الأفقية.
- توجد في بعض المنشآت موازين رقمية تُظهر الوزن تلقائياً. وقد يكون لدى بعض المستشفيات ومنشآت الرعاية طويلة الأجل موازين خاصة للمرضى غير القادرين على الوقوف. ومن أمثلة هذه الموازين ميزان الكرسي المتحرك (الشكل 4-3ب") وميزان السرير ذي الرفع الميكانيكي.
- كما توجد في بعض المستشفيات ومنشآت الرعاية طويلة الأمد أسرّة بميزان مدمج (الشكل "4-3ج") يمكن استخدامه لوزن المرضى المصايبين بالغيبوبة أو المشلولين. ومن المهم اتباع تعليمات الشركة المصنعة عند استخدام أي ميزان خاص للحصول على قياسات دقيقة للوزن.



- يسجل الوزن بالكيلوجرام (كغ). فالموازين المترية تقيس بالكيلوجرام وقيمة أصغر تدريجة فيها 0.1 كغ. ويُسجل الطول بالسنتيمتر (سم). ولعارضة القياس تدرجات قيمتها 1 سم.

كيفية قياس وتسجيل الطول والوزن للبالغين أو الأطفال How to Measure and Record the Height and Weight of an Adult or Child

- اجمع المعدات.
- اغسل يديك دائمًا قبل بدء الإجراء.
- عرف عن نفسك وتعرّف على المريض. اشرح الإجراء.
- اطلب من المريض خلع الأحذية، والملابس الخارجية الثقيلة، والمحافظ، والأشياء الثقيلة التي قد تكون في جيوب الملابس. في المستشفى أو منشأة الرعاية طويلة الأمد، عادة ما يوزن المريض وهو يرتدي ثواباً طبياً.
- ارفع عارضة الطول لمستوى أعلى من طول المريض (الشكل "4-4أ").
- ساعد المريض في الصعود على الميزان. يجب أن يقف المريض بدون مساعدة، مع وضع قدميه في منتصف المنصة وتبعيدهما عن بعض قليلاً.
- تحذير:** راقب المريض عن كثب في جميع الأوقات لمنع السقوط.
- حرك عارضة مقياس الطول للأسفل حتى تلامس الجزء العلوي من رأس المريض (الشكل "4-4ب").
- تحذير:** تحرك ببطء كي لا يرتطم المريض بالعارضه.
- اطلب من المريض أن يقف منتصبًا قدر الإمكان. اطلب منه النظر إلى الأمام مباشرة لإبقاء الرأس مستوياً وثابتًا.
- انتظر حتى تصبح الشاشة الرقمية ثابتة وسجل الأرقام الظاهرة.
- تحقق من قراءتك. سجل الوزن بشكل صحيح.
- إذا لم يُسجل مقاس الطول رقميًّا، اقرأ الطول من على عارضة المقياس.
- تحقق من قراءتك، وسجل الطول بدقه.



الشكل "4-4أ" ارفع عارضة الطول للمقياس إلى مستوى أعلى من طول المريض.



الشكل "4-4ب" حرك عارضة مقياس الطول للأسفل حتى تلامس الجزء العلوي من رأس المريض.

- ارفع عارضة الطول وساعد المريض في النزول عن الميزان.
- تحذير: راقب المريض عن كثب لتفادي سقوطه. 
السلامة
- أعد جميع المعدات إلى مكانها وأغسل يديك.
- سجل جميع المعلومات المطلوبة على سجل المريض وأدخلها في الحاسب. 
المجتمع على سبيل المثال: "التاريخ"، "الوقت"، "الوزن: 60 كغ"، "الطول: 163 سم"، و"توقيعك" ومسماك الوظيفي".
- أما في العيادات التي تستخدم السجلات الصحية الإلكترونية (electronic health records EHRs)، فتدخل المعلومات مباشرة في سجل المريض على جهاز الحاسب.

كيفية قياس وزن الرضيع وتسجيله

How to Measure and Record the Weight of an Infant

- اجمع المعدات.
- أغسل يديك.
- حضر الميزان. ضع منشفة أو ورقة مخصصة على كفة الميزان لحماية الرضيع من برودة المعدن المفاجئة ومن العوامل الممرضة.
- عرّف بنفسك. اشرح الإجراء للوالد/القائم على رعاية الرضيع. حدد هوية الرضيع عن طريق سؤال الوالد / القائم على الرعاية عن اسمه. اطلب من الوالد/مقدم الرعاية خلع ملابس الرضيع. أحياناً يترك الرضيع بقميص داخلي أو بيجامة.
- ضع الرضيع على الميزان وانتظر حتى يظهر الوزن على الشاشة الرقمية.
- كن منتبهاً في جميع الأوقات. لتفادي سقوط الرضيع، أبقِ يدًا واحدة فوق الرضيع (الشكل "5-4"). 
السلامة



الشكل "5-4" أبقِ يدًا واحدة قريبة من الرضيع بشكل دائم كي تمنع سقوطه عن الميزان.



- سجل الوزن بالكيلوغرام. تحقق من قراءتك للتأكد من دقتها.
- سجل جميع المعلومات المطلوبة على سجل المريض و / أو أدخلها في المجتمع الحاسب. على سبيل المثال: "التاريخ"، و "الوقت"، و "الوزن: 4.3 كغ"، و "توقيعك"، و "مسماك الوظيفي".
- أما في العيادات التي تستخدم السجلات الصحية الإلكترونية، فتدخل المعلومات مباشرة في سجل المريض على جهاز الحاسب.
- نُظف وأعد جميع المعدات إلى مكانها. أغلق الموازين واستخدم مطهراً المسحها.

كيفية قياس طول الرضيع وتسجيله

How to Measure and Record the Height of an Infant

- اجمع المعدات (شريط قياس).
- اغسل يديك.
- احمل الطفل وضعه على سطح مستوٍ.
- راقب الرضيع عن كثب في جميع الأوقات. لا تتركه دون رقابة. إذا كان من الضروري التقط شيء أو الوصول إلى أي شيء قريب، فاستخدم يدًا واحدة لمسك الرضيع واليد الأخرى للوصول.



الشكل "4-أ" ضع رأس الرضيع عند تدريجة الصفر، واسحب قدميه برفق لتتمكن من قياس طوله.



الشكل "4-ب" افرد شريط القياس بخط مستقيم لقياس طول الرضيع.

- ضع تدريجة الصفر على شريط أو مسطرة القياس عند رأس الرضيع. إذا كانت مسطرة القياس جزءاً من طاولة الفحص، فضع الرضيع بحيث يكون رأسه عند تدريجة الصفر (الشكل "4-6أ"). اطلب من الوالد / القائم على الرعاية أو من مساعد لك أن يمسك الرأس عند هذه التدريجة. اسحب ساقى الرضيع برفق. إذا استخدمت شريط قياس، فقس حتى كعب الرضيع (الشكل "4-6ب"). إذا استخدمت مسطرة، فضع الكعب على العارضة مع إبقاء الساق مستقيمة.
- إذا كان الرضيع مستلقياً على ورق طاولة الفحص، فضع علامة على الورقة عند رأس الطفل وكعبه، ثم قس المنطقة المُعلمة.
- سجل الطول بشكل صحيح بالسنتيمتر. تحقق من قراءتك.
- سجل جميع المعلومات المطلوبة على سجل المريض وأدخلها في الحاسوب. على سبيل المثال: "التاريخ"، و"الوقت"، و"الطول: 60 سم"، و"توقيعك"، و"مسماك الوظيفي".
- أما في العيادات التي تستخدم السجلات الصحية الإلكترونية (EHRs)، فتُدخل المعلومات مباشرة في سجل المريض على جهاز الحاسوب.
- نظّف وأعد جميع المعدات إلى مكانها. اطّو شريط القياس.

كيفية قياس محيط رأس الرضيع وتسجيله

How to Measure and Record the Head Circumference of an Infant

- اجمع المعدات (شريط قياس).
- اغسل يديك.
- ضع الرضيع على طاولة الفحص أو اطلب من الوالد / القائم على رعايته حمله.
- استخدم إبهاماً أو إصبعاً لثبت تدريجة الصفر في شريط القياس على جبين الرضيع فوق الحاجبين مباشرة.




الشكل "7-4" لقياس محيط الرأس، لف الشريط حول رأس الرضيع، بحيث يكون فوق أذنيه تماماً وأعلى الجبهة.

- استخدم يدك الأخرى للف الشريط حول رأس الرضيع، فوق الأذنين مباشرةً، وفوق العظم القذالي في الناحية الخلفية للرأس، ثم العودة إلى الجبهة مرة أخرى ليلاقي تدريجة الصفر على الشريط (الشكل "7-4").
- اسحب الشريط بإحكام لضغط الشعر، لكن ليس بشدة.
- اقرأ القياس على الشريط لأقرب 0.1 سم.
- سجل القراءة.
- أعد الرضيع إلى الوالد / القائم على رعايته.
- نظف وأعد جميع المعدات إلى مكانها. اطوي شريط القياس.

كيفية قياس محاطة صدر الرضيع وتسجيله

How to Measure and Record the Chest Circumference of an Infant

- اجمع المعدات (شريط قياس).
- اغسل يديك.
- استخدم إبهام يد واحدة لثبت تدريجة الصفر على الشريط في منتصف القص.
- استخدم يدك الأخرى للف الشريط بإحكام تحت الإبط وحول الظهر دورة كاملة ليلتقي طرفا الشريط في منطقة منتصف القص (الشكل "8-4").
- تأكد أن شريط القياس في مستوى حلمة الصدر وأنه غير ملتف.
- اقرأ القياس بعد الزفير أو أثناء مرحلة الراحة بين مرات التنفس.
- اقرأ القياس على الشريط لأقرب 0.1 سم.
- سجل القراءة.



الشكل "8-4" لقياس محاطة الصدر، لف الشريط بإحكام حول الصدر والظهر على خط الحلمة.



سجل جميع المعلومات المطلوبة على سجل المريض وأدخلها في الحاسوب.
على سبيل المثال: "التاريخ"، و"الوقت"، و"محيط الصدر: 43.8 سم"،
و"توقيعك"، و"مسماك الوظيفي".

- أما في العيادات التي تستخدم السجلات الصحية الإلكترونية، فتدخل المعلومات مباشرة في سجل المريض على جهاز الحاسوب.
- نظف وأعد جميع المعدات إلى مكانها. اطوي شريط القياس.

اختر معلوماتك

1. ما القياسات الثلاثة التي تؤخذ بانتظام للربيع؟
2. ما الحالة الدماغية التي يشير إليها محيط رأس الربيع فوق الرتبة المئوية 95؟

2:4 ضبط وضعية المريض

Positioning the Patient

تعدد الوضعيات التي ينبغي أن يضبط عليها جسد المريض بتنوع الإجراءات والفحوصات الطبية المقررة، وتطلب كل وضعية تهيئة جسد المريض بشكل مناسب على طاولة الفحص الطبي أو طاولة الجراحة. فحرّي بنا معرفة كيفية العمل على الطاولة قبل محاولة وضع المريض. لذا اطلب توجيهات أو اقرأ إرشادات الشركة المصنعة بعناية. بعد الاستعمال، تُنظف طاولات الفحص الطبي وطاولات الجراحة بصابون أو محلول مطهر. بالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما يستخدم ورق مخصص لتفطية طاولة الفحص قبل الفحص، ثم يزال ويستبدل بعد الفحص.



طمئن المريض أثناء أي إجراء أو فحص. وتأكد أنه يفهم ما يجري ويمضي موافقته لتنفيذ الإجراء. وفي جميع الأوقات، راقب المريض بحثاً عن علامات الضيق والانزعاج.



تحقق من جميع عوامل الأمان لمنع السقوط والإصابات. تحرك بحرص كي لا تؤذني نفسك.

احرص على ألا ينكشف المريض لآخرين خلال أي فحص أو إجراء. يجب إغلاق الباب وإسدال الستائر إن وجدت. ويجب الحرص على ستر المريض أو تغطيته بشكل ملائم لتجنب الكشف غير الضروري. في الوقت ذاته، يجب وضع الستارة بشكل يمكن الطبيب أو الفني من الوصول بسهولة إلى المنطقة المراد فحصها أو معالجتها. وتوجد فيما يلي وصفاً بعض وضعيات الفحص الأكثر شيوعاً.



• وضعية الاضطجاع الأفقي (الاستلقاء) : **Horizontal recumbent (supine)**

- تستخدم هذه الوضعية لفحص أو علاج مقدمة أو الجزء الأمامي من الجسم (الشكل "9-4").
- يستلقي المريض على ظهره ويباعد ساقيه قليلاً. يُسمح بوضع وسادة صغيرة تحت الرأس.
- تُبسط الذراعان على جانب الجسم.
- توضع الملاعة فوق المريض، لكنها تترك فضفاضة من جميع جوانبها لتسهيل الفحص أو العلاج.

• وضعية الانكباب على البطن (الانبطاح) : **Prone**

- تستخدم هذه الوضعية لفحص أو علاج الظهر والعمود الفقري (الشكل "10-4").
- يستلقي المريض على بطنه ويدير رأسه إلى أحد الجانبين، ويمكن وضع وسادة صغيرة تحت رأسه.
- يمكن ثني الذراعين عند مستوى المرفقين ووضعهما على جانبي الرأس، أو وضعهما على جانبي الجسم.
- توضع ملاعة فوق المريض، لكنها تترك فضفاضة من جميع الجوانب لتسهيل الفحص أو العلاج.

• وضعية سيمز (على الجانب الأيسر) : **Sims' (left lateral)**

- تستخدم هذه الوضعية في فحوصات المستقيم والتنظير السيني البسيطة، والحقن الشرجية، وأخذ درجات حرارة من المستقيم، وعلاجات المستقيم (الشكل "11-4").
- يستلقي المريض على جانبه الأيسر.
- يضع المريض ذراعه اليسرى خلف ظهره.
- يدبر رأسه جانباً، ويمكن استخدام وسادة صغيرة.
- تكون الذراع اليمنى أمام المريض، ويثنى الكوع.
- تكون الرجل اليسرى مطوية أو مثنية قليلاً.
- تكون رجل المريض اليمنى مثنية بشدة عند الركبة وتترفع لتصل إلى البطن.
- يمكن تقطيع المريض بملاءة واحدة كبيرة أو ملائتين صغيرتين تلتقيان في منطقة المستقيم، يمكن أيضاً استخدام ملاعة فيها فتحة في موقع الفحص.
- وجميع الملاعات حرة التعليق على الجانبين.

• وضعية الركبة - الصدر : **Knee-chest**

- تستخدم هذه الوضعية في فحوصات المستقيم، خاصة الفحص بالمنظار السيني (الشكل "12-4")، ولا يلجأ إليها إلا عندما لا تتوفر طاولات مخصصة لفحص المستقيم.



- يُسند المريض وزن جسمه على ركبتيه وصدره.
- تُثنى الذراعان قليلاً عند المرفقين وتُبسطان فوق الرأس.
- تكون الركبتان مُباعدتين قليلاً والفخذان بزاوية قائمة على الطاولة.
- يمكن تغطية المريض بملاءة واحدة كبيرة أو ملائتين صغيرتين تلتقيان في منطقة المستقيم، يمكن أيضاً استخدام ملءة كبيرة فيها فتحة في منطقة المستقيم. والملاءات حرة التعليق من دون طيٍّ ودكٍّ.
- تحذير: لا تضع المريض على هذه الوضعية حتى يكون الطبيب جاهزاً  السلامة لبدء الفحص.
- تحذير: لا تترك المريض بمفرده في هذه الوضعية. يصعب على المريض البقاء في هذه الوضعية، لذا تستخدم فقط عند الضرورة.  السلامة

• وضعيات الاضطجاع جالساً (فاولر) **Fowler's**:

- تستخدم هذه الوضعيات لتسهيل التنفس، وتحفيض التوتر، وتشجيع التصريف، ولفحص الرأس، والرقبة، والصدر.
- يستلقي المريض على ظهره.
- يرفع الرأس في واحدة من إحدى ثلاث وضعيات رئيسية:
 - **وضعية فاولر المنخفضة:** يرفع الرأس بزاوية 25 درجة.
 - **وضعية نصف فاولر (أو منتصف فاولر):** يتم رفع الرأس بزاوية 45 درجة (الوضعية الأكثر استخداماً) (الشكل "4-13").
 - **وضعية فاولر المرتفعة:** يُرفع الرأس بزاوية 90 درجة (الشكل "4-13 ب").
- تمدد الأرجل وتُبسط على الطاولة، ولكن تثنى الركبتان قليلاً وتُدعم أحياناً بوسادة.
- تُستخدم ملءة لتغطية المريض، وتُترك فضفاضة وحرّة التعليق.

• وضعية استئصال الحصاة **Lithotomy**:

- تُستخدم هذه الوضعية في الفحوصات المهبالية، والقسطرة البولية، وفحوصات تنظير المثانة، وجراحة منطقة الحوض (الشكل "4-14").
- يوضع المريض على ظهره.
- تُفصل الركبتان وتُثنى، وتوضع القدمان في ركاب.
- توضع الذراعان على الجانبيين.
- تكون الأرداف عند النهاية السفلية للطاولة.
- يُخفض الطرف السفلي للطاولة أو يُدفع حسب طراز طاولة الفحص.



- يغطى المريض بملاءة واحدة كبيرة توضع على الجسم بشكل ماسي (معين). تكون إحدى الزوايا في الجزء العلوي من الصدر، والأخرى تتدلى بشكل حز بين الساقين. تُلف كل واحدة من الزاويتين الآخرين حول قدم من أقدام المريض.

• وضعية الاضطجاع الظاهري **Dorsal Recumbent**:

- هذه الوضعية مشابهة لوضعية استئصال الحصاة، لكن المريض فيها يكون على سرير أو على طاولة بدون ركاب (الشكل "15-4").
 - تكون رجلاً المريض مُباعدتين لكنهما ممدودتان بشكل مسطح على الطاولة أو السرير.
 - تثنى الركبتان.
 - يستر المريض.
- النقطة الأخرى مماثلة لتلك في وضعية استئصال الحصاة.

• وضعية النكوس أو ترندلينبورغ **Trendelenburg**:

- تزيد هذه الوضعية جريان الدم في الرأس والدماغ، ويمكن استخدامها في حالة الصدمة الدورانية، فترفع فيها نهاية السرير أو الطاولة، ثم يستقي المريض في وضعية الاضطجاع الأفقي، بحيث يكون الرأس أخفض من القدمين.
- يمكن استخدام وضعية ترندلينبورغ الجراحية (الشكل "16-4") في جراحات وعلاجات الحوض، فيستطع المريض على ظهره، ثم تُخفض مقدمة الطاولة بزاوية 45 درجة لخفض الرأس، وتصبح القدمان والساقان بوضعية مائلة للأسفل.
- كثيراً ما تستخدم الأحزمة لثبت المريض في هذه الوضعية.
- يعتمد ستر المريض في هذه الوضعية على المعالجة المُجرأة، فتستخدم عادة ملاءة واحدة كبيرة وتترك معلقة فضفاضة. أمّا في الإجراءات الجراحية، فيُغطى المريض بملاءة بها فتحة تكشف منطقة الجراحة.

• وضعية الإنثناء والتدعى (في طب المستقيم والشرج) **Jackknife**:

- تستخدم هذه الوضعية بشكل أساسي في جراحة المستقيم أو فحوصاته، وجراحة الظهر أو علاجاته.
- يكون المريض في وضعية الانبطاح.
- تُرفع الطاولة من المنتصف بحيث تكون منطقة المستقيم على ارتفاع أعلى. تحتاج هذه الوضعية طاولة جراحية خاصة (الشكل "16-4").
- يوجه رأس وصدر المريض نحو الأسفل، بينما تتدلى الأقدام والأرجل من الطرف المقابل للطاولة.
- يجب توفير الدعم الكافي للمريض لتفادي الإصابة. وتستخدم الأحزمة لثبت المريض في مكانه.




- يغطى المريض بملاءة جراحية فيها فتحة تكشف منطقة الجراحة أو المعالجة، ويمكن استخدام ملاءتين صغيرتين لتثقيان في منطقة الجراحة أو المعالجة.
- تحذير: من المهم استخدام ميكانيكا الجسم الجيد أثناء وضع المريض، لأن ذلك سيحميك أنت والمريض.

اخبر معلوماتك

1. ما الذي يجب عليك فعله لوقاية نفسك من الإصابة عند ضبط وضعية المريض بشكل معين؟
2. ما استخدامات وضعيات فاولر؟




الشكل "10-4" وضعية الانكباب (الابتاح).



الشكل "9-4" وضعية الاضطجاع الأفقي (الاستلقاء).



الشكل "12-4" وضعية الركبة - الصدر.



الشكل "11-4" وضعية سيمز (جانبية يسرى).





الشكل "13-4ب" وضعية فاولر المرتفعة.



الشكل "13-4أ" وضعية نصف فاولر (أو منتصف فاولر).




الشكل "15-4" وضعية الاضطجاع الظاهري.



الشكل "14-4" وضعية استئصال الحصاة.



الشكل "17-4" طاولة جراحية خاصة لازمة لتطبيق وضعية الإنقاء والتديي (في طب المستقيم والشرج).



الشكل "16-4" وضعية ترندلينبورغ الجراحية.

الاستقصاء عن اضطرابات الرؤية

Screening for Vision Problems


تُجرى اختبارات فحص الرؤية لقياس **حدة البصر Visual Acuity** لدى الفرد، أو قدرته على إدراك وفهم ما يراه. غالباً تكون جزءاً من الفحص السريري لكشف داء عيني، ويجب إجراء أي اختبار يشمل قياس حدة البصر في غرفة مضاءة جيداً. ويُفضل إجراء الفحص في ضوء النهار العادي مع تقاضي التعرض لأشعة الشمس المباشرة. أثناء فحص المريض، انتبه إلى حدوث إحدى الحالات التالية: حول، أو ميلان المريض نحو لوحة فحص العين، أو إغلاق إحدى العينين عند فحص كلتا العينين، أو الإفراط في الرمش، أو دماغ العينين. وإذا لوحظت عيوب مما سبق في أي فحص، يجب إحالة المريض إلى طبيب العيون لإجراء فحص موسع.

تضمن إحدى طرائق فحص الرؤية استخدام مخطوطات حدة البصر، وتستخدم هذه المخطوطات لاختبار الرؤية عن بعد، وتأتي هذه المخطوطات بأشكال مختلفة، فيحتوي بعضها على صور للاستخدام عند فحص الأطفال الصغار.

وللرموز (الحروف أو الصور) ارتفاعات مختلفة على المخطط، فهي تتراوح من صغيرة في الجزء السفلي من المخطط إلى كبيرة في الجزء العلوي. وعند الوقوف على بعد 6 أمتار من المخطط يجب أن يكون الشخص الذي يتمتع بحدة رؤية طبيعية قادراً على رؤية الأحرف التي يبلغ ارتفاعها 20 ملimetراً (ملم).

تحتبر مخطوطات حدة البصر فقط عيوب الرؤية عن بعد، أو قصر النظر (**الحسر Myopia**)، ويستخدم نظام مختلف لفحص عيوب الرؤية عن قرب (مشكلات في قراءة الكتابة الصغيرة ورؤية الأشياء القريبة) والتي تعرف بـ **بعد النظر Hyperopia**. يستخدم هذا النظام بطاقة مطبوعة عليها فقرات قصيرة متنوعة، فتُطبع كل فقرة بحجم مختلف يتراوح ارتفاعه بين 0.37 و 2.5 ملم. وتتوفر بطاقات برموز أو صور متنوعة للاستخدام لدى الأطفال الصغار أو الأفراد الذين لا يستطيعون القراءة، ويحمل المريض البطاقة بعيداً عن العينين بحوالي 35-40 سنتيمتراً (سم)، ثم يقرأ النص المطبوع أو يتعرف على الصور، والتي تصبح أصغر تدريجياً، ثم تسجل أصغر كلمة مطبوعة مقرءة أو أصغر رمز يمكن للمريض قراءته والتعرف عليه دون أخطاء.

تحتبر العيوب في رؤية الألوان أو عمي الألوان باستخدام سلسلة من الأرقام المطبوعة بنقاط ملونة علىخلفية من النقاط بألوان متباعدة (الشكل "18-4")، ويمكن للمرضى الذين لديهم رؤية طبيعية للألوان التعرف على الأرقام. بينما



الشكل "18-4" لا يستطيع الأشخاص المصابون بعمى الألوان رؤية الأرقام الموجودة في أنواح ألوان إيشيهارا.

لا يستطيع المرضى الذين يعانون من عمي الألوان رؤية الأرقام أو أنهم يرون أرقاماً خاطئة. ويتم هذا الاختبار عادة في غرفة مضاءة بضوء النهار العادي وليس ضوء الشمس الساطع.

عند فحص حدة البصر، هناك مصطلحات خاصة يجب تذكرها:

- **الحسر**: قصر النظر، وهو عيب في الرؤية البعيدة.
- **مد البصر**: بعد النظر، وهو عيب في الرؤية القريبة.
- **منظار العين** Ophthalmoscope: أداة لفحص العين.
- **مقياس ضغط العين** Tonometer: أداة لقياس التوتر أو الضغط داخل العين، وغالباً ما يشير الضغط المرتفع إلى وجود الزرق.

اختبر معلوماتك

1. أين ينبغي إجراء اختبار حدة البصر؟
2. ما هو استخدام منظار العين؟

4:4 المساعدة في الفحص الطبي Assisting with Physical Examinations

إن الفحوصات السريرية التي تجري كثيرة التنوع، وتحتاج إلى وسائل مختلفة في إمكاناتها والمعدات المتاحة من طبيب إلى آخر. ومع ذلك، هناك بعض المبادئ الأساسية التي تطبق على جميع الفحوصات. إذ تُستخدم أربع تقنيات رئيسية أثناء الفحص وهي الملاحظة، والجس، والقرع، والإصقاء.

- **الملاحظة Observation**: يتأنى الطبيب المريض بعناية لملاحظة أشياء مثل لون الجلد، والطفح الجلدي، والزوائد، والتورم، والندب، والتشوهات، وحركات الجسم، وحالات الشعر والأظافر، وسخونة المريض العامة.
- **الجس Palpation**: يستخدم الطبيب يديه وأصابعه ليشعر بنواحي الجسم المختلفة (الشكل "19-4") ويحدد ما إذا كان جزء من الجسم متضخماً، أو قاسياً، أو في غير موضعه، أو مؤلماً عند الجس.
- **القرع Percussion**: يقرع الطبيب ويستمع إلى الأصوات القادمة من أعضاء الجسم المختلفة (الشكل "20-4"). وقد يضع الطبيب إصبعاً أو عدة أصابع من اليدين واحدة على جزء من الجسم، ثم يستخدم أصابع اليد الأخرى للقرع على هذا الجزء من الجسم. حيث تسمح الأصوات الصادرة للفرد المدرب بتحديد حجم، وكثافة، وموقع الأعضاء الداخلية.



- **الإصغاء Auscultation:** يستمع الطبيب إلى الأصوات الصادرة من داخل جسم المريض (الشكل "21-4")، ويستخدم السمعاء الطبية في معظم الحالات. يستمع الطبيب إلى الأصوات الصادرة عن القلب، والرئتين، والأمعاء، وأعضاء الجسم الأخرى.



الشكل "19-4" في الجسم، يستخدم الطبيب يديه وأصابعه لتحسس أجزاء مختلفة من الجسم.



الشكل "21-4" يستخدم الطبيب الإصغاء والسماعة الطبية ليسمع أصوات القلب والرئة الخلفية.



الشكل "20-4" يقتضي القرع النقر على أجزاء الجسم والاستماع إلى الأصوات الصادرة عن أعضائه.




المعدات Equipment

يجب تجميع كامل المعدات الالزمة قبل بدء الفحص (الشكل "22-4"). ستختلف المعدات المطلوبة حسب مناطق الجسم المراد فحصها. وتشمل بعض المعدات والأدوات المستخدمة في الفحوصات المختلفة ما يلي:

- **مرآة الحنجرة Laryngeal mirror:** أداة ذات مرآة في أحد طرفيها، وتستخدم لفحص الحنجرة، أو صندوق الصوت، في الحلق.
- **منظار العين Ophthalmoscope:** أداة مضاءة لفحص العينين (الشكل "23-4").
- **منظار الأذن Otoscope:** أداة مضاءة لفحص الأذنين (الأشكال "4-24أ" و "4-24ب").
- **مطرقة القرع (المنعكسات) Percussion (reflex) hammer:** أداة تستخدم لفحص المنعكسات الوترية.
- **منظار القولون السيني Sigmoidoscope:** أداة مضاءة لفحص القولون السيني (الجزء الداخلي من الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة)، تستخدم خلال تنظير السين.
- **المنظار Speculum:** أداة تستخدم لفحص القنوات الداخلية للجسم.
- **مقاييس ضغط الدم Sphygmomanometer:** أداة تستخدم لقياس ضغط الدم.
- **السماعة الطبية Stethoscope:** أداة تستخدم للاستماع إلى أصوات أعضاء الجسم الداخلية.



الشكل "22-4" يجب تجميع كامل المعدات الالزمة قبل بدء الفحص.



الشكل "23-4" يستخدم منظار العين لفحص عين المريض.

- **خافض اللسان Tongue blade/depressor:** عود خشبي أو بلاستيكي يستخدم لخفض اللسان من أجل السماح بفحص الحلق.

جهز نفسك

Prepare Yourself



يجب اتباع احتياطات السلامة المعيارية في جميع الأوقات أثناء إجراء الفحص تجذير السريري، ويجب أيضاً تنظيف وتطهير أو تعقيم أي أدوات أو معدات ملوثة بالدم أو سوائل الجسم بشكل صحيح بعد الاستخدام. على المساعد الطبي أن يكون واعياً لمحیطه دائمًا وأن يتبع خطوات لمنع انتشار العدوى.

- يجب غسل اليدين مراراً.



- يجب ارتداء القفازات في حال احتمال ملامسة الدم أو سوائل الجسم.

تجذير

- إذا كان تطايير السوائل أمراً محتملاً، فارتدي ثوباً طبياً، وقناعاً أو واقياً للوجه، وواقياً للعينين. والتزم باحتياطات السلامة المعيارية في جميع الأوقات.



جهز المريض Prepare the Patient

- عرّف عن نفسك وتعرف على المريض. اشرح الإجراء المراد استخدامه. وتذكر أن هذا الإجراء له عدة خطوات.
- يُجب أن يتضمن تحضير المريض شرحاً دقيقاً لجميع المجتمع الإجراءات، فقد تساعد الشروحات المفصلة في تخفيف بعض الخوف. إذ غالباً ما يكون المرضى متذوقين ويحتاجون إلى التطمئن.
- اطلب من المريض إفراغ المثانة قبل البدء بالفحص حتى تكون المثانة فارغة ويمكن حينها جس الأعضاء الداخلية في منطقة المثانة. وإذا طلب تحليل البول، فيمكن الحصول على عينة البول في هذا الوقت.
- قد تشمل بعض الفحوصات التي تُجرى بشكل متكرر قبل الفحص السريري ما يلي:
 - تسجيل الطول والوزن.
 - أخذ وتسجيل العلامات الحيوية، بما في ذلك درجة الحرارة، وعدد النبض، وعدد مرات التنفس، وضغط الدم.
 - التتحقق من حدة البصر وتسجيل النتائج.
 - إجراء اختبار قياس السمع (اختبار سمعي خاص يتطلب تدريياً إضافياً لإجرائه) وتسجيل النتائج.
 - جمع عينات الدم للاختبارات المطلوبة (قد يطلب الطبيب اختبارات مختلفة).
 - إجراء تخطيط كهربائية القلب (مخطط كهربائية القلب، واختبار للتحقق من نمط التوصيل الكهربائي في القلب) إذا طلب الطبيب ذلك.
- وضع المريض على طاولة الفحص وتغطيته بشكل صحيح.
- إعلام الطبيب أن المريض جاهز.



الشكل "4-24أ" يستخدم منظار الأذن لفحص جوف الأذن لدى المريض.



الشكل "4-24ب" قد يكشف الفحص بالمنظار عن انفصال الغشاء الطبلي أو علامة على التهاب الأذن الوسطى أو عدوى الأذن الوسطى.

أثناء الفحص During the Examination

- كن على استعداد للمساعدة عند الحاجة.
- ناول الطبيب المعدات اللازمة عند الطلب.



- ضع المريض بالوضعية الصحيحة أثناء كل مرحلة من الفحص.
- كن على استعداد للمساعدة في كل إجراء.

بعد الفحص After the Examination

- عند انتهاء الفحص، ساعد المريض على الجلوس، ودعه يرتاح لبضع دقائق.
- في حال عدم ملاحظة أي علامات ضعف أو دوار، فساعد المريض على النزول عن الطاولة.
- أبلغ المريض كيف ومتى سيُخبر بنتائج الفحوصات.
- اطلب من المريض ارتداء ملابسه أو سعاده في ذلك إذا لزم الأمر.
- ضع لصاقات على جميع العينات والزرعات تحوي اسم المريض، ورقم التعريف، واسم الطبيب. اطبع جميع المعلومات في استماراة (استمارات) طلبات المخبر أو استخدم استماراة مُولدة بواسطة الحاسوب. يمكن أن تشمل المعلومات التاريخ، والوقت، واسم المريض، والعنوان، ورقم التعريف، واسم الطبيب ورقم تعريفه، ونوع العينة أو المكان الذي أخذت منه، والاختبار المطلوب. أرسل العينات إلى المخبر في أسرع وقت ممكن.
- ارتد قفازات أثناء تنظيف وتعقيم أي معدات ملوثة. ثم ضع جميع المواد الملوثة التي يمكن التخلص منها في كيس النفايات المعدية. واستخدم مطهراً لمسح أي مناطق ملوثة.
- انزع القفازات وتخلص منها في كيس النفايات المعدية، ثم اغسل يديك.
- سجل جميع المعلومات الالازمة في سجل المريض أو أدخلها في سجله الصحي الإلكتروني. على سبيل المثال: "التاريخ"، و"الوقت"، و"الفحص السريري"، و"زرعة الحلق المرسلة إلى المختبر"، و"توقيعك" و"مسماك الوظيفي". وضع نسخة من أي استماراة طلب مخبرٍ في ملف المريض. قد يقوم الطبيب أحياناً بتسجيل المعلومات الالازمة.

اخبر معلوماتك

1. ما التقنيات الأربع الرئيسية المستخدمة أثناء الفحص؟
2. اذكر الاختبارات الخمسة الأكثر شيوعاً والتي تجري قبل الفحص السريري.



المساعدة في الجراحة الصغرى وإزالة الغرز

Assisting with Minor Surgery and Suture Removal

كونك مقدم رعاية صحية، يمكن أن يطلب منك الاستعداد والمساعدة في عملية جراحية صغرى أو إزالة غرز في أي منشأة رعاية صحية أو طبية أو للعناية بالأنسان. تشمل الجراحة الصغرى إزالة التآليل أو الكيسات أو الأورام أو الزوائد أو الأجسام الغريبة، بالإضافة إلى أخذ الخزعات من الزوائد الجلدية أو الأورام، خياطة الجروح، شق وتفریغ مناطق في الجسم، وغيرها من الإجراءات المُشابهة.

الأدوات والمعدات

Instruments and Equipment

تعتمد الأدوات والمعدات المستخدمة على نوع الجراحة أو الإجراء المُراد تنفيذه. تشمل بعض الأدوات واللوازم الأساسية التي يمكن استخدامها (الشكل "28-4") ما يلي:

- **المشارط Scalpels**: أدوات تتكون من مقبض يتصل بشفرات قاطعة، وتستخدم لشق (قطع) الجلد والأنسجة، وتتوفر مشارط تستخدم لمرة واحدة، ولها شفرة واقية قابلة للسحب لمنع حدوث أذيات الأدوات الحادة.
- **المقصات الجراحية Surgical scissors**: مقصات خاصة ذات نهايات كليلة أو حادة أو مزبج من كليهما؛ وتوصف وفقاً ل نهاياتها على أنها حادة-حادة، حادة-كليلة، أو كليلة-كليلة. تستخدم لقطع الأنسجة.
- **المرقئات Hemostats**: مجموعة خاصة من الأدوات المنحنية أو المستقيمة، تكون مسننة النهايات؛ تستخدم لضغط (أو لقط) الأوعية الدموية لإيقاف النزيف أو للإمساك بالأنسجة.
- **ملاقط الأنسجة Forceps**: أدوات ذات نتوء مدبب واحد أو أكثر (أسنان) عند نهايتي طرفيه، تستخدم لإمساك الأنسجة.
- **ملاقط الشظايا Splinter forceps**: أدوات مدببة النهايات وبدون أسنان، تستخدم لإزالة الأجسام الغريبة من الجلد أو الأنسجة.
- **مشابك المناشف Towel clamps**: لكل مشبك منها نهايتان حادتان تُقفلان على بعضهما، وتستخدم لربط الستائر الجراحية ببعضها البعض، ولثبيت الأنسجة **المُسلّحة** (المفصولة أو المقطعة إلى أجزاء).
- **المُبعدات Retractors**: الأدوات المستخدمة لثبيت أو سحب شفتيّ أو جوانب الجرح أو الشق، وتدعى أيضاً خطّافات الجلد.




- **مواد الغرز Sutures**: مواد خاصة تستخدم في الغرز، وتستخدم لإبقاء الجرح أو الشق مغلقاً. وتهضم مواد الخياطة القابلة للامتصاص مثل الخيط المعموي الجراحي أو الفيكريل بواسطة إنزيمات الأنسجة ويتمتصها الجسم. أما مواد الغرز غير القابلة للامتصاص مثل الحرير، والنایلون، والداكرون، والفولاذ المقاوم للصدأ، ومشابك أو دبابيس الجلد المعدنية فتزال بعد التئام الأنسجة أو الجلد (الشكل "26-4").

- **حاملات الإبر Needle holders**: أدوات خاصة تستخدم لثبيت الإبرة أو دعمها أثناء إدخال الغرز.

- **الإبر Needles**: أدوات مدببة رفيعة مع عين في أحد طرفيها، وتستخدم لمسك الخيط أثناء إدخال الغرز في شق أو جرح، وتكون عادة منحنية لتسهيل إدخالها في الجلد. تحتوي الإبر المُطْرَقة على خيط معلق ب نهايتها، فتشكلان وحدة واحدة.

- **مقص الضمادة Bandage scissors**: مقص خاص ذو نهايات سفلية كليلة، وتستخدم لإزالة الضمادات والعصائب. وتقى النهايات الكليلة من إصابة الجلد المجاور مباشرة للضمادة.



الشكل "25-4" بعض الأدوات الجراحية البسيطة.



الشكل 26-4 تتوفر مجموعة واسعة من مواد الخياطة والإبر للعمليات الجراحية الصغرى.

يتطلب تحضير طاولة الأدوات الجراحية استخدام تقنية تعقيم صارمة للوقاية من العدوى. ويجب تعقيم الأدوات والمواد، وتوخي الحذر لتجنب تلوثها عند وضعها في الطاولة. تتوفر أيضاً تجهيزات معقمة كاملة في عبوات تجارية، وهي معدّة للاستخدام لمرة واحدة. وتتضمن الأمثلة تجهيزات لإجراء الغرز وإزالتها. ومن المهم اتباع تقنية تعقيم ما أثناء فتح العبوات للحفاظ على تعقيم جميع المواد في العبوة.

تحضير المريض

Preparing the Patient

قبل الخضوع لأي عملية جراحية بسيطة، يجب على المريض التوقيع على استمارة موافقة خطية، تتضمن الموافقة على العملية، ويدرك العلاجات البديلة، ويسرد المضاعفات أو المخاطر المحتملة للجراحة. وإذا كان المريض قاصراً أو يفتقر للأهليّة، يجب على شخص مفوض التوقيع على الاستمارة. كما تقدم معظم العيادات تعليمات مكتوبة قبل وبعد الجراحة.

في كثير من الأحيان، يكون المرضى الذين سيخضعون لجراحة بسيطة أو إزالة الغرز خائفين وقلقين. لهذا، طمئن المريض قدر المستطاع، وأحل الأسئلة الدقيقة المتعلقة بالجراحة أو الإجراء إلى الطبيب.



المجتمع

تحضير المكان Preparing the Site

لتجهيز جلد المريض قبل الجراحة الصغرى، قم بالآتي:

- اغسل يديك وارتدي قفازات.
- اغسل المكان جيداً بصابون مطهر.
- من الممكن حلق منطقة الجراحة إذا كانت كثيفة الشعر، وعندما يُطلب ذلك، فامسّك الجلد وشّده، ثم احلقه بشفرة تستخدم لمرة واحدة، مع اتجاه نمو الشعر. يعتبر حلق منطقة الجراحة أمراً جدلياً لأن الحلاقة تزيد من احتمالية حدوث السحجات والجروح مما يترك مناطق عارية معرضة للإصابة بالعدوى.
- من المهم تجنب خدش المريض بشفرة الحلاقة. تخلص من الشعر  تحذير الطويل باستخدام قطعة شاش أو منشفة ورقية، واشطف المنطقة ثم جففها بالشاشة.
- قبل الجراحة الصغرى، غالباً ما يخدر الطبيب مكان الجراحة موضعياً مما يفقده الحسّ ويقلل من الألم. وقبل حقن المُخدر الموضعي، يجوز للطبيب تطبيق مخدر موضعى سائل أو رذاذ على سطح الجلد لتخفييف ألم الحقن، ويجب أن تكون مواد التخدير متوافرة، وتوضع عادة على جانب الطبق المعقم.

أثناء الجراحة During Surgery

يُتوقع من المساعد الطبي المساعدة أثناء الجراحة حسب الحاجة. يعتمد الإجراء على الطبيب الذي يجري الجراحة، لذا كن متيقظاً لجميع مراحل الإجراء وكن على أهبة الاستعداد للمساعدة عند اللزوم.

- يجب أن تكون الضمادات المعقمة متوافرة للاستخدام، وعادة ما توضع مباشرة على طاولة الجراحة بحيث تكون في المتناول. ويفضل بعض الأطباء ترك الضمادات المعقمة في الأغلفة الأصلية المعقمة ووضعها في المنطقة المجاورة.
- سيسّع الطبيب ستائر Drapes معقمة، لذا أبقي مشابك المناشف جاهزة كي يستخدمها الطبيب لتنبيت ستائر في مكانها. وقد يعمّم الطبيب مكان الجراحة بمطهر.





الشكل "28-4" يجب وضع عينات النسج أو الخزعة المستأصلة أثناء الجراحة الصغرى في النوع الصحيح من العبوات ليفحصها أخصائي التشريح المرضي لاحقاً.

الشكل "27-4" أمسك العبوة بوضعية مناسبة ليتمكن الطبيب من ملء المحقنة دون تلوث الإبرة.

- عندما يكون الطبيب جاهزاً لحقن المخدر، استخدم ضمادة شاش مشبعة بالكحول لتنظيف الجزء العلوي من عبوة محلول المخدر، وأمسك العبوة بوضعية مناسبة ليتمكن الطبيب من ملء المحقنة دون تلوث الإبرة (الشكل "27-4"). ثم يحقن الطبيب بعدها المخدر، ويجب التخلص من الإبرة والمحقنة على الفور في حاوية الأدوات الحادة.
- إذا لزم الأمر، فارتدي قفازات معقمة وساعد حسب الحاجة. أمسك المُبعدات، وناول الأدوات، وساعد في الإجراء.
- تُرسل أنسجة الجسم، والزوائد غير الطبيعية، والعينات الأخرى المستأصلة أثناء الجراحة إلى المختبر لفحصها، ويجب وضع كل عينة في عبوة مناسبة على الفور لتجنب الضياع، وتوضع عينة الخزعة في محلول الفورمالين الذي يحفظ العينة حتى يمكن فحصها. ستزود معظم المعامل منشأة الرعاية الصحية بعبوات العينات الالزمة.
- في حالة استئصال عينة نسيجية أو خزعة، فاقتح غطاء عبوة العينة، ثم أمسك العبوة وأبقِها قريبة من الطبيب حتى يتمكن من وضع العينة فيها (الشكل "28-4"). سُمّ العبوات بشكل صحيح واستكمال استماراة طلب المختبر. تستخدم العديد من المعامل استمارارات تم إنشاؤها بواسطة الحاسوب. يجب إرسال العينات إلى المختبر في أسرع وقت ممكن.
- إذا كان الطبيب سيدخل الغرز، فتأكد أن مواد الخياطة والإبر جاهزة للاستخدام.
- تزود بمواد أو معدات إضافية حسب الحاجة.

بعد الجراحة After the Surgery

- بعد الجراحة، ساعد في وضع الضمادات والعصابات.
- انتبه لأية علامات ضيق. وفي حال غياب علامات الضعف أو الدوار، ساعد المريض في النزول عن الطاولة، وراجع معه تعليمات ما بعد الجراحة.
- زود المريض بنسخة مكتوبة من تعليمات ما بعد الجراحة إذا كانت هذه هي السياسة المتبعة في العيادة. وأبلغ المريض كيف ومتى سيُخبر بنتائج الفحوصات.
- ضع لصاقات على جميع العينات التي تحوي المعلومات الصحيحة من اسم المريض ورقم التعريف واسم الطبيب، أو استخدم الملصق الذي تم إنشاؤه بواسطة الحاسب. اطبع جميع المعلومات في استمارة طلب المختبر، وتشمل التاريخ، والوقت، واسم المريض وعنوانه ورقم تعريفه، واسم الطبيب ورقم تعريفه، ونوع العينة أو المكان المأخوذة منه، والفحص المطلوب. وتأكد أن كل عينة موجودة في العبوة أو الزجاجة الصحيحة، وتحقق أن أغطية العبوات مغلقة بإحكام، ثم أرسل العينات إلى المختبر في أسرع وقت ممكن. سيزود أخصائيو التشريح المرضي معظم منشآت الرعاية الصحية بعبوات خاصة.
- ارتدي قفازات لتنظيف وتعقيم جميع الأدوات والمعدات. ضع الأشياء الحادة مثل الإبرة والمحنة وشفرة المشرط (أو مشرط الاستخدام لمرة واحدة) في حاوية الأدوات الحادة فوراً بعد الاستخدام، وضع المواد الملوثة ذات الاستخدام لمرة واحدة في حاوية النفايات المعدية. واستخدم مطهراً لمسح أي منطقة ملوثة.
- ضع جميع المعدات في مكانها الصحيح.
- أخلع القفازات وتخلص منها في كيس النفايات المعدية. اغسل اليدين.
- سجل جميع المعلومات المطلوبة على ملف المريض أو أدخلها في السجل الصحي الإلكتروني. على سبيل المثال: التاريخ، والوقت، والإزالة الجراحية للورم من الساعد الأيمن، والعينة المرسلة إلى مخبر التشريح المرضي، وتعليمات بعد الجراحة المقدمة للمريض شفوياً وكتابياً، وتوقيعك، والمسمي الوظيفي. ضع نسخة من أي طلب مخبري في ملف المريض. وقد يسجل الطبيب أحياناً المعلومات المطلوبة.
-  لأن التلوث بالدم وسوائل الجسم أمر محتمل أثناء الجراحات الصغرى؛ تحذير يجب تطبيق الإجراءات الوقائية القياسية في جميع الأوقات. يجب غسل اليدين بشكل متكرر ومسح القفازات بمطهر، ووضع المواد الملوثة - التي تستخدمن لمرة واحدة - في كيس النفايات المعدية قبل التخلص منها. ويجب وضع الأشياء الحادة مثل شفرات المبضع (أو المباضع التي تستخدم لمرة واحدة) والإبر في



حاوية أدوات حادة مقاومة للتسرب وللانتقاب فور الانتهاء من استخدامها، ويجب أن يكون المساعد الطبي واعيًّا لمحيطة، وعليه اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع انتشار العدو.

إزالة الغرز Suture Removal

تطلب إزالة الغرز أيضًا اتباع تقنية تعقيم، حيث تعتبر العدو تهديدًا دائمًا، وبالتالي يجب الوقاية منها.

- ستحتاج الأدوات والمواد (الشكل "4-29") باختلاف الطبيب. الأدوات الرئيسة المستخدمة في هذا الإجراء هي مقص الخياطة وملقط الإبهام. وكثيرًا ما تُعبأ هاتان الأداتان في أطقم معقمة يمكن التخلص منها، وتدعى مجموعات إزالة الغرز (الشكل "4-30"). يستخدم ملقط الإبهام لإمساك الغرز وتُشد بالإبهام والسبابة. ثم يمكن إدخال النصل المنحني لمقص الخياطة تحت الخيط ليسهل قص الغرز وإزالتها.
- بعد إزالة الغرز، ضع ضمادات وعصابة نظيفة على الجرح، واستخدم ملقط التضميد أو ارتد قفازات معقمة لوضع ضمادة معقمة على المكان المنشود (الشكل "4-31أ"), ثم ضع شاشًا أو شريطًا لاصقًا لتثبيت الضمادة في مكانها (الشكل "4-31ب").
- أرشد المريض حول كيفية العناية بالجروح، وقدم تعليمات مكتوبة إذا كانت هذه هي سياسة العيادة. راقب المريض بحثًا عن علامات الضيق. في حال عدم ملاحظة أي علامات ضعف أو دوار، فساعد المريض في النزول عن الطاولة.
- ارتد قفازات لتنظيف وتعقيم جميع الأدوات. إذا كانت مجموعة الخيوط مخصصة للاستخدام مرة واحدة ، فضعها في حاوية الأدوات الحادة.
- ضع جميع المواد الملوثة المخصصة للاستخدام مرة واحدة في كيس النفايات المعدية، واستخدم مطهرًا لمسح أي منطقة ملوثة.
- اخلع القفازات وتخلص منها في كيس النفايات المعدية، ثم اغسل يديك.



- سجل جميع المعلومات المطلوبة على ملف المريض أو أدخلها في السجل الصحي الإلكتروني. على سبيل المثال: التاريخ، والوقت، والفرز المُزالة من المساعد الأيمن، والضمادة المعقمة التي وضعت، وتوقيعك والمسمي الوظيفي. وقد يسجل الطبيب أحياناً المعلومات المطلوبة.

اختبار معلوماتك

1. اذكر أربع أدوات أو معدات أساسية يمكن استخدامها في الجراحة أو الإجراء.
2. هل تتطلب إزالة الغرز تقنية تعقيم؟ علّ إجابتك.



الشكل "30-4" مجموعة إزالة الغرز مكونة من مقصات غرز وملقط.

إيهام.



الشكل "29-4" مثال عن طاولة تجهيز لإزالة الغرز.



الشكل "31-4 بـ" ثبت الضمادة في مكانها باستخدام شاش أو شريط لاصق.



الشكل "31-4 أ" استخدم ملقط التضميد أو ارتد قفازات معقمة لوضع ضمادة معقمة على المكان المنشود.



تسجيل وتركيب جهاز تخطيط كهربائية القلب

Recording and Mounting an ECG

لفهم مخطط كهربائية القلب، من الضروري فهم نمط التوصيل الكهربائي في عضلات القلب (الشكل "32-4"). حيث تحكم نبضات كهربائية داخل القلب بانقباض عضلاتها. تنشأ النبضة في **العقدة Node** الجيبية الأذينية (sinoatrial SA)، وهي منطقة من عضلة القلب قرب القسم العلوي من الأذين الأيمن. وتتحرك النبضة عبر الأذينين؛ مما يتسبب في تقلص عضلاتهما، ثم تنتقل النبضة إلى العقدة الأذينية البطينية (AV atrioventricular) عبر مجموعة من الألياف تسمى حزمة هيس His، ثم عبر فرعى الحزمة اليمنى واليسرى إلى الفروع النهائية والتي تدعى ألياف بوركنجي Purkinje. وتوزع ألياف بوركنجي النبضة على عضلات البطينين الأيمن والأيسر مُسببةً انقباضها.



الموجة Q هي انحراف أو موجة سلبية.

الموجة R هي انحراف أو موجة إيجابية.

الموجة S هي موجة سلبية.

الموجة T هي موجة إيجابية وتمثل عودة الاستقطاب البطيني.

الموجة U (تشاهد في بعض المرضى) هي انحراف إيجابي يتعلّق بعودة الاستقطاب.



الشكل "32-4" مع مرور النبضة الكهربائية عبر مسار التوصيل في القلب، تخلق نمطاً مسجلاً هو مخطط.

يُسجل جهاز تخطيط القلب حركة النبضة الكهربائية على شكل سلسلة من الموجات تعرف باسم معقد PQRST:

- تحدث الموجة P عندما تنشأ النبضة في العقدة الجيبية الأذينية وتنتقل عبر الأذينين.
- تمثل الموجة QRS حركة النبضة عبر العقدة الأذينية البطينية، وحزمة هيس، وفروع الحزمة، وألياف بركتجي.
- تمثل الموجة T عودة استقطاب البطينين، أو فترة التعافي في البطينين قبل حدوث تقلص آخر.

يسجل جهاز تخطيط كهربائية القلب نمط التيار الكهربائي المار في القلب على شكل مخطط ECG، ويمثل كل معقد PQRST النشاط الكهربائي الذي يحدث في كل تقلص لعضلة القلب؛ لذا يمثل كل معقد PQRST نبضة قلب واحدة. ونظراً لأن أي نمط غير طبيعي من النبضات الكهربائية سيكون ظاهراً على مخطط كهربائية القلب، يمكن استخدام هذا المخطط لتشخيص أمراض القلب وأذية عضلاته.

 يشعر العديد من المرضى بالخوف أو القلق من إجراء مخطط كهربائية القلب. المجتمع لهذا من المهم شرح هذا الإجراء للمريض، والتأكد على أنه ليس مؤلماً أو مزعجاً. ضع المريض بوضعية مريحة مع دعم جميع أجزاء جسمه، وشجعه على الاسترخاء وتجنب الحركة أثناءأخذ مخطط كهربائية القلب. إذ يمكن أن تسبب حركة العضلات في حدوث تداخل كهربائي وستظهر في تسجيل مخطط كهربائية القلب. وقد يشوّش التوتر العصبي التسجيل أيضاً.

تسجيل تخطيط القلب

Recording an ECG

باستخدام أقطاب كهربائية خاصة، يُسجل النشاط الكهربائي من زوايا مختلفة تسمى المتجهات. تعطي المتجهات المختلفة الطبيب صورة أكثر اكتمالاً عن القلب. ويمكن للطبيب تحديد أجزاء القلب المريضة أو المقصرة وظيفياً عبر ملاحظة اضطراب كهربائي في أي من المتجهات.

يتكون مخطط كهربائية القلب الكامل من 12 متجه. توضع الأقطاب الكهربائية في موقع محددة من الجسم للتقطاف الجهد الكهربائي الحالي، وتؤدي التوصيات بين الأقطاب الكهربائية المختلفة إلى إنشاء متجهات مختلفة لها ثلاثة تصنيفات: المتجهات المعيارية، والمتجهات المعززة، ومتجهات الصدر (الشكل "34-4").

- تشمل المتجهات المعيارية أو الطرفية المتجهات 1 (I) و 2 (II) و 3 (III) (الشكل "34-4"). يسجل كل منها الجهد بين طرفيين من أطراف الإنسان.




الموضع الموصى بها لمتجهات القلب المتعددة (رسم توضيحي خطّي للموضع على الصدر)	الترميز الواسم	الأقطاب الموصولة	المتجهات المعيارية أو متجهات الأطراف ثنائية الأقطاب
	1 نقطة 2 نقطة 3 نقطة	RA & LA RA & LL LA & LL	المتجه I المتجه II المتجه III
	1 شرطة 2 شرطة 3 شرطة	(RA & LA-LL) (LA & RA-LL) (LL & RA-LA)	متجهات الأطراف المعززة أحادية القطب aVR aVL aVF
	V ₁ : المسافة الوربية الرابعة، عند الحافة اليمنى للقصص V ₂ : المسافة الوربية الرابعة، عند الحافة اليسرى للقصص V ₃ : منتصف المسافة بين الموضع 2 و 4 V ₄ : المسافة الوربية الخامسة، على الخط منتصف الترقوة الأيسر V ₅ : نفس المستوى الأفقي للموضع 4، على الخط الإبطي الأمامي الأيسر V ₆ : نفس المستوى الأفقي للموضع 4 على الخط الإبطي المتوسط الأيسر. (انظر البيانات على اليسار)	(C & LA-RA-LL)	المتجهات الصدرية أو البركية V

الشكل "33-4" ترتيب وترميز المتجهات في مخطط كهربائية القلب المعياري.

- تمثّل متجهات الجهد المعزز (انظر الشكل 4-34) زوايا مختلفة للمتجهات المعيارية. يرمز "augmented voltage right arm aVR" إلى "الجهد المعزز للذراع اليمنى"، و "augmented voltage left arm aVL" إلى "الجهد المعزز للذراع اليسرى"، و "augmented voltage left foot aVF" إلى "الجهد المعزز للقدم اليسرى".

- متجهات الصدر أو البركية الستة، تسجل زوايا النبضة الكهربائية من نقطة مركزية داخل القلب إلى مواضع محددة على مقدمة الصدر (انظر الشكل 4-34). وتوضع أقطاب الصدر في ستة مواضع محددة على الصدر للحصول على هذه الزوايا (انظر الشكل 4-33) :

- V₁: المسافة الوربية الرابعة (المسافة بين الأضلاع) على الجانب الأيمن من القص (عظم الصدر).
- V₂: المسافة الوربية الرابعة على الجانب الأيسر من القص.
- V₃: في منتصف المسافة بين الموضعين V₂ و V₄.
- V₄: المسافة الوربية الخامسة على الخط منتصف الترقوة (خط مرسوم من منتصف الترقوة).



الشكل "34-4" أنماط وتوصيات ووضع المتجهات. (أ) متجهات الأطراف المعيارية. (ب) متجهات (aV) معززة الجهد. (ج) المتجهات الصدرية أو البيركية.



الشكل "35-4" ملقط بأسنان عند نهاية سلك التوصيل لجهاز تخطيط القلب الكهربائي، مرتبط بقطب مخصص للاستخدام مرة واحدة.

- V_5 : نفس مستوى 4، ولكن عند الخط الإبطي الأمامي الأيسر.
 - V_6 : نفس مستوى 4، ولكن عند الخط الإبطي المتوسط الأيسر.
 توضع أقطاب كهربائية مخصصة للاستخدام لمرة واحدة على أجزاء مختلفة من الجسم لتسجيل هذه المتجهات الستة عشر (الشكل "38-4"). للمتجهات ملقط بأسنان لتوصيلها بالأقطاب الكهربائية (الشكل "38-4ب"). وترمز هذه المتجهات بحيث يوضع كل منها في الموضع المناسب:

- "RA, Right Arm" تعني "الذراع الأيمن": يوضع على المنطقة الخارجية للحمية من الجزء العلوي للذراع اليمنى.
- "LA, Left Arm" تعني "الذراع الأيسر". يوضع على المنطقة الخارجية للحمية من الجزء العلوي للذراع اليسرى.

• "RL, Right Leg" تعني "الساقي اليمنى". يوضع على الجزء اللحمي من أسفل الساق

اليمنى؛ وهذا لا يسجل متوجه ولكن وظيفته أرضي تفريغ للتشوиш الكهربائي.

• "LL, Left Leg" تعني "الساقي اليسرى"، يوضع على الجزء اللحمي من أسفل

الساقي اليسرى.

• "C, Chest" أو "V" تعني "الصدر": يوضع في ستة مواقع مختلفة على الصدر (انظر

الشكل "33-4").

يجب أن تتبع أسلاك التوصيل خطوط الجسم (الأشكال "36-4" و "36-3"). إذا

كان هناك سلك مفرط الطول، فلْفه في حلقة واربطه بشريط أو حبطة، وانتبه

بشكل خاص إلى الملصقات ورموز الألوان عند توصيل أطراف الكابلات بالأقطاب

الكهربائية الصحيحة، وتأكد من إحكام جميع الوصلات وأنّها في نفس الاتجاه.

تحتفي مختلف أجهزة تخطيط القلب فيما بينها بشكل طفيف، ولكن معظمها يحتوي على


نفس الأجزاء الأساسية. من المهم قراءة تعليمات الشركة المصنعة المرفقة مع

كل جهاز. هناك صنفان رئيسيان من أجهزة تخطيط القلب: أحاديد القناة ومتمعددة

القناة. وينتج جهاز التخطيط أحادي القناة شريطاً ضيقاً من الورق يُظهر متوجهها

واحداً في كل مرة. وتستخدم معظم المنشآت جهاز تخطيط متعدد القنوات ينتج ورقة

كاملة تُظهر جميع المتجهات الاثني عشر، مع تسمية كل متوجه باسمه (الشكل "37-4").



الشكل "36-4" يجب أن تتبع أسلاك التوصيل خطوط الجسم عندما تتصل بالأقطاب: (أ) متجهات الصدر واليد؛ (ب) متجهات القدمين.



الشكل "37-4" ينتج جهاز تخطيط القلب الكهربائي متعدد القنوات ورقة كاملة تُظهر جميع المتجهات الاثني عشر.



الشكل "38-4" مخطط كهربائية القلب مُركّب على حامل.

تركيب مخطط القلب الكهربائي على الحامل Mounting an ECG

بعد تسجيل جميع متجهات مخطط القلب الكهربائي ECG، يُركّب قسم من كل متجه مُسجّل على حامل مخصص. وتنتج الأجهزة متعددة القنوات مخططاً واحداً يملاً كاملاً، وتثبت هذه الحوامل أحياناً على دعامات أقوى باستخدام شريط لاصق، ويجب أن يكون الحامل النهائي أنيق الشكل بحيث يكون كل متجه في المكان الصحيح على الحامل. ويجب تسمية الحامل باسم المريض، وعنوانه، واسم الطبيب، والتاريخ، وأي معلومات أخرى ذات صلة (الشكل "38-4").



ستحفظ أجهزة تخطيط القلب المحسبة بـتخطيط القلب في ذاكرة الحاسب حتى يمكن عرضها على الشاشة. وستوفر معظم أجهزة تخطيط القلب المحسبة أيضاً نسخة مطبوعة من مخطط كهربية القلب. اتبع تعليمات الشركة المصنعة لحفظ مخطط كهربية القلب بشكل صحيح في السجل الصحي الإلكتروني للمريض.

اختبار معلوماتك


1. ما العقدة التي ينشأ منها النبض الكهربائي للقلب؟ أين تقع تلك العقدة؟
2. ما الصنفان الرئيسيان لأجهزة تخطيط القلب؟

7:4 التعامل مع الأدوية Working with Medications


الدواء هو عقار يستخدم للعلاج أو الوقاية من مرض أو حالة ما. ويقدم النص الآتي معلومات أساسية فقط حول تحضير واعطاء الأدوية. لكنها رغم ذلك تكسبك الوعي بأهمية اتخاذ أعلى درجات العناية عند التعامل مع جميع الأدوية. ومن المهم ذكره أنه لا يصف الأدوية إلا الأشخاص المصرح لهم. وتتوافر الأدوية بأشكال مختلفة، عادة ما تكون سائلة أو صلبة أو شبه صلبة.

• السوائل:

- معلق مائي Aqueous suspension: دواء مُذاب في الماء.
- معلق Suspension: الشكل الصلب للدواء مخلوط مع محلول. وهذا يجب رجه جيداً قبل استعماله لإعادة تعليق الدواء في المحلول.
- الشراب Syrup: محلول مركز من السكر والماء والدواء.
- الصبغة Tincture: دواء مُذاب في الكحول.
- يُجب سكب الأدوية السائلة على مستوى العين للتأكد من دقة الجرعة (شكل "39-4").




الشكل "39-4" يُجب سكب الأدوية السائلة على مستوى العين للتأكد من دقة الجرعة.



الشكل "40-4" الأشكال الدوائية الصلبة.





الشكل "41-4" أنواع الحقن، والزوايا الصحيحة لإعطاء الأدوية بالحقن.

- مغلف معوي Enteric coated: دواء ذو غلاف خاص لا يذوب حتى تصل المادة إلى الأمعاء الدقيقة.

• **المواد شبه الصلبة:**

- مرهم Ointment: دواء مع أساس دهنّي.

- معجون Paste: مرهم بمادة متماسكة القوام.

- كريم Cream: دواء ذو أساس قابل للذوبان في الماء.

- تحميلاة Suppository: جسم مخروطي الشكل يحتوي عادة على أساس من زبدة الكاكاو أو الجلسرين ممزوجاً بالدواء. يدخل في المستقيم حيث يذوب نتيجة حرارة الجسم، ومن ثم ينتشر الدواء. ويستخدم عن طريق المستقيم لتحفيز حركات التمتع، والمساعدة في طرد البراز، وتحفييف الألم، وتقليل درجة حرارة الجسم (تحاميل الأسبرين)، وإيقاف التقيؤ (مضادات القيء).

يمكن إعطاء الأدوية بعدة طرائق. ونذكر منها:

• **فموياً Oral:** عن طريق الفم، للأشكال السائلة والصلبة.

• **شرجياً Rectal:** عبر المستقيم، للسوائل والتحاميل.

• **الحقن Injection:** يعطى بإبرة ومحقنة، ويطلق عليه سبيل غير معوي، ويعني ذلك أي مسار غير القناة الهضمية (الجهاز الهضمي) (الشكل "41-4"). طرائق الحقن هي:

- تحت الجلد (SQ Subcutaneous): الحقن في طبقة النسيج تحت الجلد مباشرة.

- عضلي (IM Intramuscular): الحقن في العضل.

- وريدي (IV Intravenous): الحقن في الوريد.



- داخل الأدمة (Intradermal): الحقن تحت الطبقة العلوية من الجلد. ومن الأمثلة على ذلك اختبارات التحسس والسلال الجلدية.


- **موضعي (أو محلي) (Topical or local):** يطبق مباشرة على سطح الجلد.

- المرام، والبخاخات، والسوائل، والرمع اللاصقة.


- يمكن استخدام الرمع اللاصقة عبر الأدمة، التي تطبق على الجلد لتوفير جرعة مستمرة من الأدوية، لعلاج دوار الحركة، وأمراض القلب، وعدم التوازن الهرموني، والانسحاب النيكوتيني (للأفراد الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين) (الأشكال "42-4أ" و "42-4ب").

- **الاستنشاق (Inhalation):** الاستنشاق أو التنفس عن طريق البخاخات أو أجهزة الاستنشاق أو الآلات الخاصة.

- **تحت اللسان (Sublingual):** يعطى تحت اللسان.



الشكل "42-4أ" تسمح طبقات الرقعة عبر الأدمة بامتصاص الدواء في مجرى الدم خلال فترة زمنية، كثيرةً ما تكون 24 ساعة.



الشكل "42-4ب" الرقعة عبر الأدمة.

مصادر المعلومات Sources of Information

قبل إعطاء أي دواء، من الضروري التحقق من معلوماته. للأدوية اسماء: اسم عام (غير محدود المُلكيّة) واسم خاص (تجاري أو علامة تجارية). إذ يمكن أن يكون للدواء العام عدة أسماء تجارية متنوعة، والتي يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر. على سبيل المثال، للأسبرين - وهو مسكن عام (حمض أسيتيل الساليسيليك) - أسماء تجارية مختلفة، مثل Anadin وFevadol Dispring Ecotring، والذي يصنّع من قبل شركات مختلفة في العديد من البلدان. ويمكن الحصول على معلومات دقيقة عن الأدوية من المصادر التالية:

- كتيب وصفات الأدوية التابع لـ"وزارة الصحة السعودية (MOH)"، والذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
 - دليل السياسات والإرشادات والمستلزمات الطبية.
 - قائمة بجميع الأدوية المعتمدة للاستخدام في مستشفيات وزارة الصحة.
 - ملحق بالاختصارات المعتمدة ونماذج وزارة الصحة والفالهارس.
- ويتوفر كتيب وصفات الأدوية التابع لوزارة الصحة على هيئة تطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية، يقدّم معلومات محدثة باستمرار حول أكثر من 1500 دواء عام وأكثر من 2000 دواء ذي علامة تجارية.
- توفر "الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء" (www.sfda.gov.sa) قوائم بالأدوية المتوفرة في المملكة العربية السعودية وعالمياً، والأدوية قيد الدراسة، والصيدليات، وتبنيات السلامة، وغيرها الكثير.
- بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني، توفر النشرات المرفقة في عبوات الأدوية معلومات قيمة أيضاً.

المعلومات المطلوبة قبل إعطاء الدواء Information Needed Before Administering a Drug

المعلومات الدوائية التي يلزم الحصول عليها من مصدر موثوق قبل إعطاء الدواء هي

- عمل الدواء: يخبرنا كيف يعمل الدواء وماذا يجب أن يفعل.
- استخدامات الدواء: تقدم جميع الأسباب المعتمدة لاستخدام الدواء في علاج حالات معينة، كما يوفر في كثير من الأحيان معلومات عن الحالات التي يعالجها الدواء وتمثل استخدامات غير معتمدة.
- مدى توفر الدواء وكيفية الحصول عليه: يسرد جميع أشكال الدواء، أو طرائق الإعطاء، مثل الكبسولات، أو الحبوب، أو الحقن، أو السوائل.



- **الجرعة:** تشير إلى الجرعة الصحيحة (الكمية المحددة من الدواء المتناولة في مرة واحدة) لكل شكل من أشكال الدواء وللحالة المحددة التي يستخدم من أجلها، وكيفية تناوله على النحو الموصوف (كمية محددة، وعدد، وتكرار الجرعات طوال فترة محددة)، كما تصنف الجرعات حسب عمر الشخص الذي يتناول الدواء.
- **إعطاء الدواء:** يوفر معلومات عن التخزين الصحيح، والتحذيرات الخاصة مثل عدم مضغ الكبسولات أو سحقها، وتناول الدواء مع الطعام، وشرب كميات كبيرة من السوائل مع الدواء، وعوامل مماثلة.
- **الآثار الضارة (أو الآثار الجانبية):** تشير إلى جميع الآثار - بخلاف تلك المقصودة - التي يمكن حدوثها، من أبسطها إلى أخطرها.
- **مضادات الاستطباب:** تسرد الأمراض أو الأسباب التي تمنع تناول الدواء.
- **تحذيرات الاستخدام:** تشدد على الحالات والأوقات التي يكون من الخطير فيها إعطاء هذا الدواء.
- **التفاعلات:** يقدم قائمة بالأدوية الأخرى التي يمكن تفاعلاها مع هذا الدواء، وكيف يتداخل استخدامه مع عمل الأدوية الأخرى أو يقلل من فعاليتها. هناك ست نقاط رئيسة يجب الانتباه إليها في كل مرة يعطى فيها الدواء، ويمكن تسميتها بـ "الصحيحات الستة":

 - الدواء الصحيح.
 - الجرعة أو الكمية الصحيحة.
 - المريض الصحيح.
 - الوقت الصحيح.
 - الطريقة الصحيحة أو طريقة الإعطاء.
 - التوثيق الصحيح.

الأمان Safety

يلزمك مراعاة قواعد السلامة التالية عند إعطاء الدواء:

- اقرأ الطلب بعناية. انتبه إلى جميع "الصحيحات الستة".
- تحقق من الحساسية الدوائية لدى المريض قبل إعطائه أي دواء.





الشكل "43-4" تحقق من الملصق أي دواء ثلث مرات على الأقل.

- تتحقق من الملصق ثلاثة مرات على الأقل للتأكد من أنه الدواء الصحيح (الشكل "43-4"). إذ يجب قراءة الملصق عند أخذ الزجاجة من على الرف، وأنشاء صب الدواء، وعند إعادةتها على الرف.
- أعدّ أو أعطِ الدواء بأمرِ الطبيب فقط.
- لا تعطِ أبداً دواء لم تحضره بنفسك.
- اعرف تأثير الدواء، والجرعة المعتادة، وطريقة الإعطاء، والآثار الضارة.
- خزن الأدوية في مكان آمن وبارد وجاف، وتأكد من أنها بعيدة عن متناول الأطفال.
- تتحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية على جميع الأدوية وتخليص من تلك التي انتهت صلاحيتها. لذا سجل جميع المعلومات المطلوبة بشأن إتلاف الدواء وفقاً لسياسة المؤسسة.
- لا تستخدم أبداً دواء من زجاجة لا تحمل ملصقاً، وتأكد أن الملصق واضح، وإذا كانت لديك شكوك بشأن هوية دواء فتخلص منه.
- لا تُعد أي دواء إلى الزجاجة، فهذا يؤدي إلى أخطاء جسيمة. وتخليص من أي دواء لم يستخدم.




- أبلغ عن جميع الأخطاء على الفور.
 - ركز أثناء التعامل مع الأدوية، وتجنب المشتتات.
- استخدم آلة حاسبة أو ورقة وقلم رصاص لحساب الجرعات، وتجنب الحسابات "العقلية" لأنها تسبب أخطاء.

يسعى فقط لمقدمي الرعاية الصحية المصرح لهم قانوناً بإعطاء الأدوية، حيث يعتبر إعطاء الأدوية مسؤولية كبيرة، ويجب عدم ادخار أي جهد للتأكد من إعطاء الدواء والجرعة الصحيحة للمريض. استخدم دائمًا النشرات المطبوعة التي تأتي مع كل دواء لتعرف المعلومات الأساسية عنه. واستفهم عن الجرعات أو الاستخدامات التي لا تبدو صحيحة. فعلى عاتقك تقع مسؤولية تحديد المسموح لك فعله قانوناً بخصوص إعطاء الدواء.

اختبار معلوماتك

1. اذكر الطرائق الأربع للحقن.
2. ما "الصحيحات الستة"؟





الشكل "44-4" استُخدمت الكلاب للتعرف على سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم وسرطان البروستات بمعدلات دقة تقترب من 100%.

وقد أنتج مؤخراً العديد من الأنوف الإلكترونية التي تستخدم حالياً في الدراسات التجريبية، حيث حققت الدراسات الأولية بعض النجاح. كان أحد الأنوف الإلكترونية قادرًا على التمييز بنسبة 80% بين مرضى سرطان الرئة وفئة المدخنين من غير المصابين بالسرطان والأكثر عرضة للإصابة به. واستطاع نموذج آخر التعرف على سرطان البروستات من خلال رائحة البول في 78% من الحالات. كما تعرّف أنف إلكتروني ثالث، عبر فحصه لغاز البراز، على 85-73% من مرضى سرطان القولون والمستقيم. بمجرد تحديد المركبات المرتبطة بالسرطان، قد يكون بالإمكان تطوير الأنف الإلكتروني عبر زرع مستشعر به يسمح باكتشاف أنواع السرطانات عبر التعرف على مركبات عينها. وعليه، من غير المستبعد أن يؤدي اختبار بسيط غير باضع باستخدام رائحة من النفس، والبول، والبراز، وحتى الدم إلى الكشف المبكر عن السرطان. وبإمكان هذا البحث إنقاذ العديد من الأرواح.

الأنف يميز السرطان؟

رغم التطور في علاج السرطان وإنقاذ العديد من الأرواح، إلا أنه من العسير جدًا كشف بعض أنواع السرطانات في مرحلة مبكرة عندما يكون العلاج ممكناً. ومن هذه السرطانات سرطان المعدة والمعظم والكلوي والبنكرياس والمبيض.

يبحث العلماء في جميع أنحاء العالم إمكانية استحداث "اختبار شم" للسرطان باستخدام الكلاب. في البداية، درب باحثون في كاليفورنيا خمسة كلاب مختلفة على شم رائحة سرطان الثدي والرئة في أنفاس المريض. ومنذ ذلك الوقت، استخدمت الكلاب للتعرف على سرطان الثدي، وسرطان الرئة، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان البروستات بدقة تقترب من 100% (الشكل "44-4").

ويعتقد الباحثون أن الكلاب قادرة على شم السرطانات عن طريق استشعار كميات قليلة من المركبات العضوية المتطايرة، والتي تمثل منتجات نهائية لعملية الاستقلاب، وتقرز في النفس والبول والبراز. ويعزل بعض الباحثين مادة البولي أمينات، وهي جزيئات مرتبطة بنمو الخلايا وتمايزها، حيث إن السرطان يرفع مستويات البولي أمين التي لها رائحة بيضاء. وتشير التقديرات أن حاسة الشم لدى الكلب قد تكون أقوى بـ 10000 إلى 100000 مرة من حاسة الشم لدى الإنسان، لذا يمكن للكلاب اكتشاف أقل الكميات من المركبات العضوية المتطايرة.

يعمل العديد من الباحثين حالياً على تحديد وعزل المركبات الكيميائية المرتبطة بأنواع مختلفة من السرطانات، ويمثل ذلك تحدياً كبيراً بسبب تشارك عدّة مواد كيميائية مختلفة في تكون رائحة السرطان في معظم الأحيان، بل من المحتمل أن يكون لكل نوع من أنواع السرطان خليطاً فريداً من المركبات الكيميائية. وعلى محور آخر، يحاول الباحثون تطوير أنوف صناعية قادرة على كشف مركبات كيميائية معينة.

خلاصة دراسة الحالة

ما المهارات التي يجب على عبد الله ونورة إجادتها ليكونا جزءاً من فريق الرعاية الصحية في العيادة؟ إذا كان عبد الله جاهلاً بإحدى المهارات أو الإجراءات، فماذا عليه فعله؟ كيف يمكن لنورة مساعدته؟

ملخص الفصل 4

- من المهم معرفة الأدوات الأساسية المستخدمة والإجراءات المنفذة أثناء الفحوصات الجسدية، والجراحة الصغرى، وإزالة الغرز لأنها تسمح للمساعد الطبي بالعمل مع الطبيب لتقديم رعاية صحية على قدر عالٍ من الجودة.
- يمنحك فهم المبادئ الأساسية لخطيط القلب الكهربائي المساعد الطبي القدرة على إجراء التخطيط بكفاءة.
- تعتبر معرفة كيفية العثور على معلومات حول الأدوية والتقنيات الصحيحة لصرفها من المسؤوليات الهامة التي تقع على عاتق المساعد الطبي.
- تعتبر المعرفة الأساسية بالمهارات الرئيسة التي يستخدمها المساعدون الطبيون مفيدة لكثير من مقدمي الرعاية الصحية، لأن العديد من هذه المهارات مستخدمة في مجالات الرعاية الصحية الأخرى.
- قياسات الطول والوزن مهمة في تقييم الحالة الصحية الأساسية للمرضى؛ لذا من الأهمية بمكان أن يعرف كل مقدم رعاية صحية كيفية قياس الطول والوزن بالشكل الصحيح.
- باتباع الأوضاع الصحيحة، يمكن للمساعد الطبي تحضير المرضى بشكل صحيح للفحص، وتوفير الراحة والخصوصية للمرضى.

حالة دراسية بسيطة 1:4 خطأ غير مقصود

لدى فاطمة - مساعدة طبية في المستشفى - مهمة اليوم، وهيأخذ المؤشرات الحيوية للمرضى. وعندما وصلت إلى سارة، اكتشفت أن درجة حرارتها تبلغ 37.6 درجة مئوية. تحققت من التوصيات، فوجدت أن الطبيب وجه بإعطاء الباراسيتامول كل أربع ساعات حسب الحاجة في حال كانت درجة حرارة أعلى من 38 درجة مئوية. انتبهت فاطمة أن الساعة الآن الرابعة مساءً، وأن آخر جرعة أعطيت كانت عند تمام الساعة الواحدة ظهراً. كانت أقراص الباراسيتامول التي في حوزتها من عيار 525 ملغ / قرص. أعطت فاطمة المريضة حبتين ودونت الوقت على مخططها كالتالي: 15:00. عندما فحصت مشرفة فاطمة مخطط سارة، أدركت أن فاطمة ارتكبت خطأً واتصلت بها لمناقشة الأمر. لم تكن فاطمة مدركة ارتكابها لخطأً، لذا شعرت بخيبة أمل في قراره نفسها عندما أشارت مشرفتها إلى الخطأ. فاطمة قلقة للغاية من أن تكون قد ألحقت ضرراً بصحة سارة.

التحليل

1. يبدو أن فاطمة ارتكبت في عدد من إجراءات. بافتراض إعطاء آخر جرعة في الساعة الواحدة ظهراً، فمتى سيكون موعد الجرعة التالية من الباراسيتامول حسب تعليمات الطبيب؟ إذا كانت الساعة الآن الرابعة مساءً، فكم مضى من الوقت على إعطاء الدواء؟ هل انتبهت فاطمة للوقت بشكل صحيح؟ إذا لم تفعل، فكيف يعبر عن الساعة 4 مساءً في نظام 24 ساعة؟

2. هل كانت درجة حرارة سارة عالية بما يكفي لإعطاء المزيد من الباراسيتامول؟ في رأيك، ماذا كان يجب على فاطمة فعله عندما انتهت من قراءة توجيهات الطبيب؟

3. ماذا يجب أن تقول المشرفة لفاطمة؟ كيف يجب أن ترد فاطمة؟

حالة دراسية بسيطة 2: الفحص السريري

خالد مساعد طبي يعمل مع طبيب في قسم الطب العام يدعى محمد. محمد مريض جديد. يحتاج محمد لإجراء فحص سريري كامل لحمد لفحص آلام البطن التي يعاني منها، وطلب من خالد تحضير حمد للفحص ومساعدته به.

التحليل

1. ماذا يجب أن يشرح خالد لحمد عن كيفية إجراء الفحص؟

2. كيف يمكن لخالد أن يحضر نفسه والمريض لإجراء الفحص؟

3. بعد الفحص، سأل حمد خالد عن رأيه بمشكلته الصحية. كيف يجب أن يرد خالد؟ لماذا؟



حالة دراسية بسيطة 3:4 إجراء جراحي

تبلغ ليانا من العمر 23 عاماً. أتت إلى عيادة الجراحة الصغرى في المستشفى لإزالة ورم حميد من ذراعها تحت تأثير التخدير الموضعي. طلب من أسماء، المساعدة الطبية، تحضيرها للجراحة. لم تدخل ليانا المستشفى من قبل، وأخبرت أسماء أنها فلقة بشأن ما سيحدث، وتريد معرفة إن كان الإجراء الجراحي سيؤلمها وما إذا كانت المعدات مُخيفة.

التحليل

1. ماذا يمكن أن تخبر أسماء ليانا عن الإجراء؟ وما الأسئلة التي يجب أن تعود بها إلى الجراح؟

2. كيف يمكن لأسماء طمأنة ليانا لتبديد مخاوفها من العملية؟

3. بعد العملية، كيف يجب أن تساعد أسماء ليانا؟



أسئلة المراجعة

١. ما أهمية أخذ قياسات الطول والوزن؟

2. اذكر ما لا يقل عن سبعة وضعيّات مختلفة يمكن استخدامها في الفحوصات أو العلاجات أو كليهما، ثم اذكر سبباً واحداً لاستخدام كلّ وضعية.

3. عَرِفَ الْحَسْرَ وَمَدَ الْبَصَرَ، وَصِفَّ الْفَرَقَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ.



4. ما مكان الملاحظة في الفحص الطبي العام؟

5. عرف الإصغاء.

6. اشرح أربعة إجراءات احترازية قياسية يجب مراعاتها أثناء المساعدة في الجراحة الصغرى أو إزالة الغرز.

7. ما الفرق بين المُرْقئ وحامِل الإبرة؟ ما وظيفة كلّ أداة منها؟



8. سُمّ التصنيفات الثلاثة للمتجهات المستخدمة في مخطط كهربية القلب، وماذا يسجل كل واحد منها؟

9. ما المعلومات التي يجب جمعها قبل إعطاء أي دواء؟

10. صِف الطرائق الآتية لإعطاء الأدوية: موضعي، تحت اللسان، وريديّ، فمويّ، استنشافي.



التفكير الناقد

1. استخدم مصادر موثوقة على الإنترنت للعثور على دواء سيليكوكسيب Celecoxib، واتكتب قائمة تشمل التأثير الأساسي لهذا الدواء، والجرعة المقترحة، وطريقة الإعطاء، والتحذيرات / الآثار الجانبية، ثم أنشئ نشرة معلومات للمريض عن هذا الدواء.

2. لماذا يجب الأخذ باحتياطات السلامة عند إعطاء أي دواء؟ ما المخاطر المحتملة عند إعطاء الأدوية؟



التمرينات

1. أ. في مجموعة مكونة من أربعة أفراد، اكتب نصاً للسيناريو التالي: أحضرت منها طفلتها لمى إلى عيادة الطبيب لإجراء فحص طبي في أسبوعها السادس. كما أحضرت طفليها الآخرين، يوسف ومحمد، لأنهما يشكون من صداع وحمى. تنادي سارة، وهي المساعدة الطبية في العيادة، على العائلة وتسجل حضورهم. تحصل على جميع القياسات وشكواهم الرئيسة وتدونها. ينظر الطبيب في أذني الصبيان ولمى، ويأمر بتحديث سجل التطعيمات للجميع وصرف مضادات حيوية لي يوسف ومحمد.
ب. في نفس المجموعة، العب الأدوار المذكورة في النص. عدّل السيناريو يجعل الأولاد مشاكدين وغير متعاونين ولا يقفون بثبات لتلقي الحقنة.
2. بالعمل مع طالب آخر، استخدم دمية CPR (الإنعاش القلبي الرئوي) لإظهار الموضع الصحيحة للمتجهات الائتي عشر لخطيط القلب الكهربائي، أو ارسم المعلومات على قطعة من الورق.

الفصل

5

رابط المدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

مهارات الأعمال والمحاسبة

دراسة حالة

على مدى السنوات الأربع الماضية، كان خالد كاتب سجلات في عيادة طبية يعمل بها عشرة أطباء. يجيد خالد وظيفته، لكنه أصيب بفيروس كورونا وتغيب بسبب المرض عن عمله لمدة أسبوعين. عندما عاد، كانت الملفات مكدسة في كل مكان؛ فهد يعلم في العيادة منظماً للمواعيد، ولكنه كلف بالعمل مع خالد ليساعده في حفظ الملفات المتراكمة ويطلعه على كيفية جدولة المواعيد. في نهاية هذا الفصل، سيطلب منك سرد المهارات التي سيحتاجها فهد ليُؤرشف بدقة، والقدرات التي سيحتاجها خالد لجدولة مواعيد المرضى.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل، ستكون قادرًا على:


- تأليف وطباعة خطابات الاستشارة، والتحصيل، والتعيين، والاستدعاء، والاستفسار.
- تعبئة نماذج التأمين الأساسية بشكل دقيق ومرتب وشامل.
- الالتزام بنظام حفظ السجلات.
- تنظيم وحفظ السجلات باستخدام كل من النظم الأبجدية والرقمية.
- استخدام هاتف العمل بشكل احترافي وفق التعليمات المقررة.
- جدولة المواعيد باستخدام دفتر المواعيد النموذجي أو برنامج على الحاسب.
- تعبئة سجلات التاريخ والتسجيل.

المصطلحات الرئيسية

نظام الاستدعاء Paging System	السجل الصحي الإلكتروني Electronic Health Record (EHR)	خدمة الرد Answering Service
بوابة المريض Patient Portal	حفظ الملفات Filing	وحدة التوجيه الآلي Automated Routing Unit
الفرز Triage	التصنيف الدولي للأمراض International Classification of Diseases	حفظ السجلات المالية Bookkeeping
البريد الصوتي Voicemail	التاريخ الطبي Medical History	هامش زمني Buffer Period

1:5 حفظ الملفات

Filing Records



الشكل "1-5" يستخدم نظام المجلدات المُرمّزة
بالألوان مجلدات مختلفة الألوان.

حفظ الملفات Filing يعني الترتيب المنهجي أو المنظم للأوراق أو البطاقات أو المواد الأخرى بحيث يكون الرجوع إليها سهلاً في المستقبل. تعتبر طرائق حفظ الملفات الصحيحة لسجلات الرعاية الصحية وغيرها من المعلومات الضرورية لسبعين رئيسين؛ أولاً، يجب أن يكون تحديد مكان المادة المطلوبة بسرعة عند الحاجة ممكناً. ثانياً، يجب أن تخزنّ المواد بأمان وتحفظ بعناية بصفتها سجلات قانونية. هناك العديد من أنظمة حفظ الملفات المستخدمة في الوقت الراهن.

أنظمة الحفظ Filing Systems

حفظ الملفات بشكل رقمي باستخدام رقم تعريف فريد هو النظام الأكثر شيوعاً، فيخصص رقم لكل مادة من المواد المراد حفظها كالأسماء مثلاً، ثم ترتّب الأرقام وتحفظ وفقاً لترتيب رقمي. يوضع اسم المريض على بطاقة الفهرسة أو يدخل ضمن قاعدة البيانات على الحاسب مع الرقم المخصص له، فيصبح لكل مريض رقم ملف فريد، وبهذا يمكن تفادى الأخطاء التي يمكن أن تحصل بسبب تشابه أسماء المرضى. كما يحافظ استخدام الأرقام على خصوصية المريض وسرية هويته في حال وقع الملف بيده شخص غير مصرح له بالوصول إليه.

أنظمة حفظ الملفات المُرمّزة بالألوان Color-Coded Filing Systems

توفر الألوان وسيلة ثانية للتحقق من وضع الملفات في المجلد المناسب نظراً لأن الملف ذا الترميز اللوني المختلف سيبدو بارزاً. إن إلقاء نظرة سريعة على المجلدات يسمح للمؤرشف بتحديد الملف الموجود في غير مكانه فوراً. تستخدم أنظمة المجلدات المُرمّزة بالألوان بشكل شائع في منشآت الرعاية الصحية، ويستخدم هذا النظام مجلدات ملفات مختلفة الألوان (الشكل "1-5")، ومن أمثلة أنظمة حفظ الملفات باستخدام الترميز اللوني ما يلي:



- **مُرّمز من قبل الطبيب:** قد يكون لدى منشآت الرعاية الصحية عدة أطباء، ولمرضى كل طبيب مجلد ملفات بلون مختلف عن ألوان مجلدات مرضى باقى الأطباء. فلمرضى أحد الأطباء مجلدات صفراء، ولمرضى الطبيب الآخر مجلدات خضراء، ولمرضى الطبيب الثالث مجلدات حمراء، وهكذا.
- **مُرّمز حسب نوع التأمين:** حيث يكون لمجلد ملفات كل نوع من أنواع التأمين الطبي لوناً فريداً خاصاً به.

تخزين الملفات

Storage of Files

يعد نظام تخزين الملفات الفعال جزءاً مهماً من أي مؤسسة رعاية صحية، وتستخدم معظم المؤسسات قواعد البيانات الإلكترونية لتخزين المعلومات عدا بعض المنشآت التي لا تزال تستخدم نظام حفظ الملفات اليدوي. إلا أن حفظ السجلات بشكل إلكتروني هو الأكثر كفاءة.

في النظام اليدوي، تخزن السجلات في مجلدات ومن ثم تحفظ المجلدات في خزائن أو رفوف الأرشيف. ويجب أن تكون مجلدات حفظ الملفات متينة وذات جودة جيدة، وأن تكون خزائن أو رفوف الأرشيف في مكان مناسب، ومقاومة للحرائق، ومجهر بأقفال. ويجب توفير مساحة كافية للملفات حتى لا تُحشر السجلات في خزائن الأرشيف ورفوفه.

نظرًا لإمكانية تراكم آلاف السجلات في منشأة رعاية صحية مزدحمة، فإن معظم المنشآت لديها نهج لتصنيفها على أنها نشطة، أو غير نشطة، أو مغلقة. السجل النشط هو سجل قيد الاستخدام حالياً لأن المستشفى تعيين المريض في الوقت الراهن، أما السجل غير النشط فهو سجل لمريض لم يُعِين لسنوات عديدة، وأما السجل المغلق فهو سجل لمريض توفي، أو نُقل إلى طبيب أو منشأة أخرى، أو ملف لسجل لم يعد مطلوبًا.

يمكن أن يختلف الغرض من الاحتفاظ بالسجلات، حيث تحتفظ معظم منشآت الرعاية الصحية بجميع السجلات في حالة الحاجة إليها لأغراض قانونية أو بحثية، وكثيراً ما تُترز السجلات غير النشطة أو المغلقة وتحفظ على قرص صلب خارجي أو بالتخزين السحابي الآمن أو الحاسب الخادم Server. لاحقاً، يمكن استرداد السجل وعرضه على الحاسوب أو طباعته ورقياً إذا لزم الأمر. من الجدير بالذكر هنا وجوب إتلاف السجل الأصلي عن طريق التقطيع أو الحرق لحماية سرية المريض.



السجلات الصحية الإلكترونية

Electronic Health Records



تستخدم منشآت الرعاية الصحية أجهزة الحاسب والملفات "غير الورقية" في نظام حفظ إلكتروني، وتدعى الملفات **بالسجلات الصحية الإلكترونية** التقنيات. تنشأ قاعدة بيانات باسم المريض، وعنوانه، رقم حالي، وتحفظ قاعدة البيانات هذه تلقائياً جميع أسماء وأرقامتعريف المرضى بالترتيب الصحيح، وعندما يصل المريض إلى المنشأة، يدخل رقم تعريفه في الحاسب لظهور معلومات قاعدة البيانات مع رقم التعريف. ورغم أن بعضبرمجيات الحاسوب تسترد ملف المريض بالاسم، فإن معظمها يتطلب رقم التعريف.

بمجرد استرداد الملف، يمكن الحصول على نسخة مطبوعة بمعلومات المريض، أو يمكن لمقدم الرعاية الصحية استخدام جهاز حاسب محمول أو جهاز لوحي لعرض المعلومات وتسجيلها أثناء تقديم الرعاية للمريض. فعندما يعيين مقدم الرعاية الصحية المريض، يدخل المعلومات الحالية في ملف المريض المح osp، كما يمكن تخزين هذه المعلومات على قرص صلب خارجي أو استخدام تخزين سحابي آمن أو إحدى خدمات شركات استضافة البيانات المتخصصة؛ ليتمكن استرجاعها عند الحاجة. ويجب عمل نسخ احتياطية بشكل متكرر عند استخدام النظام الإلكتروني؛ لأنـه في حالة تعطل الحاسـب أو محرك الأقراص الثابتـة ستـفقد جميع المعلومات. وتعمل معظم العيادات التي تستخدم نظاماً إلكترونياً نسخـاً احتياطـية تلقـائية مـجدولة بشكل متـواصل أو كلـ ساعة أو كلـ يوم لتجنب فقدان المعلومات.

يعد الحفاظ على سرية سجلات المرضى أمراً ضرورياً عند استخدام الأنظمة الإلكترونية أيضاً. ويعد استخدام كلمات المرور، والجدران النارية، ومنع صلاحيـات الوصول لأـشخاص مـحدـدين، واستخدام التخـزين السـحـابـي الآـمـنـ أو إـحدـى خـدمـات شـركـات استـضـافـة الـبيانـاتـ المتـخـصـصـةـ منـ أسـالـيبـ المحـافظـةـ عـلـىـ سـرـيـةـ مـلـفـاتـ المـرـضـيـ.

طورت "المملكة العربية السعودية" الملف الصحي الموحد، وهو عبارة عن منصة صحية رقمية توفر معلومات محدثة للمرضى، توضح التاريخ الطبي ونوع الأمراض والأدوية المصنورة، والتأمين الطبي، ونتائج الفحوصات المخبرية، واللـقاـحـاتـ، والإـحالـاتـ. كما يـسـاـهمـ النـظـامـ فـيـ تـوـحـيدـ السـجـلـاتـ الطـبـيـةـ لـتـحـسـينـ جـوـدـةـ الرـعاـيـةـ الصـحـيـةـ وـسـلـامـةـ المـرـضـيـ. والنـظـامـ مـتـاحـ لـجـمـيعـ الـمـوـاطـنـيـنـ وـالـمـقـيـمـيـنـ وـلـكـلـ شـخـصـ لـهـ "ـمـلـفـ تـعـرـيفـ محـليـ"ـ، وـفـيـهـ تـسـجـلـ الـمـعـلـومـاتـ الطـبـيـةـ مـثـلـ الـحـسـاسـيـاتـ، وـفـصـيـلـةـ الدـمـ، وـالـأـمـرـاضـ الـمـزـمـنةـ، وـالـطـولـ، وـالـوزـنـ، وـمـؤـشـرـ كـتـلـةـ الـجـسـمـ، وـأـيـ موـاعـيدـ أوـ إـحـالـاتـ، أوـ نـتـائـجـ الـمـخـبـرـ أوـ الـأشـعـةـ، وـالـوـصـفـاتـ الطـبـيـةـ، وـالـإـجـازـةـ الـمـرـضـيـةـ، وـالـلـقاـحـاتـ. كما يمكن الوصول إلى بعض المعلومات الطبية الأساسية عبر تطبيق "صحتي" للهواتف الذكية.



اخبر معلوماتك

1. عرف الملف النشط.
2. عرف الملف الصحي الموحد.

استخدام الهاتف 2:5

Using the Telephone

أساليب استخدام الهاتف الأساسية Basic Telephone Techniques

نظراً لأن حديثك عبر الهاتف يؤثر في الطرف الآخر سواء كان مريضاً أو غيره، فمن المهم أن تكون على دراية بالأساليب والمهارات الصحيحة لاستخدام المجتمع الهاتف كأداة اتصال هامة للتواصل والعلاقات العامة في أي مؤسسة صحية. سيؤثر الانطباع الذي تتركه بعد المحادثة على الهاتف على المريض أو المتصل الآخر؛ لذا من الضروري أن تكون لبقة، ودبليوماسيّاً، وحازماً لكن مرناً، وودوداً لكن مهنياً، ومهذباً، ويجب أن تكون قادراً على اتخاذ القرارات وأن تكون على استعداد لتحمل المسؤولية. كما أن استخدام نبرة الصوت الصحيحة أمر ضروري أيضاً فيكون صوتك لطيفاً، ومنخفض النبرة، وواضحاً، ومفهوماً، وعليك تجنب النغمة الرتيبة أو غير المبالغية، وينبغي نطق الكلمات بشكل سليم إلى جانب استخدام القواعد اللغوية الصحيحة في جميع الأوقات. تحلل باللباقة والأخلاق الحميدة طوال المحادثة، وتذكر أن تستخدم الكلمات "من فضلك" و "شكراً".

عليك دائماً الرد على الهاتف فوراً، والإجابة مبتسماً (الشكل "2-5")؛ حيث يساعد ذلك في تلطيف صوتك. فعلى الرغم من عدم رؤية المتصلين لابتسامتك إلا أنهم قادرون على الإحساس بها في صوتك.

عريف بالعيادة أو المستشفى - وبنفسك غالباً - عند الرد على الهاتف. على سبيل المثال، لا تقل "مرحباً"، أو "نعم"، أو حتى "صباح الخير" فقط عند الرد. استخدم تحيات مثل "صباح الخير، عيادة الدكتور العلي"، "مرحباً، مستشفى الرعاية الصحية، مها تتحدث" أو "عيادة الأمراض التنفسية، مها تتحدث. كيف يمكن أن أساعدك؟" بهذه الطريقة، يعرف المتصلون أنهم وصلوا إلى الجهة الصحيحة.

في العديد من المؤسسات، يكون فرز المكالمات من مسؤولية موظف الاستقبال. يعني ذلك أن عليك تحديد المكالمات التي يجب إحالتها إلى الطبيب أو إلى شخص آخر مناسب، وتلك التي يمكنك التعامل معها بنفسك، أو التي يجب توجيهها إلى عامل آخر في الجهة. عادة ما يكون لكل منشأة صحية بعض السياسات المتعلقة



الشكل "2-5" أجب مبتسماً على الهاتف.

بالمكالمات، على سبيل المثال، في بعض العيادات، تُوجّه المكالمات الواردة من أسرة الطبيب الصغيرة (أي الزوجة أو الزوج والأطفال)، والمكالمات من الأخصائيين الآخرين إلى الطبيب مباشرة، في حين تُصنّى المكالمات الأخرى لتحديد ما إذا كانت حالات طوارئ أو أن هناك حاجة ليتحدث المتصل مع الطبيب أم لا. وستساعدك الخبرة في فرز المكالمات على اتخاذ القرارات المناسبة. لفرز المكالمات، يجب عليك أولاً الحصول على معلومات محددة، وتشمل:

- **اسم المتصل:** لمعرفة اسم المتصل، تجنب عبارات مثل "من معن؟" أو "من أنت؟" من الأفضل أن تقول، "ليتك تعرفنا باسمك من فضلك؟" أو "هل لي أن أسأل من المتصل، من فضلك؟"
- **رقم المريض أو رقم التعريف:** ستحتاج أيضاً أن تطلب من المتصل رقم التعريف أو رقم المريض، حيث سيضمن ذلك استرداد السجلات الصحيحة.
- **تاريخ الميلاد:** تطلب معظم العيادات تاريخ ميلاد المريض للتحقق من هوية الشخص المتصل.
- **طبيعة المكالمة أو الغرض منها:** عندما يتصل المرضى بإحدى مؤسسات الرعاية الصحية، غالباً ما يطلبون التحدث مع شخص معين. عبر السؤال، "هل يمكنني مساعدتك؟" أو "هل لي أن أخبر د. إبراهيم لماذا تحصل؟" يمكنك تحديد غرض المكالمة، وقد تضطر أحياناً لقول، "د. أسماء مع مريض في الوقت الراهن، هل ترغب أن أخبرها بشيء؟" أو "المعالج غير موجود في الوقت الحالي، هل يمكن أن تشرح لي مشكلتك لأرى إن كان بإمكان شخص آخر مساعدتك؟" تتبه لمكالمات الطوارئ، ففي بعض الحالات، يكون المريض مضطرباً دون أن تكون حالته طارئة. لذا، تحدد معظم منشآت الرعاية الصحية إجراءات **فرز Triage** عبر الهاتف للتعامل مع مكالمات الطوارئ، ويقصد بالفرز عملية تقييم الموقف وتحديد أولويات العلاج. غالباً ما يُحتفظ بقائمة من الأسئلة بجانب الهاتف، وتستخدم للمساعدة في تقييم الموقف. على سبيل المثال، يمكن استخدام الأسئلة التالية حسب الموقف:

• من هو المريض؟

• ماذا حدث؟ متى حدث ذلك؟



- هل يتنفس المريض؟ هل هو واعٍ؟ هل ينZF؟
- هل من المحتمل أن يكون المريض قد تناول سمّاً؟ هل كان هناك تماس مع سمّ؟
إذا كان الأمر كذلك، فما هو، ومتي، وكم الكمية؟
- هل اتصلت بخدمات الطوارئ الطبية؟

من خلال طرح الأسئلة المناسبة والحفاظ على رباطة جأشك، ستتمكن غالباً من التعرف على حالات الطوارئ الحقيقية. تُحال معظم حالات الطوارئ إلى الشخص المناسب إذا كان موجوداً، وإذا لم يكن الشخص المؤهل للرد على مكالمات الطوارئ موجوداً، فاحصل على معلومات مهمة حتى تتمكن من مساعدة المتصل في الحصول على المساعدة من الطرف الصحيح، قد تكون حالة المريض إلى خدمة طوارئ طبية ضرورية، أو إلى قسم أو مستشفى، ويجب أن تكون قائمة أرقام الطوارئ متاحة بسهولة حتى يمكن إعطاء الرقم الصحيح للمتصل. وتتبع معظم المؤسسات إجراءات معينة في حال غياب الشخص المؤهل للإجابة على مكالمات الطوارئ.

يمكن أيضاً استخدام الفرز عبر الهاتف لتحديد مدى قرب موعد المريض، حيث تساعد الأسئلة المحددة في توفير معلومات حول خطورة حالته، وتشمل هذه الأسئلة:

- ما الأعراض التي تعاني منها؟
- منذ متى وأنت تعاني من الأعراض؟
- هل تعاني من حمى أو ارتفاع في درجة الحرارة؟
- هل تعاني من صعوبة في التنفس؟
- هل تشعر بالألم؟ أين؟ ما شدته؟

سيسمح لك تقييم إجابات المريض بتحديد إن كان ينبغي معاينة المريض على الفور أم تأجيل موعده لوقت مناسب. لا تتردد أبداً في طلب النصيحة من الآخرين إذا لم تكن متأكداً من خطورة حالة المريض.

كن متحفظاً وفطناً في جميع الأوقات وتجنب الرد باستخدام إجابات من قبيل "الطيب يتناول القهوة في الردهة"، أو "لم يأتِ بعد ولا أعرف مكانه" أو تعليقات مماثلة، واستبدل ذلك بعبارات مثل، "إنه غير موجود حالياً" أو "أتوقع عودتها في الساعة الرابعة، هل لي أن أنقل رسالتك؟"

قبل إنتهاء أي محادثة هاتفية، كرر المعلومات المهمة للمتصل. على سبيل المثال، قل: "موعدك في الساعة 10:00 صباحاً في اليوم العاشر من شهر رجب"، أو "سيعود الطبيب الاتصال بك بعد الساعة 4 مساءً اليوم". في نهاية المحادثة، أغلق دائمًا بعبارة "شكراً لك على الاتصال. وداعاً"، وأنه المكالمة بلطف إذا أمكن، أتح للمتصل إنتهاء المكالمة أولاً، لأنك إذا أنهيت المكالمة أولاً، يمكن أن تقوت شيئاً ي يريد المريض قوله. في معظم المؤسسات، تدوّن ملاحظات عن أي مكالمات تتطلب اتخاذ إجراءات



معينة، ويمكن كتابة هذه الملاحظات بخط اليد أو إدخالها في قاعدة بيانات الحاسب أو في السجلات الصحية الإلكترونية للمريض. في مؤسسات أخرى، يُحتفظ بسجلات الهاتف، وتُسجّل كل مكالمة، ويكون السجل دقيقاً، ويحوي دائمًا المعلومات التالية (الشكل "5-3أ"):

- **اسم المتصل:** دون الاسم الكامل للمتصل، واكتبه بشكل صحيح.
 - **رقم هاتف المتصل:** سجل الرقم الكامل، وإذا كان هناك وقت محدد يمكن فيه الوصول إلى المتصل، فأضف هذه المعلومات.
 - **الرسالة:** لخص بإيجاز سبب المكالمة مع تضمين كل المعلومات المهمة.
 - **تاريخ ووقت المكالمة.**
 - **الإجراء اللازم:** إذا اتخذ أي إجراء، فسجله، وإذا كان لا بد من اتخاذ إجراء ما، فسجل الإجراء اللازم، مثل "سوف نتصل مرة أخرى"، أو "يرجى معاودة الاتصال"، أو "يرجى الاتصال بعد الساعة 3 مساءً".
 - **اسم الشخص الذي رد على المكالمة:** تدوين اسم مستلم المكالمة سيساعد في الرد على أسئلة مستقبلية متعلقة بالمحادثة الهاتفية
- إذا كانت المؤسسة تعتمد على تدوين ملاحظات مكتوبة، فمن الضروري إبقاء قلم رصاص أو قلم وورقة بجانب الهاتف. وتستخدم بعض المؤسسات كراسات مخصصة للملاحظات الهاتفية. إذا كانت هناك حاجة إلى نسخة من الرسالة لسجل المريض أو السجل الهاتفي للمؤسسة، استخدم الكراسات المخصصة لتدوين ملاحظات عن المحادثات الهاتفية الواردة للمؤسسة الصحية. (الشكل "5-3ب"). سجل أي ملاحظة متعلقة بمحادثة هاتفية بشكل واضح، واكتب المعلومات الهامة وتحاش الأخطاء اللغوية. ويفيد استخدام سماعة رأس للهاتف في تحرير يديك ويسهل عليك كتابة أو إدخال الملاحظات على المحادثة الهاتفية.



الشكل "5-3ب" استخدم الكراسات المخصصة لتدوين ملاحظات عن المحادثات الهاتفية الواردة للمؤسسة الصحية.

For _____	Date _____	Time _____										
WHILE YOU WERE OUT												
M _____	OF _____											
<input type="checkbox"/> Phone _____	<input type="checkbox"/> Fax _____											
<input type="checkbox"/> Mobile _____	Area Code _____	Number _____ Extension _____										
<table border="1"> <tr> <td>TELEPHONED</td> <td>PLEASE CALL</td> </tr> <tr> <td>CAME TO SEE YOU</td> <td>WILL CALL AGAIN</td> </tr> <tr> <td>WANTS TO SEE YOU</td> <td>URGENT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RETURNED YOUR CALL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SPECIAL ATTENTION</td> </tr> </table>			TELEPHONED	PLEASE CALL	CAME TO SEE YOU	WILL CALL AGAIN	WANTS TO SEE YOU	URGENT	RETURNED YOUR CALL		SPECIAL ATTENTION	
TELEPHONED	PLEASE CALL											
CAME TO SEE YOU	WILL CALL AGAIN											
WANTS TO SEE YOU	URGENT											
RETURNED YOUR CALL												
SPECIAL ATTENTION												
Message _____												
Signed _____												

الشكل "5-3أ" يوفر نموذج استمارة الرسالة الهاتفية للمتلقى جميع المعلومات اللازمة للرد على الرسالة.

غالباً ما تتضمن أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية استخدام **بوابات المرضى Patient Portals**، أو موقع إنترنت آمنة على شبكة الإنترنت، أَسّسها طبيب، أو منشأة رعاية صحية، أو أي مقدم رعاية صحية آخر، ويُمنح المرضى رمز وصول للتسجيل في البوابة حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول في أي وقت للوصول الإلكتروني إلى سجلاتهم الصحية الإلكترونية. ويتتيح ذلك للمرضى طلب إعادة صرف الوصفات الطبية، وطرح الأسئلة، وطلب موعد أو التحقق منه، وعرض تقارير المختبر، وأداء مهام أخرى مماثلة. عندما يُرسل طلب أو سؤال مريض إلكترونياً، يبعث النظام تبليغاً للرد عليه، ويتحتم توجيه هذه الطلبات أو الأسئلة إلى الشخص المناسب بنفس طريقة توجيهه الـ **الطلبات أو الأسئلة الهاتفية**.

يحصل أن تكون بعض المكالمات الواردة للمؤسسة الصحية إشكالية، إذ من الممكن أن يرفض بعض الأفراد الكشف عن أسمائهم أو ذكر الغرض من مكالماتهم، وفي بعض الأحيان، يحاول المتصل تخويف أو تهديد متلقي المكالمة. لذا، حاول أن تحافظ على رباطة جأشك وتحكم بأعصابك، ولا تتردد في قول "لا يمكنني مقاطعة د. أسماء مالم أخبرها من المتصل". كن مهذباً ولكن حازماً في التعامل مع هذا النوع من المتصلين. إذا أعطى المتصل اسمه ولكنه رفض ذكر الغرض العام للمكالمة فعليك التحلي باللباقة، وعندما ينتابك الشك، يمكنك تعليق المكالمة ومراجعة الشخص الذي يريد المتصل، ليتسنى له تحديد ما إذا كان سيرد على المكالمة أم لا. إذا كان لا بد من تعليق المكالمة أو كنت تعلم بوجود تأخير بسيط قبل أن يرد الشخص المناسب على المكالمة، أسأل المتصل، "هل يمكنك الانتظار للحظة؟" تأكد من موافقة المريض على وضعه قيد الانتظار قبل تعليق المكالمة، ولا تترك المتصل منتظراً لمدة تزيد عن دقيقة. إذا كان هناك تأخير أكثر من ذلك، فاعرض على المتصل أخذ رقمه واطلب من الشخص المنشود معاودة الاتصال. وكن مراعياً لجميع المتصلين.

تطلب أساليب استخدام الهاتف الصحيحة ممارسة وخبرة. لذا فكر في نوع الانطباع الذي ترغب في تكوينه، ثم استجب بالطريقة الملائمة، وفي كل الأوقات، فكر قبل أن تتكلم، وتجنب التعليقات التي تسيء للمتصلين، وعاملهم كما تحب أن تعامل في حال كنت أنت المتصل.

أنظمة التوجيه الآلي للهاتف

Automatic Routing Telephone Systems

يوجد في العديد من منشآت الرعاية الصحية أنظمة هاتف مزودة **بوحدة توجيه آلية Automated Routing Unit**. يسمح هذا النوع من الأنظمة بالرد على العديد من المكالمات الهاتفية في نفس الوقت، حيث يقوم النظام بالرد على الهاتف ويتوفر



الصوت المسجل توجيهات للمتصل. وتستخدم معظم الأنظمة قائمة فيها سلسلة من الأرقام، ويضغط المتصل على الرقم الصحيح للتواصل مع قسم أو فرد معين. يمكن برمجة نظام التوجيه بحيث يمكن تحويل المتصل الذي لديه حالة طوارئ على الفور إلى فرد يمكنه التعامل مع حالته.

بعد **البريد الصوتي Voicemail** ميزة شائعة في معظم أنظمة التوجيه الآلية، فإذا لم يكن الفرد موجوداً، يُطلب من المتصل ترك رسالة أو يُوجه للتواصل مع شخص آخر. من الضروري أن يفحص الأفراد الذين لديهم بريد صوتي الرسائل بشكل متكرر. وتتوفر معظم الهواتف إشارة، مثل صوت تبيهه، لتبيه الفرد بأن الرسائل موجودة على نظام البريد الصوتي. وينتج عن تجاهل هذه الرسائل وعدم الإجابة عليها علاقات سيئة مع العامة.

خدمات الرد والمُجيب الآلي Answering Services and Machines

تستخدم العديد من مؤسسات الرعاية الصحية **خدمة رد** للإجابة على المكالمات الهاتفية عندما يكون الموظفون غير متواجدون. وتحتاج خدمة الرد للمريض التحدث مع عامل الهاتف الذي يسعه تحويل مكالمة المريض أو الاتصال بالشخص المعنى، كما تمكّن هذه الخدمة المتصل من ترك رسالة صوتية. وتتوفر مؤسسة الرعاية الصحية لعامل الهاتف إجراءات الواجب اتباعها في حالة الطوارئ، وأرقام هواتف الأفراد الذين يتعين الاتصال بهم، وإرشادات عامة لمجموعة متنوعة من المكالمات. وهذه الخدمة هي عادة خدمة برسوم شهرية.

ويُستخدم جهاز الرد الآلي في بعض جهات الرعاية الصحية، ولكنه ليس بنفس كفاءة خدمة الرد على المكالمات. عادة، يُعرف التسجيل في جهاز الرد الآلي عن المؤسسة ويطلب من المتصل ترك رسالة، ويشمل أيضاً في بعض مؤسسات الرعاية الصحية ساعات العمل. في حال استخدام جهاز الرد على المكالمات، يجب أن توجه الرسالة الترحيبية المرضى لما يجب عليهم فعله إن كانوا يتصلون لأمر طارئ، وفي بعض المؤسسات الطبية تتضمن الرسالة رقم الطوارئ الذي يمكن للمريض الاتصال به. وتتوفر معظم الجهات رقمًا بديلاً يمكن للمرضى الاتصال به في حالات الطوارئ. يجب فحص جهاز الرد بشكل متكرر بحثاً عن الرسائل، ويجب تخصيص فرد لمهمة التحقق من الرسائل فور فتح المؤسسة وعلى فترات متقطعة إذا استخدم الجهاز أثناء ساعات العمل.



أنظمة الاستدعاء Paging Systems

يتيح نظام الاستدعاء **Paging System** الاتصال بالفرد باستخدام جهاز النداء أو جهاز الاستدعاء، ويمكن لجهاز النداء أن يصدر رسالة صوتية، أو إشارة مثل صافرة تنبه الفرد إلى الاتصال برقم معين لتلقي الرسالة، أو رسالة رقمية على شاشة عرض تحتوي على رسالة أو رقم هاتف المتصل. ويعتمد نوع الرسالة المستلمة على نظام الاستدعاء المستخدم. وتُستخدم معظم أجهزة النداء للاستقبال فقط ولا تتمكن مستخدمها من الإرسال لكنها تتيح الوصول إلى الفرد على مدار 24 ساعة في اليوم. لذا، على متلقي رسالة جهاز النداء استخدام هاتف للتواصل مع المتصل إلا أنه يمكن أيضًا استخدام أجهزة النداء ثنائية الاتجاه الحديثة لتلقي الرسائل وإرسالها، الأمر الذي يلغي الحاجة لاستخدام الهاتف. وتدفع مؤسسة الرعاية الصحية عادة رسومًا شهرية لكل جهاز نداء قيد الاستخدام.

الهواتف الخلوية Cellular Telephones

يسعى الهاتف المحمول (الخلوي) أو الهاتف الذكي بالاتصال ثنائي الاتجاه بين الأشخاص في أي مكان تقريبًا، ويتوفر مرونة أكبر بكثير للفرد لتلقي المكالمات، لهذا يعتبر أكثر كفاءة من جهاز النداء لأن الفرد لا يضطر إلى استخدام هاتف آخر للرد.


البريد الإلكتروني Electronic Mail

يتيح استخدام البريد الإلكتروني إرسال واستقبال وإعادة إرسال الرسائل، ولذا فهو بديل جيد للاتصال الهاتفي. وتستخدم شركات التأمين، وخدمات الفواتير، ومؤسسات الرعاية الصحية، رسائل البريد الإلكتروني للتواصل مع بعضها البعض. في مؤسسات الرعاية الصحية الكبيرة حيث تكون أجهزة الحاسب متصلة عبر شبكة اتصال إلكترونية محلية، يمكن توجيه رسالة بريد إلكتروني إلى العديد من الموظفين في نفس الوقت لتحل محل رسالة مكتبية مطبوعة. لكن إذا أرسلت رسالة بريد إلكتروني عبر الإنترنت عبر موائم أو مودم modem غير آمن، فيمكن اعتراضها وقراءتها من قبل الآخرين. لهذا، لا ينبغي إرسال معلومات المريض السرية ما لم يستخدم برنامج تشفير قوي، أو جدار حماية، أو حماية بكلمة مرور.



اخبر معلوماتك

1. ما المعلومات التي تحتاجها لتمكن من فرز مكالمة هاتفية؟
2. عند تلقي رسالة هاتفية، ما العناصر الستة التي يجب أن تحتويها الرسائل دائمًا؟



الشكل "4-5 ب" نموذج عن شاشة حاسب تظهر موعداً محفوظاً.



الشكل "4-5 أ" في معظم مؤسسات الرعاية الصحية، تحجز المواعيد عبر الحاسوب.

3:5 جدولة المواعيد Scheduling Appointments

طول فترة انتظار الطبيب أو العامل الصحي المعنى بحالة المريض هي واحدة من الشكاوى الأكثر شيوعاً التي يتدولها المرضى، وللحد من تلك الشكاوى، تستخدمن العيادات جداول مواعيد منظم بعناية، حيث أن الجدولة الصحيحة للمواعيد ضرورية للحفاظ على علاقات عامة جيدة.

في معظم مؤسسات الرعاية الصحية، تجدول المواعيد عن طريق الحاسب (الأشكال "4-5 أ" و "4-5 ب"). حيث يحدد الحاسب تلقائياً التاريخ والوقت المتاحين التاليين، ويوفر سجلاً للمواعيد المجدولة، ويمكن برمجته لتخصيص فترة زمنية محددة لإجراء معين، ويطبع نسخاً من الجدول اليومي. وعلى الرغم من فعالية وكفاءة الجدولة المحسوبة، إلا أنه لا بد من وجود نظام بديل لأوقات التعطل، أو الأوقات التي لا يعمل فيها الحاسب.

إذا كان برنامج الحاسب لا يعمل، أو غير متوفّر في العيادة، يمكن استخدام دفاتر المواعيد أو السجلات. وتختلف دفاتر المواعيد أو السجلات من عيادة إلى أخرى، ومع ذلك، يحتوي معظمها على صفحة واحدة أو نصف صفحة لكل يوم، وعادةً ما يقسم الوقت إلى وحدات من 10-15 دقيقة تتيح الاستثمار الأمثل للوقت. كن على دراية بنوع دفتر المواعيد الذي ستستخدمه وتعرف على الفترة الزمنية التي يمثلها كل سطر.

هناك حاجة إلى نهج منظم لتجنب جدولة المرضى في الأوقات التي لا يتوفّر فيها الشخص المنشود، عند جدولة المواعيد، ضع في اعتبارك فترة الراحة والمجتمعات اليومية ، وتجنب جدولة أي موعد خلال هذه الفترات. وعادةً ما توضع علامة X كبيرة على كل فترة من هذه الفترات الزمنية بحيث لا تحدث أخطاء في الجدولة، بعض برامج جدولة المواعيد المحوسبة تُبرِز الفترات غير المتاحة للمواعيد بلون أو خط مختلف لتمييزها.

يسخدم عادة قلم رصاص لتسجيل المواعيد في دفتر أو سجل المواعيد وذلك كي يمكن المحو في حال طرأ تعديل ويمكن تحصيص الوقت لمريض آخر. لذا اتبع إجراءات مؤسستك.

قبل جدولة أي موعد، حدد المدة التي تستغرقها الإجراءات المختلفة في مؤسستك، فإذا استغرق الفحص ساعة واحدة، وحددت موعداً مده 15 دقيقة، فإنك ستتأخر 45 دقيقة على المواعيد اللاحقة. وتحتفظ العديد من المؤسسات بقوائم الإجراءات المعيارية ومتوسط الوقت المطلوب لكل منها بالقرب من دفتر المواعيد، والجدول "1-5" مثال على ذلك.

الإجراء	المدة (دقائق)
ترميم المُلغم	30
الترميم المركب	30
تحضير التاج	60-45
وضع التاج	20-15
تركيب طقم الأسنان	15
تحضير طقم الأسنان	45-30
الفحص (البدئي)	30
الفحص (العام)	15
القلع	45-30
وقائي (عام)	45-30
قتاة الجذر	60-45
التببيض	60-45

الجدول "1-5" المدة اللازمـة للـإجراء.



ويجب ترتيب المواعيد بشكل متقارب قدر الإمكان، ولكن ليس قريباً جدًا بحيث يشعر المرضى بالازدحام في العيادة أو يُطلب منهم الانتظار لفترات طويلة. كما تعتبر الفترات الطويلة من الوقت غير المجدول مضيعة للوقت والمال ومكلفة. لذا تحدد بعض المؤسسات **هامشاً زمنياً Buffer Period** يتراوح من 15 إلى 30 دقيقة في منتصف الفترة الصباحية ومنتصف الفترة المسائية، حيث يتيح هذا الوقت اللحاق بالركب إذا تجاوزت بعض المواعيد وقتها المخصص، وإذا لم يحدث ذلك وتمت المواعيد كما هو مخطط، يمكن استخدام هذا الوقت لأعمال أخرى، مثل معاودة الاتصالات الهاتفية أو رؤية مرضى حالات الطوارئ.

اليوم	الاثنين	التاريخ	8 فبراير - 20
	X	(مؤتمر - رؤساء الأقسام)	9:00
			9:15
		"ياسر" - صورة صدر - 4328 - 555	9:30
		"سارة" - تحقق من الحميمية - 3811 - 555 - 11	9:45
		"نورا" - 3428 - 555	10:00
	↓	جراحة ظفر إصبع القدم	10:15
	*	هامش زمني	10:30
		"سلطان" - فحص طبي - 5318 - 555 - 18	10:45
			11:00
	↓		11:15
		الأطفال: "فيصل، ريم، سعود"	11:30
	↓	تطعيمات	11:45
	X	(غداء)	12:00
			12:15

الشكل "5-5" نموذج جدول مواعيد.

عندما يتصل المريض لطلب موعد، اعرف الفرض وراء ذلك، ثم حاول منحه موعداً مناسباً له. يمكنك على سبيل المثال أن تسأل المريض "هل تفضل الصباح أم بعد الظهر؟" "ما اليوم المناسب لك؟" و "هل ستكون الساعة الثانية أم الرابعة أكثر ملائمة لك؟" وأعط المريض خيارات ليساعدك في تحديد الوقت واليوم الصحيحين. تكون الخيارات محدودة أحياناً لأن جدول المواعيد ممتئ، ومع ذلك، من خلال منحهم أكبر قدر ممكن من الخيارات، فإنك تخبرهم أنك تحاول مساعدتهم.

 تأكد من حصولك على المعلومات المطلوبة قبل إنتهاء محادثتك مع المجتمع المريض. احصل على الاسم الكامل للمريض، ولا تتردد في طلب تهجئة الاسم إذا لم تكن متأكداً من التهجئة الصحيحة. حدد سبب الموعد، ومن الحكمة أخذ رقم هاتف المريض تحسباً لأي طارئ يستدعي إلغاء الموعد. تساعد كتابة رقم الهاتف في دفتر المواعيد في تقاضي الحاجة إلى البحث عن الرقم في سجل المريض، وتتوفر الوقت أيضاً. ثم كرر التاريخ واليوم والوقت المحدد للموعد على مسامع المريض، ومن خلال تكرار كلّ من التاريخ واليوم، تجري تحققاً مزدوجاً وتفادي الأخطاء. تأكد من أن المريض يفهم كل المعلومات، وقبل إغلاق الهاتف، يمكنك تكرار المعلومات مرة أخرى بقول، "نتوقع قدومك الجمعة، 1 مارس، الساعة الثانية. شكرًا لاتصالك سيدة شهد. مع السلامة."

إذا حجز المريض موعداً في منشأة الرعاية الصحية، يجب إعطاؤه بطاقة موعد أو ورقة مطبوعة، تحتوي على تاريخ الموعد ويومه ووقته. ويستخدم العديد من منشآت الرعاية الصحية البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية لتذكير مرضاهم بالمواعيد، لذا تأكد من اتباع السياسة المعمول بها في منشأتك.

بعد حجز موعد، علم مكانه في جدول المواعيد. في العديد من المؤسسات، تُستخدم الأسهم التي تمتد أسفل اسم المريض لملء المدة الزمنية الكاملة التي سيحتاجها المريض (الشكل "5-5")، ويمتنع هذا حدوث أخطاء في الجدولة. أما أنظمة الحاسوب، فعادة ما تخصص الوقت المطلوب تلقائياً بناءً على نوع الإجراء المختار.

كن مهذباً إذا اتصل المريض لإلغاء موعد، واسأله عما إذا كان يرغب في تحديد موعد جديد، واحذف الموعد من الجدول المحوسب أو أزله من الجدول المطبوع عبر شطب الموعد بخط واحد، ثم سجل جميع المعلومات الجديدة في خانة الوقت الصحيحة. ليس من الضروري التحريّ وراء الموضوع وسؤال المرضى عن سبب الإلغاء، وقد يقدم العديد من المرضى تفسيرات من تقاء نفسم، وحتى وإن لم يفعلوا ذلك فلا تسألهـم.

مشكلات جدولة المواعيد مزمنة وتحدث في كل العيادات والمستشفيات، إذ قد يعجز بعض المرضى مواعيد ويختلفونها. يوجد عدة طرائق للتعامل مع المشكلة إذا



ارتکب المريض هذا الفعل بشكل متكرر. إحدى الطرائق هي تحديد موعد المريض في نهاية اليوم، بهذه الطريقة، إذا لم يلتزم المريض بموعده، لن يتأثر المرضى الآخرون ولا الجدول الزمني كثيراً. في معظم العيادات، تُدون المواعيد الملغاة أو "عدم الحضور" في ملفات المرضى. إذا كان المريض الذي ألغى الموعد أو تغيب عنه بحاجة إلى رعاية مستمرة فيجب بذل الجهد للاتصال به. كما أن لدى معظم المراكز الطبية والمستشفيات سياسة توجّب الاتصال بهذا المريض وتسجيل تاريخ وقت كل مكالمة على ملفه، وعند عدم تجاوب المريض بعد عدة مكالمات هاتفية تُبعث له رسالة أو بريد إلكتروني تشرح الحاجة إلى الرعاية. ويوفر توثيق جميع الجهد في ملف المريض الحماية القانونية عند رفع المريض دعوى قضائية. ويقع القرار النهائي بشأن كيفية التعامل مع هذه المواقف على عاتق صاحب المسؤولية.

تحدث حالات الطوارئ في كل عيادة أو مستشفى. وفي هذه الحالة، يمكن أن تتأخر المواعيد عن الوقت المحدد، وفي بعض الأحيان، يكون من الضروري إلغاء جميع المواعيد المجدولة. ويجب إخطار المرضى عبر الهاتف بذلك قبل قدومهم إلى العيادة أو المستشفى إن أمكن. وعندما تتصل لإلغاء موعد، فابذل قصارى جهدك لإعادة جدولة المريض في وقت يناسبه. أما إذا وصل المريض إلى العيادة وكانت المواعيد متاخرة عن الوقت المحدد، فاقعرض على المريض الاختيار بين الانتظار أو تحديد موعد آخر. عند إخبار المرضى بحدوث حالة طوارئ (لا يلزم شرح ماهية حالة الطوارئ) وأنه سيتعين عليهم الانتظار، فالكثير منهم لن يمانعوا وسينتظرون، لكن لا ينبغي أبداً ترك المريض منتظرين دون تقديم تفسيرات.

تطلب جدولة المواعيد بشكل صحيح تدريباً. فإذا كان نظامك الحالي يسبب انتظار المرضى لفترات طويلة، فراجعه وتحقق منه، وحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة الوقت المخصص لموعد كلّ مريض، وأضف هوامش زمنية إضافية لمرضى الطوارئ إذا لزم الأمر، وكن دائماً على استعداد لتصحيح المشكلات وترك انطباع جيد عن العيادة أو المستشفى.

اخبر معلوماتك

1. لماذا تقوم بعض العيادات بجدولة هامش زمني في منتصف الصباح؟
2. كيف يمكن التواصل مع مريض يغيب عن المواعيد بشكل متكرر؟



تحتفل أنواع السجلات الطبية، ومن أشكالها الشائعة استمارات معلومات المريض والتاريخ الطبي. ويمكن طباعة هذه الاستمارات وإكمالها يدوياً، كما يمكن إدخال المعلومات في قاعدة بيانات الحاسوب أو السجلات الصحية الإلكترونية. تعتبر جميع السجلات سرية، ولا يمكن الإفصاح عن أي معلومات منها دون موافقة خطية من المريض. وتعود ملكية هذه الاستمارات إلى الطبيب أو المؤسسة، ويجب إغلاقها أو تأمينها إلكترونياً في حال عدم استخدامها.

تسمى استمارات معلومات المريض أيضاً استمارات تسجيل المرضى (الشكل "6-5")، وتتماًلأ هذه الاستماراة في أول زيارة للمريض إلى أي عيادة أو مؤسسة صحية، وتحتوي على معلومات المريض الشخصية. في الزيارات اللاحقة، يُطلب من المرضى التحقق من المعلومات للتأكد من صحتها. وقد تكون الاستماراة عبارة عن ورقة أو ضمن مجلد المريض. في معظم العيادات، تُدخل المعلومات في قاعدة بيانات على الحاسوب في السجل الصحي الإلكتروني للمريض، وتُظهر الأشكال "5-7أ" و "5-7ب" نماذج عن شاشات إدخال معلومات المريض والتأمين عبر الحاسوب. وبغض النظر عن نوع الاستماراة المستخدمة، يحتوي معظمها على المعلومات التالية:

- اسم المريض الكامل.
- عنوان المريض.
- رقم هاتف المريض.
- عنوان البريد الإلكتروني للمريض.
- الحالة الاجتماعية للمريض، والجنس، وتاريخ الميلاد.
- مكان عمل المريض.
- اسم الشخص المسؤول عن الحساب (في حالة الدفع).
- معلومات شركة التأمين، بما في ذلك اسم الشركة وعنوان، وأرقام وثيقة التأمين وفصيلة الدم، والمعلومات الأخرى ذات الصلة.
- اسم الطبيب أو الشخص الآخر المُحول.



معلومات المريض			
اسم المريض	الحالة الاجتماعية	مطلق	متزوج
عنوان الشارع	أعزب	أرمل	منفصل
رقم الهاتف المحمول	<input type="checkbox"/> دائم <input type="checkbox"/> مؤقت		
جهة عمل المريض	عنوان البريد الإلكتروني		
عنوان شارع جهة العمل	المدينة، المنطقة، رقم المبني	الرمز البريدي	رقم هاتف المنزل
في حالة الطوارئ، تواصل مع:	رقم رخصة القيادة		
اسم الزوج/ الزوجة	عنوان البريد الإلكتروني		
الزوج/ الزوجة	المدينة، المنطقة، رقم المبني	الرمز البريدي	رقم هاتف العمل
عنوان شارع جهة العمل	المهنة (أشر إذا كان طالبًا) سنوات الخدمة؟		
من أحالك إلى هذه العيادة؟	كم عدد سنوات الخدمة؟		
إذا كان المريض قاصراً أو طالباً			
اسم الأم	المدينة، المنطقة، رقم المبني، الرمز البريدي		
جهة عمل الأم	المهنة (أشر إذا كان طالبًا)	كم عدد سنوات الخدمة؟	رقم هاتف العمل
عنوان شارع جهة العمل	المدينة، المنطقة، رقم المبني		
اسم الأب	المدينة، المنطقة، رقم المبني، الرمز البريدي	رقم هاتف المنزل	الرمز البريدي
جهة عمل الأب	المهنة (أشر إذا كان طالبًا)	كم عدد سنوات الخدمة؟	رقم هاتف العمل
عنوان شارع جهة العمل	المدينة، المنطقة، رقم المبني		
معلومات التأمين			
الشخص المسؤول عن الدفع، إذا لم يكن أحد الأشخاص أعلاه	المدينة، المنطقة، رقم المبني، الرمز البريدي		
<input type="checkbox"/> الشركة الاسم والعنوان	اسم حامل وثيقة التأمين	رقم الشهادة	رقم الفصيلة
<input type="checkbox"/> الشركة الاسم والعنوان	اسم حامل وثيقة التأمين	رقم وثيقة التأمين	رقم الفصيلة
<input type="checkbox"/> الشركة الاسم والعنوان	اسم حامل وثيقة التأمين	رقم وثيقة التأمين	رقم الشهادة
التفويض: أصرح بموجب هذا للطبيب المشار إليه أعلاه بتقديم معلومات إلى شركات التأمين فيما يتعلق بهذا المرض / الحادث، ويجب هذا أمنح الطبيب بشكل لا رجعة فيه جميع مدفوعات الخدمات الطبية المقدمة. أفهم أنني مسؤول مالياً عن جميع الرسوم سواء أكان التأمين يغطيها أم لا.			
توقيع الطرف المسؤول			

الشكل "6-5" نموذج استمارة معلومات المريض.



الشكل "5-7ب" نموذج لواجهة قاعدة بيانات على الحاسوب لإدخال معلومات التأمين.

"5-7أ" نموذج لواجهة قاعدة بيانات على الحاسوب لإدخال معلومات المريض.

في معظم المراكز الطبية والمستشفيات، تدخل هذه المعلومات في قاعدة بيانات الحاسب وتوضع نسخة مطبوعة في سجل المريض أو تضاف هذه المعلومات إلى السجل الصحي الإلكتروني للمريض. ويجب توخي الحذر لضمان دقة جميع المعلومات، فتحقق جيداً من الأرقام والتهجئة.

التاريخ الطبي Medical History (الشكل "5-8") هو استمار آخر مهم يستخدم في جميع مؤسسات الرعاية الصحية تقريباً، حيث تساعد المعلومات الواردة في هذه الاستماره الطبيب على تقديم رعاية أفضل، بل على تشخيص المرض أحياناً. ويمكن تسجيل التاريخ الطبي في استمار أو إدخاله في قاعدة بيانات الحاسب في السجل الصحي الإلكتروني للمريض. ولهذه الاستمارات أشكال متعددة أيضاً، ولكن معظمها تحتوي على الأجزاء الأساسية الآتية:

- **معلومات عامة:** تتضمن الاسم، العنوان، وال عمر، ومعلومات أخرى مماثلة.
- **التاريخ المرضي للعائلة:** تتضمن معلومات عن أفراد الأسرة المباشرة للمريض، بما في ذلك الوالدان، والأجداد، والأخوة والأخوات. وتُطرح أسئلة بخصوص أمراض القلب، والسرطان، والاضطرابات العقلية، والسكري، والصرع، وأمراض الكلى، والحساسية. إن كان أحد أفراد الأسرة متوفياً، يُسجل سبب الوفاة وعمره عند حدوثها. وهنا يُحصل على المعلومات المتعلقة بالأقارب عبر الدم فقط، ولا تهم المعلومات المتعلقة بالأقارب عبر الزواج، مثل الحماة، لأنه لا يمكن للمريض وراثة الأمراض من هؤلاء الأفراد.



استمارة التاريخ الطبي

العنوان	التاريخ	
اسم المريض		
العمر		
الجنس	تاريخ الميلاد	
الرمز البريدي	المدينة	
عنوان البريد الإلكتروني	رقم الهاتف المحمول	
	()	
	رقم وثيقة التأمين	
	شركة التأمين	
العنوان	مكان العمل	
	الهاتف	
	مسؤوليات العمل	
	ولي الأمر/الوصي إذا كان قاصر	
العنوان	المدينة	
الرمز البريدي	رقم الهاتف الخليوي	
عنوان البريد الإلكتروني	()	
	رقم الهاتف ()	
القصة العائلية:		
قائمة أفراد الأسرة: (الأم، الأب، الإخوة، الأخوات، الأجداد، إلخ) – الأعمار والحالة الصحية (إذا كان متوفياً اكتب سنه في وقت وفاته والسبب). ضع قائمة بالحساسيات و / أو أي حالات أو أمراض يمكن أن تكون لديهم أو أصيبوا بها، مثل الربو، التهاب المفاصل، والسل، والسكري، والسرطان، وأمراض القلب، وفرط التوتر الشريانية، وأمراض الكلى، والأمراض العقلية، والاكتئاب، أو أي مشكلات صحية أخرى تعرفها في عائلتك.		
*التاريخ الطبي السابق للمريض: حدد المرئيات الموجودة على اليمين إما "نعم" أو "لا" للأسئلة التالية:		
نعم	لا	
() () () () ()	داء السكري	الحمى القرمزية أو الحمى الرثوية
() () () () ()	الدرق أو سلعة درقية	ألم في الصدر
() () () () ()	توتر الغدد	خفقان القلب أو نبض أو معدل ضربات قلب
	الجهاز البولي والتناسلي	سرير
() () () () ()	أمراض الكلية أو الحصيات، أو داء برايت	ارتفاع ضغط الدم
() () () () ()	إنجاح بولي، تبؤل مؤلم ومتكرر	انتفاخ اليدين وأو القدمين
() () () () ()	دم أو قيح في البول	المعدة والأمعاء
() () () () ()	أمراض منقلة جنسياً (الأمراض الزهرية)	سرس الرهض أو حرقة الفواد
	الجهاز الهضمي والغضري	الغثيان / أو الإقياء
() () () () ()	مشكلات سهولة حدوث التعب و/أو الانزعاج	فقدان الشهبة
() () () () ()	انهيار عصبي/اكتئاب	التجشؤ أو الغازات
() () () () ()	شلل الأطفال	القرحة الهضمية، أمراض المرارة والكبد
() () () () ()	الأخلاقجات	البرقان الأصفر أو التهاب الكبد
() () () () ()	آلام حصلية و/أو مفصالية	الإسهال أو الإمساك
() () () () ()	آلم أو أذية الظهر / التهاب عظم ونقفي /	الزحار
() () () () ()	الروماتيزم	النزف المستقيمي، البواسير
		براز طيني أو قطراني
		الغدد
		زيادة أو نقصان الوزن
آخر دورة طمئنة		
منع الحمل		نعم () لا ()
اذكري تواريخ كل العمليات/الجراحات، الأذنيات، والأمراض التي استدعت الدخول إلى المستشفى		هل تتناول أدوية في الوقت الحالي؟ إذا كانت الإجابة نعم، فإن عدد الأدوية
هل سبق وأصبت أو تعالجت من السرطان أو أي ورم؟		هل سبق وأصبت أو تعالجت من السرطان أو أي ورم؟
هل تعاني من فقر الدم؟ أو هل سبق لك وتناولت أدوية حديدة؟		هل تعاني من فقر الدم؟ أو هل سبق لك وتناولت أدوية حديدة؟
هل تستخدم التبغ؟		هل تستخدم التبغ؟
ما النوع؟		ما النوع؟
للنساء فقط		دورات طمئنة مؤلمة
حمل/اجهاض/اسقاط		حمل/اجهاض/اسقاط
إناث أو سيلان مهبلي/نزف غير طبيعي		إناث أو سيلان مهبلي/نزف غير طبيعي
يرجى منك استخدام ظهر هذه الاستمارة لشرح إجاباتك بـ "نعم". شكرًا لك.		

الشكل "8-5" نموذج استمارة تاريخ طبي.



- **التاريخ الطبي للمريض:** يشمل الأمراض السابقة، والعلاجات، والعمليات، والحوادث، والعيوب الجسدية، والحساسية، وأمراض الطفولة، وعناصر أخرى مماثلة. لكل مرض في الماضي، تُسجّل سنة المرض أو عمر المريض وقت المرض. ولكل عملية سابقة، يُسجّل تاريخ العملية أو عمر المريض وقت إجراء العملية، ونوع العملية.

- **التاريخ الشخصي / الاجتماعي:** يشمل ذلك أسئلة حول النظام الغذائي للمريض، أو نومه، أو ممارسة التمارين الروتينية والعادات الشخصية، مثل التدخين. وإذا كانت مريضة، يشمل أيضًا تسجيل المعلومات المتعلقة بالحمل وعدد الأطفال ونمط الدورة الشهرية. وعادة ما يطلب ذكر الأدوية الحالية التي يتناولها المريض.

- **العلة أو المرض الحالي:** يشمل هذا الجزء وصفاً دقيقاً للعلامات والأعراض التي يعاني منها المريض حالياً. ويجب الانتباه إلى المعلومات المتعلقة بوقت حدوث المرض لأول مرة، والعلاجات السابقة، وأي معلومات أخرى ذات صلة يقدمها المريض. ويدعى هذا القسم أحياناً بالشكلية الرئيسية.

- **الفحص الطبي:** يفحص الطبيب جميع أجهزة الجسم ويسجل الموجودات الإيجابية والسلبية، ويمكن أن يتضمن هذا القسم أيضاً نتائج الفحوصات المخبرية رغم وجود قسم منفصل أحياناً للفحوصات المخبرية.

- **التشخيص، التنبؤ، والعلاج:** يمكن فصل هذه الأقسام أو دمجها في الاستماراة، ويكملاها الطبيب بعد مراجعة كل المعلومات السابقة. يعرف التشخيص على أنه حكم الطبيب على المرض أو الحالة التي يعاني منها المريض. في بعض الأحيان، يذكر التشخيص الأولى، أو يمكن أن يكتب الطبيب "R/O, rule out" متبوعاً باسم مرض أو أكثر للإشارة إلى ضرورة إجراء الفحوصات لاستبعاد الأمراض المذكورة. أمّا التنبؤ، فهو رأي الطبيب فيما يتعلق بمسار المرض أو الحالة، والنتائج المتوقعة، مثل "الشفاء التام في غضون أسبوع إلى أسبوعين"، كما يذكر أيضاً أي علاج محدد مُعطى.



الشكل 9-5 حافظ على خصوصية المريض التامة
إنشاء إكمال نموذج التاريخ الطبي.

في معظم العيادات، سيملاً مساعد الرعاية الصحية فقط أقسام معلومات المريض، والتاريخ العائلي، والتاريخ الطبي للمريض، والتاريخ الشخصي. ويمكن أن يُطلب من المرضى أيضًا تعبئة استمارة بهذه المعلومات؛ ليتحقق منها لاحقًا المساعد أو الطبيب، ثم يكمل الطبيب أو شخص مخول آخر جميع أجزاء التاريخ الطبي الأخرى.



تأكد من توفير الخصوصية الكاملة للمريض أثناء ملء استمارة التاريخ المجمع الطبي (الشكل "9-5")، لأجل ذلك ينبغي استخدام غرفة منفصلة وإغلاق بابها. كما يجب طرح أسئلة محددة وبطريقة احترافية وليس فضولية، ومن المهم التأكد من فهم المريض لمعنى الأسئلة جميعها. وقد تضطر على سبيل المثال أن تشرح للمريض أن داء السكري هو داء يسببه تناول السكريات. ويجب أن تكون المعلومات المجمعة دقيقة وكاملة، وينبغي إعادة فحص الحقائق حسب الضرورة، ومنح المريض الوقت الكافي للتفكير في كل سؤال، كما أنه من المهم أن يشعر بالراحة والاطمئنان أثناء الاستجواب. انتبه لأي معلومات إضافية يقدمها المريض إذا بدت مهمة للتاريخ المرضي العام. إذا لم تجد مناطق مخصصة في الاستمارات لهذا النوع من المعلومات، فتأكد من إبلاغ الطبيب أو الشخص المناسب بهذه المعلومات.

يجب مراعاة المتطلبات القانونية أثناء التعامل مع السجلات الطبية، ومن الضروري أن تذكر أن جميع المعلومات الموجودة في السجل سرية ولا يمكن إعطاؤها لأي فرد، أو وكالة، أو شركة تأمين أخرى دون الحصول على إذن خطّي من المريض. ويجب تخزين السجلات في منطقة آمنة ومغلقة، والوصول إليها محدود. كما يجب أن تستخدم السجلات المحوسبة أيًّا من تقنيات التشفير، أو جدران الحماية، أو الحماية بكلمة مرور.

عادةً ما يُدخل الإصدار النهائي من التاريخ الطبي في برنامج حاسب ويطبع من أجل السجل الدائم للمريض، أو يضاف إلى السجل الصحي الإلكتروني للمريض. تأكد أن أي نسخة مكتوبة بخط اليد واضحة ومقروءة، وتحقق جيدًا من جميع المعلومات للتأكد من تسجيلها بشكل صحيح.

اخبر معلوماتك

1. اذكر المعلومات التي ترد في استمارة معلومات المريض.
2. أين يُخزن التاريخ الطبي للمريض؟

أنواع الخطابات

Types of Letters

هناك أنواع مختلفة من خطابات العمل، تتضمن بعض أنواعها التي قد يُطلب منها إعدادها ما يلي:

- **خطاب الموعد:** لإعلام المريض بموعد محدد يجب تضمين جميع المعلومات، بما في ذلك اليوم، والتاريخ، والوقت في الخطاب. وفي العديد من الوكالات، تُرسل تذكيرات بالمواعيد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.
- **خطاب الاستدعاء:** يُذكر المريض أن الوقت قد حان للمراجعة من أجل الفحص الدوري. أحد الأمثلة على ذلك هو خطاب تذكير لإجراء فحوصات ما بعد الجراحة. وفي بعض المراكز الطبية أو المستشفيات، تُرسل بطاقات الاستدعاء، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة إلى المرضى.
- **خطاب الاستشارة:** يُرسل إلى متخصص آخر لطلب فحص مريض معين. ويستخدم أحياناً كإحالة إلى طبيب، أو معالج، أو مؤسسة علاج/تشخيص أخرى.
- **خطاب الاستفسار:** لطلب بعض المعلومات. وأحد الأمثلة على ذلك هو خطاب يطلب من المريض تقديم معلومات حول التأمين الطبي.

أجزاء الخطاب

Parts of a Letter

يجب أن يتضمن كل خطاب أجزاء معينة، نذكرها هي ومكوناتها فيما يلي:

- **ترويسة الخطاب (أو الرأسية):** في معظم الحالات، يُستخدم قالب على الحاسب لإنشاء الخطابات، وتحفظ ترويسة الخطاب أو الرأسية في القالب. ويوضع اسم المؤسسة وعنوانها ورقم هاتقها في القالب، وسيطبع مع الخطاب. تذكر بعض مؤسسات الرعاية الصحية أيضاً عنوان موقع الويب والبريد الإلكتروني، وبعضاً منها الآخر يستخدم الورق المطبوع، ويطبع اسم المؤسسة وعنوانها ورقم هاتقها على الورق ترويسة للخطاب.
- **سطر التاريخ:** يكتب فيه تاريخ كتابة الرسالة وموقعه أسفل ترويسة الخطاب.
- **العنوان الداخلي:** هو اسم وعنوان الشخص أو الشركة التي يرسل إليها الخطاب.

- **التحية:** اسم الشخص الموجه إليه الخطاب، وتتضمن المسمى الوظيفي متبعاً بالاسم الأخير للشخص. إذا كان الخطاب موجهاً إلى المسمى الوظيفي (على سبيل المثال، مدير الموارد البشرية)، فيجب أن تكتب التحية بهذا الشكل: مدير الموارد البشرية المحترم أو إلى من يهمه الأمر.
- **سطر الموضوع:** تتضمن بعض الرسائل سطر موضوع للإشارة إلى سبب الكتابة، وقد لا يوجد هذا الجزء في كل الخطابات.
- **المتن:** هو الرسالة التي ينقلها الخطاب. تتضمن معظم الخطابات ثلاثة فقرات، توضح الفقرة الأولى سبب كتابة الرسالة، وتسرد الفقرة الثانية الحقائق الرئيسية، أما الفقرة الثالثة فهي التوقيع أو التذكير النهائي.
- **اختتام لقب:** يُمهى الخطاب بمحاملة لطيفة، والأكثر شيوعاً استخدام مع خالص التقدير، مع فائق الاحترام، أو المخلص لك. وفي اللغة الإنجليزية، تبدأ الكلمة الأولى فقط من الاختتام اللقب بحرف كبير.
- **التوقيع:** الاسم والمسمى الوظيفي للشخص الذي يكتب الرسالة. اترك مساحة بعد الاختتام اللقب للتوقيع بخط اليد، ثم أدخل الاسم والمسمى الوظيفي للشخص الذي يرسل الخطاب.
- **الأحرف الأولى للشخص المرجعي:** هي الأحرف الأولى من اسم الشخص الذي ي ملي الخطاب والأحرف الأولى من اسم الشخص الذي يعد الخطاب، أو الأحرف الأولى من اسم المُعد فقط.
- **ذكر المُرفقات:** إذا أرسلت مرفقات مع الخطاب، يذكر ذلك في النهاية مع وصف موجز للمادة المرفقة.



الصياغة الملائمة للخطابات

Proper Form for Letters

عند كتابة خطاب باستخدام الحاسب، من المهم اتباع قواعد محددة واستخدام التباعد الصحيح. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:

- تكون الخطابات مهنية ومرتبة، ومن المهم ضبط التهجئة وعلامات الترقيم بشكل صحيح، ويمكنك استخدام التدقيق الإملائي والنحوي على الحاسب لتصحيح الأخطاء. استخدم قاموساً للتحقق من المصطلحات الطبية أو الخاصة بالأسنان والتي قد لا تكون موجودة في المدقق الإملائي في برنامج معالجة النصوص.

<p>مجمع العليا للخدمات الطبية مدينة الرياض الرياض 11433</p> <p>(السطر الخامس عشر تقريباً)</p>	<p>مجمع العليا للخدمات الطبية مدينة الرياض الرياض 11433</p> <p>12 يناير، --</p>	<p> AMC</p> <p>سطر التاريخ</p>
<p>العنوان الداخلي</p> <p>د. صالح سعد جدة، المملكة العربية السعودية صندوق بريد 40111</p> <p>(مسافة مضاعفة)</p> <p>الدكتور صالح سعد المحترم: (مسافة مضاعفة)</p> <p>لقاء الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع</p> <p>(مسافة مضاعفة)</p>		
<p>التيبة</p> <p>شكوراً لدعوتي للتحدث في لقاء الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع في 15 يونيو -20. كما طلب، سيفصل موضوعي استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي في مساعدة الأطباء في إجراء تشخيص أكثر دقة دون اللجوء إلى الإجراءات الجراحية الغازية. سيرسل العنوان الدقيق لخطابي يوم الجمعة المقبل.</p> <p>(مسافة مضاعفة)</p> <p>أرجو منكم توجيه مدير مكتبكم أن يرسل لي معلومات بخصوص عدد المشاركين المتوقع، ووقت اللقاء، والمكان، وأي تفاصيل أخرى تساعدي في تحضير خطابي.</p> <p>سأكتب أو أتصل إذا كان لدى أي أسئلة إضافية.</p> <p>(مسافة مضاعفة)</p> <p>وتقبلوا خالص شكري وتقديرني</p>		
<p>المن</p> <p>الأختام لبق</p> <p>5-4) 5 سطور فاصلة</p> <p>التوفيق</p> <p>د. ياسر عبد الله</p> <p>(مسافة مضاعفة)</p> <p>الأحرف الأولى للشخص ٧A</p> <p>المرجعي</p> <p>(مسافة مضاعفة)</p> <p>ذكر المرفقات</p> <p>المُرفق: منشور عن التصوير بالرنين المغناطيسي</p>		

الشكل "10-5" صياغة الخطاب بالطريقة العمودية. تكون كل الأقسام على محاذاة مع الهاشم الأيمن.



مجمع العليا للخدمات الطبية

مدينة الرياض

AMC

2332 شارع العليا
منطقة العليا
الرياض 11433

(السطر الخامس عشر تقريباً) 12 يناير، --20

(السطر العشرون تقريباً)

د. صالح سعد
جدة، المملكة العربية السعودية
صندوق بريد 40111

الدكتور صالح سعد المحترم:

لقاء الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع

شكراً لدعوتي للتحدث في لقاء الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع في 15 يونيو-20. كما طلب،
سيصف موضوعي استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي في مساعدة الأطباء لإجراء تشخيص
أكثر دقة دون اللجوء إلى الإجراءات الجراحية الغازية. سيرسل العنوان الدقيق لخطابي يوم الجمعة
المقبل.

أرجو منكم توجيه مدير مكتبكم أن يرسل معلومات بخصوص عدد المشاركين المتوقع، ووقت اللقاء،
والمكان، وأي تفاصيل أخرى تساعديني في تحضير خطابي.

سأكتب أو أتصل إذا كان لدي أي أسئلة إضافية.

وتقبلوا خالص شكري وتقديربي

د. ياسر عبد الله

YA

المُرفق: منشور عن التصوير بالرنين المغناطيسي

الشكل "11-5" صياغة الخطاب بالطريقة العمودية المُعدلة.

- تختلف طرائق تسييق الخطابات، إلا أن هناك طريقتين شائعتين هما الطريقة العمودية والطريقة العمودية المعدلة. في الأولى (الشكل "10-5")، تُحاذى جميع أجزاء الخطاب بدءاً من الهامش الأيمن للورقة. في الثانية (الشكل "11-5")، تُحاذى أجزاء معينة من الخطاب عند خط المنتصف للورقة، وتحاذى المتبقية عند الهامش الأيمن للورقة.



- إذا استخدم قالب حاسب يحتوي على ترويسة خطاب، فانزل بمسافة من ثلاثة إلى أربعة أساطر أسفل الترويسة، وابدأ بالكتابة عند خط المنتصف في الطريقة العمودية المعدلة أو عند الهاشم الأيمن في الطريقة العمودية. أدخل الشهر واليوم والسنة، ولا تختصر الشهر.
- إذا كانت الترويسة مطبوعة على الورق، انزل بمسافة 15 سطراً تقريباً من أعلى المستند. وابدأ الكتابة عند خط المنتصف في الطريقة العمودية المعدلة أو عند الهاشم الأيمن في الطريقة العمودية. أدخل الشهر واليوم والسنة، ولا تختصر الشهر.
- انزل بمسافة خمسة أساطير وابدأ بكتابة العنوان الداخلي في السطر الخامس أسفل السطر الأخير من الترويسة، وابدأ من خط الهاشم الأيمن بغض النظر عن طريقة التنسيق. يجب أن يتكون العنوان الداخلي من ثلاثة أساطر على الأقل. السطر الأول هو اسم ولقب (على سبيل المثال، السيد أو الآنسة) للشخص الذي يرسل الخطاب إليه. لا تستخدم لقباً مزدوجاً، مثل دكتور أ.د. صفا، دكتور في الطب؛ بدلاً من ذلك، استخدم أ.د. صفا، دكتور في الطب. السطر الثاني هو رقم المبنى والشارع، أما السطر الثالث فهو الحي، والسطر التالي هو الرمز البريدي متبعاً بالمدينة.
- انزل بمسافة سطرين وابدأ التحية في السطر الثاني أسفل العنوان الداخلي، وابدأ من الهاشم الأيمن بغض النظر عن طريقة التنسيق.
- إذا اشتمل الخطاب على سطر الموضوع، فانزل مسافة سطرين أسفل التحية، وابدأ في الكتابة عند الهاشم الأيمن لإدراج موضوع الخطاب.
- انزل بمسافة سطرين وابدأ كتابة المتن في السطر الثاني بعد التحية أو سطر الموضوع، وابدأ كل سطر من المتن عند الهاشم الأيمن. لا توضع عادةً مسافة بادئة للسطر الأول من أي فقرة في الطريقة العمودية أو العمودية المعدلة، ورغم ذلك، تقوم بعض الوكالات بوضع مسافة بادئة للسطر الأول من كل فقرة بخمس مسافات في الطريقة العمودية المعدلة.
- انزل بمسافة سطرين بعد الجملة الأخيرة في المتن وابدأ كتابة الخاتمة. ابدأ عند خط المنتصف في الطريقة العمودية المعدلة أو عند الهاشم الأيمن في الطريقة العمودية. في اللغة الإنجليزية، أول حرف من الكلمة الأولى من الاختتام اللبق يكتب بحرف كبير، ثم توضع فاصلة في نهاية الاختتام، على سبيل المثال، مع خالص التقدير، مع فائق الاحترام.
- اترك أربعة إلى خمسة أساطر فارغة للتواقيع بخط اليد، وابدأ بالاسم واللقب في السطر الخامس أو السادس أسفل الاختتام اللبق. ابدأ عند خط المنتصف



للطريقة العمودية المعدلة أو عند الهاشم الأيسر للطريقة العمودية، وأدخل اسم ولقب الشخص الذي يرسل الخطاب. يمكن وضع الألقاب الطويلة في السطر الثاني تحت الاسم.

- اكتب الأحرف الأولى من اسم الشخص المرجعي. أبدأ عند الهاشم الأيمن بغض النظر عن طريقة التنسيق، واتكتب إما الأحرف الأولى من اسم المُعد فقط أو الأحرف الأولى لاسم الكاتب والأحرف الأولى لاسم المُعد، واستخدم إما الأحرف الكبيرة أو الصغيرة. إذا استخدمت مجموعتين من الأحرف الأولى، افضل الأحرف الأولى الكبيرة باستخدام نقطتين، واستخدم شرطة مائلة لفصل الأحرف الأولى الصغيرة، على سبيل المثال، Lms / whb أو WHB / lms. تستخدم بعض المؤسسات الأحرف الأولى الكبيرة لاسم الكاتب، والأحرف الأولى الصغيرة للمُعد، والنقطتين لفصل بين المجموعتين.
- اترك هواشم مرتبة ومتقاربة على كل جانب الورقة، ينبغي أن تكون الهاشم عريضة بما يكفي لتكون ملائمة، ولكنها ليست واسعة للغاية بحيث تشوّه المظهر.

ملخص Summary

يجب تدقيق جميع الخطابات قبل أن يستلمها المرسل للتوقيع، لذا فعليك التأكد من كتابة جميع الكلمات بشكل صحيح، واستخدم الجمل الكاملة وعلامات الترقيم الصحيحة، واستخدم التدقيق الإملائي والنحووي المتوفّر في معظم برامج معالجة النصوص. في معظم المؤسسات، تُستخدم أجهزة الحاسوب وبرامج معالجة النصوص لإعداد الخطابات، لذلك من السهل تصحيح الأخطاء على شاشة الحاسوب قبل طباعة نسخة ورقية من الخطاب.

لدى العديد من مؤسسات الرعاية الصحية نماذج خطابات قياسية محفوظة في قاعدة بيانات الحاسوب أو مضمونة في برامج العيادة. عندما تكون هناك حاجة إلى خطاب لغرض معين، مثل خطاب الموعد، يسترد نموذج لخطاب الموعد، ثم يدخل اسم المريض ومعلوماته الشخصية في نموذج الخطاب. وإن كانا نريد إرسال نفس الخطاب إلى مجموعة كبيرة من الأشخاص، فيمكن استخدام ميزة دمج البريد (الموجودة في معظم برامج معالجة النصوص) لإنشاء عدد كبير من الخطابات المخصصة لكل فرد في وقت واحد.

اخبر معلوماتك

1. اذكر أربعة أنواع من الخطابات التي قد يُطلب منك إعدادها.
2. ما الذي يحتويه متن الخطاب؟



نظراً لأن العديد من المرضى يعتمدون على شركات التأمين لدفع النفقات الطبية والسنوية، فمن الممكن أن تكون تعبئة استمارات التأمين جزءاً من واجبات المساعد الطبي. ولحمل الشركات على الدفع الفوري، عليك تعبئة الاستمارات بشكل صحيح. إن المعلومات المتعلقة بالتفطية التأمينية للمريض ضرورية، وعادة ما تُجمع هذه المعلومات في أول زيارة للمريض إلى المؤسسة، وتسجل المعلومات في استماراة معلومات المريض أو في قاعدة بيانات الحاسوب أو في السجلات الصحية الإلكترونية الخاصة بالمريض. بالإضافة إلى ذلك، تنسخ معظم المؤسسات الوجه الأمامي والخلفي لبطاقة تأمين المريض وتضع النسخة في ملف المريض أو في سجله الصحي الإلكتروني. من الضروري أن تكون جميع الأسماء والعناوين وأرقام العقود صحيحة، لذا، تحقق مرة أخرى من هذه المعلومات أثناء تسجيلها، ومن الحكمة أيضاً التتحقق من أن تغطية المريض التأمينية لم تتغير في كل مرة يزور فيها المريض مؤسسة الرعاية الصحية.

إذا أراد المريض المطالبة بتفطية التأمين، فتأكد أنه أكمل كل أجزاء الاستماراة المطلوب منه تعبئتها، وتأكد أيضاً من توقيع المريض على الاستماراة أينما كان توقيعه مطلوباً. إذا كان المريض مُعالاً، مثل الزوج/ة أو الطفل الراشد المميز، فمن الضروري الحصول على توقيع الشخص الذي أصدر عقد التأمين له، ويشار إلى الشخص المُعال هذا بالمؤمن.

لا يمكن الإفصاح عن المعلومات الطبية السرية ما لم يوقع المريض على تصريح بالإفصاح عن المعلومات لشركات التأمين. ونظراً لأن معظم المؤسسات اليوم تكمل استمارات التأمين على جهاز حاسب وتقدم المطالبات إلكترونياً، فإن المريض والمؤمن عليه يوقعان عادةً على استماراة "تفويض للإفصاح عن المعلومات ومنح المزايا". ويُحتفظ بهذه الاستماراة في ملف المريض وتوضع على استماراة التأمين عبارة "الملف موقع من المريض". في بعض المؤسسات، تُمسح الاستمارات ضوئياً وتوضع في ملف جهاز الحاسوب، وتودع إلكترونياً مع استماراة التأمين أو تكون جزءاً من السجل الصحي الإلكتروني للمريض.



ترميز (تکوید) استمارات التأمين Coding Insurance Forms

تحتوي العديد من نماذج التأمين على جزأين يتطلبان رموزاً: التشخيص التقنيات والإجراءات / الخدمات. وتُستخدم الرموز الأبجدية الرقمية (الأحرف والأرقام) للتعرف على المعلومات بطريقة موحدة وقياسية. تستخدم معظم شركات التأمين أجهزة الحاسب لمعالجة الطلبات، لذلك يجب أن تكون الرموز الأبجدية الرقمية دقيقة. إذ يمكن أن يؤدي استخدام رمز غير صحيح إلى رفض الطلب أو تأخير دفعه.

طورت "منظمة الصحة العالمية" (WHO) نظام ترميز للتشخيص للمساعدة في تتبع المرض، والحفاظ على إحصائيات المراضاة (الإصابة بالمرض) والوفيات (حدوث الوفاة)، وإنشاء قاعدة بيانات دولية للتعرف على الأمراض. يُعرف نظام الترميز هذا **بالتصنيف الدولي للأمراض (ICD)**. تستخدم "المملكة العربية السعودية" النسخة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض، والتعديل "الأسترالي" (ICD-10-AM) لترميز التشخيص، والتصنيف "الأسترالي" للتدخلات الصحية (ACHI)؛ وللإبلاغ عن إجراءات المرضى الداخليين. يُعرف التشخيص على أنه تحديد مرض أو حالة المريض. إذا شخص المريض على أنه يعاني من أكثر من حالة واحدة، يذكر أولاً التشخيص الأكثر أهمية ورمز (ICD-10-AM) المقابل له، ثم يتبع بالتشخيصات الأخرى ورموز ICD-10-AM الخاصة بها حسب ترتيب الأهمية.

تكون طريقة الترميز هذه نوعية جداً لكل مرض أو حالة، وتبدأ الفئات بحرف، وكل مستوى من التشعب هو فئة فرعية. قد تكون الرموز من ثلاثة أو أربع أو خمس أو ست أو سبع خانات. على سبيل المثال، تمثل الفئة S42 كسرًا في الكتف وأعلى الذراع. بينما يمثل الكود S42.2 كسرًا في النهاية العلوية لعظم العضد. كما يمثل الكود S42.20 كسرًا غير محدد في النهاية العلوية لعظم العضد. أما الخانة السادسة فتحدد الجهة، اليسار أو اليمين. وبالتالي، يمثل S42.201 كسرًا غير محدد في النهاية العلوية لعظم العضد الأيمن. وتسمح الخانة السابعة بمزيد من التحديد؛ حيث يمثل الكود S42.201A كسرًا غير محدد في النهاية العلوية لعظم العضد الأيمن، والكسر مبدئياً مغلق، في حين، يشير الكود S42.201B إلى كسر غير محدد في النهاية العلوية لعظم العضد الأيمن، والكسر مبدئياً مفتوح. إذا كان هناك أكثر من ثلاثة خانات في الكود، تستخدم النقطة لفصل الخانة الثالثة عن الرابعة. ويجب تكويد كل تشخيص إلى أعلى درجة من الدقة النوعية أو سيتم رفض الطلب. لذا، من المهم جداً استخدام أكبر قدر ممكن من الخانات لكل تشخيص.



من المهم استخدام أحدث إصدار من الكتاب أو برنامج الحاسوب للتأكد من أن الرموز دقيقة وحديثة (الشكل "14-5"). يخصص لكل إجراء أو خدمة كود مكون من خمس خانات بدون فواصل أو نقاط عشرية. وتُستخدم المُعَدّلات لتقديم شرح إضافي أو لتبديل معنى الكود، وتُحصل عن الكود عبر شرطة. على سبيل المثال، يشير الرمز 44950 إلى استئصال الزائدة الدودية أو إزالة الزائدة الدودية جراحياً، ويكون هذا الكود عادة هو الوحيد المطلوب، لكن إذا كان استئصال الزائدة الدودية معقداً للغاية واستغرق وقتاً أو عناء أكثر بكثير مما يلزم، يُضاف المُعَدّل 22 إلى كود المصطلح الإجرائي الحالي (CPT) للحصول على كود صحيح هو 44950-22.

للعثور على تشخيص في كتاب الأكواط، ابحث عن الاسم أو المصطلح الرئيس في الفهرس الأبجدي. على سبيل المثال، ابحث عن استئصال الرحم لتشخيص استئصال الرحم الجزئي، ثم استخدم رقم الكود في الفهرس الأبجدي للعثور على رقم ICD-10-AM المطابق في القائمة المجدولة لاستئصال الرحم الجزئي. تبدأ معظم برامج الحاسب بالاسم أو بالفئة المكونة من ثلاثة خانات. عندما يدخل الاسم أو الكود المكون من ثلاثة خانات في الحاسوب، تظهر قائمة بالعناوين الفرعية والأكواط الكاملة. يوضح الجدول "2-5" أمثلة على رموز ICD-10-AM لتصنيف أمراض الزائدة الدودية.

المرض	الكود
التهاب الزائدة الدودية الحاد	K35
التهاب زائدة دودية حاد مصحوب بالتهاب بريتوان معتم:	K35.2
بدون خراج	K35.20
مع خراج بريتواني	K35.21
التهاب زائدة دودية حاد مصحوب بالتهاب بريتوان موضعي:	K35.3
بدون انتفاخ أو غرغرينا	K35.30
مع غرغرينا وبدون انتفاخ	K35.31
مع انتفاخ ولكن بدون خراج	K35.32
مع انتفاخ وخراب	K35.33
التهاب زائدة دودية حاد غير محدد وأنواع أخرى	K35.8
التهاب زائدة دودية حاد غير محدد	K35.80
أنواع أخرى من التهاب الزائدة الدودية الحاد:	K35.89
بدون انتفاخ أو غرغرينا	K35.890
بدون انتفاخ، مع غرغرينا	K35.891

الجدول "2-5" نموذج لأكواط ICD-10-AM.

تعبئة طلبات التأمين Completing Insurance Claims

فيما يلي بعض القواعد العامة التي تطبق على تعبئة استمرارات التأمين:

- تأكّد من استخدام الاستماراة الصحيحة.
- اقرأ الاستماراة جيداً أو راجعها على الحاسب للتأكد من فهمك للمطلوب.
- تحقق من تعبئة المريض للخانات الصحيحة، وتأكّد من وجود توقيعه في جميع الأماكن المطلوبة. إذا كنت تستخدم برنامج حاسب لتوليد الاستماراة، تأكّد من توقيع المريض والمؤمن عليه على استماراة "تفويض للإفصاح عن المعلومات ومنح المزايا". غالباً ما يحتفظ بهذا في ملف المريض أو في سجله الصحي الإلكتروني.
- تحقق مرة أخرى للتأكد من صحة جميع الأسماء، والعناوين، وأرقام العقود المدرجة في النموذج.
- تتضمّن أرقام وثائق التأمين أو أرقام العقود في كثير من الأحيان حرفًا أو سلسلة من الأحرف. تأكّد من صحة هذه الأرقام ووجودها في الأماكن المخصصة على الاستماراة.
- استخدم الأكواد الصحيحة، عندما تكون مطلوبة. في معظم الاستمرارات، تستخدم الأكواد الرقمية لمكان الخدمة، وتُستخدم أيضًا لوصف نوع الخدمة.
- أجب على جميع الأسئلة الواردة في الاستماراة بدقة، وأدرج المعلومات المحددة. على سبيل المثال، بدلاً من وضع "الفحوصات المخبرية"، ضع قائمة بالفحوصات المُجرأة.
- يسمح باستخدام الاختصارات القياسية في معظم الاستمرارات، لكن تأكّد من دقة جميع الاختصارات المستخدمة، ولا تستخدم أي نقاط مع الاختصارات.
-  تأكّد من تحديد المبالغ المطلوب بها بدقة، وتحقق مرتين من العمليات الحسابية.
- تأكّد من توقيع الطبيب أو الشخص المخول على الاستمرارات في المناطق المخصصة.
- لاحظ المربع الخاص بالدفع المالية. إذا قبل الطبيب أو المؤسسة المبلغ الذي تسمح به شركة التأمين عن التكفة بالكامل، يختار "نعم"; وإذا لم يكن كذلك، يختار "لا".
- تنسخ الاستماراة أو تطبع، وتوضع نسخة في ملف المريض، أو تدرج في سجله الصحي الإلكتروني.



- تحقق مجدداً من كامل الاستماراة قبل إرسالها إلكترونياً أو بريدياً.

في العديد من المراكز الطبية، تستخدم أجهزة حاسب مبرمجة لتعبئة استمارات طلبات التأمين النموذجية، وتدخل معلومات المطالبة بالتفطية التأمينية في الحاسب، ثم يدرج الحاسب بعدها المعلومات في الأماكن المناسبة في استمارة التأمين ليتسنى طباعتها أو إرسالها بريدياً، لكن العديد من المؤسسات ترسل استمارات التأمين حالياً إلكترونياً على مودم آمن. ويساعد ذلك في تسريع المعاملة وتحصيل الدفعة المالية. هذه البرامج سهلة الاستخدام وتتوفر وقتاً كبيراً في التعامل مع استمارات التأمين.



اختبار معلوماتك

1. اذكر اسم المنظمة التي طورت نظام ترميز للتشخيص.
2. عند تعبئة استمارة التأمين، ما عليك سوى تضمين معلومات موجزة مختصرة. صح أم خطأ؟

7:5 نظام حفظ السجلات المالية Maintaining a Bookkeeping System

تنقل معظم المنشآت والعيادات **نظام حفظ السجلات المالية Bookkeeping** إلكترونياً، لكن بعضها لا يزال يستخدم نظام لوحة التثبيت، على كلّ حال، يستخدم كلا النظائر نفس المفاهيم لتبسيط التدفق النقدي.

نظام لوحة التثبيت Pegboard System

يُطلق على نظام لوحة التثبيت أيضاً نظام "الكتابة مرة واحدة". حيث تدون سجلات مختلفة في آنٍ واحد، ويشتمل هذا النظام عادةً على سلسلة السجلات الآتية:

- **البيان اليومي** (أو المذكرة اليومية): سجل يومي لجميع المرضى المعاينين، وجميع الرسوم المستحقة، وجميع المدفوعات المستلمة (الشكل "12-5"). كما توفر المذكرة عمود "إجمالي" ويمكن استخدامه لقسام الإيداع البنكي، وملخص تحليل الأعمال، وقسم لإجمالي الحسابات اليومية والشهرية، وقسم "إثبات القيود" للتحقق من دقة إجمالي الحساب، وقسم لتسجيل حسابات القبض أو إجمالي المبالغ المستحقة على المرضى. عندما تجمع إمدادات شهر كامل من البيانات اليومية في مجلد واحد، نحصل على السجل الشهري لجميع الأعمال.



الشكل "12-5" يوفر البيان اليومي سجلاً يومياً للمرضى المعainين، والرسوم المستحقة، والمدفوعات المستلمة.

- **سجل الحساب - المقوبضات:** يحتوي على معلومات حول الرصيد السابق المستحق، ورسوم العلاج، والدفعة المستلمة، والرصيد الحالي. وتتوفر العديد من القسائم أيضاً مساحة لتدوين الموعد التالي للمريض. وعند اكتماله، يمكن تسليم الإيصال للمريض كسجل بالدفع أو الرصيد المستحق. في بعض المؤسسات، تستخدم نسخة أخرى من هذا السجل، وهي عبارة عن استماراة من ثلاثة طبقات تذكر كل المعلومات السابقة بالإضافة إلى خدمات محددة وأرقام أ��وا التأمين المقابلة لها. وتستخدم هذه النسخة، التي يُطلق عليها اسم استماراة التواصل أو الفاتورة الخارقة، بمثابة بيان لشركة التأمين. كما يمكن للمؤسسة الاحتفاظ بنسخة واحدة، وإرسال النسخة الثانية إلى شركة التأمين (أو إرفاقها باستماراة التأمين) لتكون بمثابة استماراة مطالبة؛ وتحمّل النسخة الثالثة للمريض لتكون بمثابة إيصال الدفع، وسجل للعلاج أو الخدمات، وفاتورة بالرصيد المستحق على الحساب، وبطاقة موعد في حال حجز موعد آخر.
- **قسيمة الدفع:** في بعض أنظمة ألواح التثبيت، تكون هذه جزءاً من سجل الحساب - المقوبضات. عندما يصل المريض إلى المؤسسة، يدخل اسمه في الأعلى، ويقطع هذا القسم من السجل من الإيصال ويرفق بملف المريض، ثم يدون الطبيب أو شخص آخر مخول بعدها العلاجات والرسوم على هذه القسيمة أثناء علاج المريض. تُرجع القسيمة إلى موظف الاستقبال، والذي يمكنه بذلك استخدامها لتحديد الرسوم.



• بطاقة الحساب: هي سجل إجمالي للرعاية المقدمة للمريض، وسجل مالي لحسابه. يذكر عليها وصف موجز للخدمات، والرسوم، والمدفوعات المسددة، والرصيد الحالي المستحق. في بعض المؤسسات، تُستخدم نسخ عن بطاقات الحساب بدلاً من الفواتير المستقلة. وتُنسخ البطاقة وترسل بالبريد العادي أو الإلكتروني إلى المريض لتقديم كشف حساب شهري.

بالإضافة إلى تسجيل زيارات المرضى والرسوم المستحقة عليهم، يُستخدم نظام لوح التثبيت لتسجيل المدفوعات المستلمة. أحد الأمثلة على ذلك هو صك مالي من شركة التأمين للدفع مقابل الخدمات. تُتبع نفس الخطوات، ولكن بدلاً من العلاج، يكتب "ROA"، والتي تعني "أضيفت للحساب"، تحت الوصف. ثم تحدد الأرصدة، وتدون جميع المعلومات في وقت واحد على البيان اليومي وبطاقة الحساب. ومن الممكن إرسال إيصال بالبريد أو إلكترونياً إلى المريض.

لدى العديد من شركات التأمين عقود مع مقدمي الرعاية الصحية، تحدّد المبالغ التي ستدفع مقابل الخدمات. عندما ترسل شركة التأمين دفعه، فإنها عادة ما ترسل استماراة "توضيح المزايا". وتسرد هذه الاستماراة المبلغ الذي يتلقاه مقدم الرعاية الصحية، والمبلغ المتفاوض عليه أو المسموح به وفقاً للعقد، والمبلغ الذي تدفعه شركة التأمين، والمبلغ المستحق على المريض. إذا كان المبلغ المتفاوض عليه أو المسموح به أقل من المبلغ المُتلقى، فيجب إجراء تعديل على حساب المريض.

في نهاية يوم العمل، يوفر البيان اليومي سجلاً إجمالياً لجميع الرسوم والمدفوعات، وطريقة للتحقق من الحسابات. ويُحصل على الإجماليات اليومية عن طريق جمع مبالغ كل عمود في البيان اليومي. كما يمكن التحقق من دقة السجلات على الفور.

نظرًا لتسجيل سلسلة من النسخ في آنٍ واحد، من المهم للمسجل استخدام قلم حبر جاف والكتابة بوضوح مع الضغط بقوّة كافية للتسجيل على جميع النسخ. وعند حدوث خطأ ما، فيجب تحديده بدقة، ولا ينبغي استخدام أي ممحاة أو سائل للتصحيح لأن هذه سجلات مالية تخضع للتدقيق لأغراض ضريبية أو قانونية. في حال حدوث خطأ فادح، فمن الممكن أن يكون إبطال سجل الحساب - المقبولات وبعد سجل جديد هو الخيار الأفضل. الدقة والوضوح ضروريان عند استخدام نظام لوح التثبيت، ونظرًا لأنها سجلات لحفظ العمليات المالية، فيجب تخزينها لحين الحاجة لمراجعتها، كما يمكن شراء مجلدات خاصة لهذا الغرض.



أنظمة المحاسبة المالية Financial Accounting Systems

تستخدم معظم منشآت الرعاية الصحية أنظمة حفظ السجلات المالية الحاسوبية، فهناك العديد من أنواع البرامج المتوفرة لذلك ويوفر معظمها نفس الوظائف الأساسية. تبدأ معظم الأنظمة بإنشاء سجل حساب المريض أو بطاقة حساب المحسوبة. تدخل المعلومات بما في ذلك اسم، وعنوان المريض، والشخص المسؤول عن الحساب، وأفراد الأسرة في الحساب، ومعلومات التأمين لكل مريض. وتشكل هذه المعلومات الشخصية للمريض قاعدة بيانات للنظام. تبرمج أيضاً أكواد ICD-10-AM المستخدمة في المؤسسة على الحاسب، جنباً إلى جنب مع وصف الأكواد والرسوم المفروضة على كل منها. كما برمجت معظم البرامج لتشير إلى مصدر الدفع. عندما يتلقى المريض خدمة، يُسترد سجل حساب المريض من ذاكرة الحاسب، وتدخل معلومات حول الخدمة في واجهة المعاملات اليومية (الشكل "13-5"). عند إدخال الأكواد الصحيحة، يحسب البرنامج تلقائياً الرصيد الحالي باستخدام الرصيد السابق في

معلومات المريض والمزود	اسم المريض	العلاقة	رقم القسمية	معلومات التأمين	مغطى بالتأمين	تنطية الخطة للمعالجة	
الرصيد الأولي	رقم الحساب	رقم المزود	تاريخ المعالجة	مكان الخدمة	وصف آخر تشخيص	مُدخل	
معلومات المعالجة والدفع	رقم الإجراء	الوصف	اللاحق	المبلغ	المستحق	الإيصال الأولي	التشخيص
الرصيد الجديد	المجموع						
E - تحرير، A - ترك، S - حفظ، H - حفظ/تعليق، F - منتهي، F1 - جديد، F2 - يومي، F3 - إبلاغ، F4 - تحديث، F5 - نشر، F6 - سحب، F7 - البريد، F8 - استدعاء، F9 - الملاحظات							

الشكل "13-5" تسمح واجهة إدخال المعاملات اليومية لمزود الرعاية الصحية بإدخال معلومات حول علاجات المريض والحفاظ على حساب المريض.

سجل الحساب وإضافته إلى الرسوم الجديدة. إذا سدت دفعه، يخصمها البرنامج ويحسب الرصيد الجديد. يحدث سجل الحساب أو بطاقة الحساب المحوسبة تلقائياً عند الإدخال. يمكن إعطاء نسخ مطبوعة من الحساب أو إرسال نسخ إلكترونية منه للمريض لتوضيح جميع الرسوم والمدفوعات، والرصيد الحالي المستحق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام سجل الحساب لتقسيط فاتورة المرضى على فترات منتظمة.

بالإضافة إلى التعامل مع حسابات المرضى، سينشئ برنامج حفظ السجلات المالية مذكرة يومية، توفر سجلاً مالياً يظهر المرضى المعainين، والخدمات المقدمة، والرسوم، والمدفوعات المسددة، والأرصدة المستحقة. ستُنشئ معظم البرامج قسيمة إيداع مولدة من المجاميع المدخلة أثناء السداد.

استخدام أنظمة الفوترة الإلكترونية سهل لأن البرنامج يوجه المستخدم خلال كل خطوة من خطوات إدخال المعلومات المالية عن طريق تقديم التوجيهات أو طرح الأسئلة. رغم ذلك، على عضو فريق الرعاية الصحية فهم المبادئ الأساسية للإدارة المالية المستخدمة في حفظ السجلات المالية اليدوية أو تلك السجلات التي تحفظ باستخدام برامج الحاسوب الآلي. كما يجب أن تتوفر الحمايات اللاحزة عند استخدام هذا النوع من الأنظمة، حيث تستخدم معظم المؤسسات الحماية بكلمة مرور، لذلك يُسمح للأفراد المصرح لهم فقط بالوصول إلى المعلومات المالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب برمجة جميع الأنظمة لتسجيل المعاملات المحذوفة لمنع أي شخص من حذف المعاملة وسرقة الأموال. في نهاية المطاف، من المهم التأكد من إجراء نسخ احتياطية دورية لجميع المعلومات، لأنها ستلزم في حال تعطل الحاسوب.

اختبر معلوماتك

1. عرف البيان اليومي.
2. ما المقصود بـ "ROA"؟




بحث اليوم الرعاية الصحية في المستقبل

الأحرف الكبيرة، وتحديد أماكن الأشياء. كان اثنان من المرضى قادرين على قراءة جمل قصيرة. ويستمر البحث في زيادة عدد الأقطاب الكهربائية في الغرسة للسماح للمرضى بتفسير المزيد من الصور.

تبذل جهود بحثية كبيرة حالياً لإنشاء غرسة شبكيّة باستخدام مادة بوليمر موصلة مغطاة ببوليمر شبه موصل، والتي تتحنى وتتشتت مثل الأنسجة الطبيعية عندما تزرع في العين. يمتص البوليمر شبه الموصل الفوتونات عندما يدخل الضوء إلى العين ويوجه الإشارات الكهربائية إلى الخلايا العصبية المتبقية في شبكيّة العين، والتي ترسل بعد ذلك النبضات إلى الدماغ ليفسرها على أنها رؤية. لا يحتاج هذا الزرع إلى كاميرا خارجية أو حاسب لأنّه يعمل على أنه أنسجة شبكيّة سليمة. وتُجرى تجارب أولية لتحديد مدى فعالية الغرسة في استعادة الرؤية.




الرؤية الطبيعية



الشبكيّة السليمة



الرؤية في حالة التهاب
الشبكيّة الصباغي



الشبكيّة في حالة التهاب
الشبكيّة الصباغي

الشكل "5-14" التهاب الشبكيّة الصباغي.

أعضاء رؤية الكترونية حيوية؟

يطلق اسم التهاب الشبكيّة الصباغي pigmentosa (الشكل "5-14") على مجموعة من أمراض العين الموروثة التي تسبب فقداناً تدريجياً للرؤية ينتهي بالعمى. وتحسب هذه الأمراض شبكيّة العين، وهي طبقة العين الحساسة عصبياً، والتي تحتوي على الخلايا المستقبلة للضوء والتي تسمى المخاريط والعصبي. تكون المخاريط حساسة لللون وتستخدم بشكل أساسى للرؤية في ظروف الإضاءة الجيدة، أما خلايا العصبى تقييد في الرؤية في البيئات المظلمة أو ذات الإضاءة الخافتة واللتقط الصور لتوفير رؤية محيطية أو جانبية. يتسبب التهاب الشبكيّة الصباغي في تراجع تدريجي لهذه الخلايا، مما يؤدي في النهاية إلى العمى. عادة ما يتم تشخيص هذا المرض لدى المراهقين والشباب، ومعظم المصابين بهذه الحالة يصبحون مكفوفين في سن الأربعين. ساعد الباحثون الأفراد المصابين بالتهاب الشبكيّة الصباغي على رؤية بعض الصور عبر إنشاء شبكيّة اصطناعية، احتوت على 16 قطبًا كهربائياً وزرعت في 6 مرضى، حيث تمكّن المرضى من تمييز بعض الأنماط الضوئية وتحديد موقع بعض الأشياء. أدى هذا النجاح إلى تطوير غرسة Argus II، والتي تحتوي على 60 قطبًا كهربائياً. ويستخدم النظام نظارات بكاميرا فيديو للتقطان المشهد، ويعالج المعلومات على جهاز حاسب بحجم المحفظة التي توضع حول رقبة المريض أو على حزام، ويرسل إشارة إلى الأقطاب الكهربائية المزروعة في شبكيّة العين، فتحفّز هذه الأقطاب المستقبلات الضوئية لتنقل الإشارة إلى الدماغ عبر العصب البصري لتكوين صور مرئية. زرع النظام في 30 مريضاً في التجارب السريرية الأولى التي استمرت لما يقارب 4 سنوات. وصحّح أنه لم يستعد الجهاز الرؤية الطبيعية، لكن تمكّن المرضى من رؤية الألوان، والتعرف على

خلاصة دراسة الحالة

عندما يقرر أن يتتبادل كلّ من خالد وفهد التدريب في الجدولة وحفظ الملفات، ما المهارات التي سيحتاجون إليها؟
ما بعض النصائح في حفظ الملفات التي سيقدمها خالد لفهد أثناء تدريبه؟ ما النقاط التي سيحتاج خالد إلى معرفتها عند تحديده لمواعيد المرضى وتلقيه الرسائل؟

ملخص الفصل 5

- يعد الاحتفاظ بسجلات المرضى، مثل استمارات معلومات المريض والتاريخ الطبي، جانباً مهماً من جوانب رعاية المرضى. كما أن الدقة ضرورية لكون السجلات الطبية وثائق قانونية.
- تُستخدم مختلف أنظمة حفظ السجلات المالية في منشآت الرعاية الصحية، بما في ذلك سجلات الخدمات المقدمة والمدفوعات المسددة والأرصدة المستحقة على الحسابات.
- يمكن تعلم مهارات الأعمال والمحاسبة لعضو فريق الرعاية الصحية القدرة على الاختيار من بين مجموعة متنوعة من وظائف الرعاية الصحية.
- تُستخدم مهارات الأعمال والمحاسبة في العديد من وظائف الرعاية الصحية، ويمكن لمقدم الرعاية الصحية توظيف العديد من هذه المهارات في حياته الشخصية.
- يعد كلّ من الاستخدام السليم للهاتف، وكتابة خطابات العمل المهنية، وتبئية استمارات التأمين، مهارات أساسية للعاملين في العيادات الطبية، أو عيادات طب الأسنان، أو منشآت الرعاية الصحية الخاصة، أو مراكز الأعمال لمقدمي الرعاية الصحية.
- تساعد طرائق حفظ الملفات وجدولة المواعيد المناسبة على سير العمل في منشآت الرعاية الصحية بكفاءة.

حالة دراسية بسيطة 1:5 مسألة الأولوية

من المقرر وصول الطبيب إلى العيادة في الساعة 10 صباحاً. وصل عبد الله للتوكيل إلى العمل ووجد عدة رسائل في انتظاره:

أ. اتصلت مني في الساعة 8:30 صباحاً بالعيادة لأن ابنتها تعاني من حمى 39 درجة مئوية. وترى من الطبيب معاينة الطفلة أو كتابة وصفة طبية. لا تذكر الرسالة أي علامات أو أعراض أخرى. ولا يمكنها إحضار الطفلة حتى الساعة 4 مساءً.

ب. اتصل محمد، وهو مستشاري في المستشفى، عند الساعة 9:15 صباحاً، لأنه فحص مريضة تدعى ربى أحالها الطبيب إليه طلباً للاستشارة. يود محمد إخبار الطبيب بالنتائج التي توصل إليها، وسيكون في عيادته من الساعة 1 إلى 4 مساءً، وفي المستشفى من الساعة 4 إلى 6 مساءً، وبعد الساعة 7 مساءً سيكون في المنزل.

ج. اتصل مندوب مبيعات شركة آيس للتجهيزات الطبية في الساعة 9:30 صباحاً بخصوص ورق ECG التي طلبها الطبيب. لم يجد الورق من طراز 524 متاحاً. إلا أن هناك بديل يمكن إرساله، وهو طراز 529، لكنه أغلى ثمناً. كما يمكن لمندوب المبيعات أيضاً محاولة تحديد مكان مخزون قديم من طراز 524، وأشار باعتقاده أن الطرازان من نفس الجودة.

د. ورد اتصال من المستشفى عند الساعة 9:45 صباحاً بخصوص يونس، الذي بدأ يتقيأ دمًا أحمر قاتلًا عند تمام الساعة 9:40 صباحاً بعد خضوعه للجراحة. الممرضة التي تتصل هي من الجناح 5 بـ، رقم داخلي 5566، وتريد من الطبيب الاتصال على الفور.

التحليل

1. كيف يقرر عبد الله ما الرسالة الأهم التي يجب على الطبيب الرد عليها أولاً؟ ما الأسئلة التي ستساعد عبد الله في ترتيب هذه الرسائل حسب الأولوية؟

2. هل ينبغي أن يتعامل عبد الله مع أي من هذه الرسائل بنفسه؟ لماذا؟

3. طلب الطبيب من عبد الله معرفة المزيد عن حالة ابنته مني. ما الأسئلة التي يجب أن يطرحها على مني؟

حالة دراسية بسيطة 2:5 مريض قلق

طلب المشرف من ميرا أخذ تاريخ نور الطبي وتبعة استماراة سجل طبي للمريضة نور التي دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية في المرأة. تبلغ نور من العمر 56 عاماً، متزوجة ولديها ثلاثة أطفال، يبدو أنها فلقة من دخول المستشفى ويظهر التوتر عليها واضحاً. جاء زوجها معها إلى الموعد. تحتاج ميرا أيضاً إلى تسجيل العلامات الحيوية لنور في استماراة التاريخ الطبي.

التحليل

1. ما الأسئلة التي تحتاج ميرا طرحها على نور؟

2. كيف يمكن لميرا أن تهدئ من روع نور حتى تتمكن من الإجابة على كامل أسئلتها؟

3. هل يجب على ميرا أخذ علامات نور الحيوية في هذا الموعد؟ علّ جوابك.



حالة دراسية بسيطة 3:5 مريض غاضب

تعمل فاطمة موظفة استقبال في عيادتك المحلية هذا الصباح، وتجيب على الهاتف بأسلوبها المعتاد. يتحدث المتصل بصوتٍ عالٍ ويصرخ، "أريد أن أتحدث إلى الطبيب الآن!" تحتاج فاطمة إلى فرز المكالمة لتحديد ما إذا كانت المكالمة مهمة ويجب إرسالها إلى الطبيب أو يمكن لممرضة أو أخصائي صحي آخر في العيادة التعامل معها. يرفض الرجل إعطاء فاطمة أي معلومات، ويواصل تكرار طلبه.

التحليل

1. كيف ينبغي أن ترد فاطمة على المتصل؟

2. ما المعلومات التي تحتاج فاطمة الحصول عليها من المتصل؟

3. إذا كانت فاطمة غير قادرة على الحصول على مزيد من المعلومات، فكيف يجب أن تتصرف؟ لماذا؟



أسئلة المراجعة

1. ما الغرض من إجراء الفرز عبر الهاتف؟

2. اذكر خمسة أقسام في استماراة التاريخ الطبي. صف بإيجاز نوع المعلومات في كل قسم.

3. اذكر الفرق بين طريقة تنسيق الخطابات العمودية وطريقة تنسيق الخطابات العمودية المعدلة.

4. ما هو كود ICD-10-AM؟



5. ما إجراءات الحماية الالزمة عند استخدام أنظمة الفوترة الإلكترونية؟

6. لماذا يستخدم سجل الحساب - المقبولات؟

7. إذا كان المريض مُعَالاً، فمن يجب أن يوقع على وثيقة التأمين؟

8. لماذا تستخدم ميزة دمج البريد؟



التفکیر الناقد

١. ابحث واحصل على استمارات تاريخ طبي للمريض فارغة من مستشفى وعيادة طبية. أجر مقابلة مع طالب آخر في الفصل وأملاً كل استماراة بناءً على المعلومات التي يخبرك بها. اكتب فقرة توضح بالتفصيل الاختلافات في الاستمارات. لماذا اختارت كل منشأة من المنشآت نوع الاستماراة التي تستخدمها؟

٢. ابحث عن شركات تأمين معينة، ومؤسسات صيانة صحية، ومؤسسات تزويد مفضلة لتحديد متطلباتها لمعالجة الطلبات.



3. أنت تعمل في عيادة طبية يعمل فيها أربعة أطباء مختلفين. أنشئ قائمة بأسئلة الفرز التي يمكنك استخدامها لتحديد ما إذا كان المريض بحاجة إلى موعد فوري.

التمرينات

1. أكمل استماراة معلومات المريض واستماراة التاريخ الطبي في الأشكال 6-5 و 8-5 بناءً على الحالة التالية: دخل سالم ونوال إلى عيادة الطبيب اليوم للمرة الأولى، متاخرين عن موعدهما. كلاهما متلاشى ويشاركان البريد الإلكتروني ولديهما تأمين صحي، لكن نوال فقط هي من حضرت بطاقتها وأمكنها إخبارهما برقمها، وهو 0112345678. لدى نوال تاريخ مرضي مع الصداع وتشوش الرؤية والسعال والربو، وتعافت لتؤثرها من التهاب المسالك البولية. ولا تتناول أي دواء باستثناء الباراسيتامول عندما تصاب بالصداع. بينما يعاني سالم من ضيق في التنفس وألم في الصدر وحرقة في المعدة، ويأخذ مضادات الحموضة وفالسارتان 350 ملغ لارتفاع ضغط الدم. ولم يُصب أي منهما بالسرطان أو يتطلب العلاج النفسي.

2. أنشئ نموذج خطاب عمل لكل من هذه الأغراض:

- أ. خطاب استدعاء.
- ب. خطاب استشارة.

3. تمرن على المواقف الآتية مع زميل، افترض أدوار كل من المتصل وموظف الاستقبال الذي يتلقى المكالمة.

- أ. مريض يتصل لتحديد موعد.
- ب. طبيب آخر يتصل لمناقشة النتائج التي توصل إليها عن مريض محال.
- ج. أم تتصل بخصوص طفلها المريض.
- د. مندوبة مبيعات تتصل بخصوص بعض المعدات الجديدة التي تريد عرضها ومناقشتها.
- هـ. رجل يتصل ويدرك أن زوجته سقطت على الأرض فاقدة الوعي.



الفصل

6

التطور المهني والتعلم مدى الحياة

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

دراسة حالة

تحب مريم عملها مساعدة تمريض، وأحد الأسباب التي دفعتها إلى اختيار مهنتها هو أنها تحب التفاعل مع الآخرين، حيث تساعدها شخصيتها الودودة على تطوير علاقات جيدة مع المرضى، كما أن تصرفاتها المرحة تجعل لها شعبية وحضوراً بين المساعدين. تتطلع مريم مؤتمرات التمريض السنوية التي تقام في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد، التي توفر فرصاً لرؤساء الأصدقاء الذين تعرفت عليهم في المهنة ومعرفة آخر الأخبار. رغم ذلك، لا تستمع مريم بجلسات التعلم، ولا تواكب أحدث الأدبيات الطبية أو تفعل أي شيء آخر لتمضي قدماً في حياتها المهنية. ما التأثير المحتمل على مستقبلها المهني؟

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل، ستكون قادراً على:

- تعريف "التعلم الطبي المستمر"، و"التطور المهني المستمر"، و"التعلم الموجه للذات"، و"القدوة"، و"المرشد".
- ذكر الطرائق التي يمكن من خلالها لأشخاص الرعاية الصحية النمو المهني.
- ذكر خمسة أغراض للمنظمات المهنية.
- شرح أهمية التعلم مدى الحياة لأشخاص الرعاية الصحية.
- وصف التغيرات والاتجاهات في الرعاية الصحية ومتطلبات التعلم المناسبة لهم.
- تقديم معايير لاختيار الدورات والمواد ذات الجودة العالمية لتحقيق التطور المهني.
- ذكر الصفات التي يجب البحث عنها عند اختيار قدوة يحتذى بها.
- شرح اختلاف الواجبات والمسؤوليات باختلاف مستويات السلم الوظيفي.

المصطلحات الرئيسية

التطور المهني Professional Development	التدريب أثناء الخدمة In-Service Training	السلم الوظيفي Career Ladder
القدوة Role Model	التعلم مدى الحياة Lifelong Learning	التعلم الطبي المستمر Continuing Medical Education (CME)
التعلم الموجه للذات Self-Directed Learning	المُرشد Mentor	التطور المهني المستمر Continuing Professional Development (CPD)



الشكل "1-6" يعني التطور المهنيّ السعي للتحسّن باستمرار وتشجيعك لخريج أفضل ما عندك.



التطور المهني والتعلم مدى الحياة 285

وزارة التعليم

Ministry of Education
2025 - 1447

التطور المهني Professional Development يعني السعي للتحسن باستمرار وأن تكون الأفضل في مهنتك (الشكل "6-1")، كما يعني أيضاً أن تجد الرضا في عملك وأن تشارك في الأنشطة المهنية التي تتعدي تلك المطلوبة خلال يوم العمل العادي. ويعد الحصول على وظيفة الخطوة الأولى فقط في المسار الوظيفي، ويبقى التطور المهني رحلة الوظيفة في المسار الصحيح سواء قضى أخصائي الرعاية الصحية كامل حياته المهنية في نفس الوظيفة أو قام بالعديد من التغييرات؛ لذا فإن التطور المهني جوهري للنجاح على المدى الطويل. تتأثر جميع مهن الرعاية الصحية بالاكتشافات الطبية والتطورات التكنولوجية المتتسارعة، لذلك يعتبر التعلم المستمر ضرورياً للأداء بفعالية والبقاء على اطلاع دائم. ويطلب عدد من المهن المحافظة على الترخيص أو الشهادة. لذا لا تنظر إلى التعلم المهني على أنه عبء، بل فرصة لتوسيع معرفتك وفرصك.

هناك العديد من الطرائق للنمو المهني والحفاظ على شغفك في العمل:

- **حدد أهدافك:** يعد تحديد الأهداف القابلة للتحقيق، بالإضافة إلى التحقق الدورى من تقدمك، محفزات فعالة للنمو. وتمثل الأهداف جيدة التخطيط خرائط طريق نحو مستقبل زاهر.
- **انضم إلى المنظمات المهنية:** بالإضافة إلى توفيرها لفرص التعلم، فإن هذه المنظمات هي أماكن لتبادل الخبرات مع المتخصصين الآخرين في مجال الرعاية الصحية. يعزز كل من الصداقة والدعم المتبادل من الرضا الوظيفي، كما تعد المشاركة النشطة في اللجان أو بصفة مسؤول إداري طريقة ممتازة لممارسة مهارات القيادة والعمل الجماعي. وتمثل المنظمات المهنية مصادر جيدة للحصول على التعلم المستمر، وستناقش المنظمات المهنية في قسم لاحق.
- **كون علاقات:** لا تقتصر أهمية بناء العلاقات على البحث الأولي عن وظيفة، فبناء شبكة علاقات وتوسيعها يعرّضك لأفكار جديدة وفرص للتقدم (الشكل "6-2"). وب مجرد أن توظف، فكر في مساعدة الآخرين على بدء حياتهم المهنية من خلال منحهم المعلومات وتشجيعهم. إن التواصل طريق ذو اتجاهين، ويجب اعتباره نشاطاً طويلاً الأمد.
- **اطلب مسؤولية إضافية:** هذه الطريقة تبين وتحافظ على اهتمامك بالوظيفة، فإذاً فأضافة مسؤوليات جديدة بعد إتقان الواجبات الأساسية وروتين العمل، تُبقي التحدي مشتعلًا.



الشكل "6-2" بناء شبكة علاقات وتعزيزها مهم لمستقبلك المهني.

- ابق على تواصل مع مُرشدك: يبقىك المرشد الجيد متحمّساً وساعيًّا نحو التميز عبر تقديم المشورة المهنية باستمرار. وستتم مناقشة المُرشدين لاحقاً في هذا الفصل.

تتضمن المهنة في مجال الرعاية الصحية مسؤوليات جسمية ومكافآت عظيمة، ويمكن أن يساعد الانخراط في فعاليات التطوير المهني في الحفاظ على التوازن وضمان حياة مهنية طويلة ومرضية في خدمة الآخرين.

المنظمات المهنية

Professional Organizations

يمكن أن تساهم المشاركة الفعالة في منظمة مهنية بشكل إيجابي في التطور المهني، ولمهن الرعاية الصحية منظمات معنية تشمل غاياتها ما يلي:

- الارتقاء بالمهنة.
 - ضمان جودة رعاية المرضى من خلال التأكد من أن المهنيين لديهم المعرفة والمهارات اللازمـة.
 - رعاية التعلـم المستمر (خبرات التعلم الأبعد من تلك اللازمـة لكتـب الشهادة أو الدرجة الأولـية للعمل في مهنة). تقدم بعض المنظمـات دورات في القيادة لمساعدة أعضائـها على التقدـم في وظائفـهم.
 - تشجيع بناء العلاقات بين الأعضـاء.
 - دعم التشريعـات لصالح المهنة.
- إن الخدمة في اللجان، والتطوع للمساعدة في المشاريع، والترشـح للمناصـب هي طرائق ممتازـة للمشارـكة. هناك العـديد من المزايا لأـلخصائيـي الرعاـية الصحـية الذين يشارـكون على أي مستـوى، ومنها:
- تعلم العمل ضمن مجموعة لتحقيق أهداف مشترـكة.
 - مقابلـة المهنيـين المـُحضرـمين القـادـرين على تقديم المشـورة المهـنية كـونـهم قـدوـة إيجـابـية.
 - مواكـبة التـطـورـاتـ الـحالـيـةـ فيـ المـيدـانـ.
 - تـنـميةـ المـهـارـاتـ الإـدارـيةـ.
 - الحصولـ علىـ دـعمـ وـتشـجـيعـ الزـملـاءـ.

اخـبرـ مـعـلومـاتـكـ

1. ماذا يعني "التطور المهني"؟
2. اذكر غايـتين من غـايـاتـ المنـظـماتـ المهـنيةـ.





الشكل "3-6" مواكبة آخر التطورات التكنولوجية أمرٌ مهم: جناح "المملكة العربية السعودية" في معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا.

أهمية التعلم مدى الحياة

The Importance of Lifelong Learning

يقصد **بالتعلم مدى الحياة Lifelong Learning** جميع أنشطة التعلم الهدافة الرسمية وغير الرسمية التي تحدث طوال حياتنا. في عصرنا الحالي يعد التعلم مدى الحياة أكثر أهمية من أي وقت مضى لأن العالم يتغير أسرع من أي وقت مضى. حتى منتصف القرن العشرين، توقع الناس أن يعيشوا بنفس الطريقة التي عاش بها آباؤهم وأجدادهم. أما الآن، فتنتج التطورات الحالية في التكنولوجيا تغييرات كبيرة خلال عمر واحد. على سبيل المثال، نشأ الأشخاص الذين هماليوم في الثمانينيات من العمر بدون تلفزيون. بدأ هؤلاء في الخمسينيات من العمر حياتهم المهنية بدون أجهزة حاسب شخصية، وألات حاسبة محمولة، وهواتف خلوية، والعديد من المنتجات الأخرى التي تعتبر الآن من الضروريات. اليوم، يعتبر معظم الناس التغيير المستمر للمنتجات الجديدة المتاحة، أو سرعة التغييرات الحاصلة في هذه المنتجات بشكل يتطلب تحديدها حتى قبل أن تهترئ بسبب الاستخدام.

ما يجده اختصاصيو الرعاية الصحية الجدد مفاجئاً هو مقدار التعلم المطلوب بعد التخرج لمواكبة التغييرات العديدة التي تؤثر على طريقة أداء الوظائف. على سبيل المثال، تعلم العديد من أفراد القوى العاملةاليوم استخدام الحاسب الشخصي بعد الانتهاء من تعليمهم الرسمي وكانوا موظفين بالفعل. وكان عليهم قضاء بعض الوقت في قراءة الكتب، أو حضور ورش العمل، أو مشاهدة مقاطع الفيديو، أو استخدام البرامج التعليمية لتعلم استخدام ما أصبح الآن أداة أساسية للعمل في مجال الرعاية الصحية. وستستمر الحاجة إلى التعلم في مجال الحاسب وحدها في النمو مع تطوير تطبيقات جديدة وإصدارات محدثة من البرامج والأجهزة (الشكل "3-6").

مواكبة التغييرات في قطاع الرعاية الصحية

Keeping Up With Changes in Health Care

نظرًا للتغير السريع الذي يشهده القطاع الصحي، فإن أساليب الرعاية الصحية تتغير بسرعة أيضًا وعليك مواكبة هذا التغيير كي تكون مؤهلاً بشكلٍ كافٍ. تخرجك يعني نهاية مرحلة رسمية وبدء مرحلة التعلم مدى الحياة.

بالإضافة إلى التكنولوجيا، تتطلب التغييرات والتوجهات الاجتماعية والسكانية أن يكتسب اختصاصيو الرعاية الصحية معارف ومهارات جديدة. ويوضح (الجدول "1-6") أمثلة على التغييرات ومتطلبات التعلم المناسبة لأخصائيي الرعاية الصحية. فقد أصبحت الإجراءات الوقائية القياسية الآن معروفة بشكل شائع في أماكن العمل، لكنها في الواقع من التطورات الحديثة نسبياً. لذا يجب تدريب العاملين



في مجال الرعاية الصحية الذين يعملون في وظائف معينة واختبارهم وفقاً لمعايير مختلفة، بما في ذلك الخصوص لمراجعات سنوية. ويجب على أخصائي المعلومات الصحية الاستمرار في تحديث معرفتهم بإدارة العقود، وأهلية المريض، وإجراءات تحرير الفواتير. كما يعني التحول في التركيبة السكانية للمرضى أن نسبة كبيرة من يقدمون رعاية مباشرة للمرضى سيقضون كثيراً من وقتهم في العمل مع كبار السن.

وقد وسع عدد من مهن الرعاية الصحية نطاق ممارستها في محاولة لزيادة كفاءة الرعاية الطبية. فحالياً يُدرب المهنيون الذين كانوا يؤدون في السابق مجموعة محدودة من المهام على مجالات متعددة ليصبحوا متعدد المهارات. من الأمثلة على الواجبات الإضافية التي تكلّفها بعض المنشآت لمساعدي الطبيين ذكر التالي: العمل في التدريب والاستكشاف الصحي، زيارة منازل المرضى لإجراء تقييمات المخاطر، والعمل فني صيدلة، وأداء واجبات فنية الأشعة ذو الترخيص المحدود. وتطلب بعض هذه الواجبات تدريباً رسمياً إضافياً.

احتياجات التعلم المقابلة بالنسبة للعاملين في المجال الصحي	التغيير
<ul style="list-style-type: none"> مراحل النمو وأحتياجات كبار السن مهارات رعاية المرضى طويلة الأمد رعاية المرضى المصايبين بحالات مزمنة 	صار الناس يعيشون لفترة أطول
<ul style="list-style-type: none"> رعاية مرضى الخرف 	زيادة أعداد المرضى المُشخصة إصابتهم بمرض الزهايمر وأشكال الخرف الأخرى
<ul style="list-style-type: none"> ممارسات وطرق رعاية صحة المريض في المنزل أساليب تغذية المريض 	صارت فترات الإقامة في المستشفى أقصر بكثير مما كانت عليه في الماضي
<ul style="list-style-type: none"> عادات وتقاليد صحية متعددة لغات غير العربية 	زيادة التنوع العرقي والثقافي للسكان
<ul style="list-style-type: none"> معرفة الطب التكميلي والبديل فهم كيفية تأثير استخدام ممارسات الرعاية الصحية المكملة والبديلة على الممارسات الطبية 	زيادة اهتمام المريض بممارسات الرعاية الصحية المكملة، مثل الوخز بالإبر والطب الشمولي
<ul style="list-style-type: none"> ممارسات الترميز وتحرير الفواتير إدارة العقد، والحصول على تقويس مسبق للعلاج، وإذن للإحالة إلى المتخصصين 	زيادة في الممولين من طرف ثالث
<ul style="list-style-type: none"> الممارسات الوقائية لدرء الأمراض والاضطرابات توعية المريض بأساليب الوقاية والعافية 	زيادة الحرص على الصحة ومسؤولية المرضى عن صحتهم
<ul style="list-style-type: none"> تطبيقات الحاسوب في الرعاية الصحية: الإدراة، والتشخيص، والعلاج، والتعليم مهارات تشغيل الحاسوب ومعرفة البرامج 	زيادة الحوسبة
<ul style="list-style-type: none"> انتشار الفيروسات وعودة الأمراض المعدية مثل الحصبة، وخطر الفيروسات بسبب العولمة الأعراض، والعلاج، والوقاية من أمراض معينة 	انتشار الفيروسات وعودة الأمراض المعدية مثل الحصبة، وخطر الفيروسات بسبب العولمة
<ul style="list-style-type: none"> تنقيف المرضى حول الاستخدام السليم للمضادات الحيوية، بما في ذلك متى لا تكون ضرورية 	زيادة البكتيريا مقاومة للأدوية
<ul style="list-style-type: none"> قاعدة مهارات متزايدة المرونة والاستعداد لأداء مجموعة من المهام المتعددة 	توسيع أدوار أخصائي الرعاية الصحية
<ul style="list-style-type: none"> مهارات العمل الجماعي مهارات التواصل بين وضمن المهن 	زيادة التخصص واستخدام الفرق لتقديم رعاية المرضى
<ul style="list-style-type: none"> تشغيل المعدات وتقدير النتائج 	التطوير المتزايد لمعدات متطرفة
<ul style="list-style-type: none"> الاكتشافات الجديدة المؤثرة على المجال المهني للأخصائي المعلومات والمهارات التي تطبق على المجال المهني للأخصائي 	معلومات جديدة حول كيفية عمل جسم الإنسان
	إجراءات التشخيص والعلاجات الجديدة

الجدول "1-6" التغيرات المؤثرة في قطاع الرعاية الصحية.



اخبر معلوماتك

1. ماذا يعني التعلم مدى الحياة؟

2. ما التعلم المهني المطلوب نظراً لأن مدة الإقامة في المستشفى صارت أقصر بكثير مما كانت عليه في الماضي؟

3:6

التعلم الطبي المستمر Continuing Medical Education

التطور المهني المستمر (CPD) والتعلم الطبي المستمر (CME) مصطلحان مختلفان لأنواع التعلم التي تحدث بعد إتمام التعليم الرسمي. ويطلب تجديد معظم أشكال الموافقات المهنية، مثل الترخيص، والشهادة، والتسجيل، استكمال عدد من ساعات الدراسة أو دورات دراسية معينة. ويجب على أخصائيي الرعاية الصحية معرفة متطلبات مهنيهم قبل مواعيد تجديد الترخيص والشهادات بوقت كافٍ لإتاحة الوقت اللازم لتحقيقها.

يختلف مقدار الوقت والأنشطة المعنية باختلاف مهن الرعاية الصحية، حيث يتطلب بعضها إكمال الواجبات أو اجتياز الاختبارات؛ بينما يتطلب بعضها الآخر حضور الصف المدرسي أو ورشة العمل (الشكل "4-6"). وتقدم العديد من الكليات والمؤسسات الطبية فصولاً وأنشطة للتعلم الطبي المستمر. وتقرر المنظمات المانحة للتراخيص، والشهادات، والتسجيلات التعلم الطبي المستمر المقبول لديها. إذ لا تقبل جميع المنظمات بكل الدورات والأنشطة. وقبل الانخراط في أي نشاط بغرض التعلم الطبي المستمر، تأكد من الموافقة عليه من قبل المنظمة المهنية أو الهيئة التنظيمية الملائمة، على سبيل المثال، من قبل الهيئة "السعودية" للتخصصات الصحية (SCFHS).

الشكل "4-6" حضور المحاضرات أو ورش العمل ضروريان لاستمرار التعلم الطبي.

إذا كنت تشارك في ورش عمل أو أنشطة أخرى، فتأكد من القيام بعملية تسجيل الدخول. فلدى بعض المنظمات الآن شارات تُمسح إلكترونيًا لتسجيل الحضور. اطلب أيضًا شهادة تثبت الحضور أو إتمام العمل، لأنها دليل على إنجازك للعمل. احتفظ بشهاداتك بعناية في مكان آمن، واستفسر عما إذا كان لدى منظمتك المهنية نظام تتبع للتعلم الطبي المستمر للأعضاء المنتسبين لها.

تقدّم المنظمات المهنية للرعاية الصحية مجموعة متنوعة من الطرق الملائمة لمساعدة أعضائها على البقاء على اطلاع بأخر المستجدات في مجالهم، وبإمكانهم تزويدك بمعلومات حول التعلم الطبي المستمر الذي تحتاجه في أي مجال أو موضوع. إلى جانب الفصول الدراسية وورش العمل التقليدية، هناك طرائق أخرى للحصول على التعليم الطبي المستمر:

- دورات وورش عمل خاصة تقدّم في الاجتماعات والمؤتمرات والاتقاقيات السنوية التي ترعاها مؤسسات الرعاية الصحية المهنية، ويمكن أن يتطلب الأمر إجراء اختبار، أو إكمال مهمة، أو إثباتاً بأي طريقة أخرى أنك حققت الأهداف المرجوة.
- مواد دراسية منزلية منشورة في مجلات مهنية.
- دورات دراسية عبر الإنترنت برعاية المنظمات المهنية.
- دورات دراسية منزلية مقدمة من قبل مزودي الخدمات التعليمية المعتمدين.
- دورات التعليم عن بعد التي تقدمها الكليات والجامعات. وتتوفر الآن العديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت، حيث يقدم العديد من المؤسسات دروساً تتضمن التفاعل مع المعلم والطلاب الآخرين.

لا تتمتع كل الجهات المؤفّرة للفرص التعليمية بجودة عالية، وليس كل الدورات مفيدة، لذا ضع في اعتبارك المعايير التالية لاختيار الدورات والمواد التي تمنحك أقصى قيمة للا وقت والمالي المستمر فيها:

- توصيات من منظمتك المهنية أو المعتمدة.
- متطلبات المهارة والمعرفة لوظيفتك الحالية.
- الأهداف المهنية المستقبلية.
- مصداقية وسمعة الجهة التعليمية.
- مجالات الضعف الشخصي والمهني التي تحتاج إلى تحسين.
- الاهتمامات الشخصية والمهنية.
- الاعتماد الأكاديمي من قبل مؤسسة مرموقة.

من الممكن أن يوفر صاحب العمل التدريب أثناء الخدمة **In-service training**، وعادة ما يكون هذا إلزامياً، ويتألف من التدريب والتواصل المهمّين لبعض جوانب عمل الموظفين.



اختبر معلوماتك

1. ما المقصود بـ "CME"؟
2. اذكر طريقتين لتلقّي التعلم الطبي المستمر.

4:6 التعلم الموجه للذات Self-Directed Learning

يشير التعلم الموجه للذات **Self-directed learning** إلى جميع الأنشطة التي تخطّط للقيام بها وتشارك فيها لتوسيع دائرة معرفتك ومهاراتك. ويعطي قيمة مضافة لأخصائي ويفتح عينيك على آفاق جديدة. هناك عدد من الطرق لدمج التعلم في حياتك اليومية وهي:

- **راقب الآخرين:** شاهد كيف يؤدي الأخصائيون المخضرمون الناجحون واجباتهم.
- **اطرح الأسئلة:** تعلم من خبرات الآخرين، حيث يسرّ معظم الناس بمشاركة ما يعرفونه (الشكل "5-6")، لكن تأكّد من اختيار الوقت المناسب لطرح الأسئلة. على سبيل المثال، لا تطرح أسئلة حول المرض في وجودهم أو عندما يكون الأخصائي الآخر مشغولاً للغاية ولا يمكنه التوقف لتجاذب أطراف الحديث.
- **اقرأ الكتب والمقالات الصحفية:** خصص وقتاً منتظماً لمتابعة المنشورات المتعلقة بمجال عملك. تنشر معظم المنظمات المهنية نشرة إخبارية أو مجلة، عبر الإنترن特 أو مطبوعة. كما أنّ هناك المئات من المجالات المتخصصة التي تغطي موضوعات الرعاية الصحية والطبية. كما يوجد في العديد من منشآت الرعاية الصحية الكبيرة مكتبات للموظفين، وبعضها بها مكتبات مفتوحة للمرضى والعوام، كما تسمح العديد من الجامعات والكليات للعوام باستخدام مكتباتهم.
- **ادرس ضمن مجموعة صغيرة:** نظم مجموعة دراسية مع موظفين آخرين في العمل. وإذا كنت تتّبع إلى مجموعة دراسية في المدرسة ففكّر في تشجيع الأعضاء على الاجتماع بانتظام بعد التخرج. ويمكنك التعلم من خلال مشاركة الخبرات في مكان العمل والعمل على موضوعات محددة للبقاء على اطلاع دائم في مجال عملك.



الشكل "5-6" تعلم من خبرات الآخرين، حيث يُسرّ معظم الناس بمشاركة ما يعرفونه.



• احضر المؤتمرات واللقاءات المهنية: تتضمن هذه غالباً محاضرات، وورش عمل، ومناقشات حول المواضيع الحالية.

• استكشف الإنترن特: توفر الإنترن特 معلومات حول جميع أنواع المواضيع وبمختلف الأشكال، بما في ذلك البث عبر الإنترن特، والبودكاست، ومقاطع الفيديو. حيث يحتوي موقع [Youtube.com](https://www.youtube.com) على عشرات مقاطع الفيديو والقنوات التعليمية حول مواضيع الرعاية الصحية. وتتناول حوارات تيد (Ted Talks) الموضوعات الرائجة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرعاية الصحية (<https://www.ted.com/talks>).

ويتيح لك التخطيط لأنشطتك الدراسية التعلم بالطرق التي تفضلاها، فابحث عن الأنشطة التي تجعل التعلم ممتعاً وادمجها في حياتك اليومية، وانظر للعالم على أنه فصل دراسي ضخم يوفر فرصاً غير محدودة للتعلم. يجب أن تكون مواكبة التغيرات وتدعم قاعدة معارفك ومهاراتك جزءاً من روتين عملك فستشعر بالرضا بمعرفة أنك ما زلت على اطلاع دائم وكفاءة عالية.

بالإضافة إلى تطوير مهارات الرعاية الصحية يمكنك التقدم في حياتك المهنية والشخصية عبر تعزيز المهارات غير الفنية. ويعتبر كلّ من التواصل الشفوي والكتابي، والعلاقات الشخصية، وتطبيقات الحاسوب، وإدارة الوقت أمثلة على المهارات المهمة التي ستساعدك على المضي قدماً في عملك.

تعلم من الأشخاص القدوة والمرشدين

Learn From Role Models and Mentors

القدوة **Role Model** هو الشخص الذي يجسد مثالاً إيجابياً ويُظهر مستويات عالية من الاحترافية والكفاءة، ويسعى جاهداً ليكون أفضل ما يمكن، ويلهم الآخرين بقدراته، وشجاعته، وتقانيه. ويعدّ السير على خطى قدوة ملائمة طريقة ممتازة لمهني الرعاية الصحية الجدد لمواصلة التعليم الذي تلقوه أثناء التدريب الرسمي.

ما الصفات التي يجب البحث عنها عند اختيار قدوة؟

ابحث عن شخص:

- يكرس نفسه لمهنته.
- لديه مهارات فنية جيدة.
- يحترم الآخرين.
- لديه معايير عالية.
- يمتلك الثقة المُكتسبة بالخبرة.
- يتمتع بمستوى عالٍ من النزاهة.
- لديه القدرة على العمل بشكل جيد مع الناس.
- يفهم مجال الرعاية الصحية.



من هو المرشد؟

المرشد Mentor هو مزيج من المدرب الشخصي والمستشار، ويجب أن يتمتع أيضًا بصفات القدوة. ويعتبر وجود مرشد جيد ميزة مهنية هائلة، إلا أن المرشد لن يأتيك من تقاء نفسه وعليك أنت البحث عنه في شخص لديه خبرة مهنية، ومعرفة واسعة، واهتمام بمساعدة الآخرين، ووقت ليقضيه معك. ربما يعمل المُرشد في نفس القسم أو المنشأة أو يكون شخصًا تقابله في لقاء مهني أو من خلال أنشطة بناء شبكة علاقات العمل المُتبعة أثناء البحث عن وظيفة (الشكل "6-6").

تتضمن بعض الطرائق التي يمكن للمرشد أن يساعد بها أخصائي الرعاية الصحية المستجد ما يلي:

- اقتراح مصادر للتعلم.
- تقديم الاقتراحات والنصائح حول الاستراتيجيات المهنية.
- التعريف بأناس في الميدان.
- تمرير المعلومات حول فرص العمل.
- تشجيعك على إخراج أفضل ما لديك.

اخبر معلوماتك

1. ما التعلم الموجه للذات؟

2. لمَ يعتبر وجود مرشد أفضلية؟

الشكل "6-6" ربما يعمل المُرشد في نفس القسم أو المنشأة أو يكون شخصًا تقابله في لقاء مهني أو من خلال بناء شبكة علاقات مُتبعة أثناء البحث عن وظيفة.



للمهن مناصب على مستويات مختلفة، تقارن بالدرجات على سلم. ورغم أن العديد من أخصائيي الرعاية الصحية يحصلون على الرضا الوظيفي والنجاح من خلال البقاء على مستوى واحد، فإن آخرين يهتمون "بصعود **السلم الوظيفي** "Career Ladder" عبر تحصيل تعليم وخبرة إضافية. ومن المهم معرفة أن العمل على مستويات مختلفة، في نفس المجال، له أشكال متنوعة، منها:

- وقت يقضى في العمل مباشرة مع المرضى.
- الأعمال الورقية والتقارير المطلوبة.
- العمل بشكل وثيق مع مشرف أو بشكل مستقل (الشكل "7-6").
- تطوير بيئة العمل.
- الواجبات الإضافية وتحمل مسؤوليتها.

لذا يستحسن أن يتعلم أي شخص يفكر في "الارتقاء في السلم" كل ما هو ممكن حول المتطلبات التعليمية، والواجبات المفروضة، وأفاق التوظيف للمستوى الجديد.

اخبر معلوماتك

اذكر مثالين للعمل على مستويات مختلفة في مجال الرعاية الصحية.

الشكل "7-6" ربما يشمل الارتفاع في السلم الوظيفي العمل بشكل وثيق مع مشرف.





الشكل "8-6" يحتاج مرضى السكري إلى مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق ثقب أصابعهم بآية للحصول على الدم.

وباستخدام هذه الأجهزة يمكن لمرضى السكر تجنب ثقب الأصابع المتكرر للحصول على الدم، ويمكنهم فحص مستويات الجلوكوز لديهم بسهولة وباستمرار. وهناك جهاز آخر قيد التقييم حالياً ويطبق أيضاً على الجلد، ويحتوي على ثقب صغيرة في قاعدته لتجميع العرق، وينقل العرق إلى خزانات صغيرة في الجهاز، ويحتوي كل خزان على مستشعر يتفاعل مع مادة كيميائية معينة في العرق مثل الجلوكوز عند مرضى السكري، واللاقات عند المصابين بالتأليف الكيسي، وحتى مستويات الأكسجين للمصابين بأمراض الجهاز التنفسى. ويُجرى بحث مماثل على العرق على الأصابع، حيث يبني المهندسون الحيوانون الآن أجهزة استشعار تقيس بشكل نوعي مجموعة واسعة من المواد. قد تمر سنوات عديدة قبل توافر أجهزة الاستشعار للاستخدام التجارى، ولكن إذا ثبت نجاحها، فستتوفر المستشعرات طريقة أسهل لإجراء العديد من الفحوصات الطبية.

لا مزيد من اختبارات الدم والبول؟

تُستخدم اختبارات الدم والبول لتشخيص العديد من الأمراض المختلفة وللحصول من الحالة الصحية للجسم. وقد يكون الحصول على الدم مؤلماً، كما أن جمع عينات البول قد يسبب فوضى. لكن الآن، وبفضل التكنولوجيا الحيوية، صار من الممكن استخدام الدموع، والعرق، واللعاب لإجراء الاختبارات التشخيصية. فمثلاً يحتاج ما يقدر بنحو 402 مليون مريض بالسكري في جميع أنحاء العالم إلى مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم عدة مرات في اليوم عن طريق ثقب أصابعهم بإبرة للحصول على الدم (الشكل "8-6"). في هذا الخصوص، استخدم المهندسون في أبحاثهم الأولية رقاقة بيولوجية صغيرة تحوي الآلاف من أجهزة قياس الضوء لقياس كمية الجلوكوز في الماء، فوجد الباحثون أن هذا المستوى مشابه لمستويات الموجودة في اللعاب. ووجد باحثون آخرون أنه يمكنهم قياس مستويات الجلوكوز في دموع الفئران باستخدام جهاز استشعار حيوي مماثل. فإذا كان بإمكان مرضى السكر استخدام الدموع أو اللعاب لقياس مستويات الجلوكوز، فسيتجنبون الانزعاج المرافق لثقب الأصابع المتكرر. إحدى المشكلات التي واجهها الباحثون هي أنهم لا يستطيعون دائماًربط مستويات الجلوكوز في الدم بمستويات الجلوكوز في اللعاب والدموع. وطورت الأبحاث الأخيرة أجهزة استشعار حيوية يمكن تطبيقها على الجلد، فتقيس هذه المستشعرات مستويات الجلوكوز في السائل المحيط بالخلايا، ويوصل جهاز إرسال صغير بالمستشعر وعند وضع مسجل فوق المستشعر، ستظهر قراءة الجلوكوز على الشاشة،

خلاصة دراسة الحالة

تفوّت مريم على نفسها فرص التطور الوظيفي، وقد لا تكون قادرة على الارتقاء في السلم الوظيفي لأنها لم تواكب مهنتها. وتعامل مع المؤتمرات السنوية على أنها فرصة لرؤية صديقاتها وليس وسيلة لاكتساب مهارات و المعارف جديدة. ربما تجد طريقة بديلة للتعلم تناسبها بشكل أفضل؟ وإذا فعلت ذلك، فستكون قادرة على الحفاظ على مهاراتها والبقاء عضوة مفيدة في مجال الرعاية الصحية.

ملخص الفصل 6

- يصف كلّ من التطور المهني المستمر/التعلم الطبي المستمر أنواع التعلم التي تحدث بعد إتمام التعليم الرسمي. ويختلف مقدار الوقت والأنشطة المعنية باختلاف مهن الرعاية الصحية.
- يتيح لك التعلم الموجه ذاتياً التعلم بالطرق التي تفضلها.
- يمكن أن يكون الأشخاص القدوة والمرشدون مفیدين في تعزيز الاحترافية والكفاءة.
- للمهن مناصب على مستويات مختلفة، تقارن بالدرجات على سلم، وغالباً ما يطلق عليها "السلم الوظيفي".
- التطور المهني ضروري لمواكبة التطورات في مهنة الرعاية الصحية. ويمكن للمنظمات المهنية الإسهام بشكل إيجابي في التطور المهني لأعضائها.
- يعد التعلم مدى الحياة أكثر أهمية من أي وقت مضى لأن العالم يتغير أسرع من أي وقت آخر في التاريخ. فسرعان ما تصبح المعرفة قديمة العهد، وفي غضون سنوات قليلة من دخول مجال الرعاية الصحية، يصبح الفرد الذي يفشل في مواكبة المعلومات الحالية غير مؤهل.

حالة دراسية بسيطة 6: تعلم مهارات جديدة

عملت أسماء دائمًا في جناح طبي عام، ولكن طلب منها الانتقال إلى قسم الشيخوخة، وهي لا تعرف الكثير عن العمل مع كبار السن.

التحليل

1. ما الذي يجب أن تعرفه أسماء قبل تولي منصبها الجديد؟

2. كيف يمكنها معرفة المزيد عن المشكلات المحتملة لكبار السن؟

3. من يمكنها طلب المساعدة؟



حالة دراسية بسيطة 2:6 مساعد طبي جديد

عمر مساعد طبي جديد في قسمك، وغير متأكد من كيفية مواكبة التطور المهني. أنت مساعد أكثر خبرة وعضو نشط في منظمة طبية مهنية محلية. يسألك عمر عما يجب عليه فعله لتحسين مهاراته.

التحليل

1. ما الطرق التي تقترحها على عمر لبدء رحلته في التطور المهني؟

2. كيف يمكنك استخدام شبكة معارفك الخاصة لمساعدة عمر؟

3. ماذا يمكن أن تخبر عمر عن مزايا الانضمام إلى المنظمة الطبية المهنية؟

حالة دراسية بسيطة 3:6 البحث عن مرشد

عمل أمير ممراضًا مساعدًا في مستشفى محلى لمدة ستة أشهر. ويشعر أنه يحتاج إلى دعم لتطوير مهاراته، فيسأل صديقه حسن الذي يعمل في منطقة أخرى بالمستشفى عما يمكنه فعله. فيقترح عليه حسن أن يطلب من زميل أكثر خبرة أن يُرشده.

التحليل

1. ما الصفات التي يجب أن يبحث عنها أمير في المرشد ولماذا هذه الصفات مهمة؟

2. ما المزايا التي يمكن أن يجنيها أمير من وجود مرشد؟

3. ماذا يفعل أيضًا كي يتطور نفسه؟



أسئلة المراجعة

1. اذكر ثلاث طرائق يمكن أن ينمو بها أخصائي الرعاية الصحية مهنياً.

2. عدد خمس مزايا للمشاركة في منظمة مهنية.

3. لماذا يعد التعلم مدى الحياة مهماً لأخصائي الرعاية الصحية؟

4. صِف خمسة تغييرات وتوجهات في الرعاية الصحية. ما متطلبات التعلم لأخصائي الرعاية الصحية المقابلة لكل منها؟



5. ما معنى وأهمية "نطاق الممارسة الموسع"؟

6. ما معايير اختيار الدورات والمواد التعليمية ذات الجودة للتعلم الطبي المستمر؟

7. ضع قائمة بأربع طرائق يمكنك من خلالها دمج التعلم الموجه للذات في حياتك اليومية.

8. ما الصفات الخمس التي يجب البحث عنها عند اختيار قدوة؟

9. ما الذي يجب أن تبحث عنه في المرشد؟



١٠. ما الذي يجب أن يتعلم الشخص الذي يفكر في الارقاء في السلم الوظيفي؟

التفكير الناقد

١. نورة مساعدة تمريض تعمل في عيادة طبيب في بلدة صغيرة. بسبب محدودية عدد منشآت الرعاية الصحية في المنطقة، يعتمد عدد من المرضى منذ فترة طويلة على هذا الطبيب المعطاء لتلبية معظم احتياجاتهم الصحية. وتستمتع نورة بالتجارب المتنوعة التي تواجهها أثناء ممارسة عملها في العيادة؛ حيث تواجه مرضى من جميع الأعمار يعانون من جميع أنواع المشكلات الصحية. أحد الأهداف المهنية المهمة لها هو تحديد مهاراتها على الدوام والاستمرار في اكتساب مهارات جديدة، لكنّ فرص التعلم المتاحة لها محدودة بسبب ازدحام جدول عملها والمسؤوليات العائلية والعيش في بلدة صغيرة. ضع خطة طويلة المدى لنورة لتحقيق هدفها.



2. اكتب نصاً تصفُ فيه مُرشدك المثالي. وحلل الطرائق التي يمكن أن يساعدك بها مرشدك على التطور.

التمرينات

1. ضع خطة شخصية للتعلم الموجه للذات.
2. اطلب دليل التعلم المستمر من كلية أو جامعة محلية. ما أنواع الدورات المقدمة؟ حدد أيّاً من الأشياء التي قد تساعدك على تطوير مهاراتك الشخصية أو المهنية، واكتب أسبابك للتقدم للدورة.
3. اختر موضوعاً صحيّاً تجده ممتعًا وابحث عنه على الإنترنت. سجل نتائجك واكتب قائمة مصادر (قائمة بالمواقع مع الاسم، وعنوان الويب، ووصف موجز للمحتويات) للموقع المفيدة.

قائمة المصطلحات

أ

التهاب المفاصل

Arthritis

مرض التهابي يصيب المفاصل، فتصبح متيبسة، وأقل مرونة بالحركة، وتسبب شعوراً بالألم.

استقلالية

Autonomy

الحكم الذاتي أو القدرة على اتخاذ القرار بشكل مستقل والسعى في مسار فعال.

استماع فعال

Active Listening

التركيز بكامل جوارحك على ما يقوله المتحدث.

إعتام عدسة العين (الساد)

Cataract

حالة تصبح فيها عدسة العين الشفافة عادة غائمة أو معتمة، ما يؤدي إلى العمى.

أعراض

Symptoms

البيانات الذاتية التي يبلغ عنها المريض والتي لا يمكن ملاحظتها أو قياسها مباشرةً من قبل أخصائي الرعاية الصحية.

انتفاخ الرئة

Emphysema

حالة تنفسية مزمنة تحدث عندما تتدحر جدران الحويصلات الهوائية (الأنساخ) وتفقد مرونتها مما يؤدي إلى ضعف تبادل الغازات في الرئتين.

التهاب الشعب الهوائية

Bronchitis

التهاب حاد أو مزمن في الشعب الهوائية (أنابيب الهواء في الرئتين).



ب

تخدير

Anesthesia

الحالة التي يصبح فيها الجسم فاقد القدرة على الشعور بالإحساس، وخاصة الإحساس بالألم.

تدلي

Dangling

وضع المريض في وضع الجلوس مع وضع قدميه وساقيه على جانب السرير قبل التمشي.

تصلب الشرايين

Arteriosclerosis

حالة تصبح فيها جدران الأوعية الدموية سميكة وتفقد مرونتها.

تصلب عصيدي

Atherosclerosis

حالة تصبح فيها الأوعية ضيقة بسبب ترسب الدهون والمعادن على الجدران الداخلية للشرايين.

تغذية راجعة

Feedback

طريقة تستخدم للتحقق من فهم ما يقال، وتتكون من إعادة الصياغة والتأمل وتوجيه الأسئلة.

تفوط (تبَرَّز)

Defecate

إخراج المواد البرازية (الفضلات) من الأمعاء عبر المستقيم.

تقييم

Assessment

جمع المعلومات والتحقق من معناها.

بعد الجراحة

Postoperative

بعد إجراء العملية الجراحية.

بيانات ذاتية

Subjective Data

شيء يبلغ عنه المريض وتعذر ملاحظته أو قياسه من قبل أخصائي الرعاية الصحية.

بيانات موضوعية

Objective Data

حقائق؛ أشياء يمكن ملاحظتها أو قياسها واختبارها.

بريد صوتي

Voicemail

نظام اتصال إلكتروني، يوجه المتصل لترك رسالة إذا لم يكن الشخص متاحاً، أو يوجه المتصل للاتصال بشخص آخر.

بوابة المريض

Patient Portal

موقع انترنت آمن على الشبكة، أسيّسه طبيب، أو منشأة رعاية صحية، أو أي مقدم رعاية صحية آخر.

ت

تبول

Urinate

طرد البول من المثانة.

تبول ليلي (بُوال ليلي)

Nocturia

التبول المفرط في الليل.



تطور مهني مستمر (CPD) Continuing Professional Development (CPD)	عملية مستمرة لتطوير المهارات المهنية للفرد والحفاظ عليها.	ال التواصل العلاجي Therapeutic Communication	ال التواصل الفعال في مجال الرعاية الصحية.
تطور مهني Professional Development	السعى للتحسن باستمرار وأن تكون الأفضل في مهنتك.	تواصل غير لفظي Nonverbal Communication	ال التواصل الذي لا يتضمن التحدث: نبرة الصوت ولغة الجسد والإيماءات وتعابير الوجه واللمس والمظهر الجسدي.
تعلم طبي مستمر (CME) Continuing Medical Education (CME)	تعليم أو تدريب أخصائيي الرعاية الصحية لمواكبة آخر التطورات في الميدان الطبي.	توجيه للواقع Reality Orientation	النشاطات التي تساعد على تعزيز الوعي ومعرفة الأشخاص والزمان والمكان.
تعلم مدى الحياة Lifelong Learning	جميع أنشطة التعلم الهدافة الرسمية وغير الرسمية، التي تجري طوال حياتنا.	تاريخ طبي Medical History	سجل يوضح جميع الأمراض، والأدواء، والعمليات الجراحية التي خضع لها المريض.
تعلم موجه للذات Self-Directed Learning	جميع الأنشطة التي يخالط لها الفرد ويشارك فيها لزيادة معرفته ومهاراته.	تدريب أثناء الخدمة In-Service Training	تدريب يقدمه صاحب العمل مخصص لتلبية حاجات الموظفين.
ج		ترندينبورغ Trendelenburg	وضعية يستلقي فيها المريض على ظهره ويكون رأسه أخفض من قدميه، أو يميل فيها كل من الرأس والقدمين إلى الأسفل.
جراحي/أثناء الجراحة Operative/Intraoperative	خلال إجراء العملية الجراحية.	تصنيف دولي للأمراض International Classification of Diseases	قاعدة البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي ترمّز بها المصطلحات السريرية.
جفاف Dehydration	الحالة التي تكون فيها كميات السوائل في الأنسجة غير كافية.		



جس

Palpation

فعل استخدام اليدين لتحسس أجزاء الجسم أثناء الفحص.

حرف

Dementia

فقدان القدرة العقلية التي تميز بانخفاض في القدرة الفكرية، وفقدان الذاكرة، وضعف الحكم، وتبدل الشخصية، والتوهان.

ح

حبسة كلامية

Aphasia

فقدان أو ضعف القدرة على استخدام اللغة أو فهمها، ويحدث ذلك نتيجة إصابة أو تلف في الدماغ.

حدة البصر

Visual Acuity

القدرة على إدراك وفهم أشعة الضوء؛ الرؤية.

حُسر

Myopia

قصر النظر، وهو عيب في الرؤية البعيدة.

حفظ السجلات المالية

Bookkeeping

عملية تسجيل المعاملات المالية في الشركة.

حفظ الملفات

Filing

ترتيب ملفات بشكل منظم.

ز

زرق

Glucoma

مرض يصيب العين يزداد فيه ضغط العين ويتدخل مع الرؤية.

خ

خثرة

Thrombus

جلطة دموية.



س

سيمز (على الجانب الأيسر) (Sims') left lateral

وضعية يستلقي فيها المريض على جانبه الأيسر مع ثني الساق اليمنى للأعلى قرب البطن.

ضيق التنفس Dyspnea

صعوبة التنفس أو التنفس مع بذل الجهد.

سكتة دماغية وعائية

Cerebrovascular Accident

تسمى أيضاً حادث دماغي أو السكتة؛ تنتج عن انقطاع إمداد الدم إلى الدماغ، بسبب تكون جلطة (خثرة)، أو انسداد شريان، أو تمزق الأوعية الدموية.

سلس بولي

Incontinence

عدم القدرة على التحكم في التبول.

ستائر

Drapes

عسر البلع Dysphagia

صعوبة في البلع.

أغطية من الورق أو القماش توضع على جسم المريض أثناء الإجراءات الطبية للمحافظة على التعقيم أو ل توفير الخصوصية.

علامات Signs

البيانات الموضوعية التي يمكن مشاهدتها على المريض.

سجل صحي إلكتروني

Electronic Health Record (EHR)

نسخة مخزنة على الكمبيوتر لكامل معلومات المريض الطبية.

سلم وظيفي

Career Ladder

المستويات المختلفة ضمن مجال مهني ما، والتي تتطلب درجات مختلفة من التعليم والتدريب.

سماعة طبية

Stethoscope

أداة تستخدم للاستماع إلى أصوات الجسم الداخلية.

عملية حل المشكلات Problem-Solving Process

طريقة خطوة بخطوة لإيجاد إجابة لسؤال واحد أو أكثر.

عينة Specimen

مقدار (من مادة سائلة أو صلبة) يؤخذ للاختبار في المختبر.

عقدة Node

بنية بيضاوية صغيرة (غدة) على شكل حبة الفول. هي جزء من جهاز المناعة في الجسم.



غ

غرز

Sutures

أنبوب من المطاط أو المعدن أو من أي نوع آخر من الأنابيب التي تُدخل إلى تجويف الجسم، وتستخدم لحقن السوائل أو إزالتها.

قسطرة
Catheter

قطب جراحية تستخدم لجمع حواف شق أو جرح، وتطلق أيضاً على المناطق التي تلتقي فيها العظام أو تلتحم معاً.

قدوة

Role Model

الشخص الذي يعتبر مثلاً إيجابياً.

ف

فرغ

Ostomy

عملية النقر على أجزاء مختلفة من الجسم أثناء الفحص.

فتحة تم إنشاؤها جراحياً في جزء من الجسم.

قرع

Percussion

Fowler's

فاولر

وضعيّات يكون فيها المريض مستلقاً على ظهره رافعاً رأسه بواحدة من عدة زوايا مختلفة.

ل

لغة الجسد

Body Language

فرز

Triage

وضعية الجسم والحركات التي تحمل رسائل إلى الشخص المراقب.

طريقة لترتيب أولويات المعالجة.

ق

قبل الجراحة

Preoperative

قبل إجراء العملية الجراحية.

م

متلقي

Receiver

قرحة الضغط

Pressure Ulcer

المستمع في محادثة ما. الشخص الذي يوجه له المرسل الكلام والرسالة.

وتسمى أيضاً قرحة الاستلقاء أو قرحة الضغط أو قرحة الفراش؛ قرحة ناجمة عن الضغط على منطقة من الجسم لفترات طويلة مما يعيق جريان الدورة الدموية.

مجال الممارسة

Scope of Practice

المسموح لك قانوناً القيام به في مهنتك.



مُرشد	Mentor	محاذاة
شخص جامع بين صفات المدرب والمستشار، يمكنه تقديم المعلومات والتشجيع اللازم.		وضع الجسم ودعمه بحيث تكون جميع أجزاء الجسم في الوضعية التشريحية الصحيحة.
مماسك	Hemostat	مرسل
أداة تستخدم لضغط (لقط) الأوعية الدموية بهدف إيقاف النزيف.		المتكلم في محاذاة ما، وهو من يخلق الرسالة ويتوّلى إيصالها.
مشرط	Scalpel	مرض الزهايمر
أداة بشفرة سكين تستخدم لشق (قطع) الجلد والأنسجة.		Alzheimer's Disease
ملاحظة	Observation	مرض دماغي متتطور يدمّر خلايا المخ؛ مما يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك، و يؤثر بشدة في عمل وحياة الشخص المصاب ونمط حياته الاجتماعي، فيتدهور وضع المريض المصاب بمرور الوقت، و غالباً يؤدي إلى الوفاة. ويصنف مرض الزهايمر اليوم بكوته السبب الرئيس السادس للوفاة عالمياً.
فعل النظر إلى شيء ما أو مراقبته أو إدراكه أو ملاحظته أثناء الفحص.		
ملقط	Forceps	مخرجات
أداة تستخدم لالتقاط الأشياء وحملها، ويمكن أن تكون مستقيمة أو منحنية مع مقبضين للأصابع.		Output
منظار	Speculum	جميع السوائل التي يتخلص منها المريض.
أداة تستخدم لتوسيع أو تكبير فتحة أو ممر في الجسم بغرض الفحص.		مدخلات
مبعد	Retractor	جميع السوائل التي يتناولها المريض.
		Intake
		مد البصر
		Hyperopia
		بعد النظر؛ وهو عيب في الرؤية القريبة.



نراة

Integrity

الصدق في جميع الأوقات؛ احترام خصوصية الآخرين؛
أن تكون مخلصاً وتحمّل مسؤولية أفعالك.

نظافة شخصية

Personal Hygiene

العناية بالجسم، وتشمل الاستحمام، والعناية بالظهر،
والعناية بالمنطقة الواقعة بين الأعضاء التناسلية
وفتحة الشرج، ونظافة الفم، والعناية بالشعر، والعناية
بالأظافر، والحلقة، عند الضرورة.

نمش الشيخوخة

Senile Lentigines

بعض صفراء أو بنية اللون تظهر على الجلد مع التقدّم في
العمر.

نوبة نقص التروية العابرة

Transient Ischemic Attack (TIA)

نوبة قصيرة تعطل تدفق الدم إلى الدماغ وتسبّب أعراضًا
مشابهة لأعراض الحادث الوعائي الدماغي أو السكتة
الدماغية؛ تسمى في كثير من الأحيان بسكتة دماغية
صغريرة.

نظام الاستدعاء

Paging System

نظام يسمح بالاتصال بالفرد عبر استخدام جهاز النداء
أو الصافرة، ويمكن لجهاز النداء أن يصدر رسالة
صوتية، أو إشارة مثل صافرة تنبه الفرد للاتصال برقم
معين لتلقي الرسالة، أو رسالة رقمية على شاشة عرض
تحتوي على رسالة أو رقم هاتف المتصل.

هذيان

Delirium

حالة من التشوش العقلي الحاد، والقابل للرجوع، وينتُج
عن الإصابة بمرض ما، أو مشكلات طبية، أو تناول أدوية
معينة

شاشة العظام

Osteoporosis

حالة تصبح فيها العظام مسامية وهشة بسبب نقص أو
فقدان الكالسيوم والفسفور والمعادن الأخرى.

هامش زمني

Buffer Period

مدة زمنية تبقى متاحة في جدول المواجه للسماح
باستقبال حالات الطوارئ والمكالمات الهاتفية وغيرها
من المواقف غير المخطط لها.

وحدة تصريف البول

Urinary Drainage Unit

جهاز خاص يستخدم لجمع البول، ويتألف من أنابيب
وكيس جمع وعادة ما تكون متصلة بالقسطرة البولية.

وذمة

Edema

تورم الأنسجة الناتج عن كمية زائدة من السوائل في
الأنسجة.



وحدة التوجيه الآلي

Automated Routing Unit

نظام يجيب على الهاتف، ويستخدم صوتاً مسجلأً لتقديم التوجيهات للمتصل.

وضعية استئصال الحصاة

Lithotomy

وضعية يستلقي فيها المريض على ظهره ويضع قدميه في الركاب، ويثنى ركبتيه ويبعدهما عن بعضهما.



National Geographic Learning,
a Cengage Company

Health Care

Program Director: Sharon Jervis
Senior Program Manager: Claire Merchant
Ministry Program Manager: Anna Missa
Project Manager: Lisa Darrand
Head of Design and Production: Celia Jones
Senior Production Manager: Phillipa
Davidson-Blake
Designers: EMC Design Ltd
Saudi Arabian Review Team: Dr. Dhafer Alqarni,
Dr. Sary Alsanea, Dr. Abdulsalam Alhaidary,
Dr. Nawal Alissa

© 2023 Cengage Learning, Inc.

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright herein may be reproduced or distributed in any form or by any means, except as permitted by U.S. copyright law, without the prior written permission of the copyright owner.

"National Geographic", "National Geographic Society" and the Yellow Border Design are registered trademarks of the National Geographic Society
® Marcas Registradas

For permission to use material from this text or product,
submit all requests online at cengage.com/permissions

Further permissions questions can be emailed to
permissionrequest@cengage.com

Student Edition: 978-603-514-024-9

National Geographic Learning

Cheriton House, North Way,
Andover, Hampshire, SP10 5BE
United Kingdom

Locate your local office at international.cengage.com/region

Visit National Geographic Learning online at ELTNGL.com

Visit our corporate website at www.cengage.com

Credits:

Cover SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images; **4** - jijomathaidesigners/Shutterstock; **20** - Chinnapong/Shutterstock; **22** - Arabsstock; **24** - Cengage Learning, Inc.; **27** - Cengage Learning, Inc.; **32** - SofikoS/Shutterstock; **34** - Arabsstock; **36** - Cengage Learning, Inc.; **41** - Arabsstock; **42** - Arabsstock; **47** - FatCamera/Getty Images; **53** - Jabah Media Production/The Stock; **67(t)** - Based on data from the Saudi Elderly Survey 2017; **67(b)** - Based on data from the Saudi Elderly Survey 2018; **69** - Katarina Premfors/arabianEye; **71** - Marcin Moryc/Shutterstock; **72** - Toa55/Shutterstock; **75(t)** - Art Directors & TRIP / Alamy Stock Photo; **75(b)** - Enriscapes/Shutterstock; **79** - Motortion Films/Shutterstock; **82** - Arabsstock; **85** - Arabsstock; **86** - dieddin/Shutterstock; **88** - Nick Davidson/arabianEye; **90(t)** - Courtesy Care Trak International, Inc.; **90(r)** - Ivonne Wierink/Shutterstock; **90(l)** - Gonzo Photo/Shutterstock; **92** - Westend61 GmbH / Alamy Stock Photo; **93** - Yuri Arcurs / Alamy Stock Photo; **104** - Cengage Learning; **105** - Arabsstock; **108(r)** - Zay Nyi Nyi/Shutterstock; **108(l)** - Douglas Olivares/Shutterstock; **108(c)** - Cengage Learning; **109** - Cengage Learning; **110** - Darren Lingard; **111** - Courtesy of Medline Industries Inc., 1-860-MEDLINE; **111(t)** - Cengage Learning; **111(b)** - Cengage Learning; **113** - Darren Lingard; **115** - Darren Lingard; **117** - Darren Lingard; **118** - Darren Lingard; **121** - Darren Lingard; **122** - Darren Lingard; **125** - Darren Lingard; **125** - Cengage Learning; **127** - Tasneem Alsultan; **128** - Cengage Learning; **131(t)** - CatbirdHill/Shutterstock; **131(c)** - Cengage Learning; **131(b)** - Cengage Learning; **132(t)** - Dorling Kindersley Ltd / Alamy Stock Photo; **132(b)** - Cengage Learning; **134** - Cengage Learning; **135** - Tasneem Alsultan; **137(r)** - Steve Lovegrove / Shutterstock; **137(l)** - mindfulness/Shutterstock; **138(t)** - DR P. MARAZZI / SCIENCE PHOTO LIBRARY; **138(b)** - SCIENCE PHOTO LIBRARY; **139(t)** - Cengage Learning; **139(b)** - Tasneem Alsultan; **140** - Cengage Learning; **144** - NIKCOA/Shutterstock; **145** - Cengage Learning; **147(t)** - Nisitmicrostock / Shutterstock; **147(c)** - drawdrawdraw/iStock; **147(b)** - Cengage Learning; **148(r)** - Courtesy of Medline Industries Inc., 1-860-MEDLINE; **148(l)** - VallarieE/Getty Images; **149** - Cengage Learning; **150** - Cengage Learning; **151** - Cengage Learning; **152** - NataKor/Shutterstock; **153** - Photo Melon / Shutterstock; **154(t)** - GladkovPhoto/Shutterstock; **154(c)** - Claudio Caridi/Shutterstock; **154(b)** - GIPHOTOSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRARY; **146** - Jabah Media Production; **159** - Cengage Learning; **161** - Cengage Learning; **162** - Leah-Anne Thompson / Shutterstock; **164(tr)** - nednapa/Shutterstock; **164(tl)** - flubydust/iStock; **164(br)** - Vitaliy Hrabar/Shutterstock; **164(bl)** - Max Labeille/Getty Images; **166** - TomoTaro/Shutterstock; **179** - Pixel-Shot / Shutterstock; **180-187** - Mohammad I. El Mouzan, Abdullah A. Al Salloum, Abdullah S. Al Heribsh, Peter J Foster, Mansour M. Qurashi, Ahmad A. Al Omar.; **189(t)** - SCIENCE PHOTO LIBRARY; **189(c)** - Oradol/Shutterstock; **189(b)** - VOISIN / PHANIE / SCIENCE PHOTO LIBRARY; **190** - Tasneem Alsultan; **191** - Iryna Inshyna/Shutterstock; **192(t)** - Gorloff-KV/Shutterstock; **192(b)** - Cengage Learning; **193** - Pixel-Shot/Shutterstock; **194** - Cengage Learning; **199** - Darren Lingard; **200** - Darren Lingard; **200(bl)** - Courtesy of Midmark Corp.; **201** - Cengage Learning; **203** - Tasneem Alsultan; **204** - Cengage Learning; **205** - MINT IMAGES / SCIENCE PHOTO LIBRARY; **206(t)** - PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRARY; **206(b)** - Courtesy of Bruce Black, MD, Brisbane, Australia; **209** - Courtesy of Miltex, Inc.; **210** - Cengage Learning; **212** - Cengage Learning; **215(tr)** - Cengage Learning; **215(tl)** - Cultura Creative RF / Alamy Stock Photo; **215(b)** - Cengage Learning; **216** - Cengage Learning; **218** - Courtesy of Quinton Cardiology, Inc.; **219(t)** - Darren Lingard; **219(b)** - ARNO MASSEE / SCIENCE PHOTO LIBRARY; **220(t)** - Cengage Learning; **220(b)** - PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRARY; **221** - Cengage Learning; **222(t)** - Tasneem Alsultan; **222(b)** - Cengage Learning; **223** - Cengage Learning; **224(t)** - Cengage Learning; **224(b)** - Art_Pictures / Shutterstock; **227** - Tasneem Alsultan; **229** - Robert Avgustin/Shutterstock; **239** - Courtesy of KARDEX ® System, Inc., Marietta, OH.; **243** - Tasneem Alsultan; **245(r)** - ©iStock.com/GeoPappas; **245(l)** - RASimon/iStock /Getty Images Plus; **249** - Tasneem Alsultan; **251** - Cengage Learning; **255** - Cengage Learning; **256** - Cengage Learning; **257** - Cengage Learning; **258** - Tasneem Alsultan; **262** - Cengage Learning; **263** - Cengage Learning; **271** - Cengage Learning; **273** - Cengage Learning; **275** - Pepermpron/Shutterstock; **285** - Cengage / photographer Tasneem Alsultan; **286** - Jabhab Media Production/The Stock; **288** - Arnold O. A. Pinto/Shutterstock; **291** - MalikNalik/Shutterstock; **293** - Cengage / photographer Tasneem Alsultan; **295** - Arabsstock; **296** - Cengage / photographer Tasneem Alsultan; **297** - Gecko Studio/Shutterstock